

# جدید رہنمائے ادویہ مکمل

## NEW COMPLETE MEDICINE GUIDE



ڈاکٹر عبدالجبار



# NEW COMPLETE MEDICINE GUIDE

## جدید رہنمائے ادویہ (مکمل)

پینٹ دواؤں پر نئے طرز کی وہ کتاب جس کا ہر ڈاکٹر کے پاس رہنا ضروری ہے۔  
انگریزی آیورویڈک اور یونانی مرکب دواؤں کے بارے میں مکمل معلومات، فوائد،  
مقدار، مضر اثرات، رد عمل، قیمت، کمپنیوں کے پتے وغیرہ۔ غرض دواؤں پر ایسی  
مکمل جامع اور معلوماتی کتاب اردو زبان میں آج تک شائع نہیں ہوئی۔

مصنف:

ڈاکٹر عبدالجبار ایف ایم بی ایس

(ڈانگ، پبلی بھیت، یو پی)

ناشر

گلوبل میڈیا اینڈ پبلیکیشنز

H-7, C، گراؤنڈ فلور، آزاد روڈ، ابوالفضل انکلیو، جامعہ نگر، نئی دہلی۔ ۲۵

فون: 91-11-26323985

E-mail : gmpublications@rediffmail.com



## انتساب-----

وقت کے قدر دانوں کے نام جو ایک ایک لمحے کو خدا کی یاد،  
حصول علم، نیکی و بھلائی کے کاموں پر صرف کرتے ہیں۔

### © جملہ حقوق محفوظ

بلا تحریری اجازت اس کتاب کے کسی حصہ کو پورا یا جز کسی بھی صورت میں  
شائع کرنا، سی ڈی یا کسی دوسرے الیکٹرونک ذریعہ سے محفوظ کرنا سنگین  
جرم ہے۔ اس کا سختی سے قانونی نوٹس لیا جائے گا۔

نئے انداز سے مرتب، اضافہ و ترمیم شدہ ..... چھٹا ایڈیشن 2003ء

نام کتاب :	جدید رہنمائے ادویہ مکمل
مصنف :	ڈاکٹر عبدالجبار ایف ایم بی ایس
تعداد :	گیارہ سو (1100)
صفحات :	800
قیمت :	160 روپے

### ملنے کے دیگر پتے:

ڈاکٹر عبدالجبار، پوسٹ ڈانگ، ضلع پیل بھیت (یو پی) - 262001


**Dr. Abdul Jabbar, P.O. Dang, Distt. Pilibhit (U.P.)-262001**

**مدھر سندیش سنگم** E-20، ابوالفضل انکلیو، جامعہ مگر، نئی دہلی-25

**Madhur Sandesh Sangam**

E-20, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-25 Tel. : 26925152





## ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے

علم الادویہ میں بردن نئی نئی دواؤں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے کچھ دوائیں متروک اور منسوخ ہوتی رہتی ہیں اس لئے اس بات کی ضرورت شدت سے محسوس ہو رہی تھی کہ نئی دواؤں کی مکمل معلومات پیش کی جائیں۔ ہماری پچھلی کتاب جدید رہنمائے ادویہ میں یہ کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی اس لئے قارئین اور کرم فرماؤں کے اصرار پر نئی دواؤں پر ایک الگ کتاب منفرد انداز میں پیش کی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے قارئین کو نہ صرف یہ کتاب پسند آئے گی بلکہ جدید دواؤں کے بارے میں مکمل اور اپ ٹو ڈیٹ معلومات ان کو مل سکے گی۔ اس میں امراض کے تحت الگ الگ نظام جسمانی میں کام آنے والی دواؤں کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ سب سے پہلے دوا کا اصلی نام GENERIC NAME پھر اس کے افعال INDICATION مقدار و ترکیب استعمال DOSAGE مختلف امراض میں ہونے والے منفی افعال CONTRA INDICATION - مضر اثرات SIDE EFFECT احتیاط PRECAUTIONS دواؤں کے ساتھ اس کا رد عمل DRUG INTERACTION تجارتی مرکبات TRADE NAME پیکنگ PACKING اور قیمت PRICE درج کی گئی ہے ساتھ ہی آئیوریدک اور یونانی کی پینٹ دواؤں کا ذکر کیا گیا ہے ہم نے ہر ممکن طریقے سے اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ مفید، معلوماتی اور اپ ٹو ڈیٹ بنانے کی کوشش کی ہے ہم اس میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں اس کا فیصلہ قارئین کریں گے اور اپنی رائے اور مشوروں سے آگاہ فرمائیں گے۔ فن کی اور آپ کی خدمت ہمارا مقصد ہے۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

عبدالجبار



# فہرست مضامین

- (۱) ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے 3
- (۲) ایلو پیتھک دواؤں کی نظام جسمانی، افعال اعضاء کے لحاظ سے ترتیب 5
- (۳) ایوروڈک دواؤں کی نظام جسمانی، افعال اعضاء کے لحاظ سے ترتیب 574
- (۴) یونانی مرکب ادویہ کی امراض کے لحاظ سے ترتیب 624
- (۵) نسخوں میں لکھے جانے والے اشارات ان کی تشریح 701
- (۶) بچوں کی مقدار خوراک 702
- (۷) ادویہ کاری ایکشن، علاج و تدابیر Reaction 703
- (۸) ایام حمل میں دواؤں کے اثرات 704
- (۹) کئی دوائیں ایک ساتھ دینے کے اثرات D/1- 717
- (۱۰) غذاؤں کے ساتھ دواؤں کے اثرات 735
- (۱۱) آکسیجن تھیراپی Oxygen Therapy 741
- (۱۲) میڈیکل آلات۔ ان کے ملنے کے پتے Medical Equipment 742
- (۱۳) دواساز کمپنیوں کے پتے Manufacturers 746
- (۱۴) انگریزی فہرست اصلی (سالت) ایلو پیتھک ادویہ Generic Index 752
- (۱۵) انگریزی فہرست ایلو پیتھک تجارتی مرکبات Trade Index 757
- (۱۶) انگریزی فہرست ایوروڈک پیٹنٹ ادویہ Ayurvedic Index 782
- (۱۷) دواؤں جو بند ہو چکی ہیں De-listed Products 784
- (۱۸) نئی دوائیں چھپتے چھپتے New Products 785
- (۱۹) ایک خوراک میں علاج کی ادویہ Single Dose Treatment 789
- (۲۰) ہیکلیس میں کام آنے والی مفید کتابیں و دوائیں Medical Books 790



## ایلوپیتھک دواؤں کی نظام جسمانی افعال اعضاء کے لحاظ سے ترتیب

نظام ہضم میں کام آنے والی دوائیں ----- 8	خون میں پروٹین کم کرنے والے مرکبات 106
دافع تیزابیت ادویہ ----- 8	وجع القلب (ہارٹ ایک) روکنے والی ادویہ 110
دافع ای بک ڈسنٹری (پچش) ادویہ ----- 16	کیلشیم چینل بلاکر ----- 121
دافع بیکٹریا اور دافع پروٹوزوا ادویہ ----- 23	ناٹھریٹ کے مرکبات ----- 130
آنتوں کی حرکات کو مست کرنے والی ادویہ -- 28	حرکات قلب کی بے ترتیبی دور کرنے والی دوائیں 132
دافع بواسیر مراہم ----- 30	ہائی بلڈ پریشر روکنے والی ادویہ ----- 137
دافع درد شکم ادویہ ----- 33	کیلشیم چینل بلاکنگ ایجنٹ ----- 143
زخم معدہ میں کام آنے والی ادویہ ----- 37	سنٹرل ایڈری نرجک ان ہی بی ٹر ----- 145
رطوبات معدہ روکنے والی ادویہ ----- 42	پیری فیمل ایڈری نرجک ان ہی بی ٹر --- 148
انزائم اور ہاضم دوائیں ----- 46	پیشاب آور (مدر بول) ادویہ ----- 149
جگر پتہ بانقرا اس کی ادویہ ----- 53	قلبی حرکات کو کنٹرول کرنے والے مرکبات --- 156
حرکات معدہ کو کنٹرول کرنے والی ادویہ -- 56	عروق کو کشادہ کرنے والی ادویہ ----- 159
ملین امعاء اور مسہل ادویہ ----- 59	عروق کو تنگ کرنے درد شقیہ روکنے والی ادویہ 166
مرخی و مسکن دوائیں ----- 62	سن اور بیہوش کرنے والی دوائیں ----- 169
نظام دوران خون پر اثر انداز ہونے والی ادویہ --- 70	سو نگھا کر بیہوش کرنے والی دوائیں ----- 171
انجماد خون روکنے والی ادویہ ----- 70	نیند آور۔ بیہوشی طاری کرنے والے انجکشن - 173
خون محفوظ رکھنے والے سلوشن ----- 72	دافع الرجی (حساسیت) ادویہ ----- 176
جریان خون روکنے والی ادویہ ----- 80	دورہ روکنے والی ادویہ ----- 191
پلازما (ماء الدم) کی کمی دور کرنے والی ادویہ --- 89	دافع قے و چکر روکنے والی ادویہ ----- 199
ویکسین و سیرم تھیراپی ----- 91	دافع پارکن سنز ڈیزیز ادویہ ----- 207
تریاقی مرکبات ----- 103	دافع بخار و مسکن درد ادویہ ----- 215



- 390 ----- خوردنی دافع ذیابیطس ادویہ ----- 216 افیون والے دافع درد مرکبات -----
- 397 ----- کارٹی سون کے مرکبات ----- 223 مرکزی نظام عصبی کو متحرک کرنے والی ادویہ -----
- 404 ----- غدہ درقیہ اور انٹی غدہ درقیہ والی ادویہ -- 226 نشہ کی عادت چھڑانے والی ادویہ -----
- 407 ----- ورم تھج دور کرنے۔ جراثیم کش مدربول مرکبات ----- 229 نفسیاتی الجھن دور کرنے والی ادویہ -----
- 422 ----- آلات بول (گردہ مثانہ) کی مسکن ادویہ ----- 231 گھبراہٹ دور کرنے والی ادویہ -----
- 427 ----- جسم میں پانی نمکیات کی کمی دور کرنے والی ادویہ - 241 مسکن دماغ و اعصاب دوائیں -----
- 434 ----- دافع وجع المفاصل (گٹھیا) ادویہ ----- 252 مسکنات منومات (نیند آور) ادویہ -----
- 436 ----- مرخی عضلات (پٹھوں کو نرم کرنے والی ادویہ - 258 جراثیم کش انٹی بائیوٹک دوائیں -----
- 445 ----- محرک اعصاب و عضلات ادویہ ----- 307 پینی سیلین کے مرکبات -----
- 446 ----- غیر کارٹی سون والی دافع درد دورم NSAID ادویہ - 313 سلفونامائیڈ کے مرکبات -----
- 464 ----- طاقت بخش مرکبات ----- 318 دافع کینسر ادویہ -----
- 465 ----- مشہمی (بھوک بڑھانے والی) ادویہ --- 335 مدافعتی نظام پر اثر کرنے والی ادویہ -----
- 466 ----- مولد خون، فولاد کے مرکبات ----- 337 دافع فائیلیریا اور دافع ویدان امعاء ادویہ -----
- 470 ----- پروٹین و خلاصہ جگر کے مرکبات ----- 345 دافع فٹلس دوائیں -----
- 471 ----- وٹامن کے مرکبات ----- 351 دافع جذام مرکبات -----
- 477 ----- کیمیشیم کے مرکبات ----- 353 دافع ملییریا ادویہ -----
- 480 ----- دافع فربہی (موہناپا دور کرنے والی) مرکبات - 359 دافع پروٹوزوا (اجسام طفلیہ) ادویہ -----
- 481 ----- شکر کے متبادل مرکبات ----- 364 دافع ٹی بی مرکبات -----
- 482 ----- مصنوعی جنسی ہارمون ----- 373 دافع وائرس ادویہ -----
- 498 ----- قاتل کرم منی ادویہ ----- 376 دافع زہر تریاقی مرکبات -----
- 499 ----- محرک و مسکن رحم ادویہ ----- 379 معاون تشخیص مرکبات -----
- 507 ----- خوردنی مانع حمل ادویہ ----- 383 اندرونی غد کو تحریک دینے والے ادویہ -----
- 508 ----- دافع مہلیی انفلکشن ادویہ ----- 387 دافع ذیابیطس ادویہ -----





- 518 پھیپھڑوں کی عروق کو کشادہ کرنے والی ادویہ --
- 527 کھانسی نزالہ زکام (حساسیت کے سبب) کی ادویہ
- 534 محرک اعضائے تنفس ادویہ -----
- 536 سرجری میں کام آنے والی ادویہ -----
- 537 ڈریسنگ میں کام آنے والے مرکبات -
- 539 دانتوں کے امراض میں کام آنے والے ادویہ -
- 540 ناک کے امراض کی دوائیں -----
- 541 حلق کے امراض کی دوائیں -----
- 542 امراض کان کی دوائیں -----
- 544 آنکھوں میں کام آنے والے مرکبات -
- 546 دافع گلو کو مائیلی سکیٹر نے والی ادویہ -----
- 547 پتلی پھیلا نے اور حرکت روکنے والی ادویہ
- 551 بیرونی امراض جلد کی دوائیں -----
- 554 دافع قنکس (بیرونی) دوائیں -----
- 567 جلد کو ملائم اور تسکین دینے والے مرکبات -
- 567 اسنیر انڈوالے بیرونی مرکبات -----
- مرکب ایورویدک دواؤں کی نظام جسمانی افعال
- 574 اعضاء کے لحاظ سے ترتیب -----
- مرکب یونانی دواؤں کی نظام جسمانی افعال اعضاء
- 624 کے لحاظ سے ترتیب -----



# نظام ہضم میں کام آنے والی دوائیں

## ALIMENTARY SYSTEM

### دافع تیزابیت PLAIN ANTACID

SODIUM BI CARBONATE

سوڈیم بائی کاربونیٹ

MAGNESIUM TRISILICATE

میکینیشیم ٹرائی سیلیکیٹ

ALUMINUM HYDROXIDE

الومینیم ہائیڈروکسائیڈ

ALGINIC ACID

الگیک ایسڈ

**افعال و منافع INDICATION:** یہ دوائیں معدہ میں تیزابیت کی زیادتی، معدہ میں خراش جلن زخم اور نفخ شکم میں مفید ہیں۔

**مقدار و ترکیب استعمال DOSAGE:** اسے ۲ گولی یا ۲ چمچے پانی میں ملا کر دن میں ۳-۵ بار

**منفی افعال مختلف امراض میں CONTRA INDICATION:** ورم زائدہ اعور۔ گردوں کی خرابی خون میں فاسفیٹ کی زیادتی میں۔

**مضرات اثرات SIDE EFFECT:** قبض پیدا کرتے ہیں خصوصاً میکینیشیم ٹرائی سیلیکیٹ۔

**احتیاط PRECAUTION:** گردوں کی کمزوری۔ گردے فیل ہو جانے میں میکینیشیم کے مرکبات استعمال نہ کریں۔

**دواؤں کے ساتھ رد عمل DRUG INTER ACTION:** ٹھنڈا سا نکلین۔ فولاد کے مرکبات کے جذب و ہضم میں خلل واقع ہو سکتا ہے۔ ڈیجاکسن۔ آئی سو نیازائیڈ اور فینوتھیازائیڈ کے اثرات کم ہو جاتے ہیں۔



## تجارتی مرکبات

- ACIDIN** (EAST INDIA) ایسی ڈین  
Mag.carb. 165 mg, dried alum. hydrox. gel 232 mg, cal. carb. 165 mg, sod. bicarb. 82 mg, light kaolin 105 mg, belladonna herb 0.03 mg; tabs. 10 Rs. 1.16
- ACIGON** (BOEHRINGER) ایسی گون  
Alginic acid 0.2 g, dried Aluminium Hydroxide gel 80 mg, Magnesium trisilicate 40 mg, Sodium bicarbonate 70 mg. chewable Tabs: 10: Rs. 3.25
- ACIGON SUSP** (BOEHRINGER) ایسی گون سیرپ  
Sod. alginate 0.44g, Dried alum. hydrox gel 0.16g, mag. trisilicate 80mg, sod. bicarb 0.14 per 10 ml, susp. 150ml Rs. 13.90
- ALUDROX** (WYETH) الوڈروکس  
Dried alum. hydrox gel 840mg, tabs 50: Rs. 10.33 180: Rs. 28.83 Alum. hydrox. 610 mg/10ml 200ml: Rs. 14.80
- ALUDROX-GEL** (WYETH) الوڈروکس جیل  
Dried alum. hydrox gel 300mg, Mag. hydrox 83mg, tabs 50: Rs. 8.41 300: Rs. 34.44
- ALUDROX-MH GEL** (WYETH) الوڈروکس ایم ایچ جیل  
Alum. hydrox. 610mg, mag. hydrox 200mg/10ml, 200ml: Rs. 10.62
- GAVISCON** (RECKITT COLMAN) گیوی کان  
Alginic acid 500mg, mag. trisilicate 25mg, Dried alum. hydrox gel 100mg, Sod. bicarb. 170mg, 8 tabs: Rs. 10.53
- KLARCID** (KLAR SEHEN) کلار سیڈ  
Dried alum. hydro. gel I.P. 250 mg, mag. hydrox B.P. 250 mg, activated dimethicone I.P. 50 mg, tabs strip of 10's Rs. 2.70
- MAGININE** (J&J DECHANE) میگ نین  
Dried alum. hydrox. gel I.P. 125 mg, mag. hydrox B. P. 250 mg. ext. Belladonna Dry IP 5mg tabs; strip of 10's Rs. 15.10; 500 tabs Rs. 46.40
- RAFTACE LIQUID** (MERIND) رف ٹیس  
Sodium Aliginate 200mg, Magnesium Trisilicate 125mg, Dried alum. hydrox. gel 300mg per 10ml; Bottle 180mg Rs. 19.71



**RAFTACE TABS (MERIND)**

Aliginic acid 500mg, Dried alum. hydrox gel 100mg, magnesium trisilicate 25mg, Sod. bicarbonate 170mg tabs; 10 Rs. 13.50

رف ٹیس ٹبلٹ

**RIFLUX LIQUID (SOL)**

Sod. alginate 200mg, dried Alum.hydrox gel 300mg, mag. trisilicate 125mg per 10ml, 200ml, Rs. 16.60; 400ml, Rs. 29.90

رف لیکس

**RIFLUX FORTE (SOL)**

Aliginic acid 200mg, Mag. hydrox 150mg, dried alum. hydrox gel 300mg, sod bicarb 70mg, tabs 20x6 Rs. 66.00

رف لیکس فورٹ

**RIFLUX (SOL)**

Aliginic acid 200mg, Dried alum. hydrox gel 80mg, sod. bicarb 70mg Mag. trisilicate 20mg, tabs 20x12, Rs.96.00

رف لیکس

**ANTACID With ANTIFLATULENTS**

DIMETHICONE

METHYL POLYSILOXANE

SIMETHICONE

ڈائی میتھی کون  
میتھائل پالی سلوکسین  
سیکی تھی کون

افعال و منافع: تیزابیت کی زیادتی معدہ میں خراش جلن، زخم معدہ، نفخ شکم، درد شکم معدہ کا زیادہ پھیل جانا، اور ACIDITY میں مفید و موثر ہیں۔

مقدار خوراک: ۱ سے ۲ گولی یا ۵ سے ۱۰ ملی لٹر دن میں ۳-۴ بار استعمال کرائیں۔

مضر اثرات: قبض ہو سکتا ہے۔

**تجارتی مرکبات****ACIDIN-MPS (EAST INDIA)**

ایسی ڈین ایم پی ایس

Dried alum. hydrox gel 250 mg, mag. hydrox, 225mg, cal. carb. 200mg, activated dimethicone 75mg; tabs, 10 Rs. 1.71

**ACIDIN-MPS GEL (EAST INDIA)**

ایسی ڈین ایم پی ایس جیل

Dried alum.hydrox. gel 250 mg, mag, hydrox. 250mg, activated dimethicone 125 mg per 10 ml : 175ml, Rs. 12.73



- ALLUJEL DF** (UNICHEM) الوجل ڈی ایف  
Dried alum. hydrox. gel 400 mg, mag. hydrox. 400 mg, methyl polysilox 30 mg per 10 ml susp. 210 ml: Rs. 8.10
- ALMACARB** (GLAXO) الماکارب  
Dried alum. hydrox. gel 325mg, mag. carb. 50mg, methylpolysilox 40mg, deglycyrrhizinated liquorice 380 mg, tabs: 10: Rs.2.77
- ALMAGEL** (IDPL) الما جیل  
Dried Alum. hydrox.gel 250mg, Mag. hydroxide 250mg, Methyl polysiloxane 10mg, Tabs. 10: Rs. 150
- ALUCINOL** (FRANCO INDIAN) الوسی نال  
Dried Alum. Hydrox. gel 300mg, Mag. hydroxide 300mg, Activated methyl polysiloxane 25mg, Tabs. 10: Rs. 2.48
- ALUCINOL SUSP** (FRANCO INDIAN) الوسی نول سرپ  
Alum hydrox. gel 600mg, Mag. hydrox 50mg/10ml. 170 ml Rs.12.35
- ALUPROGEL** (REMEDIES INDIA) الوپرو جیل گولی سرپ  
**FORT/SUSP/TABS**
- Dried Alum hydrox.Gel 400mg, Mag. hydrox 400mg, sinethicone 50mg per 10ml: 200ml Rs. 14.95; 10 tabs Rs. 3.39
- CENOLCID GEL** (CARMNOL LABS) سی نول سڈ جیل  
Dried aluminium hydroxide IP 300mg, magnesium hydroxide NF 300mg, activated dimethicone 25mg, sorbitol soln. 70% IP 200mg, per 10ml, 200ml Rs. 14.40.
- DIMOL** (WALLACE) ڈائی مول  
Activated dimethicone 40mg, Tabs 10: Rs. 3.50 500: Rs. 60.00
- DIMOL SUSP** (WALLACE) ڈائی مول سرپ  
Activated dimethicone 200 mg per 5ml, 60ml: Rs.12.96
- DIOVOL FORTE DGL**(WALLACE) ڈائی وول  
Dried alum. hydrox gel 300mg mag. hydrox 250mg Activated dimethicone 40mg deglycyrrhizinated liquorice 400mg /5ml susp 175ml: Rs.17.80
- DIOVOL FORTE SUSP** (WALLACE) ڈائی وول فورٹ سرپ  
Dried alum. hydrox. gel 300mg Mag. hydrox 250mg Activated dimethicone 40mg per 5ml 175ml: Rs. 19.20 450ml: 28.20



**DIOVOL FORTE TABS**(WALLACE)

ڈائی وول فورٹ ٹبلیٹ

Dried alum. hydrox gel 300mg Maghydrox 250mg activated dimethicone 40mg. Tabs 10: Rs. 2.65.

**DISILOX MPS**

(STADMED)

ڈائی سی لاکس ایم پی ایس ٹبلیٹ

Dried Alum. hydrox. gel 250mg, Mag. hydroxide 250mg, Methyl polysiloxane 50mg Tabss; 10. Rs. 1.44: 1000: Rs.65.38

**DISILOX MPS SUSP** (STADMED)

ڈائی سی لاکس ایم پی ایس سرپ

Dried Alum. hydrox. gel 250mg, mag. hydroxide 250mg, methyl polysiloxane 50mg per 5ml. 170ml Rs. 10.50, 400ml Rs. 21.75

**DISOGEL SUSP**

(CONCEPT)

ڈائی سو جیل سرپ

Alum. hydrox. gel 250mg, mag. hydroxide 250mg liquorice (deglycyrrhizinated 400mg dimethyl polysiloxane 40mg per 5ml susp 175ml Rs. 18.95, 450ml: Rs. 43.00

**DISOGEL TABS**

(CONCEPT)

ڈائی سو جیل ٹبلیٹ

Alum. hydrox. gel 250mg, mag. hydroxide 250mg liquorice (deglycyrrhizinated 400mg dimethyl polysiloxane 40mg Tabs 10 tabs Rs.3.40

**DISTENIL**

(SUN PHARMA)

ڈسٹینل

Simethicone 80mg Activated charcoal 400mg dual coated tabs; 6 tabs Rs.9.00

**EMBESIL GEL**

(RHONE-POULENC)

ایم بی سل

Dried alum hydrox 250mg Mag. hydrox 250mg activated polydimethylsiloxane 50mg/5ml 170ml: Rs.9.74

**GETOSIL PLUS SUSP** (FALMA LABS)

گیٹو سیل پلس سرپ

Dried alum hydrox gel 600mg, Mag. trisilicate 300mg, mag. hydroxide 200mg, dimethyl polysiloxane 50mg/10ml susp; 110ml Rs.12.85

**LOGASCID**

(ASTRA-IDL)

لوگاسڈ

Dried alum. hydrox. gel 200mg mag. hydrox 200mg Methyl polysiloxane 20mg 10tabs: Rs.1.52: 500tabs; Rs.48.57

**LOGASCID SUSP**

(ASTRA-IDL)

لوگاسڈ سرپ

Dried alum. hydrox gel 200mg, Mag. hydrox 200mg, Activated dimethicone 20mg/5ml 200ml: Rs.15.21 400ml: Rs.21.44



**LOGASCID FORTE** ASTRA IDL

لوگاسڈ فورٹ

Dried alum. hydrox gel 400mg mag. hydrox 400mg, methyl polysiloxane 50mg 10tabs: Rs.2.00

**MAGEL-MPS** (EUPHORIC)

مے جل

Simethicone 60mg & magaldrate 400mg tabs; 150ml & 450ml suspension  
Price N/A.

**ORBITS** (PHARMED)

آربٹ

Activated methylpolysilox 30 mg, mag. hydrox 200mg, alum hydrox gel per 10ml; Gel 200ml : Rs. 15.69

**PARACTAL** (GERMAN REMEDIES)

پراکٹال

Polymethyl silox 250mg, Dried Alum. hydrox gel 500mg tabs 6 tabs Rs.3.17

**PEPTICA** (GENO)

پپٹیکا

Dried Alum. hydrox. gel 300mg, Mag. Trisilicate 200mg Dimethyl polysilox 20mg Diazepam 2mg tabs; 10 Rs.3.00; 500 Rs.80.00

**PFT** (NICHOLAS)

پی۔ ایف۔ ٹی

Activated dimethicone 125mg, Mag hydrox 400mg, Tabs 10, Rs. 4.46

**pH4** (BIOLOGICAL E.)

پی۔ ایچ۔ فور

Magaldrate 800mg, activated dimethicone 50mg, tabs: 10: Rs.5.45

**pH4 SUSP** (BIOLOGICAL E.)

پی۔ ایچ۔ فور

Magaldrate 480mg, activated simethicone IP 20mg colour tartrazine per 5ml susp.230ml syrup Rs.21.50

**POLYCROL FORTE GEL** (NICHOLAS)

پولی سرال

Activated dimethicone 125mg, Mag, hydrox 100mg, Alum. hydrox gel 5g per 5ml, syrup 200ml, Rs. 18,20; 450ml: Rs.33.50

**POLYCROL FORTE** (NICHOLAS)

پولی سرال فورٹ

Activated dimethicone 125mg, Mag, hydrox 400mg, Dried alum. hydrox gel 400mg, tabs 10, Rs.4.02

**PROPAMID-MPS** (CFL)

پروپامڈ

Activated dimethicone 125mg, Metoclopramide 5mg, Chewable Tabs 10, Rs.7,55

**ROLAC PLUS** (WYETH)

رولیک پلس

Magaldrate 480mg simethicone 20mg tabs 10 tabs Rs. 5.70



- ROLAC** (WYETH) رولیک  
Magaldrate 480 mg; Tabs 10: Rs.5.35
- RELCER GEL** (GLENMARK) ریلر  
Alum. hydrox. gel 6G, Mag. hydroxide 80mg, activated dimethicone 100mg, deglycyrrhizinated liquorice equi. to liquorice equi. to liquorice 400mg per 5ml gel 180ml Rs. 16.69
- SANZYME DS TABS** (UNI-SANKYO) سن زائم ڈی ایس  
Dried alum. hydroxide gel 250mg, mag. hydroxide 150mg, sodium bicarbonate 150mg, simethicone 30mg, fungal diastase (1:1000) 25mg; tabs: 10 Rs.7.42
- SILOX FORTE GEL** (SEARLE) سی لاکس فورٹ جیل  
Dried alum hydrox gel 300mg Mag hydrox 150mg simethicone 125mg. per 5ml; susp gel 200ml. Rs. 13.68
- SILOXOGENE** (SEARLE) سی لاکسو جین  
Dried alum. hydrox. gel 300mg, mag. hydrox 150mg, activated dimethylpolysilox. 40 mg; tabs: 10: Rs. 1.79, 500: Rs. 46.64
- SIMECO SUSP** (WYETH) سی می کو سرپ  
Alum. hydrox. gel 215 mg, mag. hydrox 80mg, Dimethyl polysilox 25mg per 5ml susp; 200ml Rs. 13.37
- SIMECO TABS** (WYETH) سی می کو ٹبلیٹ  
Dried Alum. hydrox. gel 300mg, mag. hydrox 83 mg, Dimethyl poly silox 25mg tabs; 10 Rs. 2.13
- SLOLACID SUSP/TABS** (DEYS) سولاسٹ  
Dried alum. hydrox. gel 300mg, mag. trisilicate 150 mg, mag. hydrox. 100mg simethicone 25mg per 5ml susp; 170ml Rs. 14.05; 340ml Rs.25.00; tabs 10, Rs.2.80
- SOLACID-O-SUSP** (DEYS) سولاسٹ او سرپ  
Dried alum. hydroxide gel 300mg, mag. trisilicate 150mg, mag. hydroxide 100mg, simethicone 25mg, oxethazone 10mg per 5ml susp. 170ml Rs.24.75
- SORBACID** (ALKEM) سوربانڈ  
Dried alum. hydrox gel 500mg, Dimethicone 25mg, sorbitol (70%) 125mg tabs 10, Rs.3.00



**SORBACID GEL (ALKEM)**

سوربا سڈ جیل

Magnesium hydrox 200mg, Dimethicone 25mg, sorbitol soin (70%) 125mg.  
per 5ml susp 200ml, Rs. 16.50

**ULGEL SUSP/TABS (DABUR)**

اُل جیل سرپ ٹبلٹ

Magaldrate 400mg, simethicone 20mg/5ml susp. 170ml: Rs.20.50, 450ml:  
Rs.39.95, tabs: 10: Rs.4.25

**ULTRACAIN GEL (BLUE CROSS)**

الٹرا کین

Dried Alum hydrox gel 400mg, mag hydrox 400mg, simethicone 50mg  
lidocaine 10mg per 5ml susp 200ml: Rs.22.50

**VISCID (INDOCO)**

وس کڈ

Dried alum. hydrox. gel 250mg, mag. hydrox. 250mg, dimethyl polysilox  
40mg, deglycyrrhizinated liquorice 400mg per 5ml susp: 200ml: Rs.17.23

**OXYTHAZINE** آکسائی تھازین

افعال منافع: زخم معدہ، ورم معدہ، ورم مری، معدہ کا منہ پھیل جانا، فم معدہ کی جلن حاملہ کی شکمی  
تکالیف میں مفید ہے۔

مقدار خوارک: ۵ سے ۱۰ ملی لٹر دن میں ۴ بار کھانے سے پہلے اور سوتے وقت۔

منفی افعال: ورم زائیدہ عور اور خون میں فاسفیٹ کی کمی میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: چکر آنا، خشکی، منہ خشک ہو جاتا ہے۔

احتیاط: حمل کے پہلے ہفتہ اور کیمنس کی تشخیص کے دوران احتیاط برتیں۔

**تجارتی مرکبات****CATOXYMAG-O-GEL (RAPTAKOS)**

کیٹوکسائی میگو جیل

Dried alum. hydrox. gel 400mg, mag. trisilicate 400mg, mag. hydrox.  
150mg, simethicone 25mg, oxethazine 10mg, per 5ml gel; 200ml: Rs.11.50

**MUCAIN (WYETH)**

میو کین

Oxethazine 10mg, alum. hydrox 0.291gm, mag. hydrox 98mg/5ml, 200ml:  
Rs.26.21



**PEPTICAINE**

(PARKE DAVIS)

پیپ ٹی کین

Oxethazine 10mg, mag. hydrox 250mg, dried alum hydrox gel 250mg, activated methyl poly siloxane 50mg per 5ml, Liq. 120ml Rs. 20.91

**TRICAINE MPS**

(SEARLE)

ٹرائی کین

Oxethazine 10mg, polysiloxane 125mg, alum hydrox equiv. to dried alum. hydrox gel 300mg, mag hydrox gel 150mg per 5ml, susp 200ml Rs. 25.75

**ANTIAMOEBIK****دافع امیبک ادویہ****METRINIDAZOLE**

میٹری نائی ڈازول

افعال و منافع: امیبا اور گیارڈا کے سبب ہونے والی پیچش اور دستوں کے لئے مانی ہوئی دوا ہے۔ انٹی می باہسٹولیکا سے پیدا ہونے والے امراض امیبائی پیچش، ورم جگر، جگر کے پھوڑے (دبیلہ) میں مفید ہے۔ مقدار و ترکیب: امیبائی امراض میں ۴۰۰ ملی گرم دن میں ۳ بار ۵ سے ۷ دن تک گیارڈا انفکشن میں ۴۰۰ ملی گرم دن میں ۳ بار ایک ہفتہ کھلائیں۔ ۲ سے ۷ سال کے بچوں کو ۵ ملی لٹر دن میں ۳ بار ۸ سے ۱۰ سال کے بچوں کو ۱۰ ملی لٹر دن میں ۳ بار۔

منفی اثرات: نظام عصبی کے امراض میں، حساسیت رکھنے والوں میں حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں، خون کی خرابی، میں استعمال نہیں کرانا چاہیے۔

مضر اثرات: معدہ امحاک حرکت دود یہ میں خلل، زبان میلی، ذائقہ خراب، خون کے سفید ذرات میں کمی۔ پتی اچھلانا (شرئی) جلد پر تھج ورم Oedema ہونا، نظام عصبی میں خلل پیشاب سیاہ، طویل علاج سے مرگی جیسے دورے پڑنا۔

احتیاط: ایام حمل اور ہائی بلڈ پریشر میں مقدار خوراک کم رکھیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، خوردنی مانع انجماد خون ادویہ، فینو باربی ٹون، سی می ٹی ڈین، فین نائن، اور ڈائی سلفی رم کے ساتھ خراب رد عمل ہو سکتا ہے۔



## تجارتی مرکبات

<b>ABDOGYL-N</b>	(BIDDLE-SAWYER)	ابڈو جی
Metronidazole 200mg, nalidixic acid 300mg: tabs: 6: Rs.25.50		
<b>ABDOGYL-N SUSP</b>	(BIDDLE SAWYER)	ابڈو جی سرپ
Metronidazole 200mg, nalidixic acid 300mg per 5ml susp: 30ml: Rs.23.50		
<b>ALDEZOLE I.V.</b>	(ALBERT DAVID)	الڈی زول وریدی
Metronidazole 500mg per 100ml inj. 100ml: Rs. 13.33		
<b>ALDIAMYCIN</b>	(ALKEM)	الڈیامائی سین
Metronidazole 100mg, furazolidone 30mg per 5ml susp: 60ml: Rs.15.90		
<b>ALFUMET</b>	(ALBERT DAVID)	الفومٹ
Metronidazole 200mg, furazolidone 100 mg, methylpolysiloxane 50mg; tabs: 10 Rs.4.10 Susp: Metronidazole 100mg, furazolidone 30mg, light kaolin 1g, pectin 50mg, per 5ml susp: 60ml: Rs.8.78		
<b>ANGYL</b>	(EUPHORIC)	این جی
Metronidazole 200mg & 400mg tabs; Price N/A.		
<b>ARISTOGYL PLUS</b>	(ARISTO)	اریسٹو جی پلس
Metronidazole 400mg diloxanide furoate 500mg simethicone 100mg tabs 10: Rs.15.33		
<b>BACIGYL TABS</b>	(ARISTO)	بی سی جی ٹبلیٹ
Metronidazole 200mg, nalidixic acid 300mg: tabs:10: Rs.33.37		
<b>BACIGYL SUSP</b>	(ARISTO)	بی سی جی سرپ
Metronidazole 100mg, nalidixic acid 100mg per 5ml susp. 40ml : Rs.22.75		
<b>Dependol</b>	Metronidazole 200mg	ڈی پنڈال
<b>DINITE SUSP</b>	(SEARLE)	ڈائی نائٹ سرپ
Diloxanide furoate 100mg metronidazole benzoyloxylate equiv: to metronidazole 300mg per 5ml susp 50ml: Rs9.91		
<b>DYSFUR-M SUSP</b>	(BIOLOGICAL E)	ڈائی سفر سرپ
Furazolidine IP 30mg, metronidazole IP 100mg per 5ml susp: 50ml Rs.6.67		
<b>DYSFUR-M</b>	(BIOLOGICAL E)	ڈائی سفر ٹبلیٹ
Furazolidine IP 100mg, metronidazole IP 300mg tabs 10, Rs.6.91		
<b>ENDAR SUSP</b>	(MAGNACHEM)	انڈار سرپ
Metronidazole Benzoate 160mg, furazolidone 30mg per 5ml susp; 60ml Rs.13.00		



<b>ENDAR TABS</b>	(MAGNACHEM)	انڈار ٹبلٹ
Metronidazole 100mg, furazolidone 30mg tabs; 10tabs	Rs.12.00	
<b>ENTAMIZOLE</b>	(BOOTS)	انٹامی زول
Diloxanide furoate 250mg, Metronidazole 250mg tabs 6:	Rs.3.84	
<b>FALMOGYL TABS</b>	(FALMA LABS)	فالموجل ٹبلٹ
Metronidazole 200mg & 400mg tabs; 200mg: 10	Rs.4.00; 400mg 10	Rx.6.44
<b>FALMOGYL SUSP</b>	(FALMA LABS)	فالموجل سرپ
Metronidazole (as benzoate) 200mg/5ml susp 60ml:	Rs. 12.85	
<b>FLAGYL</b>	(RHONE-POULENC)	فلے جل
Metronidazole 200mg, 400mg tabs 200mg: 10:	Rs.3.94 500: Rs.117.34	
400mg: 10: Rs. 6.57 500: Rs. 211.22		
<b>FLAGYL SUSP</b>	(RHONE-POULENC)	فلے جل سرپ
Benzoyl metronidazole equiv to metronidazole 200mg per 5ml susp 30ml:		
Rs. 7.61 60ml: Rs.11.98		
<b>FLAGYL I.V INJ</b>	(RHONE-POULENC)	فلے جل بوٹل
Metronidazole 500mg per ml inj. 100ml bottle:	Rs.16.18	
<b>FLAGYL-DF</b>	(RHONE-POULENC)	فلے جل ڈی ایف
Metronidazole 400mg diloxanide furoate 500mg tabs 15:	Rs.20.99	
<b>FLAGYL-F SUSP</b>	(RHONE-POULENC)	فلے جل ایف سرپ
Metronidazole 100mg furazilidone 30mg per 5ml :	Rs.9.60	
<b>FLAGYL F TABS</b>	(RHONE-POULENC)	فلے جل ایف ٹبلٹ
Metronidazole 400mg furazolidone 100mg: tabs 10:	Rs9.33	
<b>FORTEZOLE MF</b>	(PFIMEX)	فورٹی زول
Metronidazole (as benzoate) 400mg, furazolidone 100mg; tabs; 10 x 10:		
Rs.107		
<b>FORTEZOLE MF SUSP</b>	(PFIMEX)	فورٹی زول سرپ
Metronidazole 100mg, furazolidone 30mg per 5ml susp: 60ml:	Rs.10.50	
<b>IVEMETRO INFUSION</b>	(TORRENT)	آئی وی میٹرو
Metronidazole 5mg per ml inj. 100ml:	Rs. 14.31	
<b>KENTROQUIN</b>	(KENT)	کین ٹرو کوئن
Metronidazole 200mg, Diiodohydroxy quinoline IP 250mg tabs; Price N/A.		
<b>LUMIGARD</b>	(SIGMA LABS)	لومی گارڈ
500mg: tabs: 6	Rs. 5.80	



**LUMIGARD FORTE** (SIGMA LABS)

لومی گارڈ فورٹ

Diloxanide furoate 500mg, metronidazole 400mg: tabs: 6: Rs.9.00

**MEGYL-F** (INDOCO)

مے جل

Furazolidone 30mg, metronidazole 100mg per 5ml surup: 60ml: Rs.12.00

**METRINA TABS** (LIFE)

میٹری نا

Metronidazole I.P. 200mg 7 400mg tabs; 200mg: 10, Rs.5.68; 400mg: 10, 10.08

**METRINA PLUS TABS** (LIFE)

میٹری نا پلس

Metronidazole I.P. 200mg, Diloxanide furoate 250mg tabs; 10tabs Rs. 10.15

**METROGYL** (UNIQUE)

میٹرو جل

Metronidazole benzoylozylate equib to metronidazole 200mg per 5ml susp 30ml : Rs.7.74 60ml: 12.28

**METROGYL COMP.** (UNIQUE)

میٹرو جل کمپوٹ

Metronidazole 400mg diloxanide furoate 500mg tabs 15: Rs.18.34; 100: Rs.120.49

**METROGYL-F TABS** (UNIQUE)

میٹرو جل ٹبلیٹ

Metronidazole 400mg, furazolidone 100mg, tabs: 10: Rs.6.99

**METTOGYL-F SUSP** (UNIQUE)

میٹرو جل سرپ

Metronidazole 200mg, furazolidone 40mg per 5ml susp: 30ml: Rs.7.77, 60ml: Rs.12.34

**METRON** (ALKEM)

میٹرون

Metronidazole 200mg tabs 10: Rs. 4.65

**METRON FORT** (ALKEM)

میٹرون فورٹ

Metronidazole 400mg tabs 10: Rs.8.05

**METRON SUSP** (ALKEM)

میٹرون سرپ

Metronidazole (as benzoyloxylate) 100mg per 5ml susp 60ml: Rs.10.45

**METRON-DF** (ALKEM)

میٹرون ڈی ایف

Metronidazole 400mg diloxanide furoate 500mg tabs 10: Rs.16.20

**MEXOGIL-F SUSP** (KANPHA)

مکسو جل ایف سرپ

Metronidazole benzoate I.P equi. to Metronidazole 100mg, furazolidone I.P. 25mg, flavoure vehicle q.s. per 5ml: 60ml: Rs.11.95



**PAKDIA SUSP**

(PREM PHARMA)

Metronidazole 100mg, furazolidone 30mg per 5ml susp: 50ml bottle;  
Rs.12.30

پکڈیا سرپ

**PREMEZOL INJ**

(PREM PHARMA)

Metronidazole 2mg, Dextrose 5% per ml; 500ml Rs. 35.00

پری می زول انجکشن

**PREMOGYL INJ**

(PREM PHARMA)

Metronidazole 5mg per ml; 100ml Rs.16.50

پری مو جیل انجکشن

**TWINDIX KID TABS**

(MAYO)

Metronidazole 100mg Nalidixic acid 150mg dispersible kid tabs 10:  
Rs.26.00

ٹون ڈکس

**TWINDIX SUSP**

(MAYO)

Metronidazole 100mg Nalidixic acid 150mg per 5ml susp 30ml: Rs 21.00

ٹون ڈیکس سرپ

**TWINDIX TABS**

(MAYO)

Metronidazole 200mg nalidixic acid 300mg: tabs10: Rs.36.00

ٹون ڈکس ٹبلیٹ

**TINIDAZOL**

## ٹنائی ڈازول

افعال و منافع: امیبا انفکشن سے ہونے والے امراض، امیبائی پچش، امیبائی ورم جگر آپریشن سے ہونے والے اثرات، سے محفوظ رہنے کے لیے مفید موثر ہے۔

مقدار و ترکیب استعمال: ۲ گرام پہلی خوراک پھر ایک گرام یا ۵۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار ۵ سے ۷ دن تک حفظ مائتہم کے لیے ۲ گرام پہلی خوراک آپریشن سے ۱۲ گھنٹہ پہلے۔ مہیلی انفکشن میں ۲ گرام پہلی خوراک دی جائے۔ ڈلوکسامائیڈ اور نارفلکساسین کے ساتھ یہ عمدہ کام کرتی ہے۔

منفی افعال: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں، ایام رضاعت میں، خون کی خرابی میں، عصبی خرابیوں میں۔

مضر اثرات: متلی، تے، زبان میلی، ذائقہ خراب، ہضم کی خرابیاں، خون کے مفید ذرات میں کمی جلد، داغ پڑنا، پتی اچھلنا (شرئی) چکتے پڑنا، عصبی خلل، پیشاب سیاہ آنا، طویل مدت تک علاج میں مرگی جیسے دورے پڑنا۔

احتیاط: حمل اور جگر کی خرابی میں۔



دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، مانع انجماد خون ادویہ، دافع مرگی ادویہ، ڈائی سلفورم سی می ٹی ڈین، لیٹھیسم کے ساتھ استعمال خراب اثرات پیدا کرتا ہے۔

## تجارتی مرکبات

<b>AMEBIS FORTE</b>	(RECON)	ای سی بس فورٹ
Tinidazole 300mg, diloxanide furoate BP 500mg tabs; Price N/A		
<b>AMIBICTIN-BD</b>	(CFL)	ای بی کٹین
Diloxanide furoate I.P. 750mg, tinidazole 600mg tabs; 10tabs Rs.24.10		
<b>DIAFLOX</b>	(AGLOWMED)	ڈیافلاکس
Tinidazole 600mg, norfloxacin 400mg: f-c tabs: 10 Price: N/A		
<b>DIALOX</b>	(AGLOWMED)	ڈیالوکس
Tinidazole 300mg, diloxanide furoate 375mg, methyl polysiloxane 25mg: tabs: 10: Rs.17.47		
<b>ENIDAZOL</b>	(EAST INDIA)	انی ڈازول
Tinidazole 300mg, tabs: 10, Rs.12.78		
<b>ENTROLATE TABS</b>	(STADMED)	انٹرولیت
Tinidazole 500mg, diloxanide furoate 500mg; tabs 4: Rs.10.00		
<b>FABIZOL</b>	(UNICHEM)	فے بی زول
Tinidazole 300mg, 500mg; tabs: 300mg; 10: Rs.8.91, 500mg; 4: Rs. 5.74		
<b>FASIGYN-500/DS</b>	(PFIZER)	فیس گیسن
Tinidazole 300mg diloxanide furoate 250mg tabs; 10, Rs.14.15		
<b>NIDAGYL</b>	(P&B LABS)	نڈا جیل
Tinidazole 300mg diloxanide furoate 250mg tabs; 10, Rs.14.15		
<b>NORBID T</b>	(ALEMBIC)	نار بیڈ ٹی
Tinidazole 600mg, norfloxacin 400mg; tabs: 10: Rs. 67.00		
<b>NORFOX-TZ</b>	(CIPLA)	نار فلاکس ٹی زیڈ
Tinidazole 600mg, norfloxacin 400mg: tabs: 10: Rs.70.00		
<b>NOXTIN</b>	(wave)	ناکس ٹن
Tinidazole 600mg, norfloxacin 400mg: tabs: 10: Rs.70.00		



<b>TAGRID</b>	(CORE)	نگریڈ
Tinidazole 300mg, Diloxanide furoate 500mg tabs; 10 Rs.20.00		
<b>TINIBA INFUSION</b>	(ALIDAC)	ٹی بی ایف
Tinidazole 800mg per 400ml inj. 400ml vial: Rs.39.50		
<b>TINI-300 - 500</b>	(KOPRAN)	ٹائی نی ۳۰۰/۵۰۰
Tinidazole 300mg & 500mg tabs : 300mg: 10 : Rs.11.29 500mg: 10 : Rs.19.60		
<b>TINI 75/150 SUSP</b>	(KOPRAN)	ٹائی نی ۷۵/۱۵۰ سیرپ
Tinidazole 75mg & 150mg per 5ml susp 75mg 60ml: Rs.17.30, 150mg: 50ml: Rs.22.50; 60ml: Rs.27.00		
<b>TINIBID-DS</b>	(CROSLANDS)	ٹائی بی ڈی
<b>TINOR</b>	(JENBURKT)	ٹی نار
<b>TINICIDE</b>	(BLUE CROSS)	ٹائی نی سائیڈ
Tinidazole 300mg & 500mg tabs 300mg: 10: Rs.9.00 500mg: 10: Rs.15.00		
<b>TINICIDE-DS</b>	(BLUE CROSS)	ٹائی نی سائیڈ ڈی ایس
Tinidazole 1000mg tabs 6, Rs. 21.40		
<b>TINICIDE FORTE</b>	(BLUE CROSS)	ٹائی نی سائیڈ فورٹ
Tinidazole 300mg, Diloxanide furoate 250mg, Simethicone 25mg tabs 10: Rs.14.80		
<b>TINIDAFYL</b>	(JAGSONPAL)	ٹائی ڈی اے فل
<b>TINI-F SUSP</b>	(KOPRAN)	ٹائی نی ایف سیرپ
Tinidazole 300mg Furazolidone 100mg Tabs 10: Rs.13.00		
<b>TINI-F TABS</b>	(KOPRAN)	ٹائی نی ایف ٹیبلٹ
Tinidazole 300mg Furazolidone 100mg Tabs 10: Rs. 13.00		
<b>TINIFLOX</b>	(CROSLANDS)	ٹائی نی فلاکس
Tinidazole 600mg, norfloxacin 400mg tabs 10: Rs.75.00		
<b>TINOXIN</b>	(KANPHA)	ٹی نوکسن
Tinidazole I.P. 600mg, norfloxacin USP 400mg: tabs: 10: Rs.5.95		
<b>TRIDAZOLE</b>	(FRANCO-INDIAN)	ٹرائی ڈازول
Tinidazole 300mg 500mg tabs 300mg: 10: Rs.9.03; 500mg: 4, Rs.6.19		
<b>ZIL</b>	(SARABHAI)	زیل
Tinidazole 300mg, 600mg & 1000 tabs; 300mg: 10, Rs.13.97; 600mg: 10,		



Rs.27.57; 1000mg: 4, Rs.21.33

**ZOA FORTE** (TATA PHARMA)

**ZOACIDE DS** (TATA PHARMA)

Tinidazole 1000mg tabs 6: Rs. 26.94

**ZOACIDE -500** (TATA PHARMA)

Tinidazole 500mg tabs 4: Rs.10.00

زو آفورت  
زو آسائیڈ ڈی ایس

زو آسائیڈ ٹبلیٹ ۵۰۰

دافع بکٹیریا اور دافع پروٹوزوا ادویہ

## ANTI BACTERIAL ANTI PROTOZOAL

BERBERINE HCL

بر بے رین ہائیڈروکلورائیڈ

CHLORAMPHENICOL

کلورم فینی کال

CHLOROQUINE PHOSPHATE

کلورو کوئن فاسفیٹ

COLISTIN SULPHATE.

کولسٹین سلفیٹ

DI-iodo HYDROXYQUIN

ڈائی آئی ڈو ہائیڈروکسائی کوئن

FURAZOLIDON

فیورازولیڈین

NALIDIXIC ACID.

نالیڈک سک ایسڈ

NEOMYCIN

نیومائی سین

PHTHALYL SULPHATHAZOLE

پتھالائل سلفا تھیا زول

QUINODOCHLORE

کیونوڈوکلور

STREPTOMYCIN SULPHATE

اسٹریپٹومائی سین سلفیٹ

SULPHAGUANIDINE

سلفا گواناڈین

افعال و منافع: یہ تمام دوائیں کبھی تنہا اور کبھی دو یا زیادہ دواؤں کے ساتھ مرکب شکل میں دستیاب ہوتی ہیں اس سے یہ زیادہ موثر ہو جاتی ہیں۔

یہ مرکبات، دبائی اور موسمی اسہال جراثیمی پیش موسم گرما کے اسہال، خراش اسہال کے سبب آنے



والے دست، تعفی و متعدی اسہال میں مفید و موثر ثابت ہوتے ہیں۔

مقدار و ترکیب: ہر دوا کی الگ الگ ہے۔ مقدار خوراک کا تعین مرض اور حالات، دوا کے ساتھ

پرچے کے مطابق کیا جائے۔

منفی افعال: حساس مریضوں میں، آئیوڈین کے مرکبات کے دوران جگر کی خرابی اور آنتوں کی رکاوٹ

میں ان کا استعمال مناسب نہیں۔

مضر اثرات: تے، متلی، ابکائی، درد سر، مع العظام میں خرابی، ہو سکتی ہے۔

احتیاط: خون کی خرابی، خون کی کمی، کلورم فینی کال سے ہونے والے انہمیاس احتیاط لازم ہے۔

## تجارتی مرکبات

### ALDIAGRAM

(ALKEM)

الڈیاگرام

Nalidixic 150mg, metronidazole (as benzoate) 100mg per 5ml susp; 60ml  
Rs. 28.90

### AMIBEX NA

(SWIFT)

ایمیکس این اے

Nalidixic acid 300mg, metronidazole 100mg tabs 10 tabs Rx. 39.80

### AMIBEX NA SYRUP

(SWIFT)

ایمیکس این اے سیرپ

Nalidixic acid 150mg, Metronidazole 100mg per 5ml liquid 30ml Rs. 23.98;  
60ml Rs. 33.98

### AMICLINE PLUP

(FRANCO-INDIAN)

امائی کلین پلس

Di-iodohydroxyquin 325mg chloroquine phos 85mg oxytetracycline Hcl 170  
mg tabs 10: Rs. 16.53

### AMICLINE

(FRANCO-INDIAN)

امائی کلین

Di-iodohydroxyquin 325mg chloroquine phos 85mg tabs 10: Rs. 11.91

### BACTOMET TABS

(WIN MEDICARE)

بکٹومت

Nalidixic acid 500mg, Metronidazole 200mg tabs; 10x4 Rs.25.00

### BACTOMET SUSP

(WIN MEDICARE)

بکٹومیٹ سیرپ

Nalidixic acid 300mg, Metronidazole 200mg susp; 30ml Rs.35.65



**BACTOMET 'C' TABS** (WIN MEDICARE)

بیکٹومیٹ سی ٹیبلٹ

Nalidixic acid 250mg, Metronidazole 100mg tabs; 10x6 Rs.224.00

**BACTOMET 'C' SUSP** (WIN MEDICARE)

بیکٹومیٹ سی سیرپ

**ENTERODIX** (ALBERT DAVID)

انٹروڈکس

Nalidixic acid 500mg : tabs: 10: Rs.37.43

**ENTERODIX SUSP** (ALBERT DAVID)

انٹروڈکس سیرپ

Nalidixic acid 300mg per 5ml susp: 30ml: Rs. 17.83

**ENTROFURAN-M CAPS** (DAYS)

انٹروفیوران ایم

Furazolidone 100mg metronidazole 300mg caps: caps 10: Rs.7.92

**ENTROFURAN-M-SUSP** (DAYS)

انٹروفیوران ایم سیرپ

Furazolidone 33mg metronidazole benzoate equal to metronidazole 100mg simethicone 25mg per 5ml susp: 60ml : Rs.9.45

**ENTERO QUINOL** (EAST INDIA)

انٹروکیونال

Quiniodochlor, 250mg: tabs: 20: Rs.6.57

**ENTEROZYME SUSP** (STADMED)

انٹروزائم سیرپ

Metronidazole benzoate equiv. to metronidazole 100mg, nalidixic acid 150mg: 30ml syrup: Rs.21.50

**ENTEROZYME TABS** (STADMED)

انٹروزائم ٹیبلٹ

Iodochlorohydroxyquin. 250mg diastase (amylolytic activity) 1:800 derived from asperglus oryzae) 45mg: 10 tabs: Rs. 7.50

**FALMENDAL TABS** (FALMA)

فال مینڈل ٹیبلٹ

Metronidazole 300mg; Furazolidone 100mg; Dimethyl polysiloxane 25mg tabs; 10 Rs.6.96

**FORTENAL** (PFIMEX)

فورٹی نال

Metronidazole 200mg, Nalidixic acid 300mg tabs Price N/A.

**FUDONE/FUDONE-M** (EUPHORIC)

فوڈون / فوڈون ایم

Furazolidone 100mg tabs; SUSP Furazolidone 50mg per 5ml susp. 60ml & 450ml; metronidazole 200mg & furazolidone 50mg per 5ml susp. 60ml & 450ml; metronidazole 400mg & furazolidone 100mg tabs; Price N/A

**FUMEDIL** (ETHNOR)

فیومیڈل

Furazolidone 50mg Metronidazole 200mg Dicyclomine Hcl 10mg caps 10, Rs.17.71



- FURANOL-M SUSP** (CARMINOL) فیورانول ایم  
Furazolidone 25 mg, Metronidazole Benzoate Eq. to Metronidazole 75mg  
60ml: Rs. 12.96
- FUROXONE** (SMITHKLINE) فیوراکسون  
Furazolidone 100mg tabs 10. Rs. 2.34
- FUROXONE SUSP** (SMITHKLINE) فیوراکسون سیرپ  
Furazolidone I.P. 250 mg per 5 ml susp: 60ml: Rs. 6.58
- GRAMOGYL** (STANCARE) گراموجل  
Nalidixic acid 300mg metronidazole 200mg: tabs 6: Rs. 23.85
- GRAMOGYL SUSP** (STANCARE) گراموجل سیرپ  
Nalidixic acid 150 mg, metronidazole 100mg per 5ml susp: Price N/A
- GRAMONEG** (RANBAXY) گرامونیک  
Nalidixic acid 500mg tabs; 4 tabs Rs. 18.46
- GRAMONEG SUSP** (RANBAXY) گرامونیک سیرپ  
Nalidixic acid 300mg per 5ml; 30ml Rs. 18.50; 60ml Rs. 32.00
- IMOSEC-S** (ETHNOR) آئی موسیک۔ ایس  
Streptomycin sulph, 500mg Loperamide Hcl 2mg caps; 4 cps Rs. 11.89
- INSEPTIN** (IDPL) ان سپ ٹین  
Strptomycin- sulph 125 mg, sulphadimidine 250mg, berberine Hcl 150mg,  
pectin 25mg, cps: 10: Rs. 10.71
- NADIX ACUTAB** (TROIKAA) ناڈکس اکیوٹیپ  
Nalidixic acid 300mg: dispersible tabs: 6: Rs. 16.50
- NALIDYS** (BIOLOGICAL E) نالیڈیس  
Nalidixic acid 300mg, Metronidazole I.P. 200mg tabs; 10: Rs. 45.18
- NALIDYS SUSP** (BIOLOGICAL E) نالیڈیس سیرپ  
Nalidixic acid 150mg, Metronidazole benzoate equib. to metronidazole  
100mg per 5ml susp: 60ml: Rs. 31.81
- NEGADIX M** (CFL PHARMA) نی گاڈکس ایم  
Nalidixic acid 300mg, Metronidazole 200mg tabs; 6 Rs. 21.00
- NEGADIX M SUSP** (CFL PHARMA) نی گاڈکس ایم سیرپ  
Nalidixic acid 150mg, Metronidazole 100mg per 5ml susp: 60ml: Rs. 28.00
- NOVONIDAGYL SUSP** (P&B LABS) نوونڈا جیل سیرپ  
Furazolidone 50mg, metronidazole benzyloxalate 200mg,



di-iodohydroxyquinoline 250mg per 10ml susp; 60ml Rs.15.74

**NOVONIDAGYL TABS** (P&B LABS)

نوونڈا جل ٹیبلٹ

Furazolidone 50mg, metronidazole 200mg, di-iodohydroxyquinoline 250mg, tabs; 10: Rs.12.03

**PESULINE-O**

(CADILA)

پیسولن او

Phthalyl sulphathiazole 1G, Pectin 150mg Kaolin 3G Tinc opium 0.08ml per 15ml susp; 60ml Rs.26.40; 450ml Rs.65.20

**QUGYL**

(SEARLE)

کوئی جل

Di-iodohydroxyquin 250mg metronidazole 250mg tabs 10: Rs.11.12

**QUGYL SYRUP**

(SEARLE)

کوئی جل سیرپ

Di-iodohydroxyquin 200mg metronidazole 200mg per 5ml susp 50ml: Rs.17.35

**SARIL**

(RALLS)

سارل

Streptomycin sulph. 240mg, Phthalyl sulphathiazole 200mg Di-iodohydroxyquin 125mg tannic acid 50mg pectin 10mg tabs; 10tabs Rs.9.51

**SPAGYL SUSP**

(INDOCO)

اسپا جل سیرپ

Nalidixic acid 150mg, metronidazole 100mg per 5ml susp; 30ml: Rs.20.50

**STREPTOMAGMA**

(WYETH)

اسٹریپٹوماگما

Streptomycin 150mg, attapulgit 350mg Pectin 45mg Dried alum. hydrox. gel 70mg tabs; 10tabs Rs.8.72

**STREPTOMAGMA GEL** (WYETH)

اسٹریپٹوماگما جل

Streptomycin 150mg Kaolin I. 5G Pectin 135mg, Alum, hydrox 200mg per 15 ml; 100ml Rs. 11.74; 450ml Rs.42.94

**TINIFLOX**

(CROSLANDS)

ٹینی فلاکس

Tinidazole 600mg, norfloxacin 400mg; tabs 10: Rs.75.00



# NORTIZOLE

**Action**

(Norfloxacin + Tinidazole)

Diarrhoea and Dysentery of Amoebic / Bacterial / Mixed origin

Manufactured in India by :



**Maxcure**

DRUGS & PHARMACEUTICALS LTD.  
G-1/568-569, RIICO IND. AREA, BHIWADI  
AT A-1129, RIICO Ind. Area, Phase II, Bhiwadi-301019

TWO POWERS COMBINATION

Security That Succeeds in  
Diarrhoea & Dysentery



# آنتوں کی حرکات دہویہ کو سست کرنے والی ادویہ

## ANTIMOTILITY

### DIPHENOXYLATE

ڈانی فینوکسائی لیٹ

افعال و منافع: دست آنا (اسہال)، جراثیمی اسہال، پانی جیسے دست آنا آنتوں کی حرکات میں تیزی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵ ملی گرام ہر ۶ گھنٹہ بعد شدید حالت میں ۱۰ ملی گرام پہلی خوراک بچوں کو آدھی ملی گرام رنی کلو گرام وزن کے حساب سے دینا چاہیے۔

منفی اثرات: دوا سے حساس مریضوں کو اور ایک سال سے کم عمر کے بچوں کو نہیں دینا چاہئے۔

مضر اثرات: تے، متلی ابکائی، بھوک کی کمی، خلل شکم، سستی خشکی، الجھن بے چینی یو فوریا، پتی اچھلنا (شرئی) الرجی، کھجلی پیدا ہو سکتی ہے۔

احتیاط: چھوٹے بچوں کو اور جسم میں پانی کی شدید کمی میں احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے

### تجارتی مرکبات

#### LOMOFEN

(SEARLE)

لوموفن

Diphenoxylate Hcl 2.mg, atropine sulph 0.05gm furazolidone 50mg tabs:10:

Rs.2.02

#### LOMOTIL

(SEARLE)

لوموتیل

Diphenoxylate Hcl 2.25mg, atropine sulph.0.025mg: tabs 10: Rs.2.40



## لوپیرامائیڈ LOPERAMIDE

**افعال و منافع:** یہ ایک مصنوعی تیار کردہ دافع اسہال دوا ہے اپنے مخصوص اثرات سے آنتوں کی حرکات دود یہ کے فعل میں سستی پیدا کرتی ہے۔ شدید اسہال ورم اور نفکشن سے ہونے والے دست میں مفید ہے پیراسائیٹ مثلاً سالمونیلہ۔ شگزیلا سے ہونیوالے دستوں اور آنتوں میں خراب فاسد مادوں کی موجودگی میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

**مقدار و ترکیب:** پہلی خوراک ۴ ملی گرام بعد کو ہر دست کے بعد ۲ ملی گرام دینا چاہیے۔

**منفی اثرات:** قبض میں اور لوپیرامائیڈ سے حساس مریضوں کو دینا مناسب نہیں۔

**مضر اثرات:** درد شکم، بے چینی، قبض خشکی، سستی، منہ خشک ہونا، متلی تھکاوٹ ہو سکتی ہے۔

**احتیاط:** آنتوں کے زخم، ورم اور ۲ سال سے کم عمر بچوں میں احتیاط برتنا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

<b>DIARLOP</b> (JAGSONPAL)	ڈائرلوپ
Loperamide Hcl 2mg; caps 10: Rs.6.25	
<b>DIARLOP SOLN</b> (JAGSONPAL)	ڈائرلوپ سرپ
Loperamide Hcl 0.2mg per ml liquid; 30ml Rs.5.90	
<b>DIARLOP PLUS</b> (JAGSONPAL)	ڈائرلوپ پلس
Loperamide Hcl 2mg, furazolidone 100mg caps; 10 caps Rs.11.50	
<b>DIARLOP PLUS SUSP</b> (JAGSONPAL)	ڈائرلوپ پلس سرپ
Loperamide hcl 1mg, Furazolidone 35mg per 5ml; 50ml Rs.19.00	
<b>IMODIUM</b> (JAGSONPAL)	اموڈیم ٹیبلٹ
Loperamide Hcl 2mg Tabs 4:Rs.3.57	
<b>IMODIUM LIQUID</b> (ETHNOR)	اموڈیم سرپ
Loperamide Hcl 0.2mg per ml Liq. 30ml: Rs. 5.15	
<b>IMOSEC-F</b> (ETHNOR)	اموسیک
Loperamide 2mg, furazolidone 100mg; caps: 4: Rs.10.90	



**LOPAMIDE (TORRENT)**

Loperamide Hcl 2mg tabs 10: Rs. 5.02 100: Rs. 30.50

لوپامائیڈ

**NILAMIDE (LA PHARMA)**

loperamide Hcl 2mg tabs 10: Rs. 3.20

نلامائیڈ

**RIDOL SOLN (GUFIC)**

Loperamide Hcl 0.2mg per ml soln 30ml: Rs.5.40

رڈول

**TYLOX-2 (DEEPHARMA)**

Loperamide Hcl 2mg, per 5ml; 30ml: Rs.6.20

ٹائی لوکس

Also capsules Loperamide hcl 2mg; caps 6 Rs. 2.28

**ANTI HAEMORRHOIDAL**

دافع بواسیر مراہم

**TOPICAL PREPARATION****Betamethasone VELERATE**

بٹامیٹھاسون ویلے ریٹ

**HYDRO CORTISONE ACETATE**

ہائیڈروکارٹی سون ایسی ٹیٹ

افعال و منافع: معدے کے درم، درد اور جلن میں مفید ہے، مقعد سے خون آنے مقعد کے پھٹ جانے، اندرونی اور بیرونی بواسیری مسوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لئے مفید و مجرب ہے۔

منفی اثرات: بٹامیٹھاسون اور کارٹی سون کے مرکبات انفکشن کی حالت میں اسی وقت استعمال کرائے جائیں جب خصوصی انفکشن کی دوا بھی چل رہی ہو۔

مضر اثرات: طویل عرصہ تک استعمال سے مقامی جلد میں خرابی آسکتی ہے۔

احتیات: یہ مرکبات حاملہ کو اور لمبی مدت تک استعمال سے پرہیز کریں۔

**تجارتی مرکبات****ANOVATE**

(GLAXO)

انوویٹ

Betametthosone valerate 0.05% Phenyl ephirine Hcl 0.1% lignocanine hcl  
2.5% oint; 15G Rs.8.62



**MEDITHANE**

(EYETH)

میڈی تھین

Hydrocortisone acetate 0.25% skin resp. factor derived from yeast cells 70.55 in shark liver vil equiv. to vit-A 180 in Bit-A 570 in phentl mercuric nitrate 0.01% per G oint 12 G Rs. 6.77

**PROCTO SEDYL**

(ROUSSEL)

پراکٹوسیدائل

Hydrocortisone acetate 5.58mg sodium heparinate 100 im soframycin 10mg Esculoside 10mg Ethoform 10mg Butoform 10mg per G oint 10G Rs.20.77

**PROCTO SEDYL-M**

(ROUSSEL)

پراکٹوسیدائل-ایم

Framycetin sulph. 5mg Hydrocortisone acetate 2.79mg Esculoside 5mg Ethyl aminobenzote 5mg butylaminobenzoate 5mg ointmet base to 500mg rectal caps; 20 caps Rs. 21.84

**DIOSMIN**

ڈایوسمین

افعال و منافع: یہ دوا عضلات کو سکیرتی (انقباض) پیدا کرتی ہے معدہ کی دیواروں کو مضبوط کرتی ہے رگوں کا پھولنا (انورسما) میں مفید ہے۔ آلات منع حمل سے ہونے جریان میں مفید ہے۔ مقدار و ترکیب: ۴۰۰ سے ۶۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار کھانے کے ساتھ کم از کم ۴ ہفتہ دوا جاری رکھنا چاہیے۔

منفی اثرات: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

مضر اثرات: معدہ اور آنتوں میں خلل، پتی اچھلنا، سرخ دانے نکلنا۔

**تجارتی مرکبات****VENEX 300/500**

(ELDER)

دے نیکس ۵۰۰/۳۰۰

Pure synthetic diosmin 300mg & 500mg tabs: 300mg: 10: Rs.79.50, 500mg :10: Rs.129.25

**VENUSMIN**

(MARTIN &amp; HARRIS)

وے نس مین

Pure synthetic diosmin 150mg, 300mg, tabs. Haemorrhoids. Varicose veins. Menorrhaga, metrorrhagia. IUD intolerances, fuctional venous disorderr. 150mg : 8, Rs. 42.95; 300mg: 8, Rs.85.00



## FLUORO CORTOLONE فلور و کارٹولون

افعال و منافع: بواسیر، درم مقعد، غشاء مخاطی کا متورم ہونا، درد و کھجلی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: اجابت سے فارغ ہو کر اور سوتے وقت ایک سپازیٹری (بٹی) مقعد میں رکھیں یا مرہم لگائیں۔

منفی اثرات: ٹی بی اور آتشک کی موجودگی میں وائرس سے پیدا ہونے والے امراض اور حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں استعمال نہ کرائیں۔

مضر اثرات: طویل عرصہ استعمال سے مقامی ساختوں میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔

### تجارتی مرکبات

**ULTRAPROCT SUPPOSITORIES** (GERMAN REMEDIES) الٹراپراکٹ (بٹی)  
Fluocortolone pivalate 0.61 mg Fluocortolone caproate 0.63mg cinchocaine  
Hcl 1mg suppos 5: Rs.30.76

**ULTRAPROCT OINT** (GERMAN REMEDIES) الٹراپراکٹ مرہم  
Fluocortolone pivalate 0.92mg Fluocortolone caproate 0.95mg cinchocaine  
Hcl 5mg per g ointment 5g: Rs.30.50

## Poli CRESULEN پالی سری سولین

افعال و منافع: بواسیر کے خون کور دکتی ہے معدہ کے عضلات کے ریشوں میں سختی پیدا کرتی ہے بوا سیر کے درم کو فائدہ پہنچاتی ہے۔

مقدار و ترکیب: دن میں ۲ بار اجابت کے بعد استعمال کریں۔

مضر اثرات: مقامی طور سے جلن محسوس ہوتی ہے لیکن جلد ختم ہو جاتی ہے۔

تجارتی نام:

فاک ٹو

**FACTU** (CROSLANDS)  
Policresulen 50mg, cinchocaine 10mg per g oint: 15g: Rs.40.00



## QUINIDOCHELOR

## کوئی نی ڈوکلور

افعال و منافع: بواسیر کے لئے مفید ہے مسوں پر لگانے سے کھجلی، بے چینی دور کرتی ہے دافع جراثیم اور فنکس کے انفکشن میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: دن میں ۳-۴ بار یہ دوا مسوں پر لگائیں۔

مضر اثرات: جلد پر دھبے دھاریاں پڑنا، حساسیت، کھجلی، ہو سکتی ہے۔

احتیاط: حساس مریضوں پر برے اثرات نمودار ہونے پر دوا روک دینا چاہیے۔

## تجارتی مرکب

PROCTO QUINOL

(EAST INDIA)

پراکٹو کیونال

Quiniodochlor I.P. 4% w/w Benzocaine I.P. 5% w/w in an emollient base ointment 25g Price N/A

## ANTI SPASMODICS

## دافع درد شکم ادویہ

DICYCLOMIN H.C.L.

ڈائی سائیکلومین ہائیڈروکلور

افعال و منافع: شکم کے عضلات کی اسپٹھن (تشنج) میں مفید ہے۔ پتہ (مرارہ) آنتوں اور آلات بول کے شدید دردوں کو سکون پہونچاتی ہے۔ حیض کا درد معدہ، آنتوں کے درد زخم اور تیزابیت کو دور کرنے کے لئے دوسری دواؤں کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے اور مفید ثابت ہوتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰ ملی گرام دن میں ۳ بار۔

منفی رد عمل: جگر کی کمزوری (ہزال الکبد) شراب کے ساتھ، پیشاب کے رکاوٹ میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، آنتوں کی حرکات کو اور عضلات کے طبعی افعال میں خلل پیدا ہوتا ہے۔

احتیاط: گلوکوما، غده قدامیہ بڑھ جانے جگر اور گردوں کے امراض میں احتیاط برتیں۔



## تجارتی مرکبات

<b>COLIMEX DROPS</b>	(WALLACE)	کولی کس ڈراپس
Dicyclomine Hcl 10mg Activated dimethicone 40mg per ml drops 30ml :		
Rs.10.00		
<b>COLIMEX TABS</b>	(WALLACE)	کولی کس ٹبلیٹ
Dicyclomine Hcl 20mg; Paracetamol 500mg tabs; 10: Rs.5.55		
<b>CYCLOMINOL</b>	(NOEL)	سائیکلومی نال
Dicyclomine Hcl 20mg; tabs; 10: Rs.4.00		
<b>CYCLOPAM TABS</b>	(INDOCO)	سائیکلوپام ٹبلیٹ
Dicyclomine Hcl 20mg paracetamol 500mg tabs 10: Rs. 7.30		
<b>CYCLOPAM DROPS</b>	(INDOCO)	سائیکلوپام ڈراپس
Dicyclomine Hcl 10mg, dimethyl polysiloxane 40mg per ml liquid. 10ml:		
Rs.9.50		
<b>CYCLOPAM INJ</b>	(INDOCO)	سائیکلوپام انجکشن
Dicyclomine Hcl 10mg per ml inj 2ml amp: Rs.2.37		
<b>CYCLOPAM SUSP</b>	(INDOCO)	سائیکلوپام سیرپ
Dicyclomine Hcl 10mg, dimethyl polysiloxane 40mg per 5ml susp 30ml:		
Rs.8.00		
<b>DYSMEN INJ</b>	(SIGMA LABS)	ڈائی سمن انجکشن
Dicyclomine Hcl 10mg per ml inj. 10ml vial: Rs.8.89		
<b>FALMASPAS</b>	(FALMA)	فال ماسپاس
Dicyclomine Hcl 10mg paracetamol 500mg tabs 10: Rs.4.99		
<b>MEFTAL SPAS</b>	(BLUE CROSS)	میفتال اسپاس
Dicyclomine Hcl 10mg mefenamic acid 250mg tabs 10: Rs.11.75		
<b>NEUROSPAS</b>	(SWIFT)	نیورو اسپاس
Dicyclomine Hcl 10mg, acetaminophen 400mg caps; 10: Rs. 11.72		
<b>NEUROSPAS FORT</b>	(SWIFT)	نیورو اسپاس فورٹ
Dicyclomine Hcl 20mg, acetaminophen 500mg caps; 10: Rs. 15.35		
<b>NEUROSPAS DROPS</b>	(SWIFT)	نیورو اسپاس ڈراپ
Dicyclomine 10mg, activated dimethicone 40mg per ml liquid; 15ml		
Rs.14.92		



**NORMAXIN**

(SYSTOPIC)

نار مکسین

Cidinium bromide 2.5mg chlordiazepoxide 5mg Dicyclomine Hcl 10mg;  
tabs; 10: Rs.9.00

**PARVON-SPAS**

(JAGSONPAL)

پارون اسپاس

Dextropropoxyphene Hcl 6.5mg-Dicyclomine Hcl 10mg Paracetamol 400mg  
caps; 10caps Rs.12.30

**REZIPENN**

(CONCEPT)

رے زی پن

Dicyclomine Hcl 10mg, dextropropoxyphene Hcl 65mg, paracetamol 500mg;  
10 tabs: Rs. 16.50

**SPASMO-PROXYVON**

(WOCKHARDT)

اسپاز موپراکسی ون

Dicyclomine Hcl 10mg, dextropropoxyphene Hcl 65 mg, acetaminophen  
400mg; caps; 8 : Rs.9.70

**ZE-SPAS**

(KEE-PHARMA)

زی اسپاس

Dicyclomine Hcl 10mg, mefenamic acid 250 mg: tabs: 10: Rs.11.50

## PROPAN THELENE پروپان تھی لین

افعال و منافع: معدہ آنتوں میں درد دور م بے چینی درد گردہ و مثانہ، پسینہ کی زیادتی پتہ کے درد دور م میں مفید ہے۔ آنتوں کے امراض کی جانچ اور زخم معدہ میں دیگر دواؤں کے ساتھ مفید رہتی ہے۔  
مقدار ترکیب: زخم معدہ میں ۱۵ ملی گرام دن میں ۳ بار کھانے سے آدھے گھنٹہ قبل، ۳۰ ملی گرام سوتے وقت۔

منفی اثرات: گلوکوما، معدہ اور آلات بول میں رکاوٹ، شدید زخم قولون میں اس کا استعمال نقصان دہ ہے۔  
مضر اثرات: خشکی آنکھ کی پتلی کا پھیل جانا۔ بصارت میں فرق۔ آنکھوں میں تناؤ اور عضلات العین میں خلل۔ گرمی کا احساس، منہ خشک، پسینہ کی کمی، قبض، دودھ کی کمی، ضعف باہ الرجی، پتی اچھلنا۔  
احتیاط: دوا کے استعمال کے دوران ڈرائیوری اور مشینوں کا استعمال ممنوع ہے۔

## تجارتی مرکبات

**PROBANTHINE**

(SEARLE)

پروبان تھین

Propantheline bromide 15 mg Tabs 10: Rs. 9.35



**SEREBANTHINE**

(SEARLE)

Propantheline bromide 15mg haloperidol caps 0.2mg 10: Rs.17.50

سیری بن حصین

**SPASTHELENE**

(SUN PHARMA)

Propantheline bromide 15mg: tabs; 10: Rs.3.98

اسپاس تھے لین

**ATROPINE SULPHATE** اٹروپین سلفیٹ

افعال و منافع: یہ درد کو دور کرنے فم معدہ کے درد۔ بچوں کے قولنج کے درد میں مفید ہے۔  
 مقدار و ترکیب: بچوں کو 0.05 ملی گرام سے 0.01 ملی گرام دودھ پلانے سے ۱۵ منٹ پہلے دن میں  
 ۳-۴ بار۔

منفی افعال: بخار کی تیزی میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: منہ خشک، وجع القلب، پیشاب تکلیف سے آنا پیاس لگنا، تپلی پھیلنا قبض قے، چکر آنا۔  
 احتیاط: ۲ سال سے کم عمر بچے زیادہ حساس ہوتے ہیں لہذا ان کو استعمال نہ کرائیں۔

**CAMYLOFIN-DI-HCL** کے مائی لوفین ڈائی ہائیڈرو کلورائیڈ

افعال و منافع: آنتوں، پیشاب کی نالی پتہ کی نالی میں شدید درد، حیض کا درد، عضلات کے تشنج سے  
 ہونے والے درد میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام ۲-۳ بار روزانہ۔

منفی اثرات: حساسیت، گلوکوما، غدہ قدامیہ کے بڑھ جانے قنات غذائی کا تنگ ہونا فم معدہ یا بواب کے  
 تنگ ہونے میں استعمال کرنا مضر ہے۔

مضر اثرات: جلد پردھے پڑنا، حساسیت، الرجی، اٹروپین کی طرح مضر اثرات

احتیاط: غدہ درقیہ کا بڑھنا، ہوائی نالیوں میں تسدد، دل کے آپریشن، بڑھاپے تیز بخار اور غدہ قدامیہ  
 کے بڑھ جانے میں احتیاط برتیں۔



## تجارتی مرکبات

AVACAN

(KHANDELWAL)

اے واکان

Camylofin (as dihydrochloride) 50 mg tabs: 10: Rs.10.;94

ANAFORTAN

انافورٹان

زخم معدہ میں کام آنے والی ادویہ

## ANTI ULCER DRUGS

ان کو ایچ ٹوری سپٹر H2 RECEPTOR بھی کہتے ہیں یہ معدہ میں پیدا ہونے والے تیزابی مادے GASTRIC ACID پیمسین وغیرہ کی افزائش کو روکتے ہیں ان میں درج ذیل دوائیں شامل ہیں۔

CIMETIDINE

سائی می ٹی ڈین

FAMO TIDINE

فاموٹی ڈین

RANI TIDINE

رینی ٹی ڈین

افعال و منافع: آنتوں کے زخم آپریشن کے بعد کے زخم، خراش معدہ اور اس سے بچاؤ حفظ ماتقدم کے لئے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: سائی می ٹی ڈین ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار یا ۴۰۰ ملی گرام دن میں ایک بار آنتوں کے زخم میں ۲۰۰ ملی گرام صرف سوتے وقت ۴ سے ۶ ہفتہ تک استعمال کرائیں۔ زخم کی حالت میں ۶ ماہ سے ۱ سال تک استعمال کرائیں۔

رینی ٹی ڈین: ۱۵۰ ملی گرام دن میں ۲ بار یا ۳۰۰ ملی گرام دن میں ابار آنتوں کے زخم اور احتیاطی تدابیر کے لئے ۱۵۰ ملی گرام سوتے وقت ۶ ماہ سے ۱ سال تک کھلائیں۔

فاموٹی ڈین: ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار یا ۴۰۰ ملی گرام صرف ابار آنتوں معدہ کے زخم اور مکمل علاج کے لئے ۶ ماہ سے ۱ سال تک کھلائیں۔

مضر اثرات: جلد پر داغ دھبے پڑنا، سردرد، چکر آنا، اسہال، ٹکان، کبھی ذہنی الجھن ہونا۔  
احتیاط: جگر اور گردے کی خرابی میں حمل اور دودھ پلانے کے ایام میں احتیاط برتیں۔



## تجارتی مرکبات

<b>ACILOC</b>	(CADILA)	ایسی لاک
Ranitidine Hcl 150 mg & 300 mg Tabs 150 mg: 10: Rs. 10.06 300 mg: 10: Rs. 18.76		
<b>ACILOC INJECTION</b>	(CADILA)	ایسی لاک انجکشن
Ranitidine Hcl 50 mg/2 ml inj 2ml: Rs. 3.40		
<b>ACIPEP</b>	(SARABHAI)	ایسی پپ
Famotidine 20 mg & 40 mg Tabs: 20 mg : 10x10: Rs. 268.80 40 mg: 10x10: Rs. 526.40		
<b>ACREDIN</b>	(SARABHAI)	ایکری ڈن
Famotidine 20 mg & 40 mg Tabs: 20 mg: 10 : Rs. 3.80, 40 mg 10: Rs. 6.40		
<b>ADVANTAC</b>	(WIN-MEDICARE)	ایڈوان ٹیک
Famotidine 20 mg, 40 mg; tabs; 20 mg; 10: Rs. 21.96, 40mg: 10: Rs. 36.68		
<b>ADVENE</b>	(BOOTS)	ایڈوین
Ranitidine 150 mg & 300 mg Tabs 150 mg: 10 Rs. 19.47 300 mg : 10: Rs. 37.78		
<b>ALPRODINE 150/300</b>	(REMEDIES)	ال پروڈین
Ranitidine 150 mg & 300 mg tabs; 150 mg 10 Rs. 11.90; 300 mg 10 Rs. 22.90		
<b>BLOCACID</b>	(IPCA)	بلو کاسڈ
Famotidine 20, 40 mg tabs 20 mg: 14 : Rs. 18.90; 40 mg: 14: 34.00		
<b>CONSEC</b>	(JAGSONPAL)	کن سیک
Ranitidine Hcl 150 mg, 300mg; tabs: 150 mg; 10: Rs. 18.84, 300 mg: 10: Rs. 36.58		
<b>FACID</b>	(INTAS)	فاسڈ
famotidine 20 mg & 40 mg Tabs 20 mg 14: Rs. 13.80; 40 mg 14: Rs. 27.00		
<b>FACID AC</b>	(INTAS)	فاسڈاک
Famotidine USP 10 mg : tabs: 14: Rs. 8.20		
<b>FACID INJECTION</b>	(INTAS)	فاسڈ انجکشن
Famotidine 20 mg/ml inj 2 ml amp. Rs. 9.20		
<b>FADINE</b>	(ARISTO)	فازین
Famotidine 20 & 40 mg Tabs 20 mg: 10 : Rs. 10.00 40 mg : 10: Rs. 20.00		



<b>FALTIDIN</b>	(ALKEM)	فالٹیڈین
Famotidine 20 mg & 40 mg tabs 20 mg: 10 : Rs. 24.00 40 mg: 10: Rs.46.10		
<b>FAMOCID</b>	(SUN PHARMA)	فاموسڈ
Famotidine 20 & 40 mg Tabs 20 mg: 10 : Rs.15.40; 40 mg : 10: Rs.28.10		
<b>FAMOFAST</b>	(FDC)	فاموفاست
Famotidine 20 mg & 40 mg Tabs 20 mg: 14: Rs. 19.45 40 mg : 14: Rs.35.65		
<b>FAMONITE</b>	(ALIDAC)	فامونائٹ
Famotidine 20 mg & 40 mg Tabs 20 mg: 14: Rs. 551; 40 mg : 14: Rs.9.86		
<b>FAMOPRIL20/40</b>	(RECON)	فاموپرل
Famotidine 20 mg/40 mg, film coated tabs. 20 mg 14 Rs. 18.20: 40 mg 14 Rs.22.60		
<b>FAMORILA</b>	(GLENMARK)	فاموریل
Famotidine 20 mg/40 mg , tabs 20 mg 14: Rs. 25.50; 40 mg 14: Rs. 45.50		
<b>FAMOTIN 20</b>	(U.S.V.R.P)	فاموٹین
Famotidine 20 mg 40 mg , tabs 20 mg 10: Rs.26.05 40 mg . 10: Rs. 51.35		
<b>FAMOTIN SUSP</b>	(U.S.V.R.P)	فاموٹین سیرپ
Famotidine 40 mg/5ml powder 30 ml: Rs. 37.35		
<b>FAMOWAL</b>	(WALLACE)	فامووال
Famotidine 20 mg /40mg , tabs 20 mg 10: Rs. 15.40; 40 mg 10: Rs. 28.00		
<b>FAMTAC</b>	(NICHOLAS)	فامٹیک
Famotidine 20 mg & 40 mg Tabs 20 mg: 14: Rs. 14.00, 40 mg: 14: Rs. 28.00		
<b>FUDONE</b>	(WOCKHARDT)	فیوڈین
Famotidine 20 mg/40 mg tabs, tabs 20 mg 10: Rs.12.80; 40mg 10: Rs.26.15		
<b>HISTAC</b>	(RANBAXY)	ہسٹیک
Ranitidine (as Hcl) 150 mg & 300 mg: tabs 150 mg : 10 tabs Rs. 18.62, 300mg: 10: Rs.36.12		
<b>HISTAC INJ</b>	(RANBAXY)	ہسٹیک انجکشن
Ranitidine Hcl 25mg per ml inj. 2ml amp: Rs.2.96		
<b>LYDIN</b>	(LYKA)	لالیڈین
Ranitidine as Hcl 150 mg & 300 mg Tabs 150 mg: 10: Rs. 18.61 300 mg: 10: Rs.36.23		



<b>PEPGARD FORT</b>	(RALLS)	پیپ گارڈ
Famotidine 20mg Tabs: 10: Rs.28.14		
<b>RANIAL</b>	(ALBERT DAVID)	زے نیال
Ranitidine Hcl 150 mg and 300mg tabs 150 mg 10 Rs. 18.99; 300 mg 10 Rs.36.86		
<b>RANTAC</b>	(UNIQUE)	رین ٹیک
Ranitidine 150 mg & 300mg tabs 150 mg, 10, Rs. 10.09 300mg, 10, Rs.18.57		
<b>RANTAC INJECTION</b>	(UNIQUE)	رین ٹیک انجکشن
Ranitidine Hcl 150 mg per 2ml inj 1x2 ml, Rs.1.79		
<b>RANTIDINE</b>	(GLAXO)	رین ٹی ڈین
Ranitidine 50 mg/2ml inj 2 ml Rs.4.17		
<b>RANITIDINE INJ</b>	(PREM PHARMA)	رین ٹی ڈین انجکشن
Ranitidine 50 mg/2ml inj. 2ml amp. Rs.4.25		
<b>RANITIN</b>	(TORRENT)	رین ٹن
Ranitidine Hcl 150 mg & 300 mg tabs 150 mg 10, Rs.10.00; 300 mg 10, Rs.18.53		
<b>RANITIN INJ</b>	(TORRENT)	رین ٹن انجکشن
Ranitidine Hcl 25 mg per ml. inj. 2ml. amp Rs. 2.22		
<b>RANTI TABS 150</b>	(MICRO LABS)	رن ٹی
Ranitidine 150 mg and 300 mg tabs 150 mg 10 tabs Rs. 18.80, 300 mg 10 tabs price N/A		
<b>RIDCER</b>	(GUFIC)	رڈسر
Ranitidine ( as Hcl) 150 & 300mg tabs 150 mg, 10, Rs.19.10; 300 mg, 10, Rs.37.15		
<b>RIDCER INJ.</b>	(GUFIC)	رڈسر
Ranitidine ( as Hcl) 25 mg per ml; inj 2ml amp Rs.3.40		
<b>RINTID</b>	(KOPRAN)	رن ٹیڈ
Ranitidine Hcl 150 mg & 300mg tabs 150 mg: 10, Rs.19.00 300mg : 10, Rs.36.86		
<b>TACUL 20/40</b>	(SYSTOPIC)	ٹاکل
Famotidine 20 & 40 mg, tabs: 20 mg: 10: Rs. 20.52, 40 mg: 10: Rs.39.90		



<b>TOBUR</b>	(THEMS PHARMA)	ٹابر
Famotidine 20 & 40 mg tabs 20 mg: 10: Rs.22.72 40 mg: 10: Rs. 45.41		
<b>TOPCID</b>	(TORRENT)	ٹاپ سڈ
Famotidine 20 mg/40 mg, tabs 20 mg 10: Rs.23.60 40 mg 10: Rs. 46.94		
<b>ULCEREX 150/300</b>	(DEE PHARMA)	السی ریکس
Ranitidine (as Hcl) 150 mg and 300 mg tabs; 150 mg : 10 Rs. 19.00; 300mg: 10 : Rs.36.50		
<b>ULCIBAN</b>	(TORRENT)	السی بان
Cimitidine 200mg & 400mg tabs 200mg : 10: Rs. 12.95 400mg : 10: Rs.25.80		
<b>ULCIMAX</b>	(PROTEC)	السی میکس
Famotidine 20 mg & 40 mg tabs 20 mg : 14: Rs.30.40, 40 mg: 10.00: Rs.41.37		
<b>ULCINIL-F</b>	(INGA)	السی ٹل
Famotidine U.S.P.20 mg/40 mg tabs; 20 mg: 10, Rs.22.00; 40 mg: 10, Rs.43.00		
<b>ULCITAB</b>	(THEMIS PHARMA)	السی ٹیب
Ranitidine (as Hcl) 150 mg & 300 mg Tabs 150 mg: 10: Rs.14.22 300 mg: 10: Rs.18.76		
<b>ULTAC</b>	(CIPLA)	الٹیک
Ranitidine Hcl 150 mg & 300mg 150 mg : 10: Rs.18.92 300mg : 10: Rs.36.72		
<b>ULTIDIN</b>	(MALLADI)	الٹی ڈین
Ranitidine Hcl 150 mg & 300 gm tabs 150 mg: 10x10 Rs. 189.00; 300mg: 10x10 Rs.366.80		
<b>ZACTANE</b>	(WYETH)	زاک ٹین
Famotidine 20 & 40 mg tabs 20 mg : 14: Rs.31.10 40 mg : 14: Rs. 60.10		
<b>ZINETAC</b>	(GLAXO)	زن ٹیک
Ranitidine as Hcl 150 mg and 300 mg tabs 150 mg: 10: Rs. 18.78; 300 gm : 10: Rs.36.43		
<b>ZORAN</b>	(STANGEN)	زوران
Ranitidine (as Hcl) 150 mg & 300 mg tabs; 150 mg: 10 Rs. 10.09; 300 mg Price N/A.		



رطوبات معدہ کی زیادتی کو روکنے والی ادویہ

**PROTON PUMP INHIBITOR**

**لن سوپرازول LANSOPRAZOL**

افعال و منافع: معدہ و آنتوں کے زخم کو مندمل کرنے، غذائی نالی کی سوجن ورم، پرانے زخم معدہ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: آنتوں کے زخم میں ۳۰ ملی گرام روزانہ ۴ ہفتے کھلائیں، معدہ کے زخم میں ۳۰ ملی گرام ۸ ہفتے کھلائیں۔ معدہ اور آنتوں میں تیزابی مادے کی زیادتی میں ۶۰ ملی گرام دن میں ۱ بار کھانے سے پہلے دینا چاہیے۔

منفی اثرات: ایام حمل اور رضاعت میں، معدہ کے کینسر میں۔ دوا سے حساسیت کی صورت میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: اسہال، درد شکم، قبض، درد سر، چکر آنا، ناک و حلق کی جھلی میں ورم، جلد پر داغ پڑنا۔ احتیاط: جگر کے امراض میں طویل عرصہ تک استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: ڈایازپام، فین ٹائن اور وٹامن بی ۱۲ کے انجذاب اور انہضام میں خلل پڑتا ہے۔

**تجارتی مرکبات**

**LANPRO**

Lansoprazole 30mg caps

**LANSOL 30** - Lanprazol 30 mg

cap 10 Rs.58.00

**SYLANS** - Lansoprazol 30 mg 10

Rs.58.00

لین پرو

لین سول ۳۰

سائی لان



## اومی پرازول OMIPRAZOL

افعال و منافع: آنتوں اور معدہ کے زخم کو مندمل کرتی ہے۔ معدہ میں تیزابیت کی پیدائش کو روکتی ہے، دواؤں کے اثرات سے ہونے والے زخم معدہ کو فائدہ پہونچاتی ہے۔

مقدار و ترکیب: معدہ و آنتوں کے زخم میں ۲۰ سے ۴۰ ملی گرام دن میں ابار صبح کو ۲ ماہ تک کھلائیں۔

منفی رد عمل: حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں اور بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: درد سر، چکر آنا، جی متلانا، اسہال آنا، درد شکم اور جلد پر داغ پڑنا۔

احتیاط: معدہ کے کینسر میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: ڈایازی پام، فین ٹائن، وارفین، سائی ٹوکروم کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

### تجارتی مرکبات

<b>HYKATAPASE</b>	(MEDLEY)	ہائی کاٹاپیس
Opmeprazole 20 mg 4 caps:	Rs. 34.40	
<b>LOKIT</b>	(KOPRAN)	لوکٹ
Omeprazole 20mg as e-c grannules caps 7x4 :	Rs.110.60	
<b>LOMAC</b>	(CIPLA)	لو-یک
Enteric coated pellets equivalent to omeprazole 20 mg caps 10,	Rs. 29.00	
<b>LORESS</b>	(BIOLOGICALE)	لوریس
Opemprazole 20mg e-c granules caps 10:	Rs. 49.85	
<b>NILSEC</b>	(MAX)	نل سیک
Omeprazole 20 mg e-c granules caps 10:	Rs. 49.85	
<b>OCID</b>	(CADILA)	اوسڈ
Omeprazole 20 mg e-c granules caps 10:	Rs. 47.50	
<b>OMALCER</b>	(WOCKHARDT)	او مل سر
Omeprazole 20 mg: e-c granules caps 10:	Rs. 69	
<b>OME-10/20</b>	(DEYS)	اومی ۱۰/۲۰
Omeprazole 10mg & 20 mg tabs 10 mg: 10:	Rs. 19.00, 20 mg : 10:	Rs.27.00
<b>OMEPRAL 10/20</b>	(FDC)	اومی پرال
Omeprazole 10 mg & 20 mg e-c granules caps 10 mg 10 :	Rs. 17.50 20 mg	
10	Rs. 30.10	



<b>OMEPREN 10/20</b>	(BLUE CROSS)	اومی پرن
Omeprazole 10 mg & 20 mg ; caps: 10 mg : 10: Rs. 17.00, 20 mg : 10: Rs.30.00		
<b>OMEPAZ 10/20</b>	(ALKEM)	اومی پراز
Omeprazole 10 mg & 20 mg : caps: 10 mg: 10: Rs. 20.00, 20 mg : 10: Rs.30.00		
<b>OMEZ</b>	(STANGEN)	اومیز
Omeprazole 20 mg caps 10: Rs.39.00		
<b>OMEZOL</b>	(ALEMBIC)	اومی زول
Omeprazole (e.c.granules) 20 mg caps: 10: Rs.19.		
<b>OMIZAC</b>	(TORRENT)	اومی زیک
Omeprazole 20 mg e-c granules caps: 10: Rs.38.90.		
<b>PEPTILCER</b>	(BIOCHEM)	پپ ٹل سر
Omeprazole 20 mg grans; 4: Rs. 34.40		
<b>PROTODID</b>	(TIDE)	پروٹو سڈ
Omeprazole 20 mg e-c granules ) caps: 10: Rs.45		
<b>RESEC</b>	(MERIND)	ری سیک
Omeprazole 20 mg caps; 10, Rs. 42.75		
<b>ULZOL</b>	(DABUR)	ال زول
Omeprazole 20 mg e-c granules caps 4: Rs.20.00		

## اوکسی فین نو نیم برومائیڈ OXY PHEN NO NIUM BROMIDE

افعال و منافع: زخم معده، ورم معده اور تیزابیت کی زیادتی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵ سے ۱۰ ملی گرام دن میں ۴ بار کھلائیں۔

منفی افعال: گلوکوما، معده کے نچلے سرے بواب کا بند ہونا، غدہ قدامیہ کا بڑھنا۔ غذائی نالی کا تسد، وجع القلب، ضعف المعاء اور عضلات میں مضر ہے۔

مضر اثرات: وجع القلب، آنکھوں میں دھندلا پن، خشکی، درد سر، قبض پیشاب رکنا، منہ خشک رہتا ہے۔ احتیاط: آنتوں کی رکاوٹ میں کمزور و ناتواں مریضوں میں پھیپھڑوں کے امراض میں۔



## تجارتی مرکبات

**ALUPROMATE TABS** (REMEDIES INDIA)

الوپرومیٹ

Oxyphenonium bromide 10 mg, Dried Alum. hydrox. gel 300 mg, Mag, hydrox. 100 mg tabs; 10 Rs. 12.08;

**ALUPROMATE-D TABS** (REMEDIES INDIA)

الوپرومیٹ ڈی

Oxyphenonium bromide 10 mg, Diazepam 2.5 mg, Dried Alum. hydrox. gel 300, mg, Alum, glycinate 100mg tabs; 10 rs. 13.30; 500 Rs 525.10

**ANTRENYL** (HIND. CIBA-GEIGY)

انٹرئل

Oxyphenonium bromide 5 mg tabs 10 Rs.6.00

**ANTRENYL DUPLEX** (HIND. CIBA- GEIGY)

این ٹرئل ڈپلکس

Oxyphenonium bromide 10 mg tabs 10 Rs.11.00

## سکرال فیٹ SUCRAL FATE

افعال و منافع: یہ زخم معده کو مندمل کرنے تیزابیت کو رکنے میں مدد دیتی ہے زخم معده کے درد و رم کو سکون دیتی ہے معده آنتوں کے زخم، بد ہضمی اور خراش معده میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲ گرام دن میں ۲ بار کھانے سے پہلے اور سوتے وقت ۲ ماہ تک کھلائیں۔  
مضر اثرات: قبض پیدا کرتی ہے۔

احتیاط: گردوں کی خرابی اور ہائپوفاسفیٹ کی کمی میں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: ٹراسا نکلیں H<sub>2</sub> Blocker ڈیجاسن، فین ٹائن، تھیوفائی لین، خون روکنے والی دواؤں اور کوئی نولون کے ساتھ دینا مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

**SUCRACE** (ALIDAC)

سکرلیس

sucralfate 1g tabs 4, Rs. 6.24

**UL-CEKON** (FDC)

السی کون

Sucralfate 1g : tabs; 10: Rs. 13.68

**ULCERFATE** (SUN PHARMA)

السرفیٹ

Sucralfate Tabs 1g 6: Rs.12.00



**TRI POTASSIUM BISMUTH SALT** ٹرائی پوٹاشیم بسمتھ سالٹ  
افعال و منافع: یہ دوا معدہ اور آنتوں کے زخم کو مند مل کرتی ہے۔ تیزابی مادے کو معتدل کرتی اور  
اندماں کے عمل کو تیز کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۴ ملی گرام دن میں ۲ بار کھانے سے آدھ گھنٹہ پہلے اسے ۲ ماہ کھلائیں۔  
منفی اثرات: گردوں کی خرابی، حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں استعمال نہ کرائیں۔  
مضر اثرات: زبان اور پاخانے کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے۔

احتیاط: دافع تیزابیت دوائیں، دودھ، اور بچوں سے احتیاط برتیں کھانے کے آدھ گھنٹہ بعد تک نہ کھلائیں

### تجارتی مرکبات

DE-NOL	(ELDER)	ڈی نول
Colloidal bismuch subcitrate 120 mg; tabs 15x8's :	Rs.39.65	
PYLOCID	(MERC)	پائی لوسڈ
Colloidal bismuth subcitrate equiv. 120mg B/203 tabs 10:	Rs. 16.79	
TRYMO	(RAPTAKO)	ٹرائی مو
Tripotssium dicitrato bismuthate equiv. to 120 mg B/203 tabs:	8: Rs.13.60	

انزائم اور ہاضم ادویہ

## ENZYMES & DIGESTIVES

AMYLASE

BILE EXTRACT

FUNGAL DIASTASE

ایمانی لیس  
بائل ایکسٹریکٹ  
فنگل ڈایاسٹیس



CUMIN OIL

LACTO BACILLUS

PANCREATIN

PAPAIN

PEPSIN

کیومن آئل

لکٹوبےسی لس

پین کریاٹین

پاپین

پپسین

افعال و منافع: یہ تمام دوائیں، ہاضمے کی خرابی، بد ہضمی میں مفید ہیں۔ ایمائی لیس اشارچ کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پے پین آدھ گھنٹہ میں اپنے سے ڈھائی ہزار گنا پروٹین کو ہضم کر سکتا ہے۔ بائل سالٹ روغنی و چربی کے اجزاء FATS کو ہضم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ فنگل ڈیاسٹیس عام غذا کے ہضم میں معاونت کرتے ہیں۔ پرانے اسہال سگرہنی سوء ہضم، نفخ شکم درد معدہ قے متلی، بھوک کی کمی، بیماریوں اور دواؤں کے سبب ہونے والی سوء ہضم میں یہ دوائیں مفید رہتی ہیں۔

مقدار و ترکیب: ہر دوا کی مقدار خوراک اور ترکیب استعمال مریض کے حالات کے لحاظ سے اور پیکنگ پر درج ہدایات کے مطابق دینا چاہیے۔

مضر اثرات: زیادہ مقدار میں دینے سے دست اور متلی کی شکایت ہو سکتی ہے۔

دوسری دواؤں کے ساتھ رد عمل: ٹیلیٹیم کارب، میگنیشیم ہائیڈرو آکسائیڈ اور فولاد کے مرکبات کے ساتھ ان کے فعل میں خلل واقع ہوتا ہے۔

## تجارتی مرکبات

AMINOZYME

(STADMED)

امینوزائم سرپ

Protein hydrolysate 720 mg Bit B1, 5 mg B2 0.75 mg B6 0.25 mg Vit C 7.1 mg niacinamide 6 mb diastase 13.2 mg per 5 ml liquid. 200 ml Rs.32.00

AMINOZYME TABS

(STADMED)

امینو زائم ٹیبلٹ

Protein hydrolysate 720 mg diastase 150 mg tabs 10 Rs.6.30



**BECOPLUS**

(UNI-SANKYO)

بیکوپلس

Lactic acid bacillus 1000 lac spores zinc sulph. 53 mg, ascorbic acid 150 mg, thiamine mononitrate 10 mg, riboflavin 10 mg, pyridoxine 3 mg nicotinamide 50 mg, calcium pantothenate 12.5 mg cyanocobalmin 5 mg, folic acid 1000 mg : caps: 10 : Rs. 15.00

**BESTOZYME PAED**

(BIOLOGICAL E)

بیسٹو زائیم (بچوں کے لیے)

Alpha Amylase IP 125 mg Papain I.P 15 mg, Anise Oil 1 mg, Caraway Oil 1 mg, Dil Oil 1 mg, flavoured syrup 30 ml Rs. 12.75

**BESTOZYME SYRUP**

(BIOLOGICAL E)

بیسٹو زائیم سرپ

Alpha Amylase IP 75 mg Papain IP 60 mg, per 5 ml flavoured syrup 230 ml Rs.29.90

**BESTOZYME CAPS**

(BIOLOGICAL E)

بیسٹو زائیم کپسول

Alpah amylase IP 100mg Papain IP 60 mg, activated dimethicone 40 mg 10 caps Rs.11.00

**B-LACT CAP**

(PREM PHARMA)

بی لیکٹ کپسول

Lactobacillus acidophilus 1000 lacs, vit. B1 10mg, vit. B2 10mg, vit. B6 3mg, vit. B12 15 mg, folic acid 1500 mg, niacinamide 100 mg, ca. pantothenate 20 mg, vit. c 75 mg: caps: 10 : Rs. 16.00

**CARMICIDE**

(INDOCO)

کاری سائیڈ

Sod. cit. 70 mg, citric acid 35 mg, tinc. zing b mitis 0.04 ml, tinc. cardam. aromaticus 0.04 ml, tinc. cinnamon 0.04 ml alcohol 0.125 ml per 5 ml syrup: 100ml: Rs.12.00

**CARMICIDE ADULT**

(INDOCO)

کاری سائیڈ (بالغوں کے لیے)

Sod. cit. 200 mg, citric acid 40 mg, tinc. zingib mit 0.12 ml, tinc. cardam aromaticus 0.12 ml, tinc. cinnamon 0.12 ml, alcohol 0.25 per 5 ml liquid. 100ml bottle: Rs.14.00

**CARMIZYME SYRUP**

(CARMINOL)

کاری زائیم سرپ

Fungal diastase 1.50 IP 300mg, liquifies 15 gm of cooked starch), papain IP 150 mg, l-lysine monohydrochloride IP 50 mg, thimine Hcl IP 2.5 mg, riboflavine Hcl IP 2.5 mg, pyridoxine Hcl IP 1 mg, macinamide IP 25 mg glycerine IP 1 g, 200gm, 200ml, Rs.33.60, 100 ml: Rs.18.00



**CARMIZYME-A**

(CARMINOL LABS)

کارمی زائم۔ اے

Diastase (1:2000) 50mg, pepsin (1:3000) 10 mg per 5 ml syrup : 200ml bottle: Rs. 31.20

**CATAZYME SYRUP**

(STADMED)

کیٹازائم سرپ

Fungal diastase (1:800) 40 mg activated polymethyl siloxane 20 mg, pepsin 20 mg per 5 ml syrup: 100 ml: Rs. 18.00

**CENOLZYME SYRUP**

(CARMINOL)

کینول زائم سرپ

vit. B1 3mg, vit. B2 3 mg, vit. B6 1.5 mg, niacinamide 45 mg, pepsin 60 mg per 15 ml; 200 ml Rs. 32.20, 100 ml: Rs.18.00

**DIGEPLEX**

(RALLIS)

ڈیجی پلکس

Diastase (1:2500) 20 mg pepsin 20 mg per 10 ml: liquid 100 ml Rs. 24.30  
170 ml Rs.30.40 450 ml Rs. 62.45

**DIGEPLEX DROPS**

(RALLIS)

ڈیجی پلکس ڈراپس

Diastase 31.25 mg Pepsin 10 mg Cardomon oil 0.4 mg Cimmamon oil 0.4 mg per ml drops 15 ml Rs.21.45

**DIGEPLEX-T**

(RALLIS)

ڈیجی پلکس ٹی

Pancreatin 0.15 g Bile ext 25 mg Pepsin 5 mg Diastase (1:2000) 10 mg Dimethylsiloxane 25 mg dragees 10x10: Rs. 140.95

**DISPEPTAL**

(BOEHRINGER)

ڈس پپٹال

Pancreatin 150 mg Vegetable enzymes (equiv to cellulases & hemicellulases Activity of 6 Grassmann Units) 33 mg, bile salts 25 mg tabs 10: Rs.20.0

**DIZYTONE**

(UNICHEMO)

ڈائی زی ٹون

Fungal diastase 900mg, vit.B1 6mg, vit.B2 5mg, B6 1.5mg, B12 5mg, nicinamide 48mg, d-panthenol 5mg per 75ml syrup: 110ml: Rs.10.26, 220ml: Rs.17.75

**ENDOS**

(GENO)

ان ڈوس

Fungal diastase 50 mg, pepsin 10mg, sod. tauroglycocholate 60mg, simethicone 60mg, dioctyl sod. sulpho succinate 100mg; caps: 10: Rs.10.72

**ENZAR FORTE**

(ELDER)

ان زار فورٹ

Pancreatin (eq: 15000 units amylase activity 4000 units lipase activity 15000 units protease activity) malt diastase (1.50) 130mg Sod. tauroglycocholate 65mg; e-c tabs. 10: Rs.19.50



**FESTAL** (HOECHST) فیٹال  
Pancreatin 192mg Bile constituents 25mg Hemicellulase 50mg tabs 10:  
Rs.25.10

**GENOZYME** (GENO) جینوزائم  
Aspergillus oryzae 50mg, pepsin 10mg, vit B1 0.5mg, B2 0.5mg, B6  
0.25mg, d-panthenol 1mg, nacinamide 5mg per 5ml susp.: 100ml: Rs. 11.76,  
200ml: Rs.19.54

**LACTISYN** (FRANCO-INDIAN) لکٹی سائن  
Lactobacillus lactis 490 million, lactobacillus acidophilus 490 million,  
streptococcus themophilus 10 million, streptococcus lactis 10 million, per  
amp. 6amps: Rs.30.90

**LACTOBACIL** (INFAR) لکٹوباسیل  
Lyophilized lactobacillus acidophilus not less than 10 million living  
organism per capsule and 1g sachet. 10 caps: Rs.24.20, 10 sachets: Rs.26.90

**LUPIZYME** (LUPIN) لوپی زائم  
Pepsin (1:3000) 12.5mg Fungal diastase (1:2000) 18.75 mg Vit.B1 2mg, B2  
1mg, B6 1.5 mg B12 (anhydrous) 1mg, D-panthenol 1.5 mg nicotinamide 1.5  
mg, per 5ml liquid 210ml: Rs.26.00

**LUPIZYME CAPS** (LUPIN) لوپی زائم کپسول  
Pepsin (1:3000) 12.5mg Fungal diastase (1:2000) 18.75 Vit. B1 2mg, B2  
1mg, B6 1.5mg, B12 (anhydrous) 1mg, cal. panthothenate 2.5mg,  
Nicotinamide 15mg, Dimethylpolysioxane 25 mg, Bile salts 40mg caps  
5x10;s Rs.26.65

**MERIZYME ELIXIR** (MERCURY) میری زائم الگزر  
Fungal diastase 1:8400 1.p. 12mg, Pepsin 80mg, Thiamine Hcl 4.5mg,  
Riboflavin Phosphate Sod. 4.5mg, Pyridoxine Hcl 1.5mg, Niacinamide  
45mg, panthenol 5mg, 200ml: Rs.29.50

**MERIZYME DROPS** (MERCURY) میری زائم ڈراپس  
Fungal diastase (1:8400) 6mg, Pepsin 5mg, Thiamine hcl 1mg,  
Riboflavin Phos. Sod 1mg, Pyridoxin Hcl 1mg, cyanacobalamine 1mg,  
Niacinamide 10mg, cyprohepatadine 0.5mg, 15ml: Rs.15.90



**MERIZYME TABS** (MERCURY)

میری زائم ٹبلیٹ

Fungal diastase (1:8400) 12mg, Pepsin 30mg, Simethicone 25mg activated wood charcoal 5mg tabs 20x6: Rs.120.00

**MOLZYME** (FDC)

مولزائم

Papain 60mg diastase (1:1500) 3.75mg Cumin oil 0.05ml, ajowan oil 0.015ml Activated wood charcoal 100mg, methyl polysiloxane (activated 25mg, belladonna dry extract 8mg tabs 30: Rs.29.00

**NEOPEPTINE CAP** (PAPTAKOS)

نیوپپ ٹین

Alpha amylase 200mg, Papain 100mg vit.B1 5mg, B2 3mg, B6 1mg, B12 5mg, nicotinamide 25mg Simethicone 30mg caps 30: Rs.18.43 100: Rs.57.25 250: Rs.122.80

**NEOPEPTINE DROPS** (RAPTAKOS)

نیوپپ ٹین ڈراپ

Alpha amylase (bacterial 1:800) 20mg, Papain 10mg, Dil oil 2mg, anise oil 2mg, caraway oil 2mg per ml drops. 15ml: Rs.20.75

**NORMOZYME** (UNILOIDS)

نار موزائم

Fungal diastase 300mg, papain 25mg, methyl polysilox 20mg, bile ext. 25mg: caps: 30: Rs.11.20, 100: Rs.34.24

**NORMOZYME SYRUP** (UNILOIDS)

نار موزائم سیرپ

Fungal diastase 500mg, papain 10mg, yeast ext. 25 mg per 5ml syrup: 100ml: Rs.9.50, 200ml: Rs.16.50

**PANKREOFLAT** (DUPHAR)

پینکریو فلیٹ

Pancreatin 170mg, activated dimethicone 80 mg, tabs 10: Rs.42.20

**PANKREON** (DUPHAR)

پین کریون

Pancreatin 121.5mg: tabs: 25: Rs. 28.00, 100: 96.11

**PANKREON COMP** (DUPHAR)

پین کریون کمپونڈ

Pancreatin 121.5mg, bile ext. 50mg: tabs: 25; Rs.34.99

**PANKREON PEAD** (DUPHAR)

پین کریون (بچوں کے لیے)

Pancreatin 250mg, vit. B12 0.5mg, bit. A 100 i.u., folic acid 0.2mg per 2.5g granules: 2.5g: Rs.3.21

**PANOLASE** (DUPHAR)

پینولیس

Pancreatin 192mg, hemicellulase 50mg, purified bile extract 25mg: tabs: 10



**PANZYNORM**

(GERMAN REMEDIES)

Pancreatin 100mg, bile ext. 40mg, dry stomach ext. 110mg: tabs: 10;  
Rs.36.09

چین زائی نارم

**PANZYNORM-N**

(GERMAN REMEDIES)

Pancreatin 125mg (equiv. to lipase 1000 units, amylase 9000 units, protease 500 units) e-c tabs. 10: Rs. 52.00

چین زائتم نارم این

**PHARMA LIQUID**

(P&amp;B LABS)

Iron choline cit. 20mg, papain 20mg, manganese cit. 15mg, guaiacol glyceryl ether 50mg, creasote 0.4ml, malt extract 0.5mg, vit. B1 2.5mg, vit. B2 2.5mg, niacinamide 22.5mg, vit. B6 0.75mg, d-panthenol 3mg, alcohol 1.7ml, alcohol content 11% v/v per 15ml liquid; 450ml Rs.37.54

فارما لکوڈ

**PIBIZYME LIQUID**

(P&amp;B LABS)

Fungal diastase (1:400) 0.2gm, pepsin 25mg, vit. B1 5mg, vit. B2 2.5mg, vit. B12 7.5mg, niacinamide 22.5mg, d-panthenol 5mg, flavoured sweetened base q.s.; 110ml Rs 18.21; 220ml Rs.26.33

پی بی زائتم لکوڈ

**RALCRIZYME**

(RALLIS)

Pancreatin 150mg, bile ext. 25mg, pepsin 5mg, diastase 10mg, dimethyl polysilox 25mg: dragees: 10: Rs. 5.60

رال کری زائتم

**SANZYME**

(UNI-SANKYO)

Fungal diastase 50mg, pepsin 10mg per 5ml syrup: 100ml: Rs. 16.30 200ml Rs.30.50

سن زائتم

**UNIENZYME MPS**

(UNICHEM)

Fungal diastase 20mg, papain 30mg, simethicone 50mg, nicotinamide 25mg, activated charcoal 75mg: tabs: 10: Rs. 9.00, 100: Rs.69.95

یونی انزائتم ایم پی ایس

**UNIENZYME SYRUP**

(UNICHEM)

Fungal diastase (1:800) 50mg, papain 60mg per 5ml syrup: 200ml bottle

یونی انزائتم سرپ

**VITAZYME**

(EAST INDIA)

Fungal diastase (1:2000) 20mg, cinnamon oil 0.125mg, caraway oil 0.25mg, cardamom oil 0.25mg, per 5ml; liq. 110ml, Rs.14.79; 225ml Rs.27.82; 450ml Rs.43.10

ویٹا زائتم

**VITAZYME DROPS**

(EAST INDIA)

Fungal diastase (1:2000) 20mg, cinnamon oil 0.2 mg, caraway oil 0.4mg, cardamom oil 0.4mg, per ml; 15ml, Rs.14.41

ویٹا زائتم ڈراپس



**VIZYLAC**

(UNICHEM)

وزائی لیک

Lactobacillus sporogenes 40 million spores, vit. B1 2.5mg, B2 2.5mg, B6 0.75mg, nicotinamide 22.5mg, folic acid 500mg, d-panthenol 2.5mg caps: 10: Rs.8.58

**VIZYLAC SYRUP**

(UNICHEM)

وزائی لیک سرب

Lactic acid bacillus  $40 \times 10^6$  thiamine Hcl 2mg, riboflavin 2.5mg, pyridoxine Hcl 1mg, nicotinamide 15mg, folic acid 100mg, d-panthenol 2.5mg, per 5ml syrup: 30ml bottle

**XYMEX**

(MEDLEY)

زائی میکس

Pepsin (1:3000) 20mg, diastase (1:50) 40mg, vit. B1 2.5mg, B2 2.5mg, B6 1mg, D-painthenol 2.5mg, Niacinamide 23mg, per 10ml liquid 170ml: Rs.24.80

**XYMEX DROPS**

(MEDLEY)

زائی میکس ڈراپس

Pepsin 5mg, papain 3mg sod citrate 20mg, citric acid 4mg, tinct zing mitis 0.012ml, cimmanon oil 0.0012ml per 0.5ml sys 15ml: 10.50

جگر، پتہ اور بانقرا اس کی ادویہ

## PANCREATIC & HEPATO BILIARY DRUGS

**BILE SALTS**

بائل سالٹ

**CHOLINE CHLORIDE**

کولین کلورائیڈ

**HYDROXY METHYL NICOTINAMIDE**

ہائیڈروکسائیڈ میتھائل نکوئیٹ نامائیڈ

**KALMEG LIQUID EXTRACT**

کال میگھ

**TRICHOLINE CITRATE**

ٹرائی کولین سائٹریٹ

**TRITHO PARAMETHOXY-**

ٹرائی تھیوپیرامیتھاکسی-

**-PHENYLPROPENE**

- فینائل پروپین

**URSO DESOXY CHOLIC ACID**

ار سوڈی سائیکسی کولک ایسڈ



افعال و منافع: یہ تمام دوائیں جگر میں تحریک پیدا کرتی ہیں صفرا کی پیدائش کو بڑھاتی ہیں جگر کی صفائی اور چربیے مادوں کو جمع ہونے نہیں دیتی ہیں۔ قبض، ورم جگر، ورم اور سنگ مرارہ کو دور کرتی ہیں بچوں کی نشوونما کے زمانے میں مفید رہتی ہیں۔

مقدار و ترکیب: عمر و حالات کے لحاظ سے مقدار کا تعین کیا جائے دواؤں کے پیکنگ پر درج ہدایات کے مطابق خواراک دی جائے۔

احتیاط: یوروڈی سوکسی کو لک ایسڈ کو جگر کے امراض مزمنہ، آنتوں کے ورم اور ایام حمل میں استعمال سے احتیاط برتنا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

### BILAMIDE

(ETHNOR)

بلامائیڈ

Pyridine-3- Carboxylic acid N-Hydroxymethyl- nicotinamide 500mg Tabs  
20; Rs. 47.45

### DELPHICOL

(LEDERLE)

ڈلفی کال

Tricholine citrate 1.44g, acetyl Dimethionine 1.22g, inositol 0.24g, vit. B12,  
12mcg/15ml syrup 100ml: Rs.22.00

### ELSORBIN

(LIFE)

ایل سوربین

Tricholine citrate 275mg, sorbital solution 3gm per 5ml syrup; 100ml  
Rs.14.70; 225ml Rs. 25.07

### ENZYSTAL

(TORRENT)

ان زائی اسٹال

Pancreatin 192mg, hemicellulase 50mg, extract felis bovis 25mg: tabs: 10:  
Rs.16.00

### ESSENTIALE

(RHONE-POULENC)

اے سن شیل

Essential phospholipids (active principle; diglyceride esters of  
cholinephosphoric acid containing an excess of unsaturated fatty acids,  
predominantly linoleic acid & oleic acid ) 175mg; caps: 10: Rs.54.35

### FARIZYM FORTE

(INFAR)

فاری زائم فورٹ

Lipase not less than 6000 fip u, protease not less than 350 fip u, amylase not  
less than 4000 fip u, cellulase to an activity of 2.5 w.u., cholic acid (as bile  
ext.) 30 mg; tabs; 10: Rs.28.75



- HEPASULFOL** (FRANCO-INDIAN) ہپاسلفول  
 Trithioparamethoxyphenyl propene (containing 40% organic sulphur)  
 12.5mg 30: Rs.29.60
- LIVOCOL LIQ.** (KLAR SEHEN) لووکول لکوڈ  
 Tricholine citrate 550mg, kalmegh I.P. 300mg, (equiv. to 3mg of andrographolids), sorbitol soln. I.P. 6mg/10ml liq. 200ml: Rs.26.87
- LIVOTONE LIQUID** (EAST INDIA) لووٹون لکوڈ  
 Sodium Benzoate I.P. 140mg, Sod. Phosphate I.P. 350mg, Cascara Dry Extract B.P. 90mg, Bile salts B.P.C. 54 90mg, kalmegh liq.ext. I.P.'66 0.5ml, Alkaloids of Kurchi I.P. '66 2.0mg, Ethyl Alcohol I.P. 9.5 % v/v 10 Rs.11.15
- LIVOTONE CAPS** (EAST INDIA) لووٹون کپسول  
 Bile salts 90mg, kalmegh liq. ext.) cascara dry ext, 90 mg, total alkaloids of kuchi 2mg; caps 10 Rs.11.12
- JETOSITOL** (ETHNOR) جٹوسی ٹول  
 Hydroxymethyl nicotinamide 500mg inositol 240mg, Vit B12 12mg: tabs 10: Rs.21.00
- MECOLIN** (STADMED) میکولن  
 Tricholine citrate 0.55g, sorbitol soln. 7.15gm/10ml Liq. 200ml: Rs.29.96
- NEOKIM SYRUP** (DEYS) نیو کم سرپ  
 Acetyl methionine 177mg, tricholine citrate 600mg, inositol 36mg, sorbitol solution q.s.malt extract q.s. per 10ml syrup 110ml: Rs.12.00
- SORBILINE** (FRANCO-INDIAN) ساربین  
 Tricholine citrate 550mg, sorbitol soln 7.15g/10ml soln. 100ml: Rs. 19.55; 200ml: 29.75
- STIMULIV** (FRANCO-INDIAN) اسٹی مولو  
 Kalmegh (andrographic paniculate) 62.5mg bhringaraj (aclipta alba) 200mg pittapapda (fumaria perviiflora) 100mg/5ml Syrup 100ml: Rs.19.25 200ml: Rs.28.43
- STIMULIV TABS** (FRANCO-INDIAN) اسٹی مولو ٹبلیٹ  
 Kalmegh 60mg, bringaraj 100mg pittapapda 100mg, boldo 60mg hathichoke 100mg tabs 60: Rs.21.13
- UDCA** (DUPHARZ) یوڈی سی اے  
 Ursodesoxychloic acid 150mg; tabs: 30: Rs. 152.00



## SILYMARIN سلائی مارن

افعال و منافع: کثرت سے نوشی کے سبب ورم جگر، مزمن ورم جگر کا سکڑ جانا cirrhosis جگر کا متعدی ورم HEPATITIS-A میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۷۰ ملی گرام دن میں ۲-۳ بار شدید حالتوں میں ۱۴۰ ملی گرام دن میں ۲-۳ بار ۶ ہفتہ تک۔

منفی افعال: حساسیت والے مریضوں کو نہ دینا چاہیے۔  
مضر اثرات: ہلکے دست آسکتے ہیں۔

احتیاط: حاملہ، دودھ پلانے والی اور بچوں میں احتیاط برتنا چاہیے۔

### تجارتی مرکب

SILYBON-70

(MICRO LABS)

سلائی بون ۷۰

Silymarin 70mg: tabs: 10: Rs.38.00

حرکات معدہ کو کنٹرول کرنے اور قے روکنے والی ادویہ

## PROMOTILITY/ANTIEMETIC

### CISAPRIDE

### سساپرائیڈ

افعال و منافع: معدہ سے خراب مادوں کو خارج کرنا، قے، متلی، ابکائی اور عاداتی قبض میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: قے و متلی میں ۱۰ ملی گرام دن میں ۲ بار قبض کے لیے ۱۰ ملی گرام دن میں ۳ بار۔  
منفی افعال: قات غذائی میں رکاوٹ سے پیدا ہونے والے امراض میں دینا نقصان دہ ہے۔  
مضر اثرات: آنسو کی حرکات میں تیزی لاتی ہے۔



## تجارتی مرکبات

<b>CISADE</b>	(UNICHEM)	سیڈ
<b>CISADE MPS</b>	(UNICHEM)	سیڈ ایم پی ایس
<b>CISANORM</b>	(GUFIC)	سی سٹانارم
Cisapride monohydrate 10mg tabs; 10 tabs Rs.39.90		
<b>CISAPID</b>	(KOPRAN)	سیساپڈ
Cisapride 10mg, 10tabs Rs.31.90		
<b>CISAPID-MPS</b>	(KOPRAN)	سیساپڈ ایم پی ایس
Cisapride monohydrate 10mg, simethicone 125mg chewable tabs; 10x10 Rs.380.10		
<b>CISAPID-MPS SUSP</b>	(KOPRAN)	سیساپڈ ایم پی ایس لکوڈ
Cisapride (monohydrate) 5mg, simethicone 125mg per 5ml susp; 60ml Rs.39.10		
<b>CISAPRO</b>	ZELTA(CADILA)	سیساپرو
Cisapride 100mg : tabs: 100: Rs.370.00		
<b>CISPEL</b>	(PANACEA)	سیس پل
Cisapride (as monohydrate) 5mg & 10mg: tabs: 5mg: 10: Rs.19.00, 10mg: 10: Rs.34.00		
<b>CISPEL SUSP</b>	(PANACEA)	سیس پل لکوڈ
Cisapride (as monohydrate) 10mg per 5ml susp.: 60ml: Rs.24.00		
<b>CIZA-5</b>	(INTAS)	سی زا-5
Cizapride 5mg: tabs: 10: Rs.19.50		
<b>CIZA</b>	(INTAS)	سی زا
Ciza is available as 10mg double score dispersible tablets containing 10mg of cizapride in strips of 10. Rs.35.00		
<b>CIZA SUSP</b>	(INTAS)	سی زا لکوڈ
Cisapride 1mg per ml liquid: 30ml: Rs.15.50 : 60ml: Rs.29.00		
<b>CIZA MPS</b>	(INTAS)	سی زا ایم پی ایس
Cisapride (as mono Hcl) 10mg methyl polysiloxane 125mg: chewable tabs; 10: Rs.36.00		
<b>ESORID</b>	(SUN PHARMA)	ای سورڈ
Cisapride 10mg (as monohyd.)10: Rs.38.00		



<b>GUTPRO</b>	(DEE PHARMA)	گٹ پرو
Cisapride 10mg: tabs: 10: 38.00		
<b>GUTPRO SUSP</b>	(DEE PHARMA)	گٹ پرو لکوڈ
Cisapride 1mg per ml susp: 60ml bottle: Rs.27.80		
<b>MOTILAX</b>	(USV)	موٹی لکس
<b>PREPULSID</b>	(ETHNOR)	پری پل سڈ
Cisapride 5mg, 10mg & 20mg: tabs: 5mg: 10: Rs.25.72, 10mg: 10: Rs.38.00		
20mg 10: Rs.68.00		
<b>PROKINE</b>	(SEARLE)	پرو کائن
<b>PROCISA</b>	(JENBURKT)	پرو سی سا
Cisapride (as monohydrate) 10mg: tabs: 10: Rs.30.95		
<b>PULSID</b>	(MAX)	پل سڈ
Cisapride (as monohyd.) 5mg, 10mg; tabs: 5mg : 10: Rs.16, 10mg: 10: Rs.29.50		
<b>PULSID SUSP</b>	(MAX)	پل سڈ لکوڈ
Cisapride (as monohyd) 5mg per 5ml susp: 60 ml: Rs.29.80		
<b>SYSPRIDE</b>	(SYSTOPIC)	سکس پرائیڈ
Cisapride 10mg; tabs: 10: Rs. 38.00		
<b>SYSPRIDE MPS</b>	(SYSTOPIC)	سکس پرائیڈ ایم پی ایس
Cisapride 10mg, methyl polysiloxane 125mg, chewable tabw: 10: Rs.39.00		
<b>UNIPRIDE</b>	(TORRENT)	یونی پرائیڈ
Cisapride (as monohydrate) 10mg, tabs: 10: Rs.39.00		
<b>ZINAMIDE</b>	(SOL PHARMA)	زی نامائیڈ



**REGLAN®**  
(Metoclopramide HCL) Tablets, Syrup, Injection.

**Targeted treatment aimed at**

**HEARTBURN  
REFLUX**



► **NAUSEA  
VOMITING**





## ملین امعاء، مسہل اور آنتوں کو چکنا کرنے والی ادویہ

### PURGATIVES/LAXATIVES/LUBRICANTS

AGAR GEL

اگار جل

BISACODYL

بسکوڈائل

DIOCTYLSODIUM

ڈاکٹائل سوڈیم

SULPHOSUCCINATE

سلفو سکسی نیٹ

GUM KARAYA AND CORTEX

گم کاریا اینڈ کورٹکس

ISPAGHOL

اسپغول

LEVULOSE

لی وولوز

LIQUID PARAFIN,

لیکوڈ پیرافین

MAGNESIUM HYDROXIDE

میگنیشیم ہائیڈروکسائیڈ

PHENOLPHTHALEIN

فینال افٹھالین

SENNOSIDES

سینو سائیڈ

افعال و منافع: مذکورہ بالا ادویہ عادی قبض، بیماری اور دواؤں سے ہونے والا قبض اپریشن سے قبل و بعد آنتوں کی صفائی آلات ہضم کی کمزوری سے فضلات کی رکاوٹ کو دور کرتی ہیں۔

مقدار و ترکیب: ہر دوا کی الگ الگ ہے، مزاج و حالات کے لحاظ سے، دوا کے ساتھ پیکنگ پر لکھی مقدار کے مطابق دی جائے۔

منفی افعال: ملک اف میگنیشیا گردوں کے امراض میں نہیں دینا چاہیے لکوڈ پیرافین کا زیادہ دنوں استعمال و نامن K کے جذب ہونے میں مانع ہے۔ فینا فٹھالین الرجی والوں کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: نفخ، شکم، پیٹ میں گرگزراہٹ، شدید اسہال، قے، کمزوری چکر آنا پسینہ کی کثرت پیٹ میں اٹھن ہو سکتی ہے۔

احتیاط: شدید قبض میں آنتوں کی جانچ پہلے کرائیں، حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں احتیاط برتیں



## تجارتی مرکبات

<b>AGAROL</b>	(PARKE DAVIS)	اگارول
Liq. paraffin 9.5ml Phenolphthalein 400mg agar 60mg per 30ml		
120ml: Rs.23.35 400ml: Rs.61.80		
<b>BIDLAX-5</b>	(BIDDLE SAWYER)	بڈالکس ۵
Bisacodyl 5mg tabs 4: Rs.2.40		
<b>CELLUBRIL</b>	(ASTRA-EDL)	سیلوبرل
Dioctyl sod. sulphosuccinate 100mg: caps: 30: Rs.22.00		
<b>CREMAFFIN</b>	(BOOTS)	کریمافین
Milk of magnesia 11.25ml Liq. paraffin 3.75ml per 15ml 210ml: Rs.23.10		
<b>CREMAFFIN PINK</b>	(BOOTS)	کریمافین پنک
Milk of magnesia 11.25ml Liq. paraffin 3.75ml Phenolphthalein 50mg per 15ml 200ml: Rs.23.00		
<b>CREMAFFIN-FS</b>	(BOOTS)	کریمافین ایف ایس
Ispagol husk 3.5g per 14.25g powder: 100g: Rs.30.00		
<b>DULCOLAX</b>	(GERMAN REMEDIES)	ڈکولیکس
Bisacodyl 5mg tabs 10x10 Rs.65.00 1000 : Rs.405.00		
<b>DULCOLAX SUPPOSITORIES</b>		ڈکولیکس سپوزٹری
Bisacodyl 5mg 10mg suppos 5: Rs.24.55 50: Rs.195.40 5mg : 5: Rs.21.0		
<b>DUPHALAC</b>	(DUPHAR)	ڈوفالیک
Levulose 667mg per ml liq.: 300ml: Rs.273.00		
<b>EVACUOL</b>	(FRANCO-INDIAN)	ایواکوال
Karraya gum 3.1g Sennosides A&B (As cal salts) 5mg per 5g granules 75g: Rs.25.00		
<b>EXITAL POWDER</b>	(KLAR SEHEN)	ایکزی ٹال پوڈر
Ispaghula jusk I.P. 3.5 gms/5.6 gms 100gm jar Rs.25.31		
<b>FYBOGEL</b>	(RECKITT & COLMAN)	فائی بوجل
Ispaghula jusk 3.5gm per 5.4 g powder. 100g: Rs.28.70		



<b>ISOGEL GRANULES</b>	(GLAXO ALLEN)	آئی سو جی اے گرینول
Ispaghula husk 27g per 30g granules: 100g: Rs. 30.00		
<b>ISOVAC</b>	(HINDUSTAN ANTIBIOTICS)	آئی سو ویک
Psylum hydrophilic mucilloid 65% granules 5g: Rs. 1.76, 80g: Rs.22.00 100g: Rs.29.50		
<b>JULAX</b>	(RALLIS)	جو لیکس
Bisacodyl 10mg casanthranol 10mg tabs 10: Rs.11.60		
<b>KANORMAL</b>	(GERMAN REMEDIES)	کانورمل
Gum karaya and cortex franulae granules: 5g: Rs. 3.08, 100g: Rs.41.06		
<b>LAXICON</b>	(STADMED)	لکسی کان
Dioctyl sod. sulpho succinate 100mg: tabs: 10: Rs. 7.50		
<b>LAXICON ENEMA</b>	(STADMED)	لکسی کان اینما :
Dioctyl sod. sulpho succinate 0.25% soln. 50ml : Rs. 12.50		
<b>NATUROLAX</b>	(INFAR)	نٹرو لیکس
Isapghula husk 3.5g, excipients 2.1gm per 5.6g powder. 1 sachet: 5.6g: Rs.2.25, 100gm jar: Rs. 33.00, 250g jar: Rs.87.00		
<b>NATUROLAX FORTE</b>	(INFAR)	نٹرو لیکس فورٹ
isapghula husk 3g, senna extract powder 100mg per 6g powder, 1 sachet: 6g: Rs.3.00, 50g jar: Rs.16.00		
<b>NATUROLAX SF</b>	(INFAR)	نٹرو لیکس ایس ایف
Isapghual husk 3.5gm, excipients 0.1g per 3.6g sugar free powder: 100g jar: Rs.35.00		
<b>NEOTOMIC ENEMA</b>	(NEO PHARMA)	نیو ٹومک اینما
Glycerin 15%, sod. chlor. 15% enema 20ml : Rs.25.00		
<b>PURSENNID</b>	(SANDOZ)	پرسے نائیڈ
Senna glycosides 18mg, dioctyl sodium sulfosuccinate 50mg: tabs: 10: Rs.5.86		
<b>TAXINE</b>	(J&K DECHANE)	ٹاکسین
Ext. Cascara Sagrada (rhamnus pur shianus) 48.6mg, phenolphthalein IP1995 100mg, sana (Cassia angustifolia) IP 81mg, kaladana (Ipomoea hederacea) IPC 16.2 mg tabs; Strips of 10's Rs.31.00; 500 Rs.115.00		



## لوولیوک Livoluk

افعال و منافع: یہ لکٹولوز Lactulose کا مرکب ہے۔ دائمی اور عادی قبض، گردوں کی خرابی، یرقان سدی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۳۰ سے ۵۰ ملی لیٹر دن میں ۲ بار اور سوتے وقت پلائیں۔

مضر اثرات: نفخ شکم، آنتوں میں اٹھن درد پیدا ہو سکتا ہے۔

احتیاط: ذیابیطس کے مریضوں میں، بوڑھے، کمزور، حاملہ اور بچوں میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: نیومائی سین، دافع، تیزابیت ادویہ مانع انفلکشن خوردنی ادویہ۔

### تجارتی مرکب

LACTULOSE

3.325gm per 5ml 60ml Rs. 32.40 200ml Rs.108.00

لکٹولوز

مرخی و مسکن عضلات ادویہ

SMOOTH MUSCLE

RELAXANT/SEDATIVES

CHLORDIAZEPOXIDE

کلورڈیازپی پاکسائیڈ

افعال و منافع: عضلات کو نرم کرنے (مرخی) کے لئے عام طور سے مستعمل ہے دافع تشنج اور مسکن دماغ TRANQUILIZER ہے۔ آنتوں کی سوزش اور تیزابیت میں دیگر دواؤں کے ساتھ نفع بخش ہے بعضی بد ہضمی، الجھن، پریشانی کے سبب ہونے والی تکالیف میں مفید ہے۔

مقدار و استعمال: ۱۰ سے ۳۰ ملی گرام یومیہ، بچوں کو ۱۰ سے ۳۰ ملی گرام کئی خوراکوں میں تقسیم کر کے۔



منفی افعال: گردوں اور جگر کے امراض میں مضر ہے۔

مضر اثرات: وزن میں اضافہ، بوڑھوں میں خلل دماغی، جلد پر دھبے پڑنا متلی ابکائی، درد سر، جنسی افعال میں رکاوٹ، قبض ہو سکتا ہے۔

احتیاط: سگریٹ کی کثرت دوا کے اثر کو کم کرتی ہے۔ دوا کے دوران ڈرائیوری اور مشنری چلانا نہیں چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: دوسری مسکن ادویہ کے ساتھ دینے سے مریض کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔

## تجارتی مرکبات

**EQUILIBRIUM**

(JAGSON PAL)

ایکولی بریم

Chlordiazepoxide 10mg; tabs.

Short-term treatment of severe or disabling anxiety with or without insomnia, symptoms of acute alcohol withdrawal.

10, Rs.8

**EQUIREX**

(JAGSONPAL)

ایکوریس

Chlordiazepoxide 5mg, clidinium bromide 2.5mg; tabs: 10: Rs. 9.50

**NORMAXIN**

(SYSTOPIC)

نار میکسن

Clidinium bromide 2.5mg dicyclomine hcl 10mg chlordiazepoxide 5mg Tabs 10: Rs.9.00

## CLIDINIUM BROMIDE کلانی ڈی نیم برومائیڈ

افعال و منافع: یہ سالٹ دافع تشنج اور منع افزاز ہے۔ آنتوں کی سوزش معدہ و آنتوں کے عضلات کے تشنج، آنتوں کے زخم اور انفکشن کے علاج میں معاون ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵ سے ۳۰ ملی گرام یومیہ۔



منفی افعال: گلوکوما، پیشاب کی نالیوں میں رکاوٹ اور غدہ قدامیہ کے ورم میں اثرات بد پیدا ہوتے ہیں۔

مضر اثرات: منہ خشک، آنکھوں میں خشکی، پیشاب میں کمی قبض ہو سکتا ہے۔

احتیاط: شراب نوشی، مسکن دماغ ادویہ، کے ساتھ، حاملہ اور ڈرائیوری کرنے والوں کو احتیاط برتنا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

**NORMAXIN** (SYSTOPIC) نارماکسن  
Clidinium bromide 2.5mg, dicyclomine Hcl 10mg, chlordiazepoxide 5mg: tabs: 10: Rs. 8.20

**NORMOSPAS** (SYSTOPIC) نارمواسپاس  
Clidinium bromide 2.5mg acetaminophen 325mg dicyclomine Hcl 10mg tabs 10: Rs.7.00

**SPASRIL** (STANCARE) اسپاسرل  
Clidinium bromide 2.5mg, chlordiazepoxide 5mg: tabs 10: Rs.8.00

## ہائیوسائین مین سلفیٹ Hyoscymine Sulphate

افعال و منافع: یہ دوا آنتوں کی حرکات دودیہ کو ست کرتی، تیزابی مادے میں کمی کرتی ہے۔ زخم امعاء، عضلات کی اینٹھن، تشنج، عصبی سوء ہضم میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: بڑوں کو ۵ء ملی گرام

منفی افعال: گلوکوما، میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: منہ میں خشکی، پسینہ میں کمی نگلنے میں تکلیف، درد سر پیشاب میں جنگلی بصارت میں فرق ہو سکتا ہے۔

احتیاط: آنکھوں کی تکلیف میں، حرکات نبض سریع ہونے میں احتیاط برتیں۔



## تجارتی مرکبات

### BARDASE

(PARKE DAVIS)

بارڈیس

Phenobarb. 16mg, hyoscyamine sulph. 0.1mg, hyoscine hydrobrom. 7mg, atropine sulph. 20mg, 20 tabs (tatadiastase 1:450) Rs. 3.52

### BELLADENAL-IN

(SANDOZ)

بلاڈینال ان

Hyoscyamine 0.2292mg, hyoscine 0.0208mg, phenobarbitone 50mg: tabs: 20: Rs. 3.38

### BUSCOPAN

(GERMAN REMEDIES)

بسکوپان

Hyoscine N.hydrobromide 10mg: tabs: 10: Rs. 8.47

### BUSCOPAN INJ

(GERMAN REMEDIES)

بسکوپان انجکشن

Hyoscine N.hydrobromide 20mg per ml: 1ml: Rs. 3.41

## ISO PRO PAMIDE

آئی سو پرو پامائیڈ

افعال و منافع: معدہ کی تیزابیت، آلات ہضم کے تشنج، بڑھی ہوئی حساسیت اور آنتوں کی حرکات کو درست کرتی ہے۔ زخم معدہ، حاد و مزمن سوزش معدہ، عصبی سوء ہضم، اسہال سوزش امعاء میں مفید ہے۔ مقدار خوراک: ۵ سے ۱۰ ملی گرام روزانہ۔

منفی افعال: گلوکوما، بواب کانٹک ہونا، خون کی کمی جگر کی خرابی، قویٰ شدید غدہ قدامیہ کے بڑھ جانے میں خراب اثر پیدا کرتی ہے۔

مضر اثرات: منہ خشک رہنا، بصارت میں خلل، نیند نہ آنا، قبض پیشاب میں تنگی۔

احتیاط: قلبی امراض کے علاج کے دوران، ضعیف اور ناتواں لوگوں میں احتیاط برتیں۔

## تجارتی مرکبات

### GASTABID-1

(TORRENT)

گیسٹائیڈ-۱

Isopropamide iodide 5mg trifluoperazine Hcl 1mg tabs 10: Rs. 4.50  
100: Rs. 45.00



GASTABID-2

(TORRENT)

کیسٹا بڈ-۲

Isopropamide iodide 5mg trifluoperazine Hcl 2mg 10, Rs. 4.90

## MEBEVERIN

مے بی ویرین

افعال و منافع: عضلات شکم کو مسترخ کرتی ہے، آنتوں کی سوزش، آنتوں میں بل پڑنا پتہ اور اس کی نالی میں تسد و تشنج، معدہ و امعاء کے زخم، پچپش، اینٹھ ورم میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰۰ سے ۴۰۰ ملی گرام کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے کھانے سے ۲۰ منٹ قبل کھلائیں۔

منفی افعال: پراسٹیٹ گلینڈ غدہ قدامیہ بڑھ جانے اور گلوکوما میں استعمال مناسب نہیں۔

احتیاط: حمل کے ایام میں اس کے استعمال سے احتیاط برتیں۔

## تجارتی مرکب

COLOSPA

(DUPHAR)

کولوسپا

Mebeverine Hcl 135mg tabs 10, Rs. 75.00

پائی پین زولیت می تھائل برومائڈ PIPEN ZOLATE METHYL BROMIDE

افعال و منافع: بچوں کے قولنج درد، نفخ شکم۔ بد ہضمی، غذائی آلات کے تشنج میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۵ سے ۱۰ ابوند کھانے سے ۱۵ منٹ پہلے۔

منفی افعال: نرم معدہ کی تنگی، حمل ایام رضاعت، وجع القلب، آلات ہضم میں رکاوٹ جگر اور گردوں کی خرابی قولون آنت میں زخم اور ورم ضعف عضلات میں استعمال نہیں کرانا چاہیے۔

مضر اثرات: خشکی، قبض، متلی، ابکائی، پیشاب میں رکاوٹ، بصارت میں فرق وجع القلب، خفقان قلب، جلد پرداغ پڑنا، چکر آنا، کمزوری، نیند نہ آنا۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: دافع حساسیت دواؤں، انٹی ڈپریشن اور بنز و ڈایازین کے ساتھ رد عمل خراب ہوتا ہے۔



## تجارتی مرکب

**PIPCOL**

(GENO)

پپ کال

Pipenzolate methyl bromide 4mg, dimethyl polysiloxane (activated)  
40mg per ml drops: 10ml bottle : Rs. 9.97

**PROPANTHELENE BROMIDE** پروپان تھیلین برومائیڈ

افعال و منافع: زخم معده، ورم معده، آنتوں کی سوزش اور ورم قولون میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: زخم معده میں ۱۵ ملی گرام دن میں ۲ یا ۳ بار کھانے سے پہلے ۳۰ ملی گرام سوتے وقت دوسری تکلیف میں ۱۵ ملی گرام دن میں ۲ بار۔

منفی افعال: گلوکوما، آلات ہضم میں رکاوٹ آلات بول اور امعاء کا ناکارہ ہونا ضعف عضلات، زخم قولون وغیرہ میں استعمال مناسب نہیں۔

مضر اثرات: خشکی، بصارت میں فرق۔

احتیاط: ورم غده قدامیہ نم معده کی تنگی، وجع القلب، حمل ایام رضاعت، قلب کے شدید امراض، غده در قیہ کا بڑھنا، ڈیجاسن کے علاج کے دوران جگر اور گردوں کے امراض میں احتیاط برتنا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

**PEPCER**

(SUN PHARMA)

پپ سر

Propantheline bromide 15mg diazepam 2.5mg dihydroxy alum aminoacetate 100mg tas 10x10: Rs.52.00

**PROBANTHINE**

(SAERLE)

پروبن تھین

Probanthiline bromide 15mg, haloperidol 0.2mg: caps: 10: Rs. 17.50

**SEREBANTHINE**

(SAERLE)

سیری بن تھین

Probanthiline bromide 15mg, haloperidol 0.2mg: caps: 10: Rs. 17.50

**SPASTHELINE**

(SUN PHARMA)

اسپاس تھیلین

Probanthiline bromide 15mg: tabs: 10: Rs.3.98



**VALE THAMATE BROMIDE**

ولے تھامیٹ برومائیڈ

افعال و منافع: زخم معدہ کے سبب قنات غذائی میں تشخ، ورم معدہ، درد شکم اور چھوٹے عضلات کے تشخ میں مفید ہے۔ زچگی کے وقت رحم کے منہ کھلنے میں تاخیر ہونے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ سے ۲۰ ملی گرام دن میں ۳ بار

منفی افعال: گلوکوما ورم غدہ قدامیہ فم معدہ کی تنگی التساع قولون میں استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے۔

**تجارتی مرکبات****EPIDOSIN**

(TTK PHARMA)

اے پی ڈوسن

Valethanmate brom. 10mg; dragees 10, Rs.9.53

**EPIDOSIN INJ**

(TTK PHARMA)

اے پی ڈوسن انجکشن

Valethamate brom. 8mg/ml; inj. 5x1ml Rs.26.35

**OSDIL**

(TROIKAA)

اوس ڈل

Valethamate brom. 8mg per ml inj. 5x1ml amps: Rs.36.75

**VALOSIN**

(SHUMA LABS)

والوسن

Valethamate bromide 8mg per ml inj. 10x1ml: Rs.46.40

**MESALAZINE**

می سالازائن

افعال و منافع: آنتوں کے قولنجی درد، زخم معدہ، و امعاء کے علاج اور حفظ ماتقدم کے لیے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۴ گرام یومیہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے حفظ ماتقدم کے لیے ۲۴ گرام یومیہ۔

منفی افعال: سیلی سیلیٹ کے مرکبات سے حساس مریضوں کو مضر ہے

مضر اثرات: معدہ و آنتوں کے فعل میں خرابی اور درد سر لاحق ہو سکتا ہے۔

احتیاط: گردوں کی خرابی، خون یوریا اور پروٹین کے اخراج کی زیادتی اور حمل میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: لکٹولوز کے مرکبات جس سے پاخانے میں تیزابیت کی کمی ہو جائے۔



## تجارتی مرکب

**TIDOCOL**

(TORRENT)

ٹی ڈو کول

Mesalazine 400mg: tabs: 10: Rs.57.90

## SULPHA SALAZINE

سلفا سالازین

افعال و منافع: آنتوں کی سوزش آنتوں کے معمولی اور شدید زخم کے علاج اور حفاظت کے لیے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: مختلف حالتوں میں الگ الگ ہے علاج کے لیے ۴۰۰ ملی گرام یومیہ کئی خوراکیوں میں۔  
منفی افعال: اس دوا سے حساس مریضوں کو، ۲ سال سے کم عمر بچوں کو، آنتوں اور آلات بول کی رکاوٹ میں اس کا استعمال مناسب نہیں۔

احتیاط: خون کی جانچ کراتے رہیں۔ گردوں اور جگر کے افعال پر نگاہ رکھیں۔

مضر اثرات: مردوں میں فقدان حویات منویہ ہو سکتا ہے

## تجارتی مرکبات

**SALAZOPYRIN**

(WALLACE)

سالازوپائی رین

Sulphasalazine 500mg tabs 10: Rs. 51.00

**SALAZOPYRIN EN**

(WALLACE)

سالازوپائی رین ای۔ این

Sulphasalazine 500mg e-c tabs: 10: Rs.75.50

## AMINOSALICYLIC ACID اے می نو سیلی سائی لک ایسڈ

افعال: بڑی آنتوں کے زخم و درم میں مفید ہے۔ ۲ سے ۴ گرام کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے۔

## تجارتی مرکب

**MESACOL TAB**

10 Rs. 52.60

تجارتی مرکب



## نظام دوران خون میں کام آنے والی ادویہ

### BLOOD SYSTEM

انجماد خون روکنے والی ادویہ ANTI COAGULANT

ANTI THROMBOLYTICS

ACENO COUMAROL

ایسی نو کو مارول

افعال و منافع: یہ دوا خون میں وٹامن K کے موثر اجزاء ۲-۷-۹-۱۰ کے فعل میں رکاوٹ پیدا کر کے انجماد خون کو روکتی ہے۔ دریدوں میں خون جمنے - تھکے CLOT بننے پھپھڑوں میں قلبی اور دماغی عروق میں خون کی رکاوٹ قلب میں شدید رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: مرض کے حالات ٹسٹ رپورٹ کے بعد دوا کے ساتھ پرچے کے مطابق مقدار کا تعین کیا جائے۔

منفی افعال: دوا کے استعمال کے دوران ۱۰ دن تک اپریشن یا بایوپسی (جسم کا ریشہ نکالنے) عروق کے پھٹنے، شدید چوٹ لگنے، غذائی نالی میں جریان خون، ہائی بلڈ پریشر حادثاتی یا صدماتی جریان خون، اور حمل کے حالت میں اس کا استعمال خطرناک ہے۔

مضر اثرات: جلد پر داغ پڑنا، بخار، تھکائی، اسہال جلد میں خرابی پیدا ہونا۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: باربیٹون کے مرکبات، ریفام پی سین، فین ٹائن، شراب فیئناں بیوٹا زون، سیکنٹی ڈین کے ساتھ اس کا خراب اثر ہوتا ہے۔

تجارتی مرکب

ACITROM

(S G PHARMA)

ایسی ٹرام

Acenocoumarol 1mg & 4mg tabs 1mg: 10: Rs.22.00



## ASPIRIN

## ایسپرین

افعال و منافع: قلبی عروق میں خون کے انجماد کو روکتی ہے۔ عروق میں تھکے CLOT نہیں بننے دیتی۔ سرخ دانوں کے افعال میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ تھرموکسن کے فعل پر اثر انداز ہوتی ہے اس طرح انجماد خون سے پیدا ہونے والے عوارض میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰۰ ملی گرام روزانہ کئی غوراگوں میں تقسیم کر کے۔ حفظہ ماتقدم کے لیے ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام پیمہ کھلائیں۔

منفی افعال: زخم معدہ و ایسپرین سے حساس مریضوں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

احتیاط: جریان خون کی حالت میں، وریڈوں کی سائٹ خراب ہونے پر اور چائے کے ساتھ نہ کھلائیں۔

## تجارتی مرکبات

**ASA 50 GR** (GERMAN REMEDIES) اے ایس اے ۵۰ جی آر

Acetyl Salicylic Acid 50mg tabs 14 tabs: Rs. 7.10

**ASPICOT** (CONCEPT) ایس پی کاٹ

Acetyl Salicylic Acid 80mg tabs 10 tabs: Rs. 2.20

**CARDIWELL-PLUS** (TORRENT) کارڈی ویل

Aspirin (enteric coated) 40mg Dipyridamole 75mg 10 tabs: Rs. 13.80

**DISPIRIN C V 100** (RECKITT & COLMAN) ڈسپیرین

Acetyl Salicylic Acid 100mg Cal. carbonate 30mg Anhydrous citric acid 10mg Solution, tablets 10 tabs: Rs. 1.82

**DYNASPRIN ENCO** (U.S. VITAMIN) ڈائنا اسپرین

Aspirin 60mg dipyridamole 75mg, e-c tabs 10: Rs. 17.02

**E-PRIN** (ELDER) ای پرین

Aspirin 325mg (enteric coated) 10: Rs. 2.46

**LODOSPRIN** (ASTRA-IDL) لوڈوا اسپرین

Acetyl salicylic acid 75mg (uncoated) tabs: 14: Rs. 7.00



**LOPRIN-75**

(UNISEARCH)

لوپرین ۷۵

Low dose aspirin 75mg tabs 14 Rs. 4.50

**THROMBOSPRIN**

(SUN PHARMA)

تھرومبواسپرین

Enteric coated aspirin 100mg Dipyridamole 75mg tabs. 10 tabs: Rs.13.30

خون کو محفوظ رکھنے والے سلوشن

## BLOOD BANKING SOLUTION

**A C D SOLUTION 'A'**

(PREM PHARMA)

اے سی ڈی سلوشن اے

Dextrose 2.4gms, sodium citrate 2.20gm, citric acid anhydrous 0.73 gm per 100ml: 500ml bottle: Rs. 30.00

**A C D SOLUTION 'B'**

(PREM PHARMA)

اے سی ڈی سلوشن بی

Dextrose 1.47gms, sodium citrate 1.32 gms, citric acid anhydrous 0.44gms per 100ml : 375ml bottle : Rs.30.00

**ANTICOAGULANT CITRATE SOLUTION -A****(ACD SOLUTION**

(TABLETS INDIA) انٹی کوآگولیٹ سائٹریٹ سلوشن

Citric acid 7.3mg, sodium citrate 22mg, dextrose 24.5mg per ml solution. 75ml in 540ml bottle.

**C P D SOLUTION**

(PREM PHARMA)

سی پی ڈی سلوشن

Dextrose 2.55gms, sodium citrate (dihydrate) 2.63gm, citric acid (mono hydrate) 0.327gms, sodium acid phosphate 0.251gm, CPD solution A 70ml for storing 500ml of blood: Rs. 30.00, CPD solution B 42ml for storing 375ml of blood: Rs. 30.00, CPD solution 14ml for storing 100ml of blood Rs.17.00

افعال و منافع: یہ سلوشن خون کو بلڈ بنک میں محفوظ رکھنے کے لیے اس میں شامل کیے جاتے ہیں۔



## DIPYRADAMOL

## ڈائی پائی راڈامول

افعال و منافع: یہ عروق کو پھیلانے والی دوا ہے۔ عروق قلبیہ کی تنگی، وجع القلب بائی پاس سرجری کے دوران بھی استعمال کی جاتی ہے۔ وارفارین اور اسپرین کے ساتھ ملا کر استعمال کرائی جاتی ہے۔

مقدار و خوراک: ۲۵ سے ۷۵ ملی گرام یومیہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔

منفی افعال: زخم معده میں مضر ہے۔

مضر اثرات: درد سر، چکر، آنا، ہضم کی خرابیاں جلد پر دھاریاں پڑنا۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: دافع تیزابیت Antacid کے ساتھ دینا نقصان دہ ہے۔

## تجارتی مرکبات

### CARDIWELL

(TORRENT)

کارڈی ویل

Dipyridamole 25mg, 75mg & 100mg dragees. 25mg: 10: Rs. 3.31  
75mg: 10: Rs. 7.30 100mg: 10: Rs. 9.76

### DYNACARD

(U.S. VITAMIN)

ڈائی ناکارڈ

Dypiridamole 25mg & 100mg tabs 25mg: 10: Rs. 2.74 100mg: 10: Rs. 7.82

### INFARTIN 60

(JENBURKT)

انفارٹن ۶۰

Aspirin 60mg, dipyridamole 75mg tabs: 30 Rs. 47.50

### PERSANTIN

(GERMAN REMEDIES)

پرسنٹین

Dipyridamole 25mg & 100mg tabs 25mg: 10: Rs. 3.57 100mg: 10: Rs. 12.09

### THROMBONIL

(SUN PHARMA)

تھرومبونیل

Enteric coated aspirin 100mg Dipyridamole 75mg tabs. 10 tabs: Rs. 13.30



## HEPARIN

### ہپارین

افعال و منافع: مانع انجماد خون دوا ہے۔ خون جمانے والے مادے تھرومبین کے فعل کو روکتی ہے وریدوں میں اور پھیپھڑوں میں انجماد خون، تھکے CLOT بننے کو روکتی ہے۔

مقدار و ترکیب: حفظ مائع کے لیے ۵۰۰۰ یونٹ پھیپھڑوں میں خون جمنے کی شدید حالتوں میں ۱۰۰۰ یونٹ براوانشیوٹن ۱ ہزار سے ۲ ہزار یونٹ فی گھنٹہ کے حساب سے یا زیر جلد انجکشن لگائیں۔

منفی افعال: زخم معده، گردے اور جگر کے امراض میں، جریان خون میں، عادی نرف الدم کے مریضوں میں شدید ہائی بلڈ پریشر میں دینا خطرناک ہے۔

مضر اثرات: جریان خون، الرجي، خون میں تھرومبین کی کمی، گنج، صفہ، ہڈیوں کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ احتیاط: اس کے ساتھ اسپرین کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

### BEPARINE INJ

(BIOLOGICAL E)

ہپارین انجکشن

Heparin sodium 100 iu; 5000 iu per ml inj 1000 iu 5ml Rs. 12.27 5000 iu 5ml Rs.69.80

### BEPARINE CREAM

(BIOLOGICAL E)

ہپارین کریم

Heparin sodium I.P. 50 iu Benzyl Nicotinate 0.2% w/w 15g tube Rs. tube Rs. 6.75

### BIOPARIN

(BIOGENICS)

بایوپارین

Heparin sodium 1000 u.u and 5000 i.u 1000 i.u 5ml vial : Rs. 17m25, 5000 i.u 5ml vial: Rs.74.50

### DECLOT

(RECON)

ڈی کلاٹ

Heparin sod. 5000 and 25,000 i.u inj 5000 i.u 5ml: Rs. 15.50, 25,000 i.u 5ml: Rs.63.00

### THROMBOPHOB

(GERMAN REMEDIES)

تھرومبوفوب

Heparin 5000 iu, benzyl nicotinate 0.2g per 100g oint: 20g: Rs.17.45



**THROMBOPHOB GEL (GERMAN REMEDIES)**

تھرومبوفوب جیل

Heparin 20,000 iu per 100g: 20g: Rs.35.10

**PHENINDIONE**

فے نین ڈی یون

افعال و منافع: انجماد خون اور تھکے CLOT بننے کو روکتی ہے۔

منفی افعال: ورم جگر عاد، گردوں کی خرابی، جریان خون کے امراض، آپریشن سے ۲۴ گھنٹہ قبل یا بعد، زچگی کے دوران، حمل اور ایام رضاعت میں شدید نقصان کا خطرہ ہے۔

مضر اثرات: جلد پر دھبے پڑنا، بخار، سفید ذرات W.B.C. کی کمی ہونا، اسہال ورم جگر گردوں کی کمزوری، پیشاب کی رنگت میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: لو بلڈ پریشر، گردوں کے علاج کے دوران، وٹامن K کی کمی۔ طویل علالت اور بڑھاپے میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: دافع درد و ورم داویہ (NSAID) دافع ذیابیطس خوردنی دوائیں سلفا گرد پ، کوکسینی ڈین، انٹی بائیوٹک، فین فارین، سی می ٹی ڈین، کارٹی سون کے مرکبات منقی جگر داویہ کے ساتھ اس کو دینا نقصان دہ ہے۔

## تجارتی مرکب

**DINDEVAN**

(BIOLOGICAL E)

ڈن ڈی وان

Phenindione 50mg: tabs: 25: Rs.8.39, 100: Rs. 52.40

**STREPTO KINASE**

اسٹرپٹوکائی نیس

افعال و منافع: یہ انجماد خون کو روکنے کی بہترین دوا ہے چوٹ موج زخموں کے اندمال کے لیے مستعمل ہے۔ چوٹ لگنے کے ۳ دن کے اندر ہی استعمال کرنا چاہیے پھیپھڑوں میں خون جمنا و ریدوں میں لو تھڑا



clot بننے کو روکتی ہے قلب کے شدید درد ہارٹ اینک میں زندگی بخش دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ڈھائی لاکھ سے ۱۵ لاکھ یونٹ شدید وجع القلب تسد دی میں ساڑھے سات لاکھ یونٹ دریدی راہ سے اگھنٹہ میں ۲۰ ہزار یونٹ کے حساب سے دینا چاہیے گہری وریدوں کے انجماد میں ڈیڑھ لاکھ یونٹ ہر گھنٹہ میں دینا چاہیے۔

منفی افعال: شدید جریان خون میں، اسٹروپٹوکاس انفکشن میں، شدید ہائی بلڈ پریشر دماغی جریان خون، جگر و گردوں کے امراض ورم بالنقراس حاد، ذیابیطس شکاری، آلات ہضم کے جریان خون، قولون میں زخم، اور استخاضہ میں اس کا استعمال خطرناک ہے۔

مضر اثرات: بلڈ پریشر میں کمی، نبض غیر منتظم اور نرف الدم ہو سکتا ہے۔

احتیاط: حمل کے دوران اور بچوں کو استعمال نہ کرائیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: وہ دوائیں جو خون کے سرخ ذرات R.B.C کو متاثر کرتی ہیں۔ اسپرین اور انڈومیتھاسین کے ساتھ دینا مضر ہے۔

### تجارتی مرکبات

**EMBOKINASE** (MODI-MUNDI PHARMA) ایبو کائی نیس

1.5 Million iu vial: Rs. 3734.00

**KABIKNASE** (PHARMACIA) کابی کائی نیس

Streptokinase i.u 750000 i.u, 1.5 million i.u. I.V. injection 750000 i.u.

Rs. 1739.00 1.5million i.u. : Rs. 3088.10

**STREPTASE** (HOECHST) اسٹریپ ٹیس

Pure stabilised streptokinase 750,000 i.u & 15,00,000 i.u vials:

750,000 iu: Rs. 1961.00, 15,00,000 iu: Rs.3497.00



## لائى سين اے سى ٹائل سيلى سائى ليٹ

### LYSINE ACETYL SALICYLATE

افعال و منافع: رگوں میں خون جمناء، خون کے سرخ ذرات کا مردہ ہونا، جسم کے شدید درد میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۰.۹۹ سے ۲.۵ گرام یومیہ وریڈی راہ سے۔

### تجارتی مرکب

**BIOSPIRIN**

(BIOCHEM)

بایوسپورین

Lysine acetylasalicylate 0.9g, glycine 0.1g per vial/ inj 1 vial Rs. 10.11

### TIKLO PIDINE

### ٹیکلو پائیڈین

افعال و منافع: انجماد خون کی تکالیف حادثات، وجع القلب، ذیابیطسی ضعف بصر بائی پاس سرجری میں مستعمل ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵۰ ملی گرام دن میں ۲ بار، ۱۰ سال سے کم عمر بچوں کو دینا درست نہیں۔

منفی افعال: جریان خون کے عوارض، غذائی نالی کے زخم، جگر کے حاد امراض، خون کی غیر طبعی حالت شدید جریان خون حمل و ایام رضاعت، جگر و گردوں کی خرابی، اور بڑھاپے میں استعمال کرنا مضر ہے۔

مضر اثرات: اسہال، متلی تے ابکائی، درد شکم، جلد پر دھاریاں، نیوٹروفیل کی کمی، غذائی نالی میں زف الدم سرد درد، کان بجنا، چکر آنا، یرقان جیسی علامات ہو سکتی ہیں۔

احتیاط: دوران علاج، آپریشن سے، جگر و گردوں کی خرابی میں، بوڑھوں و بچوں کو احتیاط لازم ہے خون کے سفید و سرخ ذرات جگر کے فعل اور کولیسٹرول کی جانچ کراتے ہیں۔

### تجارتی مرکبات

**TICLOP**

ZELTA(CADILA)

ٹیک لوپ

Ticlopidine Hcl 250mg: tabs: 50: Rs.475.00



**TICLOPIDINE**

(CONCEPT)

Ticlopidine 250mg tabs: 10: Rs. 94.00

ٹیک لופی ڈین

**TICLOVAS**

(USV)

Ticlopidine Hcl 250mg: tabs: 10: Rs. 109.50

ٹیک لوواس

**TYKLID**

(TORRENT)

Ticlopidine Hcl. 250mg: Tabs: 10: Rs. 169.70

ٹائی کلڈ

**UROKINASE**

یوروکائی نیس

افعال و منافع: یہ دوا جے ہوئے خون کو تحلیل کرتی ہے، چوٹ لگنے کے سون کے اندر یہ دوا اثر کرتی ہے، وجع القلب، پھیپھڑوں میں خون جمنا، گہری وریدوں میں خون جمنا عروق و مویہ میں تھکے clot بنا، بیرونی وریدوں میں گانٹھیں پڑ جانے پر یہ دوا بہت موثر رہتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰۰۰ سے ۴۵۰۰ ہزار یونٹ / فی کلو گرام وزن کے حساب سے ڈیکسٹروز کے ساتھ ملا کر وریدی چڑھائی جاتی ہے۔

منفی افعال: اپریشن کے بعد دس دن تک، پھٹے ہوئے زخم کی حالت میں، قنات غذائی آلات بول میں نرف الدم، ہائی بلڈ پریشر، حمل، زچگی کے بعد ۰ دن تک اس کا استعمال مضر ہے۔

مضر اثرات: جریان خون، ری ایکشن الرجی کی شکایت ہو سکتی ہے۔

احتیاط: دوران حمل، بچوں کو استعمال کرانے میں احتیاط برتیں۔

زواؤں کے ساتھ رد عمل: گلوکوز ایسپرین اور انڈومیتھاسین کے ساتھ خراب رد عمل ہوتا ہے۔

**تجارتی مرکبات****UROKINASE**

(MODI-MUNDIPHARMA)

یوروکائی نیس

Urokinase 2.5 lakhs iu and 5 lakhs iu inj. 2.5 lakhs vial: Rs. 2062.00

Slakhs vial: Rs. 4011.00

**UROKINASE**

(WIN-MEDICARE)

یوروکائی نیس

per vial inj. 50,000 iu Rs. 650.50, 250,000 iu Rs. 1920, 500,000 iu Rs. 3640.00



UKIDAN

(SERUM INSTITUTE)

یونی ڈان

per vial inj 100,000 iu Rs. 1159.21 500,000 iu Rs. 4077.87

**WARFARIN SODIUM**

وارفارین سوڈیم

اُفعال و منافع: انجماد خون کو روکتی ہے وٹامن K کے اثر کو ختم کرتی ہے۔ وریدوں میں خون کا جماؤ، پھیپھڑوں کی عروق و شرائین میں رکاوٹ، وجع القلب، سرطان الریہ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ سے ۵۰ ملی گرام پو میہ۔

منفی افعال: زخم معدہ و امعاء، زنی رجحان رکھنے والوں، آپریشن اور ولادت کے ۲۴ گھنٹہ تک، جگر اور گردوں کی خرابی میں استعمال نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: گمخ (سوفہ) جلد پر دھبے پڑنا، اسہال کی شکایت ہو سکتی ہے۔

احتیاط: رضاعت، ہائی بلڈ پریشر میں، بڑھاپے، شدید علالت میں احتیاط برتنا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: دافع ذیابیطس خوردنی ادویہ، سلفا ڈرگس، کوئی نی ڈین فین فارین، سائی می نی ڈین، کارٹی سون کے مرکبات، دافع فنگس اور دافع درد ادویہ۔

**تجارتی مرکب**

UNIWARFIN

(UNICHEM)

یونی وار فین

Warfarin sodium 5mg tabs. 25 tabs Rs. 13.25



## جریان خون روکنے والی ادویہ

### COAGULANT

ADRINOCHROME-MONO (۱) ایڈی ری نو کرم مونو سیکسی کاربازون

SEMICARBAZONE

CARBAZO CHROME (۲) کاربازو کروم سیلی سیلیٹ

SALICYLATE

افعال و منافع: انجماد خون میں معاون ہے۔ منہ سے خون آنا آنکھ کے طبقہ ریٹینا میں نزع الدم، نکسیر کثرت حیض، ٹانسلز کے آپریشن سے قبل و بعد، دیگر جریان خون کی حالتوں میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: اسے ۲ گولی دن میں دو بار انجکشن وریڈی ۲ ملی لیٹرون میں ۲ بار۔

منفی افعال: ان مریضوں میں جو سیلی سیلیٹ سے حساسیت رکھتے ہیں۔

احتیاط: انجکشن وریڈی لگانا چاہیے۔

### تجارتی مرکبات

CHROMOSTAT INJ (LIFE) کرومواٹسٹ انجکشن

Adrenochrome monosemicarbazone 1mg inj; 25x2ml Rs.87.15;  
25x10ml Rs.180.94

CHROMOSTAT TABS (LIFE) کرومواٹسٹ ٹیبلیٹ

Adrenochrome monosemicarbazone 0.5mg; menaphthone sod.  
bisulphite (vit.K3) 10mg, ascorbic acid (vit C) 150mg, rutin 50mg,  
calcium dibasic phosphate 132 mg tabs 10, Rs.12.94

K-STAT INJ (MERCURY) کے اسٹٹ انجکشن

Adrenochrome monosemicarbozone 1mg 2ml Rs. 3.60

SIOCHROME (ALBERT DAVID) سائیو کروم

Adrenochrome mono semi carbazone 0.75mg Menodione sodium  
bisulphate 20mg, Rutin 50mg, vit-C 150mg Calcium dibasic  
phosphate 200mg tabs. 10 tabs Rs.6.74



**STYPTOCHROME INJECTION I.M**

اسپٹوکروم انجکشن ای ایم

(DOLPHIN)

Adrenochrome monosemicarbazone 1.5mg per 2ml amp: Rs. 4.24

**STYPTOMET**

(DOLPHIN)

اسپٹو مٹ

Ergometrine maleate 0.5mg adrenochrome monosemicarbazone 1mg, rutin 50mg menadione sod bisulphite 5mg dibasic cal phos 200mg tabs 10: Rs. 19.52

**SYPTOVIT**

(DOLPHIN)

اسپٹو وٹ

Adrenochrome monosemicarbazone 0.33mg, menadione sod bisulphite 10mg, ascorbic acid 100mg cal dibasic phos 125mg tabs 10: Rs. 15.02

**STYPTOCID**

(STADMED)

اسپٹو سڈ

Adrenochrome monosemicarbazone 0.5mg, menadione sod. besulphite 10mg Rutin 50mg, Vit C. 37.5mg, vit D 200 i.u, cal dibasic phos 125mg 10: tabs: 14.75

**STYPTOCID INJ**

(STADMED)

اسپٹو سڈ انجکشن

Adrenochrome monosemicarbazone 0.75mg/2ml. Rs. 3.60

**STYPTOCID FORTE INJ** (STADMED)

اسپٹو سڈ فورٹ انجکشن

Adrenochrome monosemicarbazone 5mg, phenol (as preservative) 0.5% w/v/ml 10ml vial: Rs. 16.50

**AMINOCARPROIC ACID** امینوکارپروایک ایسڈ

افعال و منافع: ایک سریع الاثر مانع جریان خون دوا ہے۔ جریان کی اکثر حالتوں میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵ گرام نارمل سیلائن یا ۵ فیصدی گلوکوز سیلوشن میں ملا کر وریدی طور سے دی جاتی ہے۔ اگھنڈے میں ایک گرام کے حساب سے دی جائے یہاں تک کہ خون بند ہو جائے ۲۴ گھنٹہ میں ۳۰ گرام سے زیادہ نہیں دینا چاہیے۔

منفی افعال: خون کی رگوں میں خون جمنے Clotting کی شکایت ہو تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔  
مضر اثرات: تیز ڈرپ دینے سے، لوبلڈ پریشر، سینہ میں درد، نبض غیر منتظم عروق شعریہ میں انجماد



خون کی شکایت ہو سکتی ہے۔

احتیاط: ڈرپ آہستہ آہستہ دینا چاہیے۔ امراض قلب جگر اور گردوں میں حمل کی حالت میں احتیاط برتن۔

## تجارتی مرکبات

CAPROSTAT INJ

(LIFE)

کیپرو اسٹیٹ

Aminocaproic acid L.P. 400mg inj; 10x10 Rs. 129.46

HEMOCID INJ

(BIDDLE SAWYER)

ہیموسڈ

Aminocaproic acid 250mg /ml 20ml vial Rs. 54.10

## CALCIUM GLUCONATE

کیلشیم گلوکونیٹ

متنی افعال: کیلشیم خون کی رگوں سے اخراج خون کی صلاحیت کو کم کرنا خون روکنے میں مدد دینا  
ہے بواسیر و آنتوں سے اخراج خون، خون تھوکتا (نفث الدم) خون کی قے آنا، آلات منع حمل کے  
سبب جریان خون، استخوانوں سے زائد اخراج خون میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰۰ ملی گرام سے ۱۰۰۰ ملی گرام تک۔

یونٹنگ ۱۰ ملی لٹر کے انجکشن کیلشیم گلوکونیٹ ہم سے ہی مختلف کمپنیاں تیار کرتی ہیں۔

## CONJUGATED ESTROGENS کنجوگیٹڈ ایسٹروجن

افعال و منافع: یہ دو خون کی باریک بالیوں سے اخراج خون کو کثرت حیض کو روکتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰ ملی گرام عضلاتی یا بہت آہستہ آہستہ وریڈی ۶ سے ۱۲ گھنٹہ کے وقفہ سے لگنا  
چاہیے۔

متنی افعال: حمل، خرابی جگر، سینہ میں کیسر، عروق میں انجماد خون کی تکالیف میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: آلات ہضم کی خرابیاں، چھاتیوں کا بڑھنا اور ڈھیلا ہونا۔



احتیاط: مزن ورم پستان، پستانوں کا غیر معمولی بڑا ہونا جسم میں پانی اور نمکیات کا غیر طبعی ہونا، مرگی، آدھائیسی (ثقیقہ)، دمہ قلب اور گردوں کے امراض، رحم میں غیر طبعی ساخت کا بننا، نوجوانوں میں اور ایام رضاعت میں احتیاط برتنا چاہیے۔

### تجارتی مرکبات

#### PREMARIN

(WYETH)

پری مارین

Conjugated estrogens 25mg, per vial with 5ml amp. of sterile diluent (2.0%) benzyl alcohol). 25mg: Rs.70.92

#### PREMARIN TABS

(WYETH)

پری مارین ٹبلیٹ

1.25mg: 20 tabs: Rs.113.00

### E THAM SYLATE

### ای تھم سائی لیٹ

افعال و منافع: عروق شعریہ سے جریان خون، کثرت حیض، رحمی جریان خون آلات منع حمل کے سبب جریان خون، میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰۰ ملی گرام ہر ۴ گھنٹہ بعد، جب تک خون بند نہ ہو۔

منفی افعال: حمل کی حالت میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: درد سر، جلد پر دو دڑے پڑنا، متلی آنا۔

### تجارتی مرکبات

#### DICYNENE

(DOLPHIN)

ڈائی سائی نین

Ethamsylate 250 & 500mg tabs 250mg: 10, Rs. 52,59 500mg: 10, Rs.103.19

#### DICYNENE INJECTION (DOLPHIN)

ڈائی سائی نین انجکشن

Ethamsylate 250mg, per 2ml i.v, i.m. inj 2ml, Rs.22.60



**ETHAMSYL**

(MEJDA)

ای تھم سائل

Ethamsylate 250 &amp; 500mg Tabs 250mg: 10: Rs. 40.75 500mg: 10: Rs.75.25

**HAEMO COAGULASE**

ہیمو کوگولیس

افعال و منافع: جسم کے کسی عضو سے جریان ہو اور کسی سبب سے ہو، خون روکنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ایونٹ زیر جلد یا عضلاتی انجکشن، آپریشن سے آدھ گھنٹہ قبل بطور حفظہ مقدم لگا سکتے ہیں۔ اگر آپریشن کے دوران اخراج خون ہو رہا ہو تو فوراً ایک ملی لٹر لگائیں بچوں کو عمر کے مطابق آدھ یونٹ سے ایک تہائی یونٹ دینا چاہیے۔

منفی افعال: انجماد خون کی ہسٹری میں نہیں دینا چاہیے۔

احتیاط: زیادہ مقدار میں اور دوسری خوراک ۸ گھنٹہ سے قبل نہ دی جائے۔

**تجارتی مرکب****REPTILASE**

(TROIKAA)

ریپ ٹی لیس

Haemocoagulase 1 NH unit per ml inj. 1ml amp: Rs.40.00

**BOTRO PACE**

(JUGGAT)

بوٹرو پیس انجکشن

1ml 35.75

**FERACRYLUM**

فیرا کرائی لم

افعال و منافع: عروق شریہ کے پھٹنے کٹنے سے اخراج خون آپریشن کے بعد ہونے والے جریان خون میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: فیصدی سلوشن اخراج خون کے مقام پر لگائیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: اپسی لان (APSILAN)، امینو کار پروٹیک ایسڈ کے ساتھ اس کا استعمال مضر ہے۔



## تجارتی مرکب

**HEMOLOK**

(THEMS CHEMICALS)

ہیمولوک

Feracrylum % solution 5ml amp Rs. 13.17; 10ml amp Rs. 18.90; 20ml amp Rs. 26.70

## میناڈیون سوڈیم بائی فاسفیٹ

### MENADIONE SODIUM BI PHOSPHATE

افعال و منافع: منہ سے خون آنا، کثرت حیض، پیشاب میں خون آنا، آنکھوں میں خون چھلکنا تکسیر د  
دیگر جریان خون کی حالتوں میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰ ملی گرام دن میں ۳ بار۔

متقی افعال: انٹی ہٹامین دواؤں کے ساتھ دینا مضر ہے جگر کی خرابی میں بھی نہیں دینا چاہیے۔

احتیاط: دوران حمل، اور رضاعت کے دوران منع ہے۔

## تجارتی مرکبات

**CADISPER.C**

(CADILA)

کیڈ سپر۔ سی

100mg tabs. 10 Rs. 10.34 1000 Rs. 869.70

**STYPTOCID**

(STADMED)

اسٹیپٹوسڈ

125mg tabs 10 tabs Rs. 13.50

**Kerutin-C**  
Injection / Tablet

Reduces In  
Blood loss

Menorrhagia  
Metrorrhagia  
Haemoptysis

  
Merryl  
LABORATORIES LTD.



## MENADION SODIUM ڈائی فاسفیٹ DIPHOSPHATE

افعال و منافع: خون میں پروتھر مبین کی کمی کے سبب ہونے والے جریان خون کو روکتی ہے جسم کے کسی بھی حصہ سے کسی سبب سے جریان خون کو روکنے میں مدد دیتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵ سے ۱۵ ملی گرام۔

احتیاط: نو مولود بچوں میں، حفاظت کے لیے، جریان خون کے خطرہ کے پیش نظر اس کا استعمال مناسب نہیں۔

## RUTIN

## ریوٹن

افعال و منافع: مختلف اسباب سے ہونے والے جریان خون، پیشاب میں خون آنا، خون تھوکنا، استساضہ، خطرہ اسقاط، آنکھوں میں خون چھلکنا مسوڑھوں سے خون آنا، نو مولود کا جریان خون وغیرہ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰ ملی گرام دن میں ۳ بار۔

احتیاط: حمل ایام رضاعت، اور جگر کی خرابی میں احتیاط برتنا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: انٹی ہسٹامین دواؤں کے ساتھ۔

## تجارتی مرکبات

### C.K.P. TABS

(BELL)

Ascorbic acid (vitC) 75mg, menadione sod bisulphite (vitK) 10mg, rutin (vitP) 0.1mg, calcium divasic phosphate 0.1g, chrbazochrome salicylate 2.5mg tabs; 10 Rs.4.55

### KALPASTIC

(BDH)

Rutin 20mg vit C 100mg Acetomenaphthtone 2mg Calcium gluconate 200mg tabs. 10 tabs Rs.15.80

سی، کے، پی ٹبلیٹ

کال پاسٹک



**KERUTIN-C**

(MERCURY)

کیروٹین۔ سی

12: Rs. 18.00

**STYPTOCID**

(STADMED)

اسٹیپٹوسڈ

10 tabs: Rs. 13.50

**METHYL ERGONOVINE**

میٹھائل ارگونوون

**METHYL HESPERIDIN**

میٹھائل ہسپریڈین

افعال و منافع: خون تھوکنا، پیشاب میں خون آنا، کثرت حیض، بار بار حیض آنا عادت اور خطرہ اسقاط کے پیش نظر خون آنا، آنکھ میں خون آنا، مسوڑھوں سے خون آنا، کسی بھی جگہ سے کسی بھی سبب سے خون آنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۴۰ ملی گرام دن میں ۳ بار۔

احتیاط: حمل دودھ پلانے کے ایام اور جگر کی خرابی میں مضر ہے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: انٹی ہشامین کے ساتھ خراب اثر ہوتا ہے۔

تجارتی مرکبات

**METHERONE INJ**

(MEJDA)

میٹھیرون انجکشن

Each ml contains: Methyl ergonocine Maleate I.P. 0.2mg per ml inj;  
50amps: Rs. 222.57

**CADISPER C**

(CADILA)

کیڈ سپر ٹبلٹ

10 tab: Rs. 10.34 1000: Rs. 869.70

**COSKLOT** 250, 500 Injection  
(Ethamsylate)

- Menorrhagia / IUCD Menorrhagia
- Epistaxis
- Surgery
- Haematemesis / Melena
- Haemoptysis



## VITAMIN K

## وٹامن کے

**افعال و منافع:** وٹامن K پلازمہ میں خون جمنے کی صلاحیت والے فیکٹر کا ضروری جز ہے اس کی کمی سے جریان خون کی استعداد بڑھ جاتی ہے۔ بچوں کو خون جمنے کی صلاحیت میں کمی ہیموفیلیا اور وٹامن K کی کمی میں مفید ہے۔

**مقدار و ترکیب:** اعلیٰ گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے ۲-۳ خواراکوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔

**منفی افعال:** جگر کی خرابی اور زیادہ مقدار میں نقصان دہ ہے۔

**مضر اثرات:** جلد پر خراش، سانس کی نالی میں خراش، خون کی کمی، پیشاب میں بلی روہین میں اضافہ۔

## تجارتی مرکب

GYNAE C V P

(U.S. VITAMIN)

گائے سی وی پی

Vit K 0.66mg citrous biflavonoid comp 150mg vit C 75mg, ferrous gluconate 67mg, menadione 0.66mg, cal. lact 300mg caps. 10 caps.  
Rs.10.57

## SOMATOSTATIN

## سوماتو سٹاٹین

**افعال و منافع:** یہ رطوبات معدہ گیسٹرک ایسڈ وغیرہ کی پیدائش کو روکتی ہے۔ قنات غذائی سے ہونے والے جریان خون کو روکتی ہے معدہ و آنتوں کے شدید جریان خون اور زخم کو روکتی ہے۔ آنتوں پتہ اور بانقراس کے آپریشن اور ناسور کو دوسری دواؤں کے ساتھ استعمال کرانے پر بہترین نتائج پیدا ہوتے ہیں۔  
**مقدار و ترکیب:** ۲۵۰ ماٹرو گرام وریڈی انجکشن بہت آہستہ ۵ منٹ میں لگائیں یا ۳ ملی گرام ڈیکسٹروز ۵ فیصدی سیلائن میں ملا کر ۱۲ گھنٹہ میں ڈرپ سے چڑھائیں۔

**منفی افعال:** حساس مریضوں، حمل، ایام رضاعت، ولادت کے فوراً بعد نہیں دینا چاہیے۔

**مضر اثرات:** متلی، تے، چکر آنا، چہرہ سرخ ہونا۔



احتیاط: انسولین لینے والے ذیابیطس کے مریضوں کو۔  
دواؤں کے ساتھ رد عمل: بکسوباہی ٹول، پٹی ٹرازول کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

## تجارتی مرکب

**STILAMIN**

(SERUM INSTITUTE)

اسٹیلامن

Somatostatin (as acetate) 250mg and 3mg, d-mannitol 5mg inj. 250mg  
amp: Rs. 599.37, 3mg amp: Rs.3711.65

**CHROMOSTAT INJ**

کروموسٹات

**CHROMOSTAT TAB**

کروموسٹات ٹبلیٹ

پلازما کی کمی دور کرنے والے مرکبات

**PLASMA SUBSTITUTE**

**DEXTRAN**

ڈیکسٹران

افعال و منافع: ڈیکسٹران ۶ فیصدی نارمل سیلائن یا ۵ فیصدی ڈیکسٹروز سیلوشن کے ساتھ پلازما کی کمی کو دور کرنے میں مفید و معاون ہے۔ ڈیکسٹران کے ذرات خون میں حل ہو کر پلازما پروٹین کی طرح کام کرتے ہیں۔ شدید جریان خون، صدمات، حادثات، آپریشن، جلنے کے نتیجے میں خون کے پلازما کی کمی کو پورا کرتا ہے۔

مقدار و ترکیب: شدید اخراج خون کے نتیجے میں ہونے والے صدمہ کی حالت میں ڈیکسٹران کی بوتل ۱۵ منٹ میں چڑھانا چاہیے دوسری بوتل ۳۰ سے ۴۵ منٹ میں، مریض کی حالت کے لحاظ سے مقدار و وقت کا تعین کرنا چاہیے۔

مضر اثرات: غدد لفاوی اور ساختوں میں ڈیکسٹران جذب نہ ہونے کے سبب کبھی کبھی ورمی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

احتیاط: زیادہ مقدار میں، قلب پر ناخوشگوار اثرات کی حالت میں، پیشاب کی کمی یا رکنے میں نہیں دینا چاہیے۔



## تجارتی مرکبات

**LOMODEX 70**

(RALLIS)

لو موڈیکس ۷۰

Low molecular wt dextran with average mol. wt of 70,000 in 5% Dextros or in 0.9% in normal saline 6% i.v infusion 540ml Rs. 61.86

**LOMODEX -40**

(RALLIS)

لو موڈیکس ۴۰

Solu of 10% w/v Dextran having average mol wt of 40,000 in 0.9% saline or 5% Dextrose. 540ml Rs. 150.28

## MODIFIED-GELATIN مائیڈ گیلٹین پالیپپٹائیڈ POLY PEPTIDE

افعال و منافع: یہ مرکب پلازما کا نعم البدل ہے خون میں پلازما کی کمی، شدید صدمات چوٹ حادثات جلنے، آپریشن، خون عطیہ دینے اور جریان خون کے نتیجے میں پلازما کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہترین ہے۔

مقدار و خوراک: صدمہ کی معمولی حالت میں ۵۰۰ سے ۱۵۰۰ ملی لٹر شدید حالت میں ۲۰۰۰ ملی لٹر تک دے سکتے ہیں۔

منفی افعال: حساسیت کی حالت میں، قلبی صدمات، مستقل رہنے والا ہائی پلڈ پریشر میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: ری ایکشن جلد پر چمکتے پڑنا Oedema، لو بلڈ پریشر، وجع القلب ابکائی متلی سینہ میں کبھی درد بخار تیز ہونا، بے چینی کھجلی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: پوری بوتل بیک وقت چڑھانا چاہیے بوتل جسمانی حرارت کے مطابق گرم ہونا بہتر ہے بلڈ بنک سے لیا گیا خون اس میں شامل کر کے نہیں چڑھانا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: ڈیجی ٹالس کے مرکبات اور شکر کے اجزاء کے ساتھ اس کا استعمال مناسب نہیں۔



## تجارتی مرکبات

HAEMACCEL (HOECHST) 500ml Rs. 145.00

SERACCEL (SERUM INSTITUTE) 500ml Rs. 129.00

بھیکل  
سیراکسل

## VACCINES AND SERUM

ویکسین و سیرم

ANTI SNAKE VENOM SERUM انٹی اسنیک وینم سیرم

افعال و منافع: یہ سیرم کالے ناگ، وائپر، کریٹ وغیرہ ہر طرح کے زہریلے سانپ کے کاٹنے میں مفید

### Snake Bite

ہے۔

مقدار و ترکیب: پہلی خوراک ۲۰ ملی لٹر محلول شدہ سیرم وریڈی طور سے بہت آہستہ آہستہ لگنا چاہیے

۱۰ ملی لٹر انٹ کے حساب سے دوسری خوراک ۲ گھنٹہ بعد دینا چاہیے اس کے بعد ہر ۶ گھنٹہ بعد یہی مقدار



Triangle-shaped head Poisonous Snake

دیتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ زہریلی علامات ختم ہو جائیں۔  
مضر اثرات: کبھی کبھی شدید سیرم ری ایکشن اور صدمہ کی حالت ہو جاتی ہے۔

احتیاط: ۱۰ ملی لٹر ۱۰ گنے ڈسٹنڈ واٹر میں حل کر کے زیر جلد لگائیں۔ ۳۰ منٹ تک مقامی رد عمل



Rounded head Non-Poisonous Snake

Reaction کو نوٹ کریں۔

## تجارتی مرکبات

SII POLYVALENT (SERUM INSTITUTE)

ایس آئی آئی پالی ویلنٹ

Polyvalent: Rs. 1582.69 Biovalent: Rs. 85.55

ANTI SNAKE VENOM (HAFFKINE)

انٹی اسنیک وینم پالی ویلنٹ انجکشن

POLYVALENT IN

10ml Rs. 126.00

**Havrix**

Hepatitis A Vaccine

The world's first hepatitis A vaccine

**Varilrix**



India's First Vaccine Against Varicella



## DIPHTHERIA ANTI TOXIN ڈفتھیریا انٹی ٹاکسین

افعال و منافع: خناق کے علاج میں یہ انجکشن بہت کارگر ہے۔ لوز تین، حنجرہ اور انفی خناق کے لیے اکیر ہے۔

مقدار و ترکیب: اگرچہ یہ انٹی ٹاکسین خناق کی شافی دوا ہے لیکن کبھی بے احتیاطی سے انجکشن کے ری ایکشن کے سبب مریض کی موت بھی اسی سے ہو سکتی ہے لہذا اس کاٹھ پہلے ضرور کر لینا چاہیے۔ 0.05 ملی لٹر ۱۰ گھنٹے نارمل سیلائن میں حل کر کے کلائی پر زیر جلد لگائیں ۲۰ منٹ کے بعد اگر اس مقام پر ری ایکشن کے اثرات مثلاً جلد کا متورم ہونا سرخی کھجلی محسوس ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ انجکشن ری ایکشن کر رہا ہے۔ اس کے لیے یہ سیرم بہت ہلکا کر کے رفتہ رفتہ مقدار خوراک بڑھا کر دینا چاہیے۔ اگر ری ایکشن کے اثرات نہ ظاہر ہوں تو ۲۰ ہزار یونٹ عضلاتی انجکشن لگائیں اگر خناق کا اثر ہوائی نالی اور ناک کی جھلی تک پہنچ گیا ہو تو ۴۰ ہزار یونٹ لگائیں۔ اگر کوئی فائدہ نہ ہو تو ۲۴ گھنٹہ بعد یہی خوراک دوبارہ لگائیں ٹھیک ہونے پر ۶ ہفتہ کے وقفہ سے دو خوراک اور لگادیں۔

مضر اثرات اور احتیاط: انٹی اسٹیک وینم کی طرح

### تجارتی مرکبات

DIPHTHERIA

(BENGAL IMMUNITY) ڈفتھیریا انٹی ٹاکسین

ANTITOXIN I.P.

Diphtheria toxoid Ampoule of 10, 000 i.u. Rs. 19.94 Ampoule of 20,000 i.u. Rs. 39.74

DIPHTHERIA ANTITOXIN (HAFFKINE)

ڈفتھیریا انٹی ٹاکسین

10, 000 i.u. amp. Rs. 34.88

DIPHTHERIA ANTITOXIN (SERUM INSTITUTE)

ڈفتھیریا انٹی ٹاکسین

10, 000 i.u. Rs. 19.00, 20, 000 i.u. Rs. 37.44



## گیس گنگرین انٹی ٹاکسین GAS GANGRENE ANTITOXIN

افعال و منافع: گیس گنگرین کے انفکشن کو روکنے اس کے علاج کے لیے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: حفظہ ماتقدم کے لیے ۱۵ ہزار یونٹ عضلاتی انجکشن لگائیں علاج کے لیے ۷۵ ہزار یونٹ عضلاتی لگائیں ۸ گھنٹہ بعد دوبارہ لگائیں یہاں تک کہ مرض کی علامات ختم ہو جائیں۔

منفی افعال: اس دوا سے حساس مریضوں کو اور ویریدی نہیں دینا چاہیے۔

احتیاط: انجکشن لگانے سے قبل ٹسٹ ضرور کرالیں۔

### تجارتی مرکبات

گیس گنگرین GAS GANGRENE ANTITOXIN (CHANDRA BHAGAT)

گیس گنگرین GAS GANGRENE ANTITOXIN I.P. (BENGAL IMMUNITY)

Gas gangrene antitoxin I.P. Ampoule or 4000 I.U. Rs. 10.0 Ampoule of 10,000 I.U. Rs. 24.65

گیس گنگرین GAS GANGRENE ANTITOXIN I.P. (HAFFKINE)

(Perfringens) 4000 i.u. Enzyme refined globulin. 4,000 i.u. Phenol I.P. (preservative) 0.25% Ampoule of 2.6 ml amp 32.33

## HISTAGLOBIN

### ہسٹا گلوبین

افعال و منافع: دمہ، بلغمی کھانسی، آدھاسیسی (شقیقہ) پتی اچھلنا، ایگزیم، ناک کی جھلی کا ورم مزمن ورم غار الانف، جلد کی الرجی، وغیرہ میں یہ دیکسین مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲ ملی لٹر کا انجکشن ایک ہفتہ کے وقفہ سے ۱۳ انجکشن لگائیں بچوں کو اعلیٰ لٹر لگائیں۔

منفی افعال: شدید حادثہ متعدی امراض میں، کارٹی سون کے علاج کے دوران، خراب رد عمل ہوتا ہوتا ہے۔

احتیاط: حمل، اور ایام حیض میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: بکٹریا سے تیار ہونے والے دیکسین کے ساتھ اس کا استعمال مناسب نہیں۔



## تجارتی مرکب

**ALLERGAM INJ**

(BIOGENICS)

اگرگم انجکشن

3x2 ml vial with water for injection: Rs. 55.00

**AUNATIV**

(PHARMACIA)

اونائیو

Human immunoglobulin 0.165g corresponding to 250 iu, Anti HBS amino acetic acid 20mg sodium chloride 4mg per ml I.M. inj 5ml amp (1250iu) Rs.6840.

**GAMMALIN H INJECTION** (CHEMECH)

گمالین ایچ انجکشن

Human normal immuno globulin 12mg Histamine dihydrochlor 0.15% Sodium Thiosulphate 32mg 3 ampoules.

**HISTAGLOBULIN**

(SERUM INSTITUTE)

ہسٹاگلوبین

Human normal immunoglobulin 12mg. Histamine dihydrochloride 0.15mg, sod. thiosulphate 32mg 3 ampoules Rs. 48.55

## HUMAN NORMAL IMMUNO GLUBULIN

ہیومن نارمل ایمنو گلوبولین

افعال و منافع: وائرس اور بکٹیریا سے پیدا ہونے والے متعدی امراض جو کہ قوت مدافعت کی کمی کے سبب پیدا ہوتے ہیں مفید ہے اس سے جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے یہ انجکشن جراثیمی امراض کو روکنے میں معاون ہوتے ہیں۔

احتیاط: انجکشن لگانے کے بعد شدید صدماتی کیفیت اور ری ایکشن کو دھیان میں رکھیں۔

## تجارتی مرکبات

**GAMMALIN INJECTION**

(CHEMECH)

گمالین انجکشن

**GAMMA FINE**

(HAFFKINE)

گما فین

Human normal immunoglobulin 10% injection 1ml Rs.16.50

**GAMMIMUNE-N**

(BIOGENICS)

گم ایمنی یون۔ این

Human normal immunoglobulin 50mg per ml inj. 100ml bottle: Rs.5450.00



**GLOBAL 10% INJ & 16.5 (BIOGENICS)**

گلوبولین

Human normal immunoglobulin I.P. 100mg & 165mg per ml inj;  
100mg 1ml vial : Rs.29.75, 165mg: 1ml vial : Rs.44.50

**SANDOGLOBULIN**

(SANDOZ)

سندو گلوبولین

Immuno globulin intravenous (human) 1g and 3g per vial powder for  
inj 1g vial Rs.3030.003 vial Rs.4630.

**RABIES VACCINE**

رے بیزو یکسین

افعال و منافع: کتے، گڈر، نیولے، بلی، وغیرہ کے کاٹنے پر اس سے بچاؤ اور علاج کے لیے یہ انجکشن مفید ہیں۔

مقدار و ترکیب: حفظ ماقدم کے لیے ۴ انجکشن لگائے جاتے ہیں پہلے دن، ساتویں دن، اور اکیسویں دن آخری انجکشن ۳۶۵ دن کے بعد، زہر کا اثر ہو جانے پر ۵ انجکشن لگانا چاہیے پہلے، تیسرے، ساتویں، چودھویں اور اٹھائی سوویں دن۔

متقی افعال: حمل کی حالت میں نیوما یکسین، کلورو ٹیڑا سائیکلین، ایمنو ٹرائسین کے ساتھ حساسیت کا خطرہ ہے۔

مضر اثرات: درد سر، ورم غدو، انجکشن کی جگہ سرخ و متورم ہونا، جلد پر الرجی کا اثر۔

احتیاط: حفظ ماقدم کے لیے بیمار، ضعیف اور بیماری کے بحرانی دور میں نہیں لگانا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: ایسی ادویہ کے ساتھ جو قوت مدافعت کو کمزور کرتی ہیں استعمال مناسب نہیں۔

**تجارتی مرکبات****BERIRAB**

(HOECHST)

بیری راب

**MERIEUX**

(SERUM INSTITUTE)

میری ایکس

**INACTIVATED RABIES VACCINE (HDC)**

ان اکیٹیوڈ رے بیزو یکسین

Injection. 1ml: Rs. 619.55

Vaccine for Human Use

**RABIPUR**

(HOECHST)

رپی پُر

per ml injection. 1ml Rs. 215.00





## TETANUS ANTITOXIN ٹے ٹے انس انٹی ٹاکسین

افعال و منافع: ٹے ٹے انس سے حفاظت اور علاج کے لیے مفید ہیں۔  
 مقدار و ترکیب: حفظ ماقدم کے لیے ۱۵۰۰ یونٹ زیر جلد لگائیں علاج کے لیے الاکھ یونٹ آہستہ آہستہ وریدی لگائیں بعد ازاں ۱۰ سے ۲۰ ہزار روزانہ جب تک مریض حساسیت نہ ہو جائے۔  
 مضر اثرات: انجکشن کے بعد فوراً ۱۰-۱۲ دن تک ری ایکشن ہو سکتا ہے جلد پر دو دوڑے چکے پڑنا کھجلی، جوڑوں کا درد جلد پر تھج odema، غدومتورم صدمہ بیہوشی۔  
 احتیاط: زیر جلد چند قطرے کائی کی جلد کے نیچے لگا کر ۱۵ منٹ انتظار کریں بغیر ٹسٹ کے لگا نا خطرہ سے خالی نہیں اگر مقام انجکشن پر کھجلی ورم سرخی ابھار نمودار ہو تو نہیں لگانا چاہیے۔

## ANTICATARMAL VACCINE انٹی کٹارل ویکسین

افعال و منافع: سردی نزلہ زکام سے حفاظت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔  
 مقدار و ترکیب: مضر اثرات و احتیاط دوا کے ساتھ پرچہ کے مطابق۔

## HEPATITIS. B. VACCINE ہپی ٹائی ٹس بی ویکسین

افعال و منافع: ورم جگر پیدا کرنے والے بی وائرس سے حفاظت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔  
 مقدار و ترکیب: ۲۰ مائیکرو گرام۔  
 منفی افعال: شدید انفکشن میں دینا مضر ہے۔  
 احتیاط: وریدی راہ سے اور حاملہ کو نہیں دینا چاہیے۔

### تجارتی مرکبات

CELLOGNOST HBsAg (HOECHST)

سیلوگ نوٹ

40: RS. 285, Storage: 2-8 degree C.

ENGERIX-B (SMITHKLINE)

انجی رکس بی

Vial with sterile syringe Rs. 430 (paed) Hepatitis B. surface antigen protein 10mg/0.5 ml inj. single dose vial with syringe Rs. 240.00 also Engerix-B multidose vial Rs.3000 (10 adult doses & 20 paediatric doses.)



## MEASLES, RUBELLA & MUMPS VACCINE

خسرہ، روبیلا اور کنور ویکسین

افعال و منافع: خسرہ روبیلا اور کنور MUMPS سے محفوظ رکھنے اور ان امراض کے خلاف قوت مدافعت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۰.۵ ملی لٹرز زیر جلد بازو کے اور پر حصہ میں لگانا چاہیے۔

منفی افعال: شدید انفکشن کی حالت میں، لیوکیمیا، شدید انیمیا، گردوں کے امراض میں، نظام عصبی کی خرابی اور تھج المفاصل میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: جلد پرداغ پڑنا، بخار غدد لعاب دہن کا بڑھنا، گردوں کے غدد لمفادیہ کا بڑھنا۔

### تجارتی مرکبات

LIVE COMBINED (CHANDRA BHAGAT)

FREEZE DRIED

MEASLES-RUBELLA,

MUMPS VACCINE

TRIMOVAX (MMR)

(SERUM INSTITUTE)

TRVIRATEN

(HOECHST)

TRESIVAC

(SERUM INSTITUTE)

لوکبا سنڈ فریزڈ رائیڈ  
میزل روبیلا مپس ویکسین

ٹرائی موواکس

ٹرائی ورائٹن

ٹری سی ویک

## MEASLES VACCINE

میزل ویکسین

افعال و منافع: خسرہ سے حفاظت اور بچوں میں اس کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے مستعمل ہے۔

مقدار و ترکیب: آدھ ملی لٹرز زیر جلد۔

منفی افعال: شدید تنفسی تکالیف میں، الرجی، متعدی امراض، تپ دق اور حاملہ میں اس کا استعمال مضر ہے۔

مضر اثرات: بخار، بد ہضمی، جلد پرداغ پڑنا، تیز بخار میں دورے پڑ سکتے ہیں۔

احتیاط: دریدی اور مرگی والے بچوں کو نہیں لگانا چاہیے ۲ سے ۸ ڈگری درجہ حرارت میں انجکشن رکھے جائیں۔



## تجارتی مرکبات

**MEASLES VACCINE**

(SERUM INSTITUTE)

میزل ویکسین

0.5 ml ampouls Rs. 14.75

**M-VAC**

(SERUM INSTITUTE)

ایم ویک

Single-dose amp. Rs.23.45

**RIMEVAX**

(SMITHKLINE)

ریمی ویکس

Single dose vial with sterile diluent and sterile syringe Rs.13.50

**MENINGO COCCAL VACCINE** میننکو کاکل ویکسین

افعال و منافع: دماغی پردوں کا ورم جو اس جرثومہ سے پیدا ہوتا ہے اس سے حفاظت کے لیے استعمال کرائی جاتی ہے۔

مقدار و خوراک: آدھ ملی لٹریزیر جلد لگائیں۔

منفی افعال: شدید انفکشن والے امراض میں اس کا استعمال مناسب نہیں۔

مضر اثرات: انجکشن کے مقام پر ورم درد سرخی اور ابھار ہونا، جسم میں پانی کی زیادتی ہونا۔

احتیاط: حاملہ اور ۲ سال سے کم عمر بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔ وریڈی نہ لگائیں۔

## تجارتی مرکبات

**MENCEVAX**

(SMITHKLINE)

مین سی ویکس

s.c. 10 dose vial with sterile diluent Rs.250.00

**MENINGO COCAL**

(SERUM INSTITUTE)

میننکو کاکل ویکسین

**VACCINE A+C**

50 dose vial Rs.295.45

**OMNIGEN C**

(BENGAL IMMUNITY)

او منی جن۔ سی

**ORAL POLIO VACCINE** (S. INSTITUTE) اورل پولیو ویکسین

افعال و منافع: ہر طرح کے پولیو انفکشن سے بچاؤ کے لیے کارگر ہیں۔



منفی افعال: شدید امراض متعدد یہ ہیں۔ حاملہ اور نیومائی سین سے الرجک بچوں میں نہیں دینا چاہیے۔  
احتیاط: صرف خوردنی استعمال کرانا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

**POLIO SABIN (ORAL POLIO) (SMITHKLINE)**

پولیو سابن

25 dose polypropylene plastic tube: Rs. 63.00

**ORAL POLIO VACCINE SABIN (HAFFKINE)**

اورل پولیو ویکسین

50 vial of 20 dose Rs. 9.22

## QUADRUPLE VACCINE

کو اڈر وپل ویکسین

افعال و منافع: یہ خناق، پولیو، کالی کھانسی اور ٹے ٹے نس سے حفاظت کے لیے استعمال کرائی جاتی ہے۔  
مقدار و خوراک: پیدائش سے تیسرے ماہ آدھی ملی لٹر ہر مہینہ ۳ مہینہ تک دی جاتی ہے، بوٹر  
خوراک ۶ ماہ بعد دینا چاہیے۔

منفی افعال: شدید انفکشن کی حالت میں عصبی خرابیوں میں اور کارٹی سون کے مرکبات کے ساتھ نہیں  
دینا چاہیے۔

مضر اثرات: مقامی رد عمل، جلد پر ابھار اور چکے پڑنا، انجکشن کی جگہ درد، ورم، ابھار ہونا بخار خشکی،  
بے چینی۔

احتیاط: ۶ سال سے زائد عمر کے بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

## SPECIAL ASTHMA MIXED VACCINE (BENGAL IMMUNITY)

افعال و منافع: یہ ویکسین نزلہ زکام اور دمہ سے حفاظت کے لیے لگایا جاتا ہے۔

مقدار و ترکیب و احتیاط: انجکشن کے ساتھ پرچہ کے مطابق۔



## SPECIAL ECZEMA MIXED VACCINE (Bengal Immunity)

ایکسٹنشنل ایگزیماسکسڈ ویکسین: یہ ایگزیماسکسڈ ویکسین، ہار ہار ہونے والے ایگزیماسکسڈ ویکسین کے لیے مستعمل ہیں۔  
مقدار و ترکیب: مضر اثرات و احتیاط: پرچہ کے مطابق۔

## STREPTO STAPHYLO MIXED VACCINE (Bengal Immunity)

اسٹریپٹو اسٹافیلوکوکس ویکسین: یہ ویکسین اسٹافیلوکوکس اور اسٹریپٹوکوکس جراثیم سے پیدا ہونے والے امراض سے حفاظت کرتی ہے۔  
مقدار و ترکیب: استعمال مضر اثرات و احتیاط کے لیے پرچہ دیکھیں۔

## TETANUS TOXOID

ٹینس ٹاکسائیڈ: بچوں اور حاملہ عورتوں کو ٹینس ٹاکس سے محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کرائی جاتی ہے۔  
مقدار و ترکیب: حاملہ کو آدمی ملی لٹرو ویکسین چھ مہینہ دوسری خوراک آدھ ماہ بعد تیسری خوراک ۹ ماہ بعد دینا چاہیے بچوں کو صرف ایک خوراک آدھ ملی لٹرو دینا چاہیے ۵ سال بعد بوسٹر ڈوز دینا چاہیے۔

## TRIPLE ANTIGEN (GLAXO)

ٹریپل اینٹی جن: یہ ویکسین خناق ٹینس اور کالی کھانسی سے حفاظت کے لیے دی جاتی ہے۔  
مقدار و ترکیب: پہلے سال کے بچہ کو ۱ ماہ کے وقفہ سے ۳ خوراکیں دی جاتی ہیں بوسٹر ڈوز ۱۸ ماہ اور ۵ سال میں دی جاتی ہے ۵ سال سے زائد عمر والوں کو نہیں دینا چاہیے۔  
منفی افعال: شدید بخار کی حالت میں والدین کو دورہ آنے کی ہسٹری میں بوقت پیدائش ہونے والے



دماغی صدمات و عوارض میں۔ ٹسٹ کرنے پر ری ایکشن ہونے میں عصبی امراض، شدید الرجی میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: بخار، بے چینی، بھوک کم ہو جاتی ہے۔

# Tyvox-Vi<sup>TM</sup> ٲائی فائڈ ویکسین

30mcg Vi Capsular Polysaccharide Typhoid Vaccine

## TYPHOID VACCINE ORAL ٲائی فائڈ خوردنی ویکسین

افعال و منافع: سالمونیلائیٹی فائی جراثیم سے بچاؤ کے لیے خوردنی طور پر استعمال کرائی جاتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۶ سال سے زائد عمر والوں کو ایک کپسول پہلے دن تیسرے دن پانچویں دن کھانے سے ایک گھنٹہ قبل تازہ پانی یا دودھ سے دینا چاہیے۔

منفی افعال: آنسوؤں کے شدید درم، شدید بخاروں، ایام حمل، اور قوت مدافعت کی کمی میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: نظام ہضم میں خرابیاں ہو سکتی ہیں۔

احتیاط: ۶ سال سے کم عمر والوں کو نہیں دینا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: انٹی بائیوٹک اور سلفا گروپ کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

## تجارتی مرکب

**TYPHORAL**

3 caps Rs. 153.00

**TYPHIM-VI**

(HOECHST)

(ALIDAC)

ٲائی فورال

ٲیئی نم



## LACTOBACILLUS SPOROGENES

لکٹو بے سی لس اسپاروجینس

افعال و منافع: یہ مونی لیال انفکشن، انٹی بائیوٹک کی وجہ سے آنے والے اسہال اور آنتوں کے فعل کو درست کرنے کے لیے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱ سے ۲ گولی دن میں ۳ بار یا ۶۰ سے ۱۲۰ ملین۔

### تجارتی مرکبات

**SPORLAC**

(UNISANKYO)

اسپارلیک

Spores of lactobacillus sporogenes 60 million tabs: 10: Rs.9.23

**SPORLAC POWDER**

(UNISANKYO)

اسپارلیک پوڈر

Spores of actobacillus sporogenes 150 million per 1.8 g powder  
15x1.8g sachets Rs.30.90

**VIZYLAC**

(UNICHEM)

وزائی لیک

Lactobacillus sporogenes 40 million spores, 10: Rs.8.58

## STERILE MILK PROTEIN

اسٹیرائل ملک پروٹین

افعال و منافع: مزمن متعدی بیماریاں، کرائک انفکشن، ایسے امراض جو انٹی بائیوٹک اور سلفا ڈرگس سے درست نہ ہوں ان کے علاج میں معاونت کرتے ہیں۔

مقدار و ترکیب: ۲ سے ۵ ملی لٹر روزانہ یا ایک دن وقفہ سے ۶ یا زائد عضلاتی انجکشن لگائیں۔

### تجارتی مرکبات

**SIOLAN-12 INJ**

(ALBERT DAVID)

سایولان انجکشن ۱۲



SIOLAN INJ

(ALBERT DAVID)

سالولان انجکشن سادہ

**CHELATING AGENT****تریاتی مرکبات****DESFERIOXAMINE****ڈس فیریو آکسامین**

افعال و منافع: جسم میں آئرن کی زیادتی، جسم سے زائد فولاد کے مادوں کو خارج کرتی ہے۔ لیکن ہموگلوبین یا انزائم کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ فولاد کے انجذاب اور کمی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ فیصدی کاسلوشن ۵۰۰ ملی گرام ۵ ملی لٹرو اثر میں حل کر کے عضلاتی دیا جاسکتا ہے۔ شدید ضرورت میں آدھ گرام سے ۴ گرام شفاف سلوشن وریدی راہ سے ۱۲ گھنٹہ میں دیا جاسکتا ہے بہت آہستہ لگانا چاہیے خوردنی طور سے ۵ سے ۱۰ گرام ۱۲ گھنٹہ میں دیا جاسکتا ہے۔

منفی افعال: حمل کی حالت میں دینا منع ہے۔

مضر اثرات: بلڈ پریشر کم، جلد پر ری ایکشن کا اثر، صدمہ، بے چینی، دورہ پڑنا، ہضم کی خرابیاں جگر اور گردے کا فعل متاثر ہونا، پیشاب گلابی یا کتھی رنگ کا آنا۔

احتیاط: دوران علاج قلب اور آنکھوں کے افعال پر نگاہ رکھنا چاہیے۔ وریدی انجکشن تیز لگانے سے موت ہو سکتی ہے۔

**تجارتی مرکب****DESFERAL**

(HIND CIBAGEIGY)

ڈس فیرال

Desferrioxamine 500mg Dry active substance. 500mg vials.

**DIMERCAPOL**

ڈائی مرک پول

افعال و منافع: معدنی زہروں مثلاً سٹیکیا، پارہ، سونا، بسمتھ، تھیلیئم، انٹی موئی، لیڈ سیسہ جیسی چیزوں کے جسم میں پہنچنے پر ان کے اخراج اور مضر اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے۔



مقدار و ترکیب: پہلے دن ۴۰۰ سے ۸۰۰ ملی گرام عضلاتی انجکشن کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے دوسرے دن ۲۰۰ سے ۴۰۰ ملی گرام بچوں کو ۵ ملی گرام فی کلو گرام وزن کے حساب سے۔

منفی افعال: فولاد اور کیلشیم کے زہروں میں، جگر کی کمزوری اور ہائی بلڈ پریشر میں مضر ہے۔

مضر اثرات: بلڈ پریشر ہائی ہونا، وجع القلب، تھکیا ہوا، جسم میں گرمی کا احساس، بھوک کی زیادتی، آنسو زیادہ آنا، آنکھوں کا متورم اور سرخ ہونا، آشوب چشم، ناک بہنا، عضلات اور اعصاب میں درد، درد شکم، درد سر، ہاتھوں میں جھنجھناہٹ، سینہ اور حلق میں تشنج، پیشانی اور ہاتھوں میں پسینہ زیادہ آنا، انجکشن کے مقام پر درد، دوسرے اور تیسرے انجکشن کے بعد بخار کی زیادتی۔

احتیاط: کسی طرح کے ری ایکشن مضر اثر بخار کی تیزی میں انجکشن روک دیں، علامات ختم ہونے پر دوبارہ لگائیں۔

## تجارتی مرکب

**B.A.L. INJECTION**

(BOOTS)

بی۔ اے۔ ایل انجکشن

Dimercapol 100mg per 2ml inj 2ml ampoule 12x2ml: Rs. 1260.00

## PENICILLAMINE

## پینی سیلامین

افعال و منافع: جسم میں کاپر (تانبا) کی مہلک مقدار پہنچنے پر اس کے خراب اثر کو دور کرنے کے لیے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ ولسن ڈیزیز، تھیراٹک فاسفل شدید پیشاب میں ذرات اور سسٹ کو دور کرنے کے لیے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ولسن ڈیزیز میں ۲۵۰ ملی گرام دن میں ۴ مرتبہ کھانے سے اگھنڈہ قبل اور سوتے وقت کھلائیں، پیشاب میں سسٹ خارج ہونے پر اسے ۴ گرام یومیہ۔

منفی افعال: حمل، گردوں کی خرابی، اے پلاسٹک انیمیا، میں کھلانا مضر ہے۔



مضر اثرات: کنبلی، جسم پر داغ پڑنا، چلتے ابھار Oedema، بخار ہڈی میں درد و دکا بڑھنا، پتی اچھلنا، بھوک کی کمی، فم معدہ پر درد، قے متلی ابکائی، دست آنا جگر خراب ہونا زخم معدہ، لیو کو سائیٹ کی کمی، تھرا مین کی کمی خون میں سرخ ذرات کی کمی اسنو فیلیا، پیشاب میں پروٹین کا اخراج، پیشاب میں خون آنا، کان بجنا عصب باصرہ میں درد ہو سکتا ہے۔

احتیاط: بخار و دیگر علامات ردیہ ظاہر ہونے پر دوا بند کر دیں کنبلی، پتی کا علاج انٹی ہشائین ادویہ سے۔

### تجارتی مرکبات

**CUPRIMINE**

(MERINO)

کیو پرامن

Penicillamine 200mg caps.

**CILAMIN-250**

(PANACEA)

سلا مین

D-penicillamine 250mg caps 10 Rs. 78.89

**PENICILLAMINE CAPS** (NEON)

پن سیلا مین کپسول

Penicillamine 250mg caps; 5x10 caps Rs.395.00

خون میں پروٹین کم کرنے والے مرکبات

**HYPOLPIDAMEMIC AGENT**

**BEZAFIBRATE**

بنز افائبریت

افعال و منافع: خون میں پروٹین کی مقدار میں اضافہ ہونے پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار

منفی افعال: جگر و پتے کے امراض، گردوں کی شدید کمزوری، حالت حمل اور ایام رضاعت میں مضر

ہے۔



مضر اثرات: فتور، غم، عصبی درد، الرجی، ہالوں کا کرنا۔  
احتیاط: ایسٹروجن تھیراپی کے دوران، بچوں کو بہتر نتائج برآمد نہ ہوں تو دوا استعمال نہ کرائیں۔  
دواؤں کے ساتھ رد عمل: مانع انجماد و خون ادویہ، دافع شکر (ڈیابیطیس) میں دینا مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

**BEZALIP**

(BOEHRINGER)

بزالپ

Benzafibrate 200mg, tabs: 10: Rs. 76.23

**BEZALIP RETARD**

(BOEHRINGER)

بزالپ دیرپا

Benzafibrate 400mg :tabs: 10: Rs. 150.00

## CHOLESTRAMIN

کولسٹرامین

افعال و منافع: خون اور پلازما میں کولیسٹرول کی مقدار کم کرنے میں، کولیسٹرول کے سبب دست آنا،  
ڈیابیطیس، صفرا کی نالی میں رکاوٹ اور کھجلی اور فریبی دور کرنے میں معاون ہے۔

مقدار و ترکیب: بڑوں کو ۲ سے ۵۴ ملی گرام روزانہ ایک خوراک یا کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے  
بچوں کو عمر کے مطابق، ۶ سال سے کم عمر بچوں کو نہ دی جائے۔

منفی افعال: صفرا کی نالی کی رکاوٹ، قبض، حمل اور ایام رضاعت، میں دینا مضر ہے۔

احتیاط: طویل مدتی علاج کے دوران حل پذیر وٹامن کا استعمال کرنا چاہیے۔

## تجارتی مرکب

**QUESTAN**

(CHANDRA BHAGAT)

کوئی سٹران

Anhydrous cholestyramine 9gm sachet Price N/A.



## CLOFIBRATE

## کلوفا بیریٹ

کولیسٹرول کی زیادتی کے سبب، قلبی تکالیف، عروق کا تنگ ہونا سانس میں تنگی، دل کا دورہ، ہارٹ اٹیک، وجع القلب، عروق قلبی میں تسد، ذیابیطس میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰ سے ۳۰ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے یومیہ ۲-۳ خوراکیوں میں تقسیم کر کے۔

منفی افعال: جگر اور گردوں کے امراض میں پتہ کی خرابی و پتھری میں لیام حمل و رضاعت میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: بالائی شکم میں تکلیف ہونا قے متلی، آنتوں کا ست ہونا، کبھی بالوں کا گرنا، عضلات میں درد، خون کے سفید ذرات W.B.C. میں کمی، ہیموگلوبین میں کمی واقع ہونا۔

احتیاط: مانع انجماد خون ادویہ کم مقدار میں دینا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: مانع انجماد خون ادویہ، فین ٹائٹن اور ٹالبوٹامائڈ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

## GEMFIBROCIL

## گیم فی بروسل

افعال و منافع: خون میں پروٹین کی زائد مقدار کم کرنے میں مفید ہے۔ ذیابیطس، موٹاپا اور ان امراض میں جو پروٹین کی زیادتی سے پیدا ہوتے ہیں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۹۰۰ سے ۱۰۰۰ ملی گرام کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے کھانے سے ۳۰ منٹ پہلے۔

منفی افعال: پتے کے امراض پتھری و رم عروق بند ہونا، جگر گردوں کے امراض میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: ہضم کی خرابی، درد شکم، متلی قے اسہال، اسٹوفیلیا، جلد پر داغ عضلاتی درد بصارت میں فرق، لیو کوسائٹ کی کمی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: علاج سے قبل خوراک ورزش وغیرہ تدابیر سے پروٹین کم کریں۔



دواؤں کے ساتھ رد عمل: مانع انجماد خون ادویہ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

<b>LIPIGEM</b>	(TIDE)	لیپی جیم
Gemfibrozil 300mg caps 10 caps	Rs.44.00	
<b>LIPIZYL</b>	(NICHOLAS)	لیپی زائل
Gemfibrosil 300mg caps 20 caps	Rs.70.00	
<b>LOSTEROL</b>	(GUFIC)	لوشرول
Gemfibrosil 300mg caps 2x15 caps	Rs. 96.15	
<b>LOPID</b>	(PARKE DAVIS)	لوپڈ
Gemgibrosil 300mg caps. 10 caps	Rs. 96.75	
<b>NORMOLIP</b>	(SUN PHARMA)	نار مولپ
Gemgibrozil 300mg caps. 6 caps	Rs.47.88	
<b>TRIGLYD</b>	(MICRO LABS)	ٹرائی گلائڈ
Gemfibrozil U.S.P. 200mg caps;	Price N/A.	

## GUGGAL STERONES

## گوگل اسٹیرون

افعال و منافع: خون میں کو لیسٹرول، پوپروٹین چربی کی زیادتی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵ ملی گرام دن میں ۳ بار کھانے کے بعد

منفی افعال: ہاضمے کی خرابیاں دست پچیش آنا

احتیاط: جگر کے امراض میں احتیاط برتیں۔

## تجارتی مرکب

<b>GUGLIP</b>	(CIPLA)	گوگلپ
Guglip equivalent to gugulsterones 25mg tabs. 15 tabs	Rs. 21.12	



## LOVASTATIN

## لووا سٹاٹن

افعال و منافع: کو لیسٹرول اور چربی کی زیادتی اور اس سے پیدا ہونے والے عوارض میں مفید ہے۔  
 مقدار و ترکیب: ۲۰ ملی گرام ایک خوراک میں شام کو کھانے کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ ۸۰ ملی گرام تک  
 منفی افعال: دوا سے حساسیت شدید ورم جگر، حمل اور ایام رضاعت میں دینا مضر ہے۔  
 مضر اثرات: جلد پر داغ پڑنا، تھج عضلات، درد سر، سینہ کا درد، متلی سانس میں تنگی درد شکم، قے  
 اسہال بے چینی، نیند میں کمی، ضعف باہ  
 احتیاط: جگر کے امراض، آنکھوں اور گردوں کی جانچ کراتے رہیں۔ کریاٹین لیول میں اضافہ ہو تو دوا  
 بند کر دیں ۱۸ سال سے کم عمر کو نہیں دینا چاہیے۔  
 دواؤں کے ساتھ رد عمل: ارائی تھرومائی سین گیم فی بروسل کے مانع انجماد خون اور ریغام پی سین  
 کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

<b>LOVADAC</b>	(ALIDAC)	لوواڈیک
Lovastatin 20mg: 10: Rs. 125.00		
<b>RECOL</b>	(THEMIS CHEMICALS)	ری کول
Lovastatin 10mg & 20 mg: tabs: 10mg: 25: Rs. 145.00, 20mg: 25: Rs.250.00		
<b>ROVACOR</b>	(STAN CARE)	روواکور
Lovastatin 10mg and 20mg : tabs: 10mg : 10: Rs. 120.00, 20mg: 10: Rs. 210.00		

## RIBO FLAVIN TETRABUTYRATE

## ریبو فلی وین ٹٹرایبوٹائی ریٹ

افعال و منافع: کو لیسٹرول، پروٹین کی زیادتی ہائپر لیوڈیمیا سے پیدا ہونے والے امراض کو دور کرنے



میں مفید ہے، شرائین میں سختی، ہائی بلڈ پریشر ذیابیطیس، جگر و پتے کے امراض، فریبی، ورم قرنیہ، آشوب چشم، الرجی چہرے کا ایگزیم، پلاگرہ منہ کی جھلی کی سوجن (قلاع) حاملہ میں ربوفلے وین کی کمی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰ سے ۴۰ ملی گرام دن میں ۳ بار

مضر اثرات: متلی، ابکائی،

## تجارتی مرکب

**LIPABOL**

(CADILA)

لیپابول

Riboflavin tetrabutyrate 20mg tabs. 10 tabs: Rs.4.98

وجع القلب کو روکنے اور عروق کو کشادہ کرنے والی ادویہ

**ANTI ANGINAL AND CORONARY VASODILATOR**

وہ دوائیں جو وجع القلب کی شدت کو کم کرتی ہیں **BETA BLOKER**

**ACEBUTOLOL**

ایس بیوٹولول

افعال و منافع: انجائنا، درد دل ہارٹ اٹیک، ہائی بلڈ پریشر حرکات قلبیہ کے بے ترتیب ہونے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ہائی بلڈ پریشر میں ۴۰۰ ملی گرام یومیہ کھلائیں یا ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار قلبی حرکات کی بے ترتیبی یا شدید ضرورت کے وقت ۲۵ ملی گرام وریڈی بھی لگایا جاسکتا ہے۔

منفی افعال: قلبی صدمہ Shock، 100/60 سے کم بلڈ پریشر، عروق قلبیہ میں تشدد اور ویراپال



کے ساتھ استعمال نہیں کرانا چاہیے۔

مضر اثرات:۔ لوبلڈ پریشرو جمع القلب، ڈپریشن، نظام ہضم میں خلل واقع ہو سکتا ہے۔  
احتیاط: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں، ایک دم دواروک دینا نقصان ہو سکتا ہے۔

## تجارتی مرکب

SECTRAL-200

(RHONE POULENC)

سیکڑال

Acebutolol Hcl equiv. to acebutool 200mg: tabs: 10: Rs. 38.72

## ATENOLOL

## ایٹی نولول

افعال و منافع: شدید وجع القلب، قلبی حرکات بے ترتیب ہونا، قلب کے والو خراب ہونا سر میں شدید چوٹ ضربات میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: شدید وجع القلب میں اور سر کی چوٹ میں ۵ سے ۱۰ ملی گرام وریڈی آہستہ آہستہ لگائیں پھر ۵۰ سے ۲۰۰ ملی گرام براہ دہن دن میں ۳-۴ بار کئی خوراکیوں میں دے سکتے ہیں۔

منفی افعال: اگر نبض کی حرکات ۵۰ فی منٹ سے کم ہوں، سسٹولک پریشر ۱۰۰ سے کم ہو قلبی تشدد دوسرے تیسرے درجے کا ہودل فیل ہونا، سینہ میں شدید درد و حمل اور ایام رضاعت میں نہیں دینا چاہیے۔  
مضر اثرات: وجع القلب، لوبلڈ پریشر، عروق قلبیہ میں تشدد قلبی صدمہ Shock جگر اور گردوں کی خرابی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: بوڑھوں میں احتیاط برتنا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: دافع ذیابیطیس ادویہ، کلونی ڈین کے مرکبات، ڈیجی ٹیلس کے مرکبات



## تجارتی مرکبات

- ALOTEN** (CORI) الوٹین  
Atenolol 50mg & 100mg: tabs 50mg: 10, Rs.11.50 100mg: 10, Rs.20.70
- ANGITOL** (SWIFT) اینٹی ٹول  
Atenolol 25mg, 50mg, & 100mg: tabs: 25mg: 15x14: Rs.174.30, 50mg 15x14: Rs.270.90, 100mg: 15x14: Rs.444.00
- ANGITOL PLUS** (SWIFT) اینٹی ٹول پلس  
Atenolol 50mg, nifedipine 20mg, sust. release tabs: 10x10: Rs. 398.00
- ATECARD** (DABUR) ایٹی کارڈ  
Atenolol 25mg, 50mg and 100mg: tabs: 25mg 14; Rs.10.80, 50mg 14; Rs.18.00, 100mg: 14; Rs. 33.00
- ATECARD-D** (DABUR) ایٹی کارڈ ڈی  
Atenolol 50mg, chlorthalidone 12.5mg tabs: 14: Rs.25.00
- ATCARDIL** (SUNPHARMA) ایٹ کارڈل  
Atenolol 50 & 100mg: tabs 50mg: 14: Rs.18.38 100mg: 14: Rs.35.18
- ATECOR** (WINMEDICARE) ایٹی کور  
Atenolol 25mg 50mg & 100mg tabs 25mg 14tabs Rs.11.00 50mg: 14 tabs Rs.18.10 100mg: 14 tabs Rs.32.00
- ATEN** (KOPRAN) اے ٹن  
Atenolol 25 mg, 50mg & 100mg tabs 25mg: 4x4x14 : Rs.193.50, 50mg 4x4x14 Rs.307.60; 100mg 4x4x14 Rs.553.20
- ATEN-75** (KOPRAN) اے ٹن ۷۵  
Atenolol 75mg: tabs: 4x4x14 tabs: Rs.442.98
- ATENEX 25/50/100** (KOPRAN) اے ٹن ۲۵/۵۰/۱۰۰  
Atenolol 25mg/50mg/100mg, film coated tabs: 25mg: 14: Rs.12.60 50mg: 14: Rs.19.50, 100mg: 14: Rs.33.00
- ATENOVA** (LUPIN) اے ٹی نووا  
Atenolol 50mg & 100mg : tabs 50mg: 14: Rs. 18.41 100mg : 14 Rs.41.96



- BETA 50/100** (STADMED) بے ۵۰/۱۰۰  
Atenolol 50 100mg: 50mg 14 tabs: Rs.19.00 100mg 14 tabs: Rs.34.50
- BETA-BIDURET** (BIDDLESAWYER) بے ٹابی ڈریٹ  
Atenolol 50mg amiloride Hcl 2.5 mg hydrochlorthiazide 25mg caps;  
10: Rs.11.50
- BETACARD** (TORRENT) لی ٹاکارڈ  
Atenolol 25mg, 50mg & 100mg tabs 25mg 14: Rs.12.95 : 50mg 14:  
Rs.19.95 100mg: 14: Rs.36.95
- BETANACTEN** (HIND ANTIBIOTICS) بی ٹا نکٹین  
Atenolol 50mg, Nifedipine (sust. Releases) 20mg caps 10x10 Rs.23.80
- BETA-NICARDIA** (UNIQUE) بیٹا نکارڈیا  
Atenolol 50mg, nifedipine (sustained release 20mg; caps 10: Rs.19.92
- BETANIF** (UNISEARCH) بیٹانف  
Atenolol 50mg , s-r nifedipine 20mg; tabs: 10 : Rs.20.80, 30: Rs.57.25
- BETANOL** (UNISEARCH) بیٹانول  
Atenolol 50mg tabs; 14 tabs Rs.18.00
- BETATRTOP** (SUN PHARMA) بیٹا ٹروپ  
Atenolol 50mg, nifedipine 20mg sustained release caps 14: Rs.33.87
- BETEN** (SIGMA LABS) بی ٹین  
Atenolol 50mg & 100mg : tabs: 50mg: 14: Rs. 16.87, 100mg : 14:  
Rs.31.87
- CALBETA** (TORRENT) کال بیٹا  
Atenolol 50mg , nifedipine s-r 20mg: tabs: 10: Rs.23.90
- CARDULES PLUS 10/20** (NICHOLAS) کارڈیولس  
Atenolol 50mg, nifedipine 10mg/20mg s-r caps: 10 mg: 10: Rs.16.50,  
20mg: 10: Rs.20.00
- CATENOL** (ALIDAC) کے ٹی ٹال  
Atenolol 50mg & 100mg Tablets: 50mg: 14: Rs.22.40: 100mg: 14:  
Rs.40.60
- DIBETA** (TORRNT) ڈائی بے ٹا  
Atenolol 50mg, hydrochlorthiazide 25mg and Amiloride 2.5mg. Caps  
10: Rs.14.07



<b>DEPTEN</b>	(CADILA)	ڈیپ ٹین
Atenolol 50mg nifedipine 20mg s-r tabs: 10tabs: Rs.19.50		
<b>EUCARD</b>	(MALLADI)	یوکارڈ
Atenolol BP 50mg & 100mg tabs; 50mg: 10x10 Rs.150.00; 100mg: 10x10 Rs. 256.50		
<b>FALTENOL TABS</b>	(FALMA LABS)	فالٹی ٹال
Atenolol 25mg; 50mg & 100mg tabs; 25mg: 14 Rs. 8.20; 50mg: 14 Rs.13.70; 100mg: 14 Rs.26.40		
<b>HIPRES</b>	(PROTEC)	ہائی پریس
Atenolol 50mg & 100mg tabs: 50mg: 10: Rs.16.65 100mg : 10: Rs.22.64		
<b>HIPRES-D</b>	(PROTEC)	ہائی پریس ڈی
Atenolol 50mg Hydrochlorthiazide 2.5mg Amiloride Hcl 2.5mg caps 10: Rs.12.07		
<b>LONOL</b>	(KHANDELWAL)	لونول
Atenolol 25mg, 50mg; 100mg; tabs 25mg 10 Rs.7.16; 50mg: 10: Rs.11.10; 100mg : 10: Rs.20.52		
<b>NILOL</b>	(INTAS)	نی لول
Atenolol 50mg, nifedipine 20mg : s-r tabs: 10: Rs. 20.50		
<b>NORMOLOL</b>	(PACE)	نارمولوجل
Atenolol 50MG & 100mg tabs: 50mg 10: Rs.12.10: 100mg 10: Rs.23.00		
<b>ODINOL</b>	(ALEMBIC)	اوڈی ٹال
Atenolol 25mg, 50mg & 100mg tabs: 25mg: 10: Rs. 8.00, 50mg: 10: Rs.12.00, 100mg : 10: Rs.15.00		
<b>PRESOLAR</b>	(CIPLA)	پری سولر
Atenolol 50mg Nifedipine (sr) 20mg: caps 10: Rs.23.08		
<b>SELCA</b>	(PACE)	سل کا
Atenolol 50mg, Nifedipine 20mg sustained release caps 10: Rs.22.10		
<b>STADMED BETA</b>	(STADMED)	اسٹڈ میڈیٹا
Atenolol 50mg & 100mg : tabs : 50mg: 14: Rs.16.00, 100mg: 14: Rs.27.00		



<b>TELOL</b>	(MAX)	ٹی لول
Atenolol 50mg & 100mg tabs: 50mg: 10: Rs. 10.42, 100mg : 10: Rs.18.03		
<b>TENASE</b>	(JENBURKT)	ٹی نیس
Atenolol 50 & 100mg : tabs: 50mg: 10: Rs.11.90, 100mg: 10: Rs.22.10		
<b>TENOCLOR</b>	(ICI)	ٹی نوکلور
Atenolol 100mg, chlorthalidone 25mg: tabs: 14: Rs.48.85		
<b>TENOCLOR-50</b>	(ICI)	ٹی نوکلور ۵۰
Atenolol 50mg, chlorthalidone 12.5mg tabs: 14: Rs.30.31		
<b>TENOCLOR-25</b>	(ICI)	ٹی نوکلور ۲۵
Atenolol 25mg, chlorthalidone 12.5mg: tabs: 14: Rs.18.92		
<b>TENOFED CAPS</b>	(IPCA)	ٹی نوفیڈ کپسول
Atenolol D.P. 50mg, Nifedipine USP 20mg, sustained release caps 10: Rs.24.50		
<b>TENOLOL</b>	(IPCA)	ٹی نولول
Atenolol 25mg, 50mg, and 100mg; 25mg: tabs 14: Rs.15.40; 50mg: tabs 14: Rs.26.60; 100mg: tabs 10: Rs.19.00		
<b>TENORIC 100</b>	(IPCA)	ٹی نورک ۱۰۰
Atenolol 100mg, chlorthalidone 25mg: tabs: 10: Rs.23.00		
<b>TENORIC-50</b>	(IPCA)	ٹی نورک ۵۰
Atenolol 50mg, chlorthalidone 12.5mg: tabs: 10: Rs.13.00		
<b>TENORIC 25</b>	(IPCA)	ٹی نورک ۲۵
Atenolol 25mg, chlorthalidone 12.5mg: tabs: 10: Rs. 12.00		
<b>TENORMIN</b>	(ICI)	ٹی نارمن
Atenolol 100mg 50mg and 25mg tabs 100mg: 14: Rs. 47.85; 50mg : 14: Rs.29.70; 25mg: 14: Rs. 18.83		
<b>TENSICARD</b>	(TROIKAA)	ٹن سی کارڈ
Atenolol 25.50 & 100mg: tabs: 25mg: 10x14: Rs.105.00, 50mg: 10x14: Rs.154.00, 100mg : 10x14: Rs.266.00		
<b>TENSIMIN</b>	(UNIQUE)	ٹن سی من
Atenolol 50mg & 100mg 50mg: 14: Rs.19.10, 100mg: 14: Rs.23.90		



## BISO PROLOL FUMERATE ہائی سوپرولول فومی ریٹ

افعال و منافع: وجع القلب انجانا، ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵ ملی گرام دن میں ابار شدید ضرورت ہو تو ۱۰ ملی گرام دن میں ابار بچوں کو دینا مناسب نہیں۔

منفی افعال: قلبی عروق میں تردد، ہارٹ اٹیک، پھیپھڑوں کا دمہ، عروق میں رکاوٹ کے امراض، حمل اور ایام رضاعت، بلغمی دمہ میں استعمال جائز نہیں۔

مضر اثرات: چکر آنا، سردرد، بے چینی، سینہ میں درد، نیند میں خلل، فتور، ہضم۔

احتیاط: ذیابیطس، چنبل (Psoriasis) میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ ری ایکشن: بلڈ پریشر کم کرنے والی دوائیں، ذیابیطس کی دواؤں کے ساتھ قلبی حرکات درست کرنے والی ادویہ کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

### تجارتی مرکب

CONCOR

(MERCK)

کن کور

Bisoprolol fumerrate 5mg: tabs: 10: Rs. 75.00

## METOPROLOL

## مے ٹوپرولول

افعال و منافع: ہائی بلڈ پریشر وجع القلب، حرکات قلب کا غیر منتظم ہونا، شدید ہارٹ اٹیک میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ہائی بلڈ پریشر میں ۱۰۰ ملی گرام یومیہ، وجع القلب، ہارٹ اٹیک C.C.F. میں ۱۰۰ سے ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار

منفی افعال: قلب کے اذن یا بطن میں رکاوٹ، قلبی صدمہ shock میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: فتور، ہضم، نیند میں خلل، جسم سرد رہنا۔

احتیاط: حمل اور زچگی کے ایام میں مقدار خوراک کم دیں، ویراپاٹل کے ساتھ اور انسولین لینے والوں کو استعمال نہ کرائیں۔



## تجارتی مرکبات

بیٹالاک انجکشن

**BETALOC INJ** (ASTRA-IDL)

Metoprolol tartrate 1mg/ml inj 5x5ml amps: Rs.12.57; 5ml Rs.2.45

**BETALOC DURULES** (ASTRA-IDL)

بیٹالاک ڈیوریٹ

Metoprolol tartrate 100mg and 200mg sustained release tablets

100mg: 10: Rs. 18.00 200mg: 10: Rs.36.00

**BETALOC** (ASTRA-IDL)

بیٹالوک

Metoprolol tartrate 50mg & 100mg: tabs 50mg : 10: Rs.10.66 100mg :

10: Rs.17.26

**LOPRESOR** (HIND.CIBAGEGY)

لوپریس

Metoprolol tartrate 50mg & 100mg tabs 50mg: 10: Rs. 12.20 100mg :

10: Rs.22.40

**LOPRESOR INJ** (HIND.CIBAGEGY)

لوپریس انجکشن

Metoprolol tartrate 5mg/5ml inj 5ml: Rs.5.53

**METOCARD** (TORRENT)

میٹوکارڈ

Metoprolol 50mg & 100mg tabs 50mg: 10: Rs.7.80 100mg : 10:

Rs.14.80

**METOLAR-H** (CIPLA)

میٹولار ایچ

Metoprolol 100mg hydrochlorothiazide 12mg tabs; 10 tabs : Rs.17.06

**METOZIDE** (TORRENT)

میٹوزائیڈ

Metoprolol 100mg Hydrochlorothiazide 12mg tabs 10 tabs: Rs.15.00

**METOLAR** (CIPLA)

میٹولار

Metoprolol 50mg/100mg tabs 50mg: 10: Rs.8.95 100mg: 10: Rs.16.32

**SELOPRES** (ASTRA-IDL)

سیلوپریس

MetoprololTARTRATE 100mg Hydrochlorothiazide 12.5mg Tabs 10:

Rs.18.35

**SELOPRESS-50** (ASTRA-IDL)

سیلوپریس ۵۰

Metoprolol tartrat 50mg Hydrochlorothiazide 12.5 mg tabs; 10:

Rs.10.10

**TRIPRESS** (ASTRA-IDL)

ٹریپریس

Metoprolol tartrate 100mg Hydrochlorothiazide 12.5mg Hydrallazine

25mg 10 tabs: Rs.21.10



## LIDOFLAZINE

## لڈو فلازین

افعال و منافع: خون کی رسد کی کمی سے ہونے والے امراض قلب میں مفید ہے۔

مقدار و استعمال: پہلے ہفتہ ۶۰ ملی گرام روزانہ دوسرے ہفتہ ۶۰ ملی گرام دن میں ۲ بار تیسرے ہفتہ ۶۰ ملی گرام دن میں ۳ بار کھانے سے پہلے اگر خاطر خواہ کامیابی نہ ملے تو مقدار خواراک بڑھادیں

متنی افعال: حالت حمل میں دینا منع ہے

احتیاط: وجع القلب کے مریضوں کو نہیں دینا چاہیے۔

## تجارتی مرکب

CLINIUM

(ETHNOR)

کلی نیم

Lidoflazine 60mg tab 10 Rs. 15.60

## PINDOLOL

## پنڈولول

افعال و منافع: معمولی اور اوسط ہائی بلڈ پریشر، وجع القلب قلبی حرکات کی بے ترتیبی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: اوسط ہائی بلڈ پریشر میں ۱۰ سے ۱۵ ملی گرام روزانہ ایک ہفتہ پھر ۵ ملی گرام ہفتہ میں ۱ بار وجع القلب میں ۵ ملی گرام دن میں ۳ بار۔ قلبی حرکات کی بے ترتیبی میں ۵ ملی گرام دن میں ۲ سے ۳ بار

متنی افعال: قلبی صدمات، قلب کے فیل ہونے، پھیپھڑوں میں تسدد، گردوں کے فیل ہونے اور حالت حمل میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: بے چینی، چکر آنا نظام ہضم میں خلل خواب میں ڈرنا چیخنا، چلانا

احتیاط: بیہوشی کی حالت میں تنگی تنفس میں ذیابیطیس اور تیزابیت میں گردوں کے فیل ہونے اور حمل میں احتیاط برتنا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: کمیشیم والی ادویہ، قلبی حرکات کو درست کرنے والی ادویہ کے ساتھ دینا منع ہے۔



## تجارتی مرکب

**VISKEN**

(SANDOZ)

وس کن

Pindolol 10mg & 15 mg: tabs 10mg: 10: Rs. 19.91 15mg 10: Rs.25.20

## PROPRANOLOL

## پروپرانولول

افعال و منافع: قلب کی حرکات کی زیادتی، ہائی بلڈ پریشر، وجع القلب، عروق میں تنگی اور ادھاسی MIGRAINE میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ہائی بلڈ پریشر میں ۴۰ ملی گرام دن میں ۲ بار آہستہ آہستہ مقدار خوراک بڑھائیں وجع القلب میں ۱۰ ملی گرام دن میں ۲ بار

منفی افعال: بلغمی دمہ، قلبی تسد، قلبی صدمہ، دل کے فیل ہونے میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

مضر اثرات: دل کا درد، لو بلڈ پریشر، خوف، ڈپریشن، متلی تے، اسہال جلد پر داغ، آنکھیں خشک جیسی علامات ہو سکتی ہیں دوا روکنے پر یہ علامات ختم ہو جاتی ہیں۔

احتیاط: دل فیل ہونے، ذیابیطیس شکر، عظم غده قد امیہ، جگر گردوں کے امراض آپریشن سے پہلے اور حالت حمل میں احتیاط

دواؤں کے ساتھ رد عمل: دیرپا مل، کلونی ڈین کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

**BETABLOC**

(USV)

بیٹا بلاک

Propranolol Hcl 10mg : tabs 10: Rs. 3.00

**BETA BLOC FORTE**

(USV)

بیٹا بلاک فورٹ

Propranolol Hcl 40mg: tabs 10: Rs.9.35

**BETA-XIPAMID**

(GERMAN REMEDIES)

بٹاز پامائیڈ

Propanolol Hcl 40mg, xipamid 10mg: tabs: 10: Rs.14.86

**BETASPAN**

(SMITHKLINE)

بیٹا پان

Propranolol Hcl 40mg: s-r caps: 10: Rs.6.75



**CARDIOLONG**

(SOL)

کارڈیولانگ

Propranolol Hcl 40mg & 80mg sustained release caps 40mg: 10: Rs. 8.62 80mg: 10 Rs. 14.00

**CIPLAR**

(CIPLA)

پلار

Propranolol Hcl 10mg, 40mg & 80mg Tablets: 10mg: 10: Rs.4.31, 40mg: 10: Rs.10.56, 80mg: 10: Rs.12.50

**CIPLAR-H**

(CIPLA)

پلار- ایچ

Propranolol hcl 40mg Hydrochlorothiazide 25mg Tablets: 10: Rs.4.62

**CORBETA**

(SARABHAI)

کاربیٹا

Propranolol Hcl 10mg & 40mg tabs: 10mg: 10 Rs. 4.01; 40mg : 10, Rs.9.32

**CORBETAZINE**

(SARABHAI)

کاربیٹازائن

Propranolol Hcl 40mg Hydrochlorothiazide 25 mg: tabs: 10: Rs.11.27

**INDERAL**

(ICI)

انڈیرال

Propranolol Hcl 10mg 40mg & 80mg 10mg: 10: Rs.4.91 40mg : 10: Rs.11.39 80mg: 10: Rs.25.83

**PROPAL**

(SIGMA LABS)

پروپال

Propranolol hcl 10 & 40mg : tabs: 10mg : 10: Rs.3.86, 40mg: 10: Rs.8.33

**SOTALOL** سوٹالول ہائیڈروکلورائیڈ**HYDROCHLORIDE**

افعال و منافع: وجع القلب، دل کی بے ترتیب حرکات، ہائی بلڈ پریشر، مایو کارڈیل انفارکشن عظم غدہ درقیہ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۸۰ سے ۱۶۰ ملی گرام یومیہ ایک خوراک میں، وجع القلب ۱۲۰ سے ۳۶۰ ملی گرام یومیہ

منفی افعال: پھیپھڑوں کی عروق میں تشنج، قلب میں تسدد کے مریضوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: بلڈ پریشر کم ہونا، نظام جذب و انجذاب METABOLISM متاثر ہونا، آنکھوں اور جلد پر ری ایکشن کا اثر نظام ہضم میں خلل ہو سکتا ہے



احتیاط: ذیابیطیس کے مریضوں کو دوا بتدریج کم کرنا چاہیے، حمل اور ایام رضاعت میں، گردوں کی خرابی اور دمہ میں احتیاط برتنا چاہیے۔

## تجارتی مرکب

**SOTAGARD**

(GLAXO)

سوٹاگارڈ

Sotalol Hcl 40mg, & .80mg tabs; 40mg: 10: Rs.11.27 80 mg: 10: Rs.21.25

کیلیم چینل بلاکر

## CALCIUM CHANNEL BLOCKER

اس میں وہ دوائیں شامل ہیں جو دل کے درد، ہارٹ اٹیک کو روکتی ہیں، قلب میں دوران خون میں ہونے والی رکاوٹ کو دور کرتی ہیں شرائین قلبیہ میں وسعت پیدا کر کے خون کی رسد کو بڑھاتی ہیں۔

**DILAZEP**

ڈلازیپ

افعال و خواص: قلبی دوران خون میں رکاوٹ، عروق قلبیہ کی خرابیاں، وجع القلب شرائین میں تشنج اور سختی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار شدید حالت میں ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار دے سکتے ہیں

منفی افعال: حساسیت پیدا کرنے والے مریضوں کو نہ دی جائے

مضر اثرات: الرجی، فتور، ہضم، سردرد، منہ میں زخم ہو سکتا ہے

احتیاط: حمل اور ایام رضاعت میں احتیاط برتنیں۔

## تجارتی مرکب

**CORMELIAN**

(KHANDELWAL)

کاری لائن

Dilazep (as dihydrochlor)

100mg, tabs: 10: Rs.35.18



## DILTAZEM

## ڈلتازیم

افعال و منافع: شریان کی سختی اور تشنج کے سبب ہونے والا وجع القلب ANGINA مزمن وجع القلب، اور ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔

مقدار و استعمال: ۳۰ سے ۶۰ ملی گرام دن میں ۳ بار کھانے سے پہلے رفتہ رفتہ مقدار خوراک پڑھائیں۔

منفی افعال: حالت حمل سک سائنس سنڈروم، دوسرے اور تیسرے درجہ کا ہارٹ اٹیک (C.C.F) سائنس میں شدید تنگی اور رکاوٹ میں دینا منع ہے۔

مضر اثرات: سائنس میں تنگی اذن اور بطن (A.V) میں رکاوٹ پیروں ٹخنوں میں ورم متلی جلد پردوغ سر درد ہو سکتا ہے۔

احتیاط: ایام رضاعت میں، لو بلڈ پریشر، گردوں اور جگر کی خرابی میں نہیں دینا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: بیٹا بلاکر، ڈیجیٹالس، ایپی ڈرون، سی می ٹی ڈین، ڈیازپام بیسوشی کی دواؤں کے ساتھ دینا خطرناک ہے۔

## تجارتی مرکبات

ان جی زیم (SUN PHARMA) ANGIZEM

Diltiazem 30mg and 60mg tabs 30mg 10: Rs.17.49 60mg 10: Rs.34.44

چینل (MICRO LABS) CHANNEL

Diltiazem Hcl 30mg and 60mg tabs 30mg 10: Rs.18.10; 60mg: 10: Rs.34.90

ڈل کال (BOEHRINGER-M) DILCAL

Diltiazem Hcl 30mg and 60mg tabs 30mg 10: Rs.14.75; 60mg: 10: Rs.28.50

ڈل کال ایس آر (BOEHRINGER-M) DILCAL SR

Diltiazem Hcl 90mg sustained release tabs 10: Rs. 38.50



<b>DICARD</b>	(INTAS)	ڈی کارڈ
Diltiazem 30mg and 60mg tabs 30mg: 10: Rs. 11.20 60mg: 10: Rs.21.90		
<b>DICARD SR</b>	(INTAS)	ڈی کارڈ ایس آر
Diltiazem Hcl 90mg : tabs: 10: Rs.41.00		
<b>DILCARDIA</b>	(UNIQUE)	ڈیل کارڈیا
Diltiazem Hcl 30mg and 60mg tabs 30mg: 10: Rs. 17.20 60mg : 10: Rs.33.30		
<b>DILCARDIA SR 90</b>	(UNIQUE)	ڈیل کارڈیا ایس آر ۹۰
Diltiazem Hcl 90mg ; sustained release tabs: 10: Rs.42.90		
<b>DILCONTIN</b>	(MODI-MUNDIPHARMA)	ڈیل کان ٹن
Diltiazem 60mg, 90mg & 120mg controlled release tabs: 60mg: 10: Rs.34.50, 90mg: 10: Rs.49.70, 120mg: 10: Rs.57.65		
<b>DILGARD</b>	(PROTEC)	ڈیل گارڈ
Diltiazem Hcl 30mg and 60mg tabs 30mg: 10: Rs.16.78 60mg : 10: Rs.32.54		
<b>DILGINA</b>	(KOPRAN)	ڈیل جی نا
Diltiazem Hcl 30mg and 60mg tabs 30mg: 10: Rs. 16.43 60mg : 10: Rs.31.16		
<b>DILITISYN</b>	(THEMIS CHEMICALS)	ڈیل ٹی سائن
Diltiazem Hcl 30mg & 60mg tabs; 30mg : 10: Rs. 16.32, 60mg: 10: Rs.25.29		
<b>DILOTOL</b>	(PACE)	ڈیلو ٹول
Diltiazem Hcl 30mg & 60mg tabs: 30 mg 10: Rs. 17.42 : 60mg 10: Price N/A		
<b>DILTIME SR</b>	(ALIDAC)	ڈیل ٹائم ایس آر
Diltiazem Hcl 90mg & 120mg: s-r tabs: 90mg: 10: Rs.44.70, 120mg: 10: Rs.58.70		
<b>DILZEM</b>	(TORRENT)	ڈیل زیم
Diltiazem 30mg and 60mg tabs 30mg: 10: Rs.18.95 60mg : 10: Rs.36.90		



<b>DILZEM-SR</b>	(TORRENT)	ڈل زیم ایس آر
Diltiazem 90mg sustained release tabs 10 tabs : Rs. 46.90		
<b>DILZEM INJ</b>	(TORRENT)	ڈل زیم انجکشن
Diltiazem Hcl 5mg per ml inj. 5ml vial: Rs. 17.00		
<b>DTM</b>	(BIOCHEM)	ڈی ٹی ایم
Diltiazem 30mg and 60mg tabs 30mg : 10: Rs. 17.50 60mg : 10: Rs. 32.75		
<b>EMDIL</b>	(MALLADI)	ایم ڈیل
Diltiazem Hcl 30mg and 60mg tabs 30mg : 10x10 Rs. 182.40; 60mg : 10x10 Rs. 253.40		
<b>MASDIL</b>	(LUPIN)	ماس ڈیل
Diltiazem 30mg & 60mg tabs: 30mg: 10: Rs. 17.77, 60mg : 10: Rs. 33.76		
<b>SEFGARD</b>	(HIND.ANTIBIOTICS)	سیف گارڈ
Diltiazem Hcl 30mg & 60mg tabs; 30mg: 10x10 Rs. 143.40, 60mg : 10x10 Rs. 168.85		

## NIFEDIPINE

## نائی فی ڈی پن

افعال و منافع: عروق قلبیہ کے تشنج، قلب میں دباؤ گھٹن محسوس ہونا، وجع القلب (انجائنا)، ہائی بلڈ پریشر، دل کے فیل ہونے میں مفید اور معاون ہے۔

مقدار و ترکیب: دل کے درد میں ۱۰ سے ۲۰ ملی گرام ہر ۸ گھنٹہ بعد زیادہ سے زیادہ ۲۰ ملی گرام ہائی بلڈ پریشر میں ۱۰ سے ۲۰ ملی گرام گھنٹہ بعد۔

منفی افعال: حساسیت، شدید وجع القلب، لو بلڈ پریشر، حمل قلبی صدمہ سانس کی تنگی دوسرے درجہ کا قلبی تسد اور ایام رضاعت میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: درد سر، بے چینی ورم odema منہ کی جھلی متورم ہو سکتی ہے۔

احتیاط: لو بلڈ پریشر میں، دوا آہستہ آہستہ بند کریں ذیابیطس اور ایام رضاعت میں احتیاط برتیں۔



## تجارتی مرکبات

<b>ADALAT OROS</b>	(BAYER)	ادالت اورس
Nifedipine 30mg & 60mg extended release tabs: Price: N/A		
<b>ANGIBLOC</b>	(ALKEM)	انجی بلاک
Nifedipine 5mg & 10mg caps 5mg : 30: Rs.9.55 10mg: 30: Rs.15.36		
<b>ANGIBLOC RETARD</b>	(ALKEM)	انجی بلاک ریٹارڈ
Nifedipine 20mg ; sustained release tabs 10: Rs.8.50		
<b>BETANACTEN</b>	(HINDUSTAN)	بتا نکٹین
Atenolol 50mg, nifedipine 20mg: s-r caps: 10: Rs.23.18		
<b>BETA-NICARDIA</b>	(UNIQUE)	بتا نکارڈیا
Nifedipine 20mg sustained release. Atenolol 50mg capsule 10caps: Rs.19.92		
<b>BETANIF</b>	(UNISEARCH)	بتانف
Atenolol 50mg , nifedipine 20mg SR caps; 10 caps Rs. 20.80; 30 caps Rs. 57.25		
<b>BETA TROP</b>	(SUN PHARMA)	بتا ٹروپ
Nifedipine 20mg Atenolol 50mg sustained releae caps 14 caps: Rs.33.87		
<b>CALBETA</b>	(TORRENT)	کیل بیٹا
Nifedipine 20mg, atenolol 50mg : s-r tabs: 10: Rs.19.54		
<b>CALBLOC</b>	(UNISEARCH)	کیل بلاک
Nifedipine 5mg, 10mg caps; 5mg: 50, Rs.20.75; 10mg: 10: Rs.6.50; 10mg: 60, Rs.36.39		
<b>CALBLOC RETARD</b>	(UNISEARCH)	کیل بلاک ریٹارڈ
Nifedipine 10mg & 20mg sustained release tabs: 10mg : 10tabs: Rs.5.50, 20mg: 10 tabs: Rs.8.18		
<b>CALCIGARD</b>	(RORRENT)	کیلی گارڈ
Nifedipine 5mg & 10mg : caps 5mg: 10: Rs.5.50 10mg: 10: Rs.7.90		
<b>CALCIGARD RETARD</b>	(RORRENT)	کیلی گارڈ ریٹارڈ
Nifedipine 20mg : tabs 10: Rs.10.50		
<b>CAPNIF</b>	(PACE)	کیپ نف



Nifedipine 5, 10 & 20mg retard tabs: 5mg: 10: Rs.4.32: 10mg: 10  
Rs.5.95: 20mg: 10: Rs.8.65

**CARDIPIN** (INTAS)

کارڈی پین

Nifedipine 5mg & 10mg: caps: 5mg: 10: Rs.4.90, 10: Rs.6.50

**CARDIPIN RETARD** (INTAS)

کارڈی پین ریٹارڈ

Nifedipine 20mg: s-r tabs: 10: Rs.9.80

**CARDULES** (NICHOLAS)

کارڈیولس

Nifedipine 5mg & 10mg liquid filled caps 5mg: 10: Rs.12.90 10mg:  
10: Rs.21.00

**CARDULES PLUS** (NICHOLAS)

کارڈیولس پلس

Nifedipine 10mg & 20mg, atenolol 50mg: s-r caps: 10mg : 10:

Rs.16.50, 20mg : 10: Rs.20.45

**CARDULES RETARD** (NICHOLAS)

کارڈیولس ریٹارڈ

Nifedipine 10mg & 20mg : caps 10mg: 10: Rs.8.30, 20mg: 10:

Rs.10.00

**DEPICOR** (MERCK)

ڈیپیکور

Nifedipine 5mg & 10mg : caps: 5mg: 10: Rs. 4.99, 10mg : 10: 7.21

**DEPICORD SR** (MERCK)

ڈیپیکور ایس آر

Nifedipine 20mg: s-r tabs: 10: Rs.9.70

**DEPIN** (CADILA)

ڈی پین

Nifedipine 10mg & 5mg caps 10mg: 30: Rs.22.75 100: Rs.74.30 5mg:

50: Rs.26.00 100: Rs.27.00

**DEPIN RETARD** (CADILA)

ڈی پین ریٹارڈ

Nifedipine 20mg: sust release tabs 10: Rs.8.90

**DEPTEN** (CADILA)

ڈیپ ٹن

Nifedipine 20mg . atenolol 50mg: s-r tabs: 10: Rs.19.50

**MYOGARD** (SEARLE)

مایو گارڈ

Nifedipine 5mg & 10mg : caps 5mg: 10: Rs. 4.40 10mg : 10: Rs. 8.23

**MYOGARD-LA** (SEARLE)

مایو گارڈ ایل اے

Nifedipine 20mg sustained release tabs: 10: Rs.10.52

**NACTEN** (HIND.ANTIBIOTICS)

نکٹین

Nifedipine 5mg, 10mg & 20mg tabs: 5mg: 10x10 Rs. 46.80; 10mg:

10x10 Rs. 64.80; 20mg: 10x10 Rs. 85.90



<b>NICARDIA</b>	(UNIQUE)	نکارڈیا
Nifedipine 5mg & 10mg caps 5mg: 10: Rs.4.97, 100: Rs.41.30 10mg: 10: Rs.7.40 100: Rs.59.65		
<b>NICARDIA-CD</b>	(UNIQUE)	نکارڈیا سی ڈی
Nifedipine extended release 30mg tabs: 10: Rs.25.10		
<b>NIFEDINE</b>	(S.G. PHARMA)	نیفی ڈین
Nifedipine 10mg; tabs: 10: Rs.7.49		
<b>NIFELAT</b>	(CIPLA)	نائی فی لیٹ
Nifedipine 5 & 10mg : Caps 5mg : 10: Rs. 5.06, 10mg: 10: Rs. 7.32		
<b>NIFELAT RETARD TABS</b>	(CIPLA)	نائی فی لیٹ ریٹارڈ ٹیبلیٹ
Nifedipine 20mg: s-r tabs 10: Rs.7.60		
<b>NIFETEX TR</b>	(BPRL)	نائی فی ٹیکس ٹری آر
Nifedipine 20mg , atenolol 50mg: Blister pack of 10caps: Price: N/A		
<b>NIFETOLOL CAPS</b>	(ANGLO FRENCH)	نائی فی ٹولول
Nifedipine USP 20mg (sustained release) Atenolol 50mg Caps 10: Rs.24.45		
<b>NILOL</b>	(INTAS)	نی لول
Nifedipine sustained release 20mg, Atenolol 50mg tabs 10 tabs : Rs.20.50		
<b>NITENOL</b>	(PHARMED)	نائی ٹی نول
Nifedipine (sustained release) U.S.P. 20mg Atenolol B.P. 50mg 10x10's		
<b>PRESOLAR</b>	(CIPLA)	پری سولر
Nifedipine 20mg, atenolol 50mg: tabs: 10: Rs.23.06		
<b>TENOFED</b>	(IPCA)	ٹے نوفڈ
Nifedipine 20mg, atenolol 50mg: caps: 10: Rs.24.50		

## NITRENDIPINE

نائی ٹرن ڈی پن

افعال و منافع: معمولی اور درمیانی درجے کا ہائی بلڈ پریشر، ہر قسم کے انجائنا (درد دل) قلبی عروق میں تنگی، قلب کے افعال کی خرابی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ ملی گرام دن میں ابار زیادہ سے زیادہ ۴۰ ملی گرام دو خوراکیوں میں یومیہ



منفی افعال: دوائے حساس مریضوں کو سانس میں تنگی قلبی تسدد، قلبی صدمہ دل کا فیل ہونا، سینہ میں درد حمل اور دودھ پلانے کے ایام میں غلط اثرات ہوتے ہیں۔

مضر اثرات: درد سر، جلد پر داغ، گھٹنوں میں ورم خفقان، چکر آنا متلی، الرجی بے چینی نقابہت خواب زیادہ دکھائی دینا تنگی تنفس، آواز کے ساتھ سانس آنا، اسہال، بکواس کرنا ضعف باد، غنودگی بصارت میں فرق بالوں کا گرنا، گلے میں خراش، نسیان، پیروں میں درد۔

احتیاط: بے ہوشی کی ادویہ، ذیابیطیس غدہ درقیہ کے خرابی، گردوں کی خرابی میں احتیاط برتیں دوا فوراً بند نہ کریں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: ڈیجاکسن، کلونی ڈین ویراپامیل، ارگٹ سی سی ٹی ڈین اور انڈو میتھاسون کے ساتھ دینا مضر ہے۔

### تجارتی مرکبات

**CARDIF** (CONCEPT) کارڈف

Nitrendipine 10mg & 20mg tabs: 10mg 10: Rs.9.50: 20mg 10: Rs.12.75

**CARDIF BETA** (ALBERT DAVID) کارڈف بیٹا

Nitrendipine 10mg & 20mg, atenolol 50mg: film coated tabs: 10mg: 10: Rs.28.00, 20mg: 10: Rs.38.00

**NITREPIN** (USV) نائی ٹری پن

Nitrendipine 10mg and 20mg tabs: 10mg: 10: Rs.14.80, 20mg: 10: Rs.19.80

### VERAPAMIL

### ویراپامیل

افعال و خواص: یہ کیلیم کو قلب کے عضلات تک پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ تشنج عضلات قلبیہ وجع القلب، ہائی بلڈ پریشر، قلبی حرکات کی بے ترتیبی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ہائی بلڈ پریشر میں ۸۰ سے ۱۶۰ ملی گرام دن میں ۲ بار، قلبی حرکات کی بے ترتیبی میں ۴۰ سے ۸۰ ملی گرام



منفی افعال: لو بلڈ پریشر میں قلبی صدمات میں، سانس کی تنگی، قلب کے اذن و بطن میں رکاوٹ، دل فیل ہونے میں سانس سنڈروم میں دینا خطرناک ہے۔

مضر اثرات: قبض درد سر، چکر آنا، جلد پر داغ پڑنا، لو بلڈ پریشر سانس کی تنگی قلاع مردوں میں چھاتیاں بڑی ہونا، دودھ نکلنا۔

احتیاط: جگر کی خرابی اور زیادہ مقدار میں دینے سے ہارٹ فیل ہو سکتا ہے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: بیٹا بلا کر دوائیں، ڈیجاکسن، سائیکلو سپورین، تھیوفائی لین، مرخی عضلات دوائیں، کارمابازی پائن، ریفام پی سین، لیتھیم، بیہوشی کی دوائیں، دافع، بلڈ پریشر ادویہ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

**CALPITIN**

(BOEHRINGER)

کیلا پیٹین

Verapamil 40mg & 80mg Dragees 40mg: 10: Rs.8.86 80mg: 10: Rs.17.36

**CALAPTIN INJ**

(BOEHRINGER)

کیلا پیٹین انجکشن

Verapamil Hcl 5mg per 5x2ml inj 2ml: Rs.8.23

**CALAPTIN 120/240 SR** (BOEHRINGER)

کیلا پیٹین ۱۲۰/۱۲۰ آر

Verapamil Hcl 120mg & 240mg sustained release tabs; 120mgmg: 10 Rs. 36.50 240mg: 10 Rs.55.00

**ISOPTIN**

(GERMAN REMEDIES)

آئی سوپ ٹین

Verapamil Hcl 40mg & 80mg: 40mg: 10: Rs. 7.43, 80mg: 10: Rs.14.37

**ISOPTIN-240 SR**

(GERMAN REMEDIES)

آئی سوپ ٹین ۱۲۰ آر

Verapamil Hcl 240mg sustained release tabs 10 tabs: Rs. 54.26

**ISOPTIN INJ**

(GERMAN REMEDIES)

آئی سوپ ٹین انجکشن

Verapamil Hcl 5mg per 2ml inj. 5x2 ml: Rs.8.23

**VASOPTEN**

(TORRENT)

واسوپ ٹین

Verapamil 40mg, 80mg, 120mg tabs 40mg: 10mg: 10: Rs.6.52 : 80mg : 10: Rs.17.38 120mg: 10: Rs.24.50



VERMIL

(THEMIS CHEMICALS)

دیر ایل

Verapamil 40mg &amp; 80mg: tabs: 40mg: 10: Rs.5.02, 80mg: 10: Rs.9.10

**NITRATES****نائٹریٹس**

اس گروپ میں وہ دوائیں شامل ہیں جو قلبی عروق میں وسعت پیدا کر کے آئسجن کی رسد میں اضافہ کرتی ہیں۔

**ERYTHRITYL TETRA NITRATE** ارائی تھرائی ٹائل ٹٹرائٹ

افعال و خواص: وجع القلب (انجائنا) ہارٹ ایک اور ہارٹ فیل ہونے کے خطرہ کے وقت استعمال کرائی جاتی ہے۔

مقدار و ترکیب: خطرہ کے وقت ۵ ملی گرام کی گولی زبان کے نیچے رکھ کر چوسیں۔ خوردنی طور پر ۱۵ ملی گرام کھانے سے پہلے یا سوتے وقت کھلائیں۔

منفی افعال: حساس اور الرجک مریضوں میں۔

مضر اثرات: درد سر، چہرے پر سرخی، بے چینی، ضعف، لو بلڈ پریشر جلد پر داغ جلد متورم ہو سکتی ہے۔

**تجارتی مرکبات**

CARDILATE

(BURROUGHS WELLCOME)

کارڈی لیٹ

Erythrityl tetranitrate 5mg &amp; 15mg : tabs: 5mg : 10x10: Rs.10.30

15mg: 100: Rs.20.67

**GLYCERYL TRINITRATE** گلیسرائل ٹرائی نائٹریٹ

افعال و منافع: یہ دوا قلب میں خون کی سپلائی کو تیز کرتی ہے قلب کے بطون کے دباؤ میں کمی کرتی ہے۔ شدید وجع القلب (ہارٹ ایک) پیچھے پھڑوں میں ورم، اور ہارٹ فیل ہونے سے بچانے اور علاج کے لئے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: وجع القلب میں آدھا ملی گرام ہر ۳ منٹ بعد جب تک درد نہ رک جائے حفظ مائع



کے لیے آدھا ملی گرام محنت و مشقت سے قبل پھپھڑوں کے درم اور اوڈیما میں ۰.۸ ملی گرام سے ۲.۴ سے ۵ سے ۱۰ منٹ کے وقفہ سے دیں۔

منفی افعال: سر کی چوٹ اور دماغی جریان خون میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: چہرے پر سرخی، سینہ میں درد، بے چینی، لوبلڈ پریش غشی، ضعف قلب نبض بطنی زیادہ مقدار میں دینے سے قے متلی، جسم نیلا، ہیموگلوبین کی کمی، دماغ میں خون کی کمی ہونا۔

احتیاط: امراض قلب وریہ میں، حالت حمل اور رضاعت میں، احتیاط برتیں دوران استعمال غشی طاری ہو سکتی ہے۔

## تجارتی مرکبات

**ANGISED**

(BURROUGHS WELLCOME)

این جی سڈ

Glyceryl trinitrate 0.5mg; tabs 30: Rs. 9.87

**NITROCONTIN**

(MODI-MUNDI PHARMA)

ناٹروکونٹن

Glyceryl trinitrate 2.6mg and 6.4mg: controlled release tabs 2.6mg:

25tabs: Rs.38.75, 6.4mg: 25 tabs: Rs.55.00

**NITROCURE**

(PANACEA)

ناٹروکیور

Glyceryl trinitrate (introglycerin) 5mg per ml inj: 5ml amps

**ISOSORBIDE**

آئی سوسار بائیڈ ڈائی نائٹریٹ

**DI-NITRATE**

افعال و منافع: درد دل (انجائنا) اور پھپھڑوں میں خون کی رسد میں کمی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: فوری اثر کے لئے ۵ سے ۱۰ ملی گرام زبان کے نیچے چوسیں۔ خوردنی طور پر ۵ سے ۱۰ ملی گرام دن میں ۴ بار۔

منفی افعال: شدید قلبی دباؤ، اور صدمہ کی کیفیت میں دینا خطرناک ہے۔

احتیاط: گلوکوما میں احتیاط برتیں۔



## تجارتی مرکبات

CARDICAP-TR	(NATCO FINE) 40MG: 25., 70.00	کھڑی کیپ ٹی آر
ISSOMACK RETARD	(BIOCHEM) 40mg: 10: Rs.31.87	آئی سو میک ریٹارڈ
ISORDIL	(GEOFFREY MANNERS) 10mg: 100:Rs.10.16	آئی سورڈیل
SORBICAP	(JENBURKT) 10 caps Rs.18.50	ساربی کیپ
SORBITRATE	(NICHOLAS) 10mg:50: Rs.9.65	ساربی ٹریٹ

## ISO SORBIDE MANO NITRATE

افعال و متاثرات: یہ ہر طرح کے درد دل انجانا میں مفید ہے۔ خون کی رگوں کے دباؤ کو کم کرتی ہے۔ قلب کی باریک رگوں میں خون پہونچانے میں مدد دیتی ہے، عروق میں تنگی و رکاوٹ کے سبب ہونے والے وجع القلب اور ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰ ملی گرام دن میں ۲-۳ بار کھانے کے بعد۔

منفی افعال: تنفس کا فیل ہونا، لو بلڈ پریشر حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں دینا خطرناک ہے۔

مضر اثرات: درد سر، چہرے پر سرخی، چکر آنا۔

احتیاط: ابتداء میں کم مقدار دیں۔ شدید قلبی دباؤ مایو کارڈیل انفارکشن، دل بیٹھنے میں احتیاط برتیں۔

## تجارتی مرکبات

ANGICOR	(HINDUSTAN GEIGY) 60mg: 10: Rs.35.00	انجی کور
ANGITRIT	(UNISEARCH) 20mg tabs 10: Rs.19.50	انجی ٹرائٹ
IHD 20/40	(STADMED) 40mg: 10: Rs.29.75	آئی ایچ ڈی ۲۰/۴۰
IMDUR	(ASTRA-IDL) 60mg, tabs:10:Rs.35.00	ایمڈور
ISMO-10/20/40	(BOEHRINGER) 40mg:10:Rs.43.10	آئی سمو ۱۰/۲۰/۴۰
ISOCOR-20	(MERCK) 20mg: tabs: 10: Rs.17.50	آئی سو کور
ISOTRIM	(PACE) 40mg: 10: Rs.31.80	آئی سو ٹریم
MONICOR	(WALLACE) 20mg tabs 10: Rs.13.95	مونئی کور
MONIT 20	(INTAS) 20mg: tabs 10: Rs.10.70	مونٹ ۲۰



<b>MONOCONTIN</b> (MODI-MUNDI PHARMA)	مونوکانٹن
50mg: controlled release tabs: 10: Rs.42.50	
<b>MONO SORBITRATE</b> (NICHOLAS)	مونو ساربی ٹریٹ
40mg: 10: Rs.38.80	
<b>MONOTRATE</b> (SUN PHARMA) 10mg 10: Rs.12.00	مونو ٹریٹ
<b>MONOTRATE OD</b> (SUN PHARMA)	مونو ٹریٹ دن میں ایک بار والی
50mg: s-r tabs: 10: Rs.41.7	
<b>NITROFIX</b> (MICRO LABS) 40mg: 10: Rs.25.00	نائٹرو فیکس
<b>VASONIT 10/20/30 TABS</b> (RECON)	واسونٹ ۳۰/۲۰/۱۰
30mg: 10: Rs.24.55	

## NITRO GLYCERINE

## نائٹرو گلیسرین

افعال و منافع: وجع القلب (Angina) کے علاج اور بچاؤ کے لئے مستعمل ہے۔  
 مقدار و ترکیب: ۵ء ۲ ملی گرام دن میں ۲-۳ بار کھلائیں انجکشن ۵ ملی گرام عضلاتی لگائیں۔  
 منفی افعال: حاد یا مزمن قلبی تناؤ، شدید انیمیا، گلوکوما، لو بلڈ پریشر میں دینا مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

<b>ANGISPAN TR</b>	(LYKA) 50: Rs.60.63	انجی اسپان
<b>ANGISPAN SP</b>	(LYKA) 50: Rs.87.91	انجی اسپان ڈریپا
<b>MILLISROL</b>	(KHNADELWAL) 10ml: Rs.34.46	ملی سروگل
<b>MYONT</b>	(TROIKAA) 5ml vial: Rs.46.50	مائی اونٹ
<b>MYOVIN</b>	(CADILA) 60g: Rs.37.53	مائی اوون کریم
<b>NITRODERM TTS</b>	(CIBA-GEIGY) 10: Rs.658.39	نائٹرو ڈرم ٹرانسڈر
<b>NITROMACK</b>	(BIOCHEM)	نائٹرو میک انجکشن
5ml amp. 10x5ml: Rs.600.00		





## تجارتی مرکبات

ILDAMIN TABS

(GERMAN REMEDIES)

ال ڈامن

24mg:10:Rs.40.00

ILDAMIN INJ

(GERMAN REMEDIES)

ال ڈامن انجکشن

Oxyfedrine hcl 4mg/2ml inj 2ml: Rs.3.18

حرکات قلب کی بے ترتیبی دور کرنے والی ادویہ

## ANTI ARRHYTHMIC DRUGS

AMIODARONE

ایمی ڈرون

افعال و منافع: حرکات قلب کی بے ترتیبی، والف پارکن سن وائٹ سنڈروم و جمع القلب کے ساتھ حرکات غیر منتظم جو کسی دوا سے ٹھیک نہ ہوں یہ دوا مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار ایک ہفتہ تک یا ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار پھر ۲۰۰ ملی گرام دن میں ابار دینا چاہیے۔

منفی افعال: اذنی بطنی رکاوٹ میں، شدید و جمع القلب صدمہ، غدہ درقیہ کی خرابی ایام رضاعت میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: طبقہ قرنیہ میں دھبے پڑنا، بصارت میں خلل، عروق نشہ میں ورم، جگر اور غدہ درقیہ کے افعال میں خرابی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: ماہر امراض قلب کی نگرانی میں استعمال کرائیں غدہ درقیہ پھیپھڑوں، جگر، آنکھوں کے افعال پر نگاہ رکھیں ہارٹ ایک اور حالت حمل میں احتیاط برتیں۔

منفی رد عمل: ڈیجاکسن، کیلشیم، مانع انجماد خون ادویہ، بیٹا بلاکروں کو روکنے والی ادویہ کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔



## تجارتی مرکبات

<b>ALDARONE</b>	(ALIDAC) 200mg; tabs 10: Rs.66.20	آلڈرون
<b>CORDARONE</b>	(TORRENT) 100mg tabs 10: Rs.39.90	کارڈرون
<b>CORDARONE-X</b>	(TORRENT)	کارڈرون ایکس
200mg tabs 10: Rs.77.90		
<b>CORARONE-X I.V. (TORRENT)</b>		کارڈرون ایکس آئی وی
50mg per ml inj. 3ml amps: Rs.32.12		

## ڈائی سوپائی رامائیڈ فاسفیٹ

## DISOPYRAMIDE PHOSPHATE

افعال و منافع: آپریشن، وجع القلب کی ادویہ کے استعمال ڈیجاکسن کے استعمال سے ہونے والی حرکات قلب کی بے ترتیبی میں مفید ہے۔ حرکات قلب کو کنٹرول کرنے میں معاون ہے۔

مقدار و ترکیب: مقدار خوراک کا تعین حالت مرض و قوت کے مطابق کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ مقدار ۸۰۰ ملی گرام ۴ خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے مرض کو کنٹرول کرنے نارمل حالت پر رکھنے کے لئے ۱۰۰ ملی گرام ہر ۶ گھنٹہ بعد دی جائے۔

منفی افعال: دوسرے اور تیسرے درجے کی اذنی بطنی رکاوٹ میں، قلبی صدمات شدید ہارٹ اٹیک میں اور دوا سے حساس مریضوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: بصارت میں فرق منہ خشک، پیشاب رکنا خون کے نمکیات میں اضافہ، عضلات میں درد، کمزوری، چکر، ذہنی الجھن، یرقان سدی، غشی، خون میں شکر کی کمی، متلی، اسہال نقاہت اور بے چینی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: ڈیجیٹالس کے مریضوں کو حالت حمل اور ایام رضاعت میں احتیاط برتیں۔

## تجارتی مرکبات

<b>NORPACE</b>	(SEARLE) 150mg; 10; Rs.56.64	نارپیس
<b>REGUBEAT</b>	(BIDDLE SAWYER)	ریگوبیٹ
100mg; tabs: 6: Rs.107.50		



**LIGNOCAINE HCL****لگنو کین ہائیڈروکلورائیڈ**

افعال و منافع: حرکات قلب کی بے ترتیبی میں مفید ہے۔ بیہوش کرنے والی دوا کے اثرات ڈیپاکسن کی مضرت کو دور کرنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵ سے ۲۵ ملی لٹر وریڈی آہستہ آہستہ ۱ سے ۲ منٹ میں دیا جائے یا ڈیکسٹروز ۵۰۰ ملی لٹر میں ۱۰ ملی لٹر انجکشن ملا کر آہستہ آہستہ چڑھایا جائے۔

منفی افعال: سانس کی تنگی میں، ہر قسم کے اذنی اور بطنی تسد میں بے ہوشی والی دواؤں سے حساس مریضوں میں دینا مضر ہے۔

مضرات: قلب میں شدید انقباض، ڈیپریشن، مایوسی، پست ہمتی، آنکھوں میں دھندلا پن، ہاتھ کانپنا، دورے پڑنا، گھبراہٹ، منہ خشک، لو بلڈ پریشر سینہ میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔

احتیاط: قلبی حرکات کی جانچ، کارڈیک مانیٹر کے ساتھ بھی یہ دوا استعمال کریں ڈیپریشن یا گھبراہٹ کی حالت میں دوا روک دینا چاہیے۔

**تجارتی مرکبات**

**GESICARD** (S.G. PHARMA)

گیسی کارڈ

20mg: inj 5ml: Rs. 1.07; 50ml : Rs. 5.97

**XYLOCARD INJ 2%** (ASTRA-IDL)

زائلو کارڈا انجکشن

5ml vial: Rs. 1.86 50ml: Rs. 10.35

**MEXILETIN****میگزلی ٹن**

افعال و خواص: قلب کے خانہ بطن میں خرابی، مایو کارڈیل انفارکشن قلب میں خون کی رسد نہ پہنچنے کے سبب قلب کی بے ترتیبی حرکات میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۴۰۰ سے ۶۰۰ ملی گرام پہلی خوراک ۲ گھنٹہ بعد ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار وریڈی راہ پہلی خوراک ۲۰۰ سے ۲۵۰ ملی گرام ۲۵ ملی گرام فی منٹ کے حساب سے دینا چاہیے پھر ۱۰۰ ملی گرام ۱ منٹ کے حساب سے دی جائے۔



مضر اثرات: فتور ہضم، نظام عصبی میں خلل اور بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے۔

احتیاط: سانس کی تنگی، سانس کی نالی میں خرابیاں، لو بلڈ پریشر و جگر اور گردوں کے امراض میں پارکنسن ڈیزیز حالت حمل اور ایام رضاعت میں احتیاط برتیں۔

## تجارتی مرکبات

**MEXITIL** (GERMAN REMEDIES) میگزئی ٹل ٹبلٹ

50mg: 10: Rs.59.80; 150mg: 10: Rs.169.70

**MEXITIL INJ** (GERMAN REMEDIES) Rs.36.23 میگزئی ٹل انجکشن

## PRO CAINAMIDE HCL پرو کے نامائیڈ

افعال و منافع: وجع القلب، شرائین قلبیہ میں تشنج اور درد، بطنی دباؤ کی کمی میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۱۰۰۰ ملی گرام (۴ گولی) پہلی خوراک پھر ۵۰۰ ملی گرام رنی کلو گرام وزن کے حساب سے ۳ گھنٹہ بعد۔ انجکشن ۵۰۰ ملی گرام سے ایک گرام ہر ۶ گھنٹہ بعد لگانا چاہیے کنٹرول ہو جانے پر صرف براہ دہن دینا چاہیے۔

مضر اثرات: ہاضمہ کی خرابیاں، لیو کو سائیٹ میں کمی ہو سکتی ہے۔  
احتیاط: قلب و جگر اور گردوں کی کمزوری میں حاملہ کمزور اور ضعیفوں کو نہیں دینا چاہیے دوران علاج سیرولاجیکل ٹسٹ کراتے رہنا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

**PRONESTYL** (SARABHAI) پرونس ٹائل

Procainamide hcl 250mg: tabs: 10: Rs.37.53

**PRONESTYL INJ** (SARABHAI) پرونس ٹائل انجکشن

Procainamide hcl 100mg per ml inj 10ml: Rs.35.50

## PROPAFENONE HCL پروپانی نون ہائیڈرو کلورائیڈ

افعال و منافع: بطنی والو کی خرابی، حرکات قلب کی بے ترتیبی والف پارکنسن وائٹ سنڈروم میں مفید ہے۔



مقدار و ترکیب: ۱۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار ۳ دن بعد ۳۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار بچوں نہیں دینا چاہیے۔

منفی افعال: ایساہارٹ ایک جو کنٹرول میں نہ آ سکے، قلبی صدمہ، سانس میں تنگی جسم میں نمکیات اور پانی کی کمی، پھیپھڑوں کی عروق میں تسد و لو بلڈ پریشر اور حمل میں نقصان دہ ہیں۔  
مضر اثرات: چکر آنا، متلی، قے، ذائقہ خراب، قبض، اسہال، درد سر، بے چینی، الرجی ضیق النفس۔  
احتیاط: صرف ڈاکٹر کی نگرانی میں دینا چاہیے، دل فیل ہونے جگر گردوں کی خرابی ضعیفوں میں ہیں میکر کے مریضوں میں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: حرکات قلب کو کنٹرول کرنے والی دواؤں، ڈیجاکسن وارفارین سی ٹی ٹی ڈین، پروپرانولول، میناپرولول اور ریقام پی سین کے ساتھ دینا مضر ہے۔

### تجارتی مرکب

RYTMONORM

(GERMAN REMEDIES)

رائٹ مونارم

Propafenone hcl 150 mg: tabs: 10: Rs.170.00

کوئی نی ڈین فینائل - تھائل باربی ٹوریٹ

**QUINIDINE PHENYETHYL BARBITURATE**

افعال و منافع: یہ دوا قلب کی انقباضی حرکات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ قلب میں تناؤ، وجع القلب، خفقان، نیند نہ آنا، بے چینی، الجھن گھبراہٹ اور عضلات کے تشنج میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۱۰۰ سے ۳۰۰ ملی گرام یومیہ ضرورت پڑنے پر مقدار دو گنی دے سکتے ہیں بچوں کو عمر کے مطابق۔

منفی افعال: قلبی افعال کے جزوی یا کلی انقطاع میں ہرگز استعمال نہ کرائیں۔  
مضر اثرات: فتور، ہضم، چکر آنا، کان بجنا، سانس میں تنگی، بصارت میں فرق درد سر بخار لو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔

احتیاط: جگر کے امراض میں احتیاط برتنا چاہیے۔



دواؤں کے ساتھ رد عمل: ڈیجاکسن اور نائٹرو گلیسرین کے ساتھ دینا مضر ہے۔

## تجارتی مرکب

NATCARDINE

(FRANCO-INDIAN)

نٹ کارڈین

400mg; tabs 10: Rs.18.66

## کوئی نی ڈین سلفیٹ QUINIDINE SULPHATE

افعال و منافع: وجع القلب شراکین اور وریڈوں میں لچک اور ضربات کی کمی، دل کے ٹیل ہونے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰۰ سے ۳۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار۔

منفی افعال: قلب میں شدید رکاوٹ، وجع القلب (انجائنا) قلب کی جھلی اور عروق میں خرابی میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: کان بجنا، بصارت میں فرق، چکر آنا، درد سر، ہاتھ کانپنا متلی تے، تشنج الرجی، غنودگی لو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔

احتیاط: بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔ ٹسٹ کے بغیر نہیں لگانا چاہیے عروق میں سدہ بننے کے خطرہ میں۔  
دواؤں کے ساتھ رد عمل: مانع انجماد خون، مرنخی عضلات، ڈی جاکسن، دافع تیزابیت، دافع بلڈ پریشر ادویہ، فینوباربیٹون فین ٹائن، نار اڈرینالین کے ساتھ دینا مناسب نہیں ہے۔

## تجارتی مرکب

QUINIDINE

(WELLCOME) 200mg; tabs:10: Rs.33.60

کوئی نی ڈین

ہائی بلڈ پریشر روکنے والی ادویہ

## PHENTOLAMINE

فین ٹولامین

افعال و منافع: ہائی بلڈ پریشر، شدید وجع القلب، پیمپروڈوں کے ورم اور ٹیومر کے آپریشن میں مفید ہے۔



مقدار و ترکیب: ۵ ملی گرام بچوں کو اعلیٰ گرام وریڈی دینا چاہیے۔ آپریشن کے دوران اگر بلڈ پریشر میں اضافہ ہو تو فوراً ۵ سے ۱۰ ملی گرام وریڈی دینا چاہیے۔

امراض میں منفی افعال: شدید لو بلڈ پریشر میں دینا خطرناک ہے۔

مضر اثرات: لو بلڈ پریشر، درد دل، چکر متلی قے اسہال اور ناک بند ہو سکتی ہے۔

احتیاط: دوران علاج بلڈ پریشر چیک کرتے رہیں ۸۰ سسٹولک سے نیچے استعمال کرنا خطرناک ہے۔

## LABETALOL HCL لابیٹالول ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: یہ الفا بیٹاری سپر بلا کرگروپ سے ہے۔ ہر طرح کے ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: پہلی خوراک ۵۰ ملی گرام دن میں ۲ بار ضرورت کے مطابق مقدار و خوراک ۲۰۰ سے ۴۰۰ ملی گرام یومیہ تک دے سکتے ہیں بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

امراض میں منفی رد عمل: پھیپھڑوں میں تشنج و درد، الرجی، دائیں بطن میں تسد، سانس لینے میں تکلیف، قلبی صدمہ، ہارٹ فیل کا خطرہ، دل بیٹھنا (کارڈیک ڈپریشن) ایام حمل اور رضاعت میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: لو بلڈ پریشر، وجع القلب، درد سر، یرقان، پراگندہ خواب نظر آنا۔

احتیاط: دل کے افعال کی خرابی یا فیل ہونے میں اچانک دوا روکنے ذیابیطس، ورم بار بطون گلہ پھولنے اور امراض جگر میں استعمال سے احتیاط برتن۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: میلشیم کے مرکبات بیہوشی کی دوا کے ساتھ نقصان ہو سکتا ہے۔

## تجارتی مرکب

NORMADATE (GLAXO) 50mg:10:Rs.15.03

نارمادیٹ

## CAPTOPRIL

## کیپ ٹوپریل

افعال و منافع: ہارٹ ایک مزمن، C.C.F. معمولی اور شدید ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: کنجسٹو کارڈیک فیلر C.C.F. میں ۱۲.۵ سے ۲۰ ملی گرام دن میں ۳ بار زیادہ سے



زیادہ ۱۵۰ ملی گرام کئی خوراکوں میں تقسیم کر کے،

ہائی بلڈ پریشر میں ۱۲.۵ سے ۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار زیادہ سے زیادہ ۵۰ ملی گرام دوا آہستہ آہستہ بڑھائی جائے۔

امراض میں منفی رد عمل: مدرات بول کے استعمال سے سوڈیم کی کمی ہو جانے پر گردوں کے امراض حمل، رضاعت میں اور بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: جلد پر داغ ڈالنے خراب، نیوٹروفیل کی کمی۔

احتیاط: گتھیا میں سن کرنے والی ادویہ، لیوکی میا پیداکرنے والی ادویہ، خون کے سفید ذرات W.B.C. پر نگاہ رکھیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: پوٹاشیم اور مدر بول ادویہ، (NSAID) عروق کشادہ کرنے والی ادویہ، کلونی ڈین، الوپیرنال، پروبنی سڈ، پروکینامائیڈ قوت مدافعت گھٹانے والی ادویہ، اور ڈیجی ٹالس کے ساتھ دینے سے اثرات خراب نکلتے ہیں۔

## تجارتی مرکبات

ACETEN	(WOCKHARDT) 25mg 10: Rs.33.35	ایسی ٹن
ACEZIDE	(WODKhardt) 15mg:10: Rs.24.13	ایسی زائیڈ
ANGIOPRIL	(TORRENT) 25mg:10: Rs.29.50	این جیو پرل
CAPOTRIL	(LUPIN) 25mg:10:Rs.34.57; 50mg:4:Rs.25.81	کیپو ٹریل
CAPOTRIL-H	(LUPIN) 25mg:10:Rs.36.23	کیپو ٹریل-اچ

## ENALAPRIL

## انالپرل

افعال و منافع: ہائی بلڈ پریشر، دل کے فیل ہونے، ذیابیطیسی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: پہلی خوراک ۵ ملی گرام دن میں ایک بار بعد میں ۱۰ سے ۲۰ ملی گرام یومیہ دل کے فیل ہونے C.C.F. میں مدر بول ادویہ کے ساتھ ۲.۵ ملی گرام یومیہ۔

امراض میں منفی رد عمل: حالت حمل اور ایام رضاعت میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: ورم تھیم Oedema، جلد پر داغ پڑنا، سردرد، بے چینی، چکر آنا، فتور ہضم۔



احتیاط: لوہڈ پریشر میں، گردوں کی خرابی میں، احتیاط برتنا چاہیے۔  
دواؤں کے ساتھ رد عمل: مدرات بول، پوٹاشیم کے مرکبات، دیگر دافع بلڈ پریشر ادویہ، اور  
لیتھیم کے مرکبات کے ساتھ اس کا استعمال مضر ہے۔

### تجارتی مرکبات

CONVERTEN	(KHANDELWAL) 10mg:10:Rs.24.82	کنورٹین
EN-ACE	(NICHOLAS) 10mg:10:Rs.29.40	این اے سی
EN-ACE-D	(NICHOLAS) 25mg:10:Rs.29.60	این اے سی۔ ڈی
ENAM	(STANGEN) 20mg:10:Rs.38.00	ای غم
ENAMATE	(GLENMARK) 10mg:10:Rs.28.19	انامیٹ
ENAPRIL	(INTAS) 20mg:10:Rs.54.00	اناپریل
ENAPRIL-HT	(INTAS)	اناپریل ایچ ٹی
Enapril maleate 10mg, Hydrochlorothiazide 25mg: tabs: 10: Rs. 26.00		
ENAPRIL LP	(INTAS)	اناپریل ایل ڈی
Enapril maleate 10mg, Hydrochlorothiazide 12.5mg: tabs: 10: Rs. 24.50		
ENCARDIL	(MRDLEY) 10mg:10:Rs.26.90	این کارڈیل
ENPRI	(WOCKHAR) 10mg:10:Rs.21.83	این پرائی
ENVAS TABS	(CADILA) 20mg:10:Rs.60.60	ان واس ٹبلٹ
ENZIDE	(CADILA)	ان زائیڈ
Enalapril maleate 10mg, hydrochlorothiazide 25mg: tabs: 10: Rs.22.00		
HYTROL	(SUN PHARMA) 10mg:10:Rs.22.00	ہائی ٹرول
INVORIL	(RANBAXY) 10mg:10:Rs. 325.20	ان وورل
INVOZIDE	(RANBAXY)	ان ووزائیڈ
Enalapri maleate 10mg, hydrochlorothiazide 25mg: tabs: 10: Rs.33.10		
MINIPRIL	(ALEMBIC)	منی پریل
Enalapril maleate 2.5mg, 5mg and 10mg: tabs: Price: N/A		
NEWACE	(MAX) 10mg :10: Rs.32.00	نیو اے سی
NORMACE	(UNISEARCH) 10mg: 10: Rs.28.10	نار میس
NURIL	(U.S. VITAMIN) 10mg; 10: Rs.28.66	نورل
OREN 2.5/5/10	(NATCO) 10mg:10:Rs.29.50	اورن ۲.۵/۵/۱۰
TENFRI	(PACE) 10mg: 10: Rs.28.65	ٹن فرائی



<b>VASONORM-5</b>	(KOPRAN) 5mg: 10: Rs.15.50	واسونارم ۵
<b>VASOPRIL</b>	(PROTEC) 5mg: 10: Rs.15.91	واسوپرل
<b>VIVIRIL</b>	(SARABHAI) 10mg: 10: Rs.26.83	وائی وی رل
<b>VIVIRIL-D</b>	(SARABHAI)	وائی وی رل ڈی
Enalapril maleate 10mg, hydrochlorthiazide 2.5mg: tabs: 10: Rs.29.50		

## LISINOPRIL

## لی سی نوپرل

افعال و منافع: یہ دوا معمولی اور درمیانی درجے کے ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: پہلی خوراک ۵، ۲۰ ملی گرام دن میں ابار پھر ۵ سے ۲۰ ملی گرام مرض کے مطابق دی جائے زیادہ سے زیادہ ۴۰ ملی گرام مدر بول ادویہ کو اس کے استعمال سے پہلے بند کر دینا چاہیے بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

متقی افعال و امراض میں: شرائین میں رکاوٹ، رگوں میں تسد، حالت حمل جسم پر خونی دھبے اور تھج میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: لو بلڈ پریشر ہونا، گردوں کی کمزوری، اوڈیما، جلد پر داغ پڑنا، چکر آنا، درد سر، اسہال، کھانسی، الجھن، گھبراہٹ، خفقان، متلی، ضعف و نقاہت۔

احتیاط: گردوں کی خرابی والے ہائی بلڈ پریشر میں، شدید قلبی دباؤ میں، گردوں کی خرابی، دوران علاج گردوں کے فعل پر نگاہ رکھیں۔

دیگر دواؤں کے ساتھ رد عمل: پوٹاشیم کم کرنے والی مدر ادویہ، انڈو میتھاسون، لیتھیم، دافع بلڈ پریشر دواؤں کے ساتھ دینا مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

<b>BIOPRIL</b>	(BIOCHEM) 10mg: 10: 32.00	بایوپرل
<b>CIPRIL</b>	(CIPLA) 10mg tabs: Rs.60.00	سپرل
<b>HIPRIL</b>	(MICRO LABS) 5mg: 10: Rs.34.80	ہیپرل
<b>HYPACE</b>	(TATA PHARMA) 10mg: 10: Rs.59.50	ہائی پیس
<b>INRAS</b>	(MERIND) 10mg: 10: Rs.66.87	ان راس
<b>LINVAS</b>	(CADILA) 10mg: 10: Rs.73.70	لن واس



LIPRIL	(LUPIN)	10mg: 10: Rs.67.59	لپرل
LISIR	(KRAMER)	10x10: Rs.507.83	لائی سر
LISICARD	(GUFIC)	10mg: 10: Rs.55.60	لی سی گارڈ
LISSINACE	(ALKEM)	10mg: 10: Rs.60.00	لی سی نیس
LISORIL	(IPCA)	10mg: 10: Rs.71.75	لی سورل
LISTRIL	(TORRENT)	10mg: 10: Rs.72.90	لس ٹرل
LPL	(CONCEPT)	10mg: 10: Rs.54.00	ایل پی ایل
ODACE	(ALIDAC)	10mg: 10: Rs.30.70	اوڈیس

## PERINDOPRIL

## پیرن ڈوپرل

افعال و منافع: وجع القلب (انجائنا) دل کا فیل ہونا، دل بیٹھنا (C.C.F.) میں مفید ہے۔  
 مقدار و ترکیب: ۲ ملی گرام پہلی خوراک دن میں ابار صبح کو دی جائے ۱ سے ۲ ہفتہ بعد ۴ ملی گرام تک  
 دی جاسکتی ہے۔ دوا سے ۲-۳ دن قبل مدرات بول بند کر دینا چاہیے، بوڑھوں میں ۲ ملی گرام سے زائد نہ  
 دیں، بچوں کو قطعاً نہ دیں۔

منفی عمل: C/1 حالت حمل، ایام رضاعت اور بچوں میں استعمال نہ کرائیں۔

مضر اثرات: کھانسی، بے چینی، کمزوری، نفاہت، درد سر، نیند اور مزاج میں خلل، ذائقہ خراب نم  
 معدہ پر درد، متلی ابکائی، درد شکم، جلد پر داغ پڑنا، خون میں یوریا کی زیادتی، پیشاب میں پروٹین کا خارج ہونا  
 ، خون میں ہیموگلوبین، سرخ ذرات پلے ٹی لیٹ میں کمی ہونا۔

احتیاط: گردوں کے افعال پر نظر، بیہوشی کی دوا، مدر بول ادویہ، دوا شروع کرنے سے ۳ دن قبل بند  
 کر دیں۔

دیگر ادویہ کے ساتھ رد عمل: پوٹاشیم کے مرکبات، مدر رات بول، مرخی اعصاب ادویہ، ایپی  
 پرائیم اور لیٹھیم کے مرکبات کے ساتھ اثرات خراب رونما ہونے میں۔

## تجارتی مرکبات

COVERSYL

(SERDIA)

کور سائل

Perindopil (as tertbutylamine) 4mg; tabs. 10: Rs.246.22



## RAMIPRIL

## رامی پرل

افعال و منافع: یہ حرکات قلب کو کنٹرول کرتی ہے ہر طرح کے ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔  
 مقدار و ترکیب: ہائی بلڈ پریشر میں ۵ء ۲۵ ملی گرام دن میں ابار قلب کے فیل ہونے میں ۲۵ء ۱۰۰ ملی گرام  
 یومیہ آہستہ آہستہ بڑھا کر ۱۰۰ ملی گرام تک دی جاسکتی ہے۔  
 منفی رد عمل: حالت حمل اور ایام رضاعت میں نہیں دینا چاہیے۔  
 مضر اثرات: چکر آنا، کمزوری، متلی قے، درد سر، خفقان، تھکاوٹ، درد شکم اسہال جھج Oedema،  
 خشک کھانسی، عضلات اور سینہ میں درد ضعف باہڈ پریشن، ذائقہ خراب۔  
 احتیاط: الرجی کی ہسٹری میں، جگر و گردوں کے امراض میں قلبی تناؤ، ہارٹ اٹیک لیو کو سائٹ کی کمی اور  
 لو بلڈ پریشر میں اور بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔  
 دواؤں کے ساتھ رد عمل: مدر بول ادویہ، دیگر بلڈ پریشر کم کرنے والی ادویہ کے ساتھ نہیں دینا  
 چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

CARDACE

(HOECHST)

5mg: 10: Rs. 70.10

کارڈیس

RAMACE

(ASTRA-IDL)

5mg: 10: Rs. 70.00

رامیس

**CALCIUM CHANNEL**

کیلیم چینل

**BLOCKING AGENT**

بلاکنگ ایجنٹ

**AMLODIPINE BESILATE** املوڈی پن بی سائی لیٹ

افعال و منافع: ہائی بلڈ پریشر کے لئے لائن نمبر کی دوا ہے۔  
 مقدار و ترکیب: ۵ء ۲۵ ملی گرام دن میں ابار زیادہ سے زیادہ ۱۰۰ ملی گرام بچوں کو نہیں دی جاسکتی۔  
 مضر اثرات: درد سر، جھج، الجھن گھبراہٹ، متلی جلد پردھاریاں، چکر آنا۔



احتیاط: حمل ایام رضاعت اور جگر کے افعال کی خرابی میں۔

## تجارتی مرکبات

AMCARD	(SYSTOPIC)	10mg: 10: Rs.136.00	ایم کارڈ
AMDEPIN	(CADILA)	10mg: 10: Rs.125.90	ایم ڈی پن
AMLODAC	(ALIDAC)	10mg: 10: Rs.39.50	الموڈیک
AMLOGARD	(PFIZER)	10mg: 10: Rs.420.72	الموگارڈ
AMLOPIN	(LYKA)	10mg: 10: Rs.120.00	ایم لوپن
AMPREZ-5/10	(CROSLANDS)	10mg: 6: Rs.70.00	ایم پریز ۱۰/۵
ANGIGAURD	(SWIFT)	10mg: 10x10: Rs.1011.00	این جی گارڈ
TAMLOD	(TATA PHARMA)	20mg: 10: Rs.	تام لوڈ

## NIMODIPINE

## نموڈی پن

افعال و منافع: عروق کے تشنج، دماغی جھلی میں جریان خون، دماغی عروق پھولنا (انورسما) یا شق ہو جانے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۶۰ ملی گرام ہر ۴ گھنٹہ بعد ۲۱ دن کھلائیں۔

منفی افعال: C/1 حالت حمل اور ایام رضاعت میں ضرر رساں ہے۔

مضر اثرات: چکر آنا، لو بلڈ پریشر، درد سر، چہرے پر سرخی، جسم میں سوجنا، متلی، تھج (اوڈیما)، کھانسی، آواز کے ساتھ سانس آنا، پیپھڑوں میں ورم ہونا۔

احتیاط: جگر کے فعل کی خرابی میں، عروق قلبیہ کی تنگی اور رکاوٹ میں احتیاط برتیں۔

## تجارتی مرکبات

MODIPIN	(ZELTA (CADILA)	30mg: caps: 30: Rs.151.80	موڈی پن
NIMODIP	(USV)	30mg: tabs: 10: Rs.59.91	نموڈپ
NIMOTIDE	(TORRENT)	30mg: caps: 6: Rs.32.90	نموٹائیڈ
VASOTOP	(PROTEC)	30mg tabs: 10: Rs.59.09	واسوٹوپ
VASOTOP INFUSION	(PROTEC)	50ml: Rs.105.00	واسوٹوپ بوتل



## FELODIPIN

## فیلوڈی پن

افعال و منافع: ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: پہلی خوراک ۵ ملی گرام پھر ۵ سے ۱۰ ملی گرام دو بار میہ بچوں کو منع ہے۔

منفی افعال: حالت حمل اور ایام رضاعت میں دینا نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: ٹخنوں کا متورم ہونا، چکر، الجھن، گھبراہٹ، درد سر، چہرہ سرخ، خفقان، مسوڑھوں کا پھولنا۔

احتیاط: خرابی جگر اور عروق قلبیہ کی تنگی میں احتیاط برتن۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: سی می ٹی ڈین، فین ٹائن، کاربامائی پائن، فینوباربی ٹون کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

**FELOGARD-ER**  
**PLENDIL**  
**RENEDIL**

(CIPLA) 10mg: 10: Rs.33.00  
(ASTRA-IDL) 10mg: 10: Rs.69.00  
(HOECHST) 10mg: 10: Rs.69.00

فیلوگارڈای آر  
پلین ڈل  
رینی ڈل

## سنٹرل ایڈری نرجک ان ہی بی ٹر

## CENTRAL ADRENERGIC INHIBITORS

اس گروپ میں وہ دوائیں شامل ہیں جو غده کلاہ گردہ کے افراز کو روک کر بلڈ پریشر پر اثر انداز ہوتی ہیں۔

## CLONIDINE HCL کلونی ڈین ہائیڈرو کلورائیڈ

افعال و منافع: یہ پلازمہ میں پائے جانے والے رے نن مادے کو کم کرتی ہے یہ مادہ بلڈ پریشر کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ہر طرح کے ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۰.۰۵ سے ۱.۰ ملی گرام دن میں ۳ بار مقدار خوراک آہستہ آہستہ بڑھانا چاہیے۔  
منفی افعال: عروق قلبیہ میں تنگی، مایو کارڈیل انفارکشن، وجع القلب، دماغی امراض، گردے کے



مزمن امراض، نقرس، جگر کی حاد تکالیف میں دینا مضر ہے۔  
 مضر اثرات: منہ خشک، پیاس، نشہ کی کیفیت، غنودگی محسوس ہوتی ہے۔  
 احتیاط: دوا ایک دم بند نہ کریں ورنہ بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، حالت حمل، ایام رضاعت و ڈپریشن میں احتیاط لازم ہے۔  
 دواؤں کے ساتھ رد عمل: اس کے ساتھ دوسری بلڈ پریشر کم کرنے والی دوائیں دینا مناسب نہیں۔

## تجارتی مرکبات

ARKAMIN	(UNICHEM)	100mg tabs: 10: Rs.4.80	ارکامین
ARKAMIN-H	(UNICHEM)		ارکامین ایچ
100mg, chlorthiazide 20mg:	tabs: 10: Rs.5.43		
CATAPRES	(GERMAN REMEDIES)	150mg: 10: Rs.3.64	کتیاپرس
CATAPRES DIU	(GERMAN REMEDIES)		کتیاپرس ڈیو
Clonidine hcl 0.1mg chlorthalidone 15mg:	tabs: 10: Rs.7.73		
CLOTHALTON	(S.G.PHARMA)		کلو تھالٹان
Clonidine hcl 100mg, chlorthalidone 15mg:	tabs: 10: Rs.3.45		

## DOBUTAMINE HCL ڈبوٹامین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: شدید وجع القلب، دل کا فیل ہونا، قلبی صدمہ میں مفید ہے۔  
 مقدار و ترکیب: ۲.۵ تا ۱۰ مائیکرو گرام سے ۱۰ مائیکرو گرام تک فی کلو/ فی منٹ کے حساب سے دی جاتی ہے۔  
 منفی افعال: حساس مریضوں میں استعمال نہ کرائیں۔  
 مضر اثرات: قلبی حرکات میں اضافہ، بلڈ پریشر اور بطنی اخراج میں اضافہ۔  
 احتیاط: دوران علاج قلب کی حرکات و ضربات بلڈ پریشر اور اخراج بول پر نظر رکھنی چاہیے حاملہ اور بچوں کو دینا منع ہے۔

## تجارتی مرکبات

DOBUCIN	(TROIKAA)	5x5ml amps: Rs.285.10	ڈبو سین
---------	-----------	-----------------------	---------



DOBURAN INJ. (SHREE GANESH) 5ml amp: Rs.335.00 ڈبوران  
 DOBUTREX (EL LILY RANBAXY) vial: Rs.388.00 ڈبوٹریکس

## METHYL DOPA

میتھائل ڈوپا

افعال و منافع: ہائی بلڈ پریشر کی اہم دوا ہے۔ شدید درمیانی درجے کا اور نہ ٹھیک ہونے والے بلڈ پریشر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار مقدار خوراک میں کمی بیشی مرض کے حساب سے ۵۰۰ سے ۲ گرام تک دے سکتے ہیں۔

منفی افعال: جگر کے حاد امراض میں، یرقان کلاہ گردہ میں خرابی یا ٹیومر میں استعمال سے خراب اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

مضر اثرات: نشہ، درد سر، ضعف نقاہت، گھبراہٹ، منہ خشک ہاضمہ خراب یرقان، خون کی کمی، کومب ٹسٹ کا نتیجہ مثبت ہو سکتا ہے۔

احتیاط: حمل میں ورم میں اور ٹسٹ غیر طبعی میں اور خون کی کمی میں احتیاط برتنا چاہیے۔  
 دواؤں کے ساتھ رد عمل: نرالی سائی لک اور دیگر بلڈ پریشر کم کرنے والی ادویہ، راؤلفیا، اور ہائیڈرالزین کے مرکبات کے ساتھ نتیجہ خراب برآمد ہوتا ہے۔

## تجارتی مرکبات

ALPHADOPA	(MERIND) 250mg tabs 10, Rs.30.48	الفاڈوپا
DOPAGYT	(THEMIS CHEMICALS) 10: Rs.15.29	ڈوپاگٹ
DOPAMET	(STANGEN) 10 tabs: Rs.13.00	ڈوپامٹ
EMDOPA	(IDPL) 10: Rs.30.49	ایم ڈوپا
MELDOPA	(IDPL) 10: Rs.30.28	میل ڈوپا
SEMBRINA 250	(BOEHRINGER) 10x10: Rs.241.39	سیم برینا ۲۵۰

Once a day

**Nicardia® Nicardia® CD**

RETARD 10 mg/20mg  
 Nifedipine Sustained Release Tablets

RETARD 30  
 Nifedipine

EXTENDED  
 RELEASE  
 TABLETS



## پیری فیئرل ایڈری نرجک ان ہی بی ٹر

### PERIPHERAL ADRENERGIC INHIBITOR

اس گروپ میں وہ ادویہ شامل ہیں جو غده کلاہ گردہ کے بیرونی حصہ کے افراز میں کمی کر کے بلڈ پریشر پر اثر انداز ہوتی ہے۔

### RESERPINE

### ری سرپین

افعال و منافع: ہر طرح کے بلڈ پریشر میں مفید ہے۔ حالت حمل میں ہونے والے قسم الدم Toxemia میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۰.۲۵ سے ۰.۵ ملی گرام روزانہ ضرورت پر ۵ ملی گرام تک دی جاسکتی ہے۔ شدید ضرورت پر اسے ۲ ملی گرام عضلاتی انجکشن لگانا چاہیے۔

منفی افعال: پارکن ڈیزیز، ڈپریشن میں غده درقیہ گردوں میں خرابی مرگی، گردہ یا کلاہ گردہ کا ٹیومرز خیم معده اور زخم قولون میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: ناک بند ہونا نقاہت، زخم معده جلد پر داغ پڑنا، اسہال، لو بلڈ پریشر سانس میں تنگی ورم تنج Odema، چہرہ سرخ ہو سکتا ہے۔

احتیاط: زخم معده کے مریضوں، ورم معده، مرارہ کی پتھری، شرا میں کی سختی سانس کی تنگی، قلبی حرکات کی بے ترتیبی، دمہ، کھانسی حمل اور ایام رضاعت میں احتیاط برتنا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: ڈیجی ٹیلیس بیہوش کرنے والی ادویہ اور دیگر بلڈ پریشر کم کرنے والی دواؤں کے ساتھ اس کا استعمال مناسب نہیں۔

### تجارتی مرکبات

ADELPHANE

(HIND. CIBA GEIGY) 10:Rs.1.22

ADELPHANE-ESIDREX

(HIND. CIBA GEIGY)

ایڈلفین  
ایڈلفین ایسی ڈریکس

10 tabs: Rs.32.09



GENOPHANE  
SARPLAZINO

(GENO)  
(GENO)

10: Rs.1.50  
10: Rs.1.71

جینوفین  
سرپلازینو

**DIURETIC**

**ڈایورٹک (پیشاب آور ادویہ)**

**AMILORIDE**

ایمی لورائیڈ

افعال و منافع: جگر کی خرابی کے سبب درم آنا، استقاء Dropsy، ضعف قلب کے سبب ہونے والا استقاء اور ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: قلبی استقاء میں ۵ سے ۱۰ ملی گرام دن میں ابار۔ ۲۰ ملی گرام تک دے سکتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر میں ۵ سے ۱۰ ملی گرام دن میں ابار استقاء کبدی میں ۵ ملی گرام دن میں ابار۔ ۲۰ گرام سے زیادہ نہیں دینا چاہیے۔

منفی افعال: خون میں پوٹاشیم کی زیادتی، پوٹاشیم والی غذا یا دوا کے استعمال جگر اور گردوں کی تکالیف میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: بھوک کی کمی، متلی تے، پیٹ میں بھاری پن، معدہ میں خراش جلن، ہاتھ پیر اینٹھنا، قبض اسہال جلد پر داغ پڑنا، لو بلڈ پریشر، پوٹاشیم میں اضافہ، تیزابیت، خون میں یوریا، نائٹریو جن کی زیادتی۔

احتیاط: ذیابیطس کے مریضوں میں، گردوں کے افعال پر نگاہ رکھیں، حمل کی حالت میں احتیاط برتیں۔

**تجارتی مرکبات**

**AMIFRU-40**

(ELDER)

ایمی فرو

Amiloride Hcl 5mg Frusemide 40mg 10: Rs.10.85

**AMIMIDE**

(BIDDLE SAWYER) 10: Rs.11.60

ایمی مائیڈ

**BETA BIDIURET**

(BIDDLE SAWYER) 10: Rs.13.85

بٹا بڈوریٹ

**BIDIURET**

(BIDDLE SAWYER) 10: Rs.12.09

بڈوریٹ

**BIDIURET-L**

(BIDDLE SAWYER) 10: Rs.7.50

بڈوریٹ ایل

**DIBETA**

(TORRENT) caps: 10: Rs.14.07

ڈاکی بیٹا

**FRUMIL**

(GENO) 5mg: tabs: 10: Rs.6.80

فرومل



**HIPRES-D**  
**LASIRIDE**

(PROTEC) 10 caps: Rs.12.07  
(HOECHST) 10: Rs.7.47

ہائپر س ڈی  
لاسی رائیڈ

## CHLORITHALIDONE

کلوری تھالی ڈون

افعال و منافع: نمبر ۱ کی ہائی بلڈ پریشر کم کرنے اور پیشاب آور دوا ہے، ورم، خون میں زہریلے اثرات حمل کا تسمم الدم Toxaemia، قبل حیض تناؤ اور درد میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰ ملی گرام یومیہ شدید حالت میں ۱۰۰ ملی گرام یومیہ دے سکتے ہیں۔ مرض پر قابو رکھنے کے لئے ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام ہفتہ میں ۳ بار

منفی افعال: دماغی الجھن یا ڈپریشن میں، زخم معدہ و آنتوں کی حالت میں، شدید کمزوری میں پتہ کی پتھری، مرگی اور دمہ میں اس کا استعمال مضر ہے۔

مضر اثرات: منہ خشک ہونا، چکر آنا۔

احتیاط: دوا ایک دم بند نہ کریں، ورنہ بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے۔ حالت حمل اور ایام رضاعت میں ڈپریشن اور گھبراہٹ اور امراض قلب میں احتیاط برتنا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: ٹرائی سائی کلک، الفابلا کر، بلڈ پریشر کم کرنے والی ادویہ ڈیجی ٹیلیس اور کوئی نی ڈین اور دافع درد ورم ادویہ NSAIDS لیتھیم انسولین اور خوردنی دافع ذیابیطیس ادویہ کے ساتھ خراب اثر ہو سکتا ہے۔

## تجارتی مرکبات

**ATECARD-D**

(DABUR)

ایٹی کارڈ۔ ڈی

Chlorthalidone 12.5mg, atenolol 50mg: tabs: 14: 25.00

**CATAPRES DIU**

(GERMAN REMEDIES)

کیتا پریس

Clonidine 0.1mg Chlorthalidone 15mg tabs 10: Rs.7.73

**CLOTHALTON**

(S G PMCLS)

کلو تھالٹن

Clonidine Hcl 100mcg Chlorthalidone 15mg tabs 10: Rs.3.45

**HYTHALTON**

(S G PMCLS)

ہائی تھالٹن

Chlorthalidone 100mg 10: Rs.25.47



**TENOCLOR**

(ICI)

ٹینوکلور

Atenolol 100mg, chlorthalidone 25mg: tabs: 14. Rs.48.85

**TENORIC**

(IPCA)

ٹینورک

Atenolol 100mg Chlorthalidone 2.5mg tabs 10: Rs.23.00

**FRUSEMIDE**

فروسی مائیڈ

افعال و منافع: پھیپھڑوں کے ورم قلبی تناؤ، وجع القلب، گردوں کے سبب ہونے والے ورم اور ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰ سے ۸۰ ملی گرام ایک خوراک دن میں ابار یا ایک دن کے وقفہ سے کھلائیں بچوں کو ۲ سے ۴ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے۔

منفی افعال: سلفاگروپ سے حساس مریضوں میں خون کی سپلائی کی کمی میں، لو بلڈ پریشر میں پوٹاشیم کی کمی میں، ایڈسین ڈیزیز میں خراب اثرات رونما ہوتے ہیں۔

مضر اثرات: فتور ہضم، بے چینی جلد پرداغ، نقرس، خون میں عدم توازن ہو جاتا ہے۔ احتیاط: حالت حمل، ایام رضاعت، نقرس، جگر اور گردوں کی خرابی ذیابیطیس پیشاب کی جلن میں احتیاط؛ تیس، علاج کے دوران اور بعد پوٹاشیم کی اضافی مقدار دیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: لیٹھیم، حرکات قلب کو کنٹرول کرنے والی ادویہ، سیفالو سپورین، ایسی ٹوزولامائیڈ کارٹی سون، انسولین دافع درد ورم ادویہ NSAID کے ساتھ دینا مضر ہے۔

**تجارتی مرکبات****AMIFRU-40**

(ELDER)

ایمی فرو ۴۰

Frusemide 40mg amiloride hcl 5mg; tabs 10: Rs.10/85

**AQUAMIDE**

(SUN PHARMA)

ایکو امائیڈ

Frusemide 20mg spironolactone 50mg tabs 10x10: Rs.220.00

**FRUMIL**

(GENO)

فرومل

Frusemide 40mg, amiloride hcl 5mg: tabs: 10: Rs.8.73

**FRUSELAC**

(LUPIN)

فروسی لیک

Frusemide 20mg spironolactone 50mg tabs 10: Rs.30.40



**FRUSENEX**

(GENO)

فروسی نیکس

Frusemide 40mg and 100mg: tabs: 40mg: 10: Rs.2.30; 100mg: 10: Rs.6.60

**LASILACTONE 50/100**

(HOECHST)

لاسی لکٹون ۵۰/۱۰۰

Frusemide 20mg Spironolactone 50mg and 100mg tabs; 50mg: tabs 10: Rs.31.27; 100mg: Rs. 53.94

**LASIRIDE**

(HOECHST)

لاسی رائیڈ

Frusemide 40mg Amiloride hcl 5mg: tabs: 10: Rs.7.47

**LASIX**

(HOECHST)

لاسکس ٹبلیٹ

Frusemide 40mg 25x10 tabs: Rs. 83.32

**LASIX INJ**

(HOECHST)

لاسکس انجکشن

Frusemide 20mg/2ml ; Rs.2.46

**SALINEX**

(IDPL) Frusemide 40mg: 10: Rs.2.70 سالی نیکس

**SPIROMIDE**

(SEARLE)

اسپائرومائیڈ

Frusemide 20mg Spironolactone 50mg 10 tabs: Rs.28.56

**HYDROCHLOR THIAZIDE** ہائیڈروکلور تھیازائیڈ

افعال و خواص: یہ گردوں سے پانی اور نمکیات کے اخراج میں تیزی پیدا کرتی ہے ہائی بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے دیگر دافع بلڈ پریشر دواؤں کے ساتھ موثر رہتی ہے قلب اور گردوں کے سبب ہونے والے ورم قبل از حیض تاؤ درد، چشم میں پانی جمع ہونا، دودھ کم کرنے حالت حمل میں، تسمم الدم Toxemia میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵ سے ۷۵ ملی گرام دن میں اخوراک یا کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے دو صبح کو ناشتہ کے بعد یا دوپہر کو کھانے کے بعد دینا چاہیے اوسط خوراک ۲۵ ملی گرام سے ۲۵ ملی گرام یومیہ ہائی بلڈ پریشر کی دواؤں کے ساتھ مقدار خوراک کم کر دیں۔

منفی افعال: ورم جگر کے سبب ہونے والا کوما، پیشاب، بالکل بند ہونا اور گردوں کے فیل ہونے میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: خون میں نمکیات کی کمی، جلد پر داغ پڑنا، بصارت میں فرق، نقرس، خون کا توازن بگڑنا



البحن بنه چینی۔  
دواؤں کے ساتھ رد عمل: لیتھیم، ڈیجی ٹیلز کے ساتھ استعمال سے خراب رد عمل ہوتا ہے۔

## تجارتی مرکبات

**ADELPHANE-ESIDREX** (HIND. CIBA GEIGY) ایسی ڈریکس  
Reserpine 0.1mg Dihydrallazine sulph 10mg Hydrochlorthiazide 10mg  
tabs 10: Rs.1.50

**BETA BIDIURET** (BIDDLE SAWYER) بٹاڈوریٹ  
Atenolol 50mg amiloride hcl 2.5mg Hydrochlorthiazide 25mg tabs:  
10: Rs.13.85

**BIDURET** (BIDDLE SAWYER) بڈوریٹ  
Hydrochlorothiazide 50mg amiloride hcl 5mg tabs 10: Rs.12.09

**CAPTOTRIL-H** (LUPIN) کیپ ٹوٹرل  
Captopril 25mg Hydrochlorthiazide 25mg tabs 10: Rs.36.23

**CIPLAR-H** (CIPLA) سپلار۔ ایچ  
Propranolol Hcl 40mg Hydrochlorthiazide 25mg tabs 10: Rs.4.62

**DIBETA** (TORRENT) ڈائی بیٹا  
Hydrochlorthiazide 25mg, atenolol 50mg, amiloride 2.5mg: caps: 10:  
Rs.14.07

**ESIDREX** (HIND. CIBA GEIGY) ایسی ڈریکس  
Hydrochlorthiazide 50mg Tabs 10x10: Rs.6.12

**HIPRES-D** (PROTEC) ہائی پریس ڈی  
Atenolol 50mg Hydrochlorthiazide 25mg Amiloride Hcl 25mg caps  
10: rs.12.07

**METOZIDE** (TORRENT) میٹوزائیڈ  
Metoprolol 100mg Hydrochlorthiazide 12mg tabs 10: Rs.15.00

**NORMACE-D** (UNISEARCH) نارمیس  
Enalapril maleate 10mg, hydrochlorthiazide 25mg: tabs: 10: Rs.29.00

**SELOPRES** (ASTRA-IDL) سیلوپریس  
Metoprolol 100mg Hydrochlorthiazide 12.5mg tabs 10: Rs.18.51



## TRIAMTERENE

## ٹرائیم ٹیرین

افعال و منافع: پیشاب زیادہ مقدار میں خارج کرتی ہے، سوڈیم پوناٹیم کے انجذاب کو روکتی ہے گردوں کی عروق پر اثر انداز ہو کر پیشاب کے اخراج میں زیادتی کرتی ہے۔ معمولی اور درمیانی ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔ دوسری ادویہ کے ساتھ قلب پر دباؤ کو کم کرتی ہے ورم کو دور کرتی ہے۔  
 مقدار و ترکیب: ورم Oedema میں ۱۰۰ سے ۲۰۰ ملی گرام یومیہ کی خوراکیوں میں تقسیم کر کے۔  
 منفی افعال: پوناٹیم کی زیادتی میں، گردوں کے فیل ہونے میں، دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: متلی، ابکائی، اسہال، پیروں کا اینٹھنا، جلد کا پھٹنا، درد سر، منہ خشک خون کا توازن بگڑنا۔  
 احتیاط: جگر اور گردوں کی کمزوری میں جسم میں تیزابیت کی زیادتی میں نفرس Gout، ایام رضاعت اور حمل میں احتیاط برتنا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: پوناٹیم کے مرکبات، لیتھیم، ڈیجی ٹلیس، انڈو میتھاسین کے ساتھ اس کا استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے۔

## XIPAMIDE

## زیپامائیڈ

افعال و خواص: یہ دوا سیدھی گردوں کی باریک نالیوں پر اثر انداز ہو کر پیشاب کے اخراج میں اضافہ کرتی ہے معمولی اور درمیانی ہائی بلڈ پریشر، قلب و جگر گردوں کی خرابی سے ہونے والے ورم استقاء Dropsy میں اور ایام حمل میں ہونے والا ورم، وجع المفاصلی ورم میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ہائی بلڈ پریشر میں ۲۰ سے ۴۰ ملی گرام ایک خوراک صرف صبح کو دوسری دواؤں کے ساتھ، ۲۰ ملی گرام سے زائد نہ دیں۔ مریض کے حالات کے مطابق مقدار خوراک کا تعین کریں۔

منفی افعال: جسم میں پانی اور نمکیات Electrolite کی کمی میں، گردوں کی شدید خرابی، جگر کی خرابی کے سبب ہونے والی غنودگی Coma میں دینا خطرناک ہے۔

مضر اثرات: ہاضمہ کی خرابیاں، چکر آنا۔

احتیاط: پوناٹیم کی مقدار بڑھا دینا چاہیے، حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں، نفرس جگر اور گردوں کی خرابی میں



ذیابیطیس، غدہ درقیہ بڑھ جانے اور ایام رضاعت میں احتیاط رکھیں۔

## تجارتی مرکبات

**BETA-XIPAMID**

(GERMAN REMEDIES)

بٹاز پائڈ

Xipamid 10mg, propranolol hcl 40mg: tabs: 10: Rs.14.86

**XIPAMID**

(GERMAN REMEDIES)

زیپائڈ

Xipamid 20mg: tabs: 10: Rs.23.42

## CLOPAMIDE

## کلوپامائیڈ

افعال و منافع: یہ دوا گردوں کے افعال پر اثر انداز ہو کر پیشاب کے اخراج کو تیز کر دیتی ہے معمولی اور درمیانی درجے کے ہائی بلنڈ پریش میں مفید ہے۔ قلب و جگر گردوں کی کمزوری کے سبب ہونے والے ورم Odema میں مفید ہے دافع درد ورم دواؤں کے سبب ہونے والے ورم میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ہائی بلنڈ پریش میں ۵ سے ۱۰ ملی گرام صبح کو دی جائے ورم میں ۲۰ سے ۴۰ ملی گرام۔  
منفی افعال: گردوں کے ورم، جگر اور گردوں کا فیل ہونا پوٹاشیم کی شدید کمی سلفا گروپ سے حساس مریضوں میں مرض ایڈین اور حمل کی حالت میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: متلی ابکائی بے چینی، الجھن، منہ خشک، درد سر، تشنج عضلات چکر آنا الرجی، روشنی سے نفرت ہو سکتی ہے۔

احتیاط: زیادہ مقدار میں اور طویل مدت تک اور ذیابیطیس میں احتیاط برتنا چاہیے۔  
دواؤں کے ساتھ رد عمل: لیتھیم، کارٹی سون کے مرکبات دافع درد ورم ادویہ NSAID کے ساتھ دینا مناسب نہیں۔

## تجارتی مرکبات

**BRINALDIX**

(SANDOZ)

بری نال ڈکس

Clopamide 20mg: tabs 5x20 Rs.70.25

**BRINERDIN**

(SANDOZ)

بری نرڈین

Reserpine 0.1mg Clopamide 5mg Dihydroaegocristine mestilate  
0.5mg tabs 10: Rs.32.09



## انڈاپامائیڈ ہیمی ہائیڈریٹ INDAPAMIDE HEMIHYDRATE

افعال و منافع: یہ معمولی درجے کی پیشاب آور دوا ہے، معمولی اور درمیانی ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔  
 مقدار و ترکیب: ۲.۵ ملی گرام دن میں ایک بار، ضرورت کے مطابق مقدار کم و بیش کی جاسکتی ہے۔  
 منفی افعال: حمل، بچوں میں، جگر اور گردوں کے شدید امراض میں استعمال مناسب نہیں۔  
 مضر اثرات: الرجی، جلد پرداغ، ورم فم معدہ، بے چینی اور عضلات میں تشنج ہو سکتا ہے۔  
 احتیاط: دیگر پیشاب آور ادویہ کے ساتھ حالت حمل اور ایام رضاعت میں اس کا استعمال مناسب نہیں۔

### تجارتی مرکبات

ATELOL-D	(THEMIS PHARMA)	ایٹیلول
Indapamide 2.5mg Atenolol 50mg tabs 14tabs	Rs.25.85	
LORVAS	(TORRENT)	لورواس
Indapamide Hemihydrate 2.5mg tabs 10 tabs	Rs.20.90	

## قلبی حرکات کو کنٹرول کرنے والے مرکبات

### INOTROPIC DRUGS

#### DIGOXIN

#### ڈیجاکسن

افعال و منافع: یہ دوا قلب کے انقباضی قوت میں اضافہ کرتی ہے حرکات قلب کی تیز حرکات اور تناؤ کو اعتدال پر لاتی ہے۔ وجع القلب کنجسٹو کارڈیک فیلر C.C.F. میں مفید ہے۔  
 مقدار و ترکیب: پہلے ۲۴ سے ۳۶ گھنٹہ تک ۱ ملی گرام سے ۵ ملی گرام قلبی حرکات کنٹرول ہونے پر ۲.۵ ملی گرام سے ۵ ملی گرام تک دی جائے مرض کے حالات اور بچوں کو عمر کے مطابق مقدار خوراک کا تعین کرنا چاہیے۔  
 منفی افعال: اذنی اور بطنی رکاوٹ میں، ناک بند ہونے، سانس کی تنگی میں دینا خطرناک ہے۔



مضر اثرات: بھوک کی کمی، قے متلی بصارت میں فرق الرمی کا اثر ہو سکتا ہے۔

احتیاط: دوران علاج مریض کو نگرانی میں رکھیں، پھیپھڑوں اور قلب کی کمزوری میں مقدار خود ایک گھنٹہ میں جسم میں پانی کے عدم توازن، جگر اور گردوں کی کمزوری، ضعیفوں، نندہ رقیہ کی خرابی میں احتیاط لازم ہے۔  
دواؤں کے ساتھ رد عمل: کیا شیم کے مرکبات، پوٹاشیم خارج کرنے والے مرکبات کوئی ڈین، لیتھیم، دافع تیزابیت، اور انٹی بائیوٹک کے ساتھ اس کا استعمال مناسب نہیں۔

## تجارتی مرکبات

**CARDIOXIN TABS**

(SANDOZ)

کارڈیو آکسن

Digoxin LP 0.25mg Tabs. 10x10: Rs. 19.48

**DIGOX**

(CADILA)

Digoxin 0.25mg: 10: Rs. 1.95

ڈیجاکس

**DIGOXIN PEAD. ELIXIR** (BURROUGGS WELLCOME)

Digoxin 0.5mg/ml liquid 30ml: Rs. 18.27

**LANOXIN INJ**

(BURROUGHS WELLCOME)

لینوکسن انجکشن

Digoxin 0.5mg/2ml inj 2ml: Rs. 5.31

## DOBUTAMINE HCL

## ڈوبوٹامین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: یہ دوا دل کے کے فیل ہونے، شدید وجع القلب، دل کے آپریشن، صدمہ قلب میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲.۵ سے ۱۰ ماٹروگرام / فی کلوگرام / فی منٹ کے حساب سے دی جائے زیادہ سے زیادہ ۴۰ ماٹروگرام / فی کلوگرام کے حساب سے دے سکتے ہیں۔

منفی افعال: حساسیت کے مریضوں کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: حرکات قلب کو تیز کرتی اور بلڈ پریشر میں اضافہ کرتی ہے۔

احتیاط: حرکات قلب تیز اور بے ترتیب ہونے پر احتیاط برتیں دوا کے استعمال کے دوران نبض اور قلب کی حرکات پر نگاہ رکھیں حاملہ اور بچوں کو استعمال نہ کرائیں۔



## تجارتی مرکبات

<b>DOBUCIN</b>	(TROIKAA)	ڈبو سین
Dobutamine hcl 50mg per ml inj. 5x5ml amps: 285.10		
<b>DOBURAN INJ</b>	(SHREE GANESH)	ڈبوران انجکشن
Dobutamine hcl 250mg per 5ml: 5ml amp: Rs.335.00		
<b>DOBUTREX</b>	(RANBAXY)	ڈبو ٹریکس

## DOPAMINE

## ڈوپامین

افعال و منافع: یہ دوا گردوں اور شکم کی عروق کو کشادہ کر کے اخراج بول میں اضافہ کرتی ہے۔ قلب سے اخراج خون میں اضافہ کرتی ہے۔ بلڈ پریشر اور روح نفسانی کو تحریک پہونچاتی ہے۔ شدید قلبی دباؤ، گردوں کے فیل ہونے، صدمہ، انفکشن، صدمہ قلب اور آپریشن کے بعد ہونے والے ضعف میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۲۰۰ ملی گرام بہت آہستہ بوتل میں ڈال کر چڑھائیں۔

منفی افعال: قلب کے بائیں بطن کے والو میں خرابی، کایا گردہ کے ٹیومر میں دینا خطرناک ہے۔

مضر اثرات: معمولی متلی اور قے کی شکایت ہو سکتی ہے۔

احتیاط: انشوزن کے دوران قلبی حرکات پر نگاہ رکھیں۔

## تجارتی مرکبات

<b>DOPAMINE HCL INJ</b>	(NEON)	ڈوپامین ہائیڈروکلورائیڈ انجکشن
5x5ml amps: Rs.100		
<b>DOPINGA INJ</b>	(INGA) 5ml: Rs.14.15	ڈوپنگا انجکشن





## عروق کو کشادہ کرنے والی ادویہ

### PERIPHERAL VASODILATOR

#### CINNA RIZINE

#### سی نارازائن

افعال و منافع: یہ دوا چکر آنے کان بجھنے، متلی ابکائی کے مراکز پر مخدر اثر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ، سفری تے، موشن سکس، منرڈیزیز میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: بالغوں کو ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار بچوں کو نصف مقدار، سفری تے اور چکر آنے میں ۲۵ ملی گرام سفر شروع کرنے سے قبل، کھلائیں۔

منفی افعال: الرجی اور حمل میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: جلد پر الرجی کا اثر، بے چینی، ضعفوں میں چکر آنے کی شکایت ہو سکتی ہے۔

احتیاط: لو بلڈ پریشر میں، دوا کے استعمال کے دوران ڈرائیوری اور مشنری چلانے سے احتیاط رکھیں۔

#### تجارتی مرکبات

CINTIGO	(WALLACE)	25mg: 10: Rs.9.90	سین ٹائی گو
CINZAN	(FDC)	25mg: 10: Rs.11.00	سین زان
DIZIRON	(GLENMARK)	25mg: 10: Rs.9.19	ڈائی زی ران
STUGERON	(ETHNOR)	25mg: 25: Rs.37.50	اسٹکی ران
STUGERON FORTE	(ETHNOR)	75mg: 20: Rs.66.00	اسٹکی ران فورٹ
VERTIGON	(GENO)	25mg: 10: Rs.9.42	ورٹائی گان

#### CYCLANDELATE

#### سائی کلان ڈی لیٹ

افعال و منافع: دماغی اور عام جسمانی عروق کی خرابی تنگی کو دور کرتی ہے ساختوں میں کولیسٹرول جمع ہونے کو روکتی ہے۔ ساختوں میں آکسیجن پہنچانے میں معاون ہوتی ہے۔ دماغی سیل کی کارکردگی میں اضافہ کرتی ہے رائی ناڈ اور برگرڈیزیز میں مفید ہے۔



مقدار و ترکیب: ۲۰۰ سے ۴۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار  
 منفی افعال: دماغی حادثات، چوٹ، گلاکوما، مایوکارڈیل انفارکشن میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔  
 مضر اثرات: نظام ہضم میں خلل، چہرہ سرخ ہونا، جلد کا سرخ ہونا۔

### تجارتی مرکبات

CLENDAL	(SUN PHARMA)	400mg: 10x10: Rs. 116.00	کلین ڈال
CYCLASSYN	(CIPLA)	10: Rs. 20.00	سائیکلاسائن
CYCLOSPASMOL	(ELDER)	10: Rs. 30.50.	سائی کلو اسپامول

### ڈائی ہائیڈرالزین سلفیٹ DIHYDRALZIN SULPHATE

افعال و منافع: یہ دوا خون کی رگوں کی سختی کو کم کرتی ہے عروق کو کشادہ کرتی ہے۔ دماغی اور گردوں کی عروق میں خون کی رسد میں اضافہ کرتی ہے۔ گردوں کی خرابی کے سبب ہونے والے ہائی بلڈ پریشر حمل کے ایام میں ہونے والے ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔

منفی افعال: وجع القلب، ورم غلاف القلب اور حمل کے نصف اول میں دینا مناسب نہیں۔  
 مضر اثرات: وجع القلب (انجائنا)، لو بلڈ پریشر، چہرہ سرخ، درد سر، عضلات و عظام میں درد پلازمہ کرے ٹی مین میں اضافہ، پیشاب میں خون آنا، گردوں کا فیل ہونا، پیشاب رکنا ورم عصب خون کا توازن بگڑنا۔

احتیاط: پیچھے پھروں اور دماغی امراض میں گردوں کے کمزور اور فیل ہونے میں جگر کی خرابی اور ایام رضاعت میں اور دو ایک دم بند کرنے میں احتیاط برتیں۔  
 دواؤں کے ساتھ رد عمل: دافع ڈپریشن اور ٹراکولائزر کے ساتھ، بیہوش کرنے والی و دافع بلڈ پریشر ادویہ، ڈایازو کسائیڈ کے ہمراہ استعمال مضر ہے۔

### تجارتی مرکب

NEPRESOL	(HIND. CIBA-GEIGY)	25mg: tabs: 10x10: Rs. 8.03	نپری سول
----------	--------------------	-----------------------------	----------



## HYDRALLAZINE

## ہائیڈروالزائن

افعال و منافع: یہ دوا شریانیں کی سختی کو دور کرتی ہے غیر اختیاری عضلات کو ڈھیلا کرتی ہے، قلبی تناؤ اور عروق کی تنگی، ورم گردہ حالت حمل میں ہائی بلڈ پریشر کو دور کرتی ہے دوسری دواؤں کے ساتھ ہائی بلڈ پریشر دور کرنے میں معاون ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵ ملی گرام دن میں ۲ بار ۲ سے ۴ دن تک ضرورت کے مطابق مقدار خوراک رفتہ رفتہ ۵۰ ملی گرام تک دے سکتے ہیں۔

منفی افعال: وجع المفاصل کے سبب ہونے والے قلبی عوارض، پھیپھڑوں کی شریانیں میں رکاوٹ، دتی اثرات اور الرجک مریضوں میں اس دوا کا استعمال مضر ہے۔

مضر اثرات: درد سر، خفقان، بھوک کم، متلی تے چکر آنا، پسینہ کی کثرت، ناک بند جلد سرخ آنسو کی کثرت آنکھیں دکھنا، جلد سن ورم تہج Odema، بخار، الرجی غذائی نالی میں جریان خون اور انیمیا ہو سکتا ہے۔

احتیاط: حمل میں خون کے غیر طبعی ہونے میں احتیاط برتنا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

### CORBETAZINE

(SARABHAI)

کاربی نازائن

Hydrallazine 25mg, propranolol hcl 40mg: tabs: 10: Rs.11.27

### TRIPRES

(ASTRA-IDL)

ٹرائی پرس

Metoprolol 100mg Hydrochlorthiazide 12.5mg Hydrallazine 25mg tabs 10: Rs.21.10

## ISOXSUPRINE HCL آکسوکس سپرائن ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: دماغ اور اعضاء جوارح کی ساختوں اور سیل میں خون کی رسد میں اضافہ کرتی اور آکسیجن کی زائد مقدار پہنچانے میں مدد دیتی ہے۔ دماغی شریانیں کی تنگی اور سختی کو دور کرتی ہے آنکھوں میں تناؤ برگرڈیزیز، رائی ناڈویزیز، قبل از ولادت وجع کاذب اور اسقاط مندرہ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: دماغ میں خون کی کمی میں خوردنی طور سے ۲۰ ملی گرام دن میں ۳ یا ۴ بار کھانے کے



بعد حالت بہتر ہونے پر مقدار آہستہ آہستہ کم کر کے ۱۰ ملی گرام دن میں ۲ بار دیں۔ انجکشن پہلی خوراک ۱۰ ملی گرام عضلاتی لگائیں حالت بہتر ہونے پر خوردنی دوا پر رکھیں وریڈی انجکشن سخت نگرانی میں ۰.۳ ملی گرام / فی منٹ کے حساب سے نارمل سیلائن میں ملا کر دیا جائے، شدید ضرورت پر ۶۰ سے ۸۰ ملی گرام تک خوردنی یا عضلاتی دے سکتے ہیں۔

منفی عمل امراض میں: جریان خون کی حالت میں استعمال کرنا سخت نقصان دہ ہے۔  
مضر اثرات: بلند پریشر کم کرتی ہے۔

## تجارتی مرکبات

<b>DUVADILAN</b>	(DUPHAR) 10mg tabs: 50: Rs. 15.87	ڈواڈی لان
<b>DUVADILAN INJ</b>	(DUPHAR)	ڈواڈی لان انجکشن
5mg/ml inj: 6x2 ml amps :	Rs. 12.95	
<b>DUVADILAN RETARD</b>	(DUPHAR)	ڈواڈی لان ریٹارڈ
40mg caps 10:	Rs. 19.67	
<b>SUPROX</b>	(SWIFT) 10mg, 15x10: Rs. 82.50	سپروکس
<b>SUPROX-SR</b>	(SWIFT) 10 tabs: Rs. 22.00	سپروکس ایس آر
<b>SUPROX INJ</b>	(SWIFT) 5x2ml amp: Rs. 10.00	سپروکس انجکشن
<b>UDILAN</b>	(TROIKAA) 10: Rs. 6.00	یوڈی لان مبلٹ
<b>UDILAN INJ</b>	(TROIKAA) 5x2 ml amp: Rs. 13.00	یوڈی لان انجکشن

## MINOXIDIL

## مناکسی ڈل

افعال و منافع: یہ عروق کو کشادہ کرنے والی دوا ہے۔ زیر جلد بالوں کے غدد کو متحرک کر کے نئے بالوں کی پیدائش کرتی ہے۔ سھ گنج سر میں داغ پڑنا، بال گرنے میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۱۳.۰ ملی لٹر مقام ماؤف پر ۷-۸ بار پورے حصہ پر اسپرے کی جائے ۱۲ گھنٹہ بعد دوبارہ کی جائے۔

مضر اثرات: کبھی خراش، سرخی، کھجلی اور الرجی پیدا ہو سکتی ہے۔

احتیاط: دوا اسپرے کرنے سے قبل متاثرہ مقام کو چکنائی روغنی اجزاء سے صاف اور خشک کر لینا چاہیے۔



## تجارتی مرکبات

GROMANE	(ALIDAC)	50ml: Rs.150.00	گرومین
HAIREX	(KOPRAN)	60ml: Rs.201.25	ہیریکس
HEBALD	(INTAS)	10ml: Rs.42.00	بی بالڈ
MINTOP	(STANGEN)	60ml: Rs.138.15	مین ٹاپ
MULTIGAIN	(TORRENT)	60ml: Rs.163.25	ملٹی گین

## NYLIDRIN

## نائی ڈرین

افعال و منافع: عروق اور ساختوں میں خون کا جمنا، خون رکنے کے سبب درد ورم، شرائین میں سختی خون کی رکاوٹ سے ہونے والے زخم، پیروں میں تشنج Leg Cramps پیروں کے سرد ہونے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: دوا کے ساتھ لٹریچر کے مطابق دیں۔

منفی افعال: پیچھے پیروں کی عروق میں شدید رکاوٹ شدید ورم میں دینا مضر ہے۔

احتیاط: غدہ درقیہ کا بڑھنا، شدید وجع القلب، رک رک کر ہونے والے دل کے درد میں احتیاط برتنا لازم ہے۔

## تجارتی مرکب

ARLIDIN TABS/INJ

ارلی ڈین ٹبلٹ / انجکشن (USV) 5ml : Rs.5.18

## PENTOXI FYLINE

## پن ٹوکسی فائی لین

افعال و منافع: شرائین کی سختی، قلب میں خون کی رسد کم پہونچنا دوران خون میں رکاوٹ ذیابیطس پیروں کے زخم غانغراٹا Gangrane آنکھ میں خون کی رسد کم پہونچنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۴۰۰ ملی گرام دن میں ۲-۳ بار کھانے کے بعد۔

منفی افعال: الرجک مریضوں میں، قلبی تناؤ، شدید جریان خون، آنکھ میں خون اترنا اور حمل میں اس کا استعمال خطرناک ہے۔



مضر اثرات: ہضم کی خرابیاں، چکر آنا، چہرہ سرخ، متلی ابکائی، درد سر، وغیرہ ہو سکتا ہے۔  
احتیاط: لو بلڈ پریشر میں، گردوں کی خرابی اور عروق نشہ کی رکاوٹ میں احتیاط برتیں۔  
دواؤں کے ساتھ رد عمل: مانع انجماد خون ادویہ، دافع ذیابیطس، دافع بلڈ پریشر اور نائٹریٹ کے مرکبات کے ساتھ استعمال مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

ERYTAL-TR	(RECON)	10: Rs. 58.00	ارائی ٹال ٹی آر
FLEXITAL	(SUNPHARMA)	10: Rs. 58.86	فلے کسی ٹال
FLEXITAL INJ FOR INFUSION	(SUNPHARMA)	15ml amps: Rs. 11.09	فلے کسی ٹال انجکشن بوتل والا
FLOWPENT INFUSION	(BOOTS)	15ml amp: Rs. 14.40	فلو پینٹ انفیوزن
FLOWPENT	(BOOTS)	tabs: 10mg: 10: Rs. 59.84	فلو پینٹ
KINETAL-400	(PROTEC)	10: Rs. 58.00	کائی ٹی ٹال ۴۰۰
KINETAL - INJ	(PROTEC)	15ml: Rs. 14.17	کائی ٹی ٹال انجکشن
PENTOFYL	(PACE)	10: Rs. 5.90	پن ٹو فائل
RBFLEX	(TIDE)	10 tabs Rs. 53.30	آر بی فلیکس
RBFLEX INJ	(TIDE)	15ml: Rs. 11.90	آر بی فلیکس انجکشن
TRENTAL-400	(HOECHST)	10: Rs. 59.84	ٹرین ٹال ۴۰۰
TRENTAL INFUSION	(HOECHST)	15ml: Rs. 14.40	ٹرین ٹال انفیوزن

## زن تھی نول نیکوٹینیٹ XANTHINOL NICOTINATE

افعال و منافع: یہ دوا جسم کی عروق شعریہ تک خون و آکسیجن پہنچانے، فاضل اور خراب مادوں کو خارج کرنے میں معاون ہے۔ دماغ میں خون کی سپلائی میں اضافہ کرتی ہے شریانیں کی سختی اور رکاوٹ کو دور کرتی ہے۔ ذیابیطسی غافلرانا، خون کی رکاوٹ سے پیدا ہونے والی تکالیف میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۳۰۰ ملی گرام عضلاتی یا وریدی بہت آہستہ آہستہ لگائیں زیادہ سے زیادہ ۹۰۰ ملی گرام یا خوردنی طور سے ۳۰۰ سے ۶۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار۔

منفی افعال: شدید قلبی دباؤ، وجع القلب، شدید جریان خون، قلب کے فعل کی خرابی میں دینا



خطرناک ہے۔

مضر اثرات: چہرہ سرخ چہرے اور گردن میں گرمی کی لہریں محسوس ہونا جو ۲۰-۱۰ منٹ میں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔

احتیاط: ہائی بلڈ پریشر اور زخم معده میں احتیاط برتیں ذیابیطس کے مریضوں میں شوگر چیک کراتے رہیں۔

## تجارتی مرکبات

**COMPLAMINA (GERMAN REMEDIES) 1x2ml: Rs.2.85**

کمپلاینا انجکشن

**COMPLAMINA TABS (GERMAN REMEDIES)**

کمپلاینا ٹبلیٹ

150mg: tabs 10: Rs.3.45

**COMPLAMINA RETARD (GERMAN REMEDIES)**

کمپلاینا ریٹارڈ

500mg: tabs: 10: Rs.13.10

## SULPHIN PYRAZONE

## سلفن پائرازون

افعال و منافع: یہ دوا جوڑوں میں خرابی، افعال میں کمی کو درست کرتی ہے۔ پرانے نقرسی تھجڑ المفاصل شدید نقرس میں مفید ہے۔ رگوں میں خون جمنے، دماغی چوٹ قلبی دباؤ، وریڈوں میں خون جمنے، رکاوٹ اور ہارٹ فیل ہونے کو روکنے میں مدد دیتی ہے۔

مقدار و ترکیب: خون جمنے Clot کی حالت میں ۶۰۰ سے ۸۰۰ ملی گرام روزانہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے نقرس میں ۲۰۰ سے ۴۰۰ ملی گرام ۲ خوراکیوں میں تقسیم کر کے پھر ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار منفی افعال: زخم معده میں اور سیلی سیلیٹ کے مرکبات کے ساتھ اس کا استعمال مناسب نہیں۔

مضر اثرات: نظام ہضم میں خلل، زخم معده کا دوبارہ ہونا، ری ایکشن، پانی اور نمکیات کی کمی، خون کا غیر طبعی اور انیمیا ہو سکتا ہے۔

احتیاط: زخم معده کے مریضوں میں احتیاط برتیں، علاج کے دوران مریض کی نگرانی اور خون کی جانچ کراتے رہیں۔



## TISSUE PLASMINOGEN ACTIVATOR

ٹشو پلازمی نو جن ایکٹی ویٹر

افعال و منافع: یہ انجکشن پھیپھڑوں کی شرائین میں خون جمنے Thrombosis میں مفید ہے، اچانک شدید وجع القلب (ہارٹ ایٹک) دل کے فیل ہونے مایو کارڈیل انفارکشن میں خطرے کے وقت استعمال کیا جاتا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰۰ ملی گرام بوتل میں ڈال کر آہستہ آہستہ ۳ گھنٹہ میں چڑھائیں۔  
منفی افعال: جریان میں، لو بلڈ پریشر میں، سرکی چوٹ دماغی عروق کے شق ہونے میں جگر کے امراض، ورم بانقراس، ورم غلاف القلب جراثیمی، اور معدہ کے زخم میں اس کا استعمال خطرناک ہے۔  
مضر اثرات: جریان خون کا خطرہ، متلی قے ابکائی، جلد پرداغ پتی اچھلنا، کھجلی محسوس ہوتی ہے۔  
احتیاط: آپریشن کے بعد چند روز تک، ذیابیطیس، جگر اور گردوں کی خرابی میں، حمل اور ایام رضاعت میں، اور عضلاتی انجکشن لگانے میں احتیاط برتیں۔

### تجارتی مرکب

ACTILYSE

(GERMAN REMEDIES)

اکٹی لائس

50 mg inj vial: Rs.17,745.13

مضیق عروق اور دافع درد شقیقہ ادویہ

**VASO PRESSOR ANTI MIGRAION**

ڈائی ہائیڈرو ارگوٹامین می سائی لیٹ

**DIHYDRO ERGOTAMINE MESYLATE**

افعال و منافع: آدھاسیسی Migrain کے درد میں مفید ہے یہ عضلات، عظام اور عروق کے تشنج اور درد میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۳ سے ۱۰ ملی گرام کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔



منفی افعال: امراض قلب و ریہ میں۔ ہائی بلڈ پریشر ہارٹ اٹیک، انفکشن، صدمہ جگر اور گردوں کے امراض میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: متلی تے، سن (خدر) اور وجع القلب پیدا کر سکتی ہے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: بیٹا بلا کر دوائیں، اور ارائی تھرومائی سین کے مرکبات کے۔ یا تھ دینا نقصان دہ ہے۔

## تجارتی مرکبات

DHE (INGA) 1mg: tabs: 10: Rs.8.35 ڈی ایچ ای  
DIHYDERGOT (SANDOZ) 1mg tabs 10: Rs.33.65 ڈائی ہائیڈرگٹ

## ERGOTAMINE TARTRATE ارگوٹامین ٹارٹریٹ

افعال و منافع: عروق کو سکڑ کر تنگ کرنے والی دوا ہے، درد شقیقہ سر کو جکڑنے والا درد سن یاس میں گرمی کی لہریں نکلنا تاؤ اور بے چینی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱ سے ۲ ملی گرام درد کے شروع میں آدھ گھنٹہ بعد اگر ضرورت ہو تو اسی گرام اور دی جائے ایک دن میں ۳ ملی گرام سے زیادہ نہیں دینا چاہیے۔

منفی افعال: ہائی بلڈ پریشر میں حمل کی حالت میں دینا خطرناک ہے۔

احتیاط: اینیسیا، غدہ درقیہ کا بڑھنا، دوا کے دوران ڈرائیوری کرنا مشین چلانا خطرناک ہے۔

## تجارتی مرکبات

ERGOPHEN (INGA) IP. 20mg: 10: tabs Rs.2.19 ارگوفین  
MIGRANIL (INGA) 10: Rs.12.95 مکرائل

## FLUNARIZINE

## فلوناریزائن

افعال و منافع: آدھایی شقیقہ Migrain کے درد میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰ ملی گرام دن میں ۱ بار ۵ دن تک پھر ۱۰ گرام دی جائے۔ ۲۰ کیلو گرام سے کم وزن والوں کو ۵ ملی گرام دی جائے۔



منفی افعال: پارکن سفر ڈیزیز میں دینا نقصان دہ ہے۔  
 مضر اثرات: نشہ کرتی ہے، جلد پر دھبے، درد سر، فم معدہ پر درد، متلی خیندہ آنا، خشکی وزن میں اضافہ۔

احتیاط: حمل اور ایام رضاعت میں دینا مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

FLUNARIN  
 NOMIGRAIN  
 SIBELIUM

(FDC) 10: Rs.22.20  
 (TORRENT) 10mg: 10: Rs.20.90  
 (ETHNOR) 10 tabs Rs.39.70

فلونارین  
 نومی گرین  
 سائی بی لیم

## MEPHENTERMINE

سے فن ثرمان

افعال و منافع: یہ لو بلڈ پریشر میں مفید ہے۔ قلب کو تحریک پہونچاتی ہے ڈپریشن کو دور کرتی ہے۔  
 مقدار و ترکیب: لو بلڈ پریشر میں ۲۰ ملی گرام دن میں ۲ یا ۳ بار دی جائے۔ ڈپریشن میں ۱۰ ملی گرام دن میں ۱ سے ۲ بار دی جائے۔

احتیاط: شام ۴ بجے کے بعد دوا نہ دیں۔ نیند کی حالت میں نہ جگائیں۔

## تجارتی مرکبات

MEPHENTINE

(WYETH)

سے فن ٹین

Mephentermine sulph 10mg tabs 20: Rs.26.50

MEPHENTINE INJ (WYETH) 10ml vial: Rs.53.50

سے فن ٹین انجکشن

## PHOLEDRINE

فولی ڈرین سلفیٹ

افعال و منافع: یہ لو بلڈ پریشر، آپریشن کے وقت بیہوشی طاری کرتے وقت تنفس کے رکنے شدید انفکشن، دواؤں کے استعمال کے دوران اچانک بلڈ پریشر کم ہو جانے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: اچانک دوران خون رکنے کو لپس (صدمہ) طاری ہونے میں عضلاتی یا زیر جلد ۲۰ ملی گرام لگائیں ضرورت پر دوبارہ لگائیں۔ وریدی طور سے ۱۰ سے ۲۰ ملی گرام بوتل میں ڈال کر آہستہ



آہستہ آہستہ سے ۲ گھنٹہ میں چڑھائیں۔

## تجارتی مرکب

VERITOL AMPOULES/LIQUID (BOEHRINGER)

ویری ٹول انجکشن

سن اور بیہوش کرنے والی ادویہ

**ANAESTHETIC**

بوپی واکین ہائیڈروکلورائیڈ **BUPIVACAINE HCL**

افعال و منافع: یہ عصبی ریشوں کے گرد حصار بنا کر اعصاب کو بے حس کر دیتی ہے نخاع سے نکلنے والے عصبی ریشوں کو سن کرنے، آپریشن کے درمیان خون کم خارج ہونے۔ ذیابیطیسی موٹاپا یا زیادہ موٹے افراد کے آپریشن میں مفید رہتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ سے ۲۰ ملی گرام ریڈھ کے مہروں کے درمیان بہت آہستہ آہستہ لگائیں۔  
متقی افعال: شدید جریان خون میں، قلبی صدمہ میں، بے ہوشی میں تسمم الدم Septicemia میں  
عنا اور متعدی امراض میں، پولیو، انیمیا، استرخاء آتشک، پشت کے درد، تحجر المفاصل، ریڈھ کی بد وضعی، نخاع کی ٹی بی، جوشیلے اور ضدی مریضوں کو استعمال نہیں کرانا چاہیے۔

مضر اثرات: زیادہ مقدار دینے سے ڈپریشن، چڑچڑاپن، بد مزاجی چکر، دھندلا پن، ہاتھ پیر کپکپانا، خشکی، دورہ پڑنا، سینہ میں تنگی، لوبلڈ پریشر، الرجی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: وریڈی استعمال نہ کریں، حمل وضع حمل کے دوران، ہائی اور لوبلڈ پریشر میں نہیں دینا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

**ANAWIN INJ**

(NEON) 5x5ml amp. Rs.34.50

اناون انجکشن

**SENSORCAINE**

(ASTRA-IDL) 20ml vial: Rs.19.44

سین سورکین

**SENSORCAINE HEAVY 0.5%**

(ASTRA-IDL)

سین سورکین ہیوی

5x4ml ampoule: Rs.29.90



SENSORCANE SPINAL

(ASTRA-IDL)

سین سورکین اسپائنل

5x4ml amps: Rs.27.90

SENSORCANE WITH ADRENALINE (ASTRA-IDL) سین سورکین وڈائیڈرینالین

LIGNOCAIN HCL

لگنوکین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: مقامی تخدیر (سن کرنے کے لئے) زیادہ موثر اور طاقت ور دوا ہے۔ غشاء مخاطی کے اندر نفوذ کر جاتی ہے دانت نکالنے، وضع حمل کے دوران نخاعی تخدیر کے ذریعہ، آپریشن سے ولادت کرانے بچھو کاٹنے، غدہ قدامیہ کے آپریشن، رحم کی صفائی، چھوٹے آپریشن جہاں مقامی تخدیر کی ضرورت ہو، نخاعی تخدیر سے زیریں شکم کے آپریشن کے لئے مستعمل ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرم نخاعی انجکشن کے ذریعہ لگائیں۔ مقامی سن کرنے کے لئے ضرورت کے مطابق لگائیں۔

منفی افعال: شدید صدمہ، قلبی عصبی امراض میں، ریڑھ کی بد وضعی میں تسمم الدم Septicemia میں شدید ہائی اور لو بلڈ پریشر میں خون کی شدید کمی Anaemia اور پشت کے درد میں اس کا استعمال مناسب نہیں۔

مضر اثرات: کبھی کبھی الرجی ہو جاتی ہے۔

احتیاط: جگر اور گردوں کی خرابی اور مرگی میں احتیاط رکھیں۔

تجارتی مرکبات

GESICAIN 2% JELLY (S.G. PHARMA) 30ml: Rs.9.03

گیسی کین جلی

GESICAIN SOLUTION (S.G. PHARMA) 2% vial: Rs.7.28

گیسی کین سلوشن

GESICAIN 2% SOL WITH ADRENALINE (S.G. PHARMA)

30ml vial: Rs.9.23

گیسی کین ۲٪ سلوشن وڈائیڈرینالین

GESICAIN 4% TOPICAL (S.G. PHARMA) 30ml: Rs.11.17

گیسی کین ٹوشن

GESICAIN OINT (S.G. PHARMA) 35g: Rs.7.64

گیسی کین مرہم

LIGNOCAINE HCL INJ (PREM PHARMA)

لگنوکین انجکشن

30ml vial: Rs.8.00



**LIGNOCAINE WITH ADRENALINE (PREM PHARMA)**

30ml vial: Rs.8.00

**LOX 2% INJ**

(NEON) 30ml vial: Rs.8.40

**XYLOCAINE**

(ASTRA-IDL) 30ml: Rs.7.95

**XYLOCAINE 2% WITH ADRENALINE (ASTRA-IDL)**

30ml: Rs.8.21

**XYLOCAINE 5% HEAVY (ASTRA-IDL)**

25x2ml: Rs.48.91

**XYLOCAINE JELLY (ASTRA-IDL) 30g: Rs.10.65****XYLOCAINE OINTMENT (ASTRA-IDL) 35gm: Rs.14.13****XYLOCAINE TOPICAL (ASTRA-IDL)**

Lignocaine hcl 4% 30ml: Rs.6.83

**XYLOCAINE VISCOUS (ASTRA-IDL)**

Lignocaine hcl 2% 100ml: Rs.8.92

لگنوکیئن انجکشن

لاکس انجکشن

زاٹلوکیئن

زاٹلوکیئن وڈائیڈرینالین

زاٹلوکیئن ہیوی

زاٹلوکیئن جیلی

زاٹلوکیئن مرہم

زاٹلوکیئن لوشن

زاٹلوکیئن اسپرے

سو نگھا کر بے ہوش کرنے والی ادویہ

**INHALATION****ENFLURANE**

ان فلورین

افعال و منافع: اس کا اثر بہت جلد اور دیرپا ہوتا ہے۔ ہر طرح کے آپریشن اور ہر عمر والوں کو استعمال کرائی جاسکتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۴ فیصدی لوشن آکسیجن یا آکسیجن نائٹر آکسائیڈ کے ہمراہ سو نگھائی جاتی ہے۔

منفی افعال: قلبی حرکات بے ترتیبی، دورے کی ہسٹری اور ولادت کے دوران اس کا استعمال مضر ہے۔

مضر اثرات: متلی تے جگر میں خرابی اور ری ایکشن ہو سکتا ہے۔



## ETHER

## ایتر

افعال و منافع: ایمر جنسی کے وقت، آپریشن کے لئے مریض کو بے ہوش کرنا چوٹ لگنا حادثات، وغیرہ کے موقع پر جلد علاج کے لئے اور تکلیف رفع کرنے کے لئے اس کو سونگھا کر بے ہوش کیا جاتا ہے۔

## FLUOTHANE HALOTHANE فلو تھین ہالو تھین

افعال و منافع: یہ ایک فراری نشہ آور دوا ہے۔ بیہوش کرنے کے لئے مستعمل ہے ہر عمر اور ہر طرح کے آپریشن کے لئے عمدہ چیز ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲ سے ۴ فیصدی لوشن آکسیجن یا آکسیجن / نائٹروس آکسائیڈ کے ساتھ مخصوص آلے سے سونگھائی جاتی ہے۔

منفی افعال: جگر کے امراض اور ابتدائی ایام حمل میں مضر ہے۔

مضر اثرات: متلی، تے، لو بلڈ پریشر، نبض ضعیف اور سانس رک رک کر آتی ہے۔

احتیاط: دوا کی بوتل کو اچھی طرح بند کر کے روشنی سے بچا کر رکھی جائے کبھی اس کے استعمال سے بلڈ پریشر اچانک کم ہو جاتا ہے اس کے لئے ایڈرنالین تیار رکھیں۔

## تجارتی مرکب

FLUOTHANE

(ICI) 250ml: Rs.1440.00

فلو تھین

## ISOFLURANE

## آئی سوفلورین

افعال و منافع: بے ہوشی طاری کرنے والی دواؤں کے ساتھ اس کے استعمال سے بیہوشی جلد طاری ہو جاتی ہے۔

ہر قسم کے آپریشن کرنے کے لئے مستعمل ہے۔

مقدار و ترکیب: ۳ فیصدی آکسیجن کے ساتھ استعمال کرائی جاتی ہے۔

منفی افعال: رحم سے جریان خون روکنے والی دواؤں کے ساتھ اس کا استعمال مناسب نہیں ہے۔



مضر اثرات: نظام تنفس پر دباؤ، لو بلڈ پریشر، رحم کو ڈھیلا مسترخی کرتا ہے متلی قے آسکتی ہے۔  
احتیاط: ولادت کے دوران اس کا استعمال جائز نہیں۔

## NITROUS OXIDE

## نائٹرس آکسائیڈ

افعال و منافع: عام بیہوشی کے لئے مستعمل ہے، دانتوں کی سرجری، بڑے آپریشن سرجری کے لئے بیہوش کرنے کے لئے مستعمل ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰ سے ۸۰ فیصدی

مضر اثرات: آکسیجن کی کمی، متلی ابکائی، لیوکوسائیٹ اور مخ العظام غیر طبعی ہونا۔

نیند اور بیہوشی طاری کرنے والے انجکشن

## INTRAVENOUS HYPNOTICS

## DIAZEPALM

## ڈایازپام

افعال و منافع: دماغ میں جلد نفوذ کر جانے کے سبب پورے جسم کے افعال کو معطل کر کے بیہوشی طاری کر دیتی ہے۔ اس سے گہری نیند آتی ہے۔ عضلات مسترخی ہو جاتے ہیں ۲ سے ۴ گھنٹہ تک مریض گہری نیند میں رہتا ہے، چھوٹے آپریشن، انڈواسکوپ، دورے پڑنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵ سے ۱۰ ملی گرام عضلاتی یا وریدی، آپریشن سے آدھ گھنٹہ قبل۔

مضر اثرات: خشکی، حرکات غیر ارادی، قبض ڈپریشن، بصارت میں فرق، ہچک، لو بلڈ پریشر، پیشاب رکنا، جلد پر داغ پڑنا، کبھی یہ قان ہونا۔

احتیاط: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں وریدی انجکشن آہستہ لگائیں امنٹ میں ملی لٹر دوسری دواؤں کے ساتھ نہ دیں۔

تجارتی مرکبات کی فہرست منوم اور مخدر ادویہ کے تحت دیکھئے۔



## KETAMINE

### کشیامین

افعال و منافع: یہ فوری اثر کرنے والی بیہوشی کی دوا ہے یہ عضلاتی اور وریدی راہ سے دی جاتی ہے۔ یہ دماغی نظام پر اثر انداز نہیں ہوتی اس لئے لو بلڈ پریشر حادثات اور صدمات میں بھی استعمال کرائی جاسکتی ہے۔ مختصر مدت کی بیہوشی کے لئے معمولی اور درمیانی آپریشن سے قبل استعمال کرائی جاتی ہے دوروں کی حالت میں شرابیوں کے چکر، اور بکواس کے لئے بچوں اور بوڑھوں کے لئے براہ مقعد بھی دی جاتی ہے۔ مقدار و ترکیب: وریدی ۱ ملی گرام / فی کلو گرام سے ۲۵، ۴ ملی گرام / کلو گرام تک دے سکتے ہیں عضلاتی ۶.۵ سے ۱۳ ملی گرام / فی کلو گرام تک لگا سکتے ہیں۔

منفی افعال: دماغی چوٹ، ایکسڈنٹ اور حساس مریضوں میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: قلب کی حرکات میں تیزی نبض سریع و متواتر سانس تیز چلنا، سانس میں تکلیف۔ قلبی حرکات بے ترتیب، خجرہ میں تشنج، تیز وریدی انجکشن لگانے یا ڈرپ دینے سے تنفس ست بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، بھوک کی کمی متلی قے انجکشن کی جگہ درد ہوتا ہے۔

احتیاط: سانس ست ہونے پر مصنوعی تنفس سے احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: اور باربیٹون کے مرکبات ساتھ استعمال نہ کریں۔

### تجارتی مرکبات

ANEKET INJ 50/10	(NEON) 10x2 ml amps: Rs.230.00	انجیکشن
KETALAR	(PARKE-DAVIS) 10ml: Rs.89.50	کیٹالار
KETAMAX	(TROIKAA) 5x2ml amps: s.109.00	کشیامیکس
KETMIN	(THEMISCHEMICALS) 2ml vial:Rs.22.90	کیٹ من

## PANTATHAL SODIUM

### پنٹاتھال سوڈیم

## THIO PANTONE SODIUM

### تھیوپن ٹون سوڈیم

افعال و منافع: وریدی طور سے معمولی اور درمیانی آپریشن کے لئے مختصر مدت میں بیہوشی طاری کرنے کے لئے یہ دوا استعمال کی جاتی ہے اس سے عضلات مسترخ نہیں ہوتے شدید دورں شرابی کا



جنوں بوڑھوں اور بچوں کے لئے براہ مقعد بھی استعمال کر سکتے ہیں۔  
 مقدار و ترکیب: ۵ء۲ سے ۵ فیصدی تازہ سیوشن استعمال کرنا چاہیے۔  
 منفی عمل: شدید امراض قلب، لو بلڈ پریشر اور ایڈین ڈیزیز میں استعمال نہ کریں۔  
 مضر اثرات: نظام تنفس پر دباؤ، وریڈوں میں انجماد خون، سانس رک کر آنا ہوائی نالی میں تشنج  
 پھیپھڑوں کی عروق میں تشنج، تھوک زیادہ آنا، ہچکی چکر آنا، درد سر، جلد پر داغ متلی ابکائی، الرجی۔  
 احتیاط: لو بلڈ پریشر میں تنفس پر دباؤ اور سانس رکنے میں احتیاط رکھیں۔

## تجارتی مرکبات

ANESTHAL	(JAGSONPAL) 1g: Rs.40.69	اے نس تھال
INTRAVALSODIUM	(RHONEPOULENC)	انٹرا وال سوڈیم
THIOSOL INJ	(NEON) 1gm vial: Rs.45.20	تھیوسول
1g: 50amps: Rs.2083.81		

## PROPOFOL

## پروپوفول

افعال و منافع: یہ منوم اور مسکن دوا ہے اس کا اثر وقتی ہوتا ہے۔ کمزور اور صاحب فراش مریضوں کو سکون سے رکھنے اور معمولی آپریشن کے لئے مستعمل ہے۔  
 مقدار و خوراک: ۲ ملی گرام / کلو گرام کے حساب سے وریڈی استعمال کیا جاتا ہے۔  
 منفی افعال: نظام تنفس کی کمزوری، دماغ میں خون کی رسد میں کمی، میں اس کا استعمال مضر ہے۔  
 مضر اثرات: متلی قے درد سر ہو سکتا ہے۔  
 احتیاط: دیگر بیہوشی طاری کرنے والی دواؤں اور افیون کے مرکبات کے ساتھ اس کا استعمال مناسب

# sobride®

DIAZEPAM TABLETS & INJECTABLES

### INDICATIONS

- For relief of tension & anxiety alone or when associated with agitation & situational stress.
- All varieties of neurosis.
- An aid to control agitation, tremor, hallucinations, in delirium tremens.
- Concurrently with other drugs or treatments in depression & psychosis.
- Toxaemia of pregnancy, to shorten labour, in threatened abortions, antepartum & postpartum haemorrhage.
- Status epilepticus or severe recurrent convulsive seizures.
- As a muscle relaxant in tetanus, in spastic muscular dystonia.



نہیں

سوبرائیڈ



**ANTI ALLERGIC****دافع الرجی****ANTI HISTAMINE****دافع حساسیت ادویہ****ASTIMIZOLE****ایس ٹی می زول**

افعال و منافع: ایک اہم دافع حساسیت دوا ہے۔ نظام عصبی کو خراب نہیں کرتی دماغ پر کوئی برا اثر نہیں ڈالتی۔ جلد پر چکتے پڑنا Oedema ناک بہنا، الرجی کے سبب آنکھ دکھنا دمہ کھجلی وغیرہ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ ملی گرام یومیہ شدید ضرورت پر ۳۰ ملی گرام تک دے سکتے ہیں بچوں کو عمر کے مطابق دوا کھانے سے آگھنٹہ قبل یا ۲ گھنٹہ بعد دی جائے۔

منفی افعال: C/1 حاملہ عورتوں، بوڑھوں اور جگر کے امراض میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: زیادہ عرصہ استعمال سے وزن میں اضافہ، منہ خشک، درد شکم اسہال نفخ شکم جلد پر داغ پڑنا۔

### تجارتی مرکبات

ACEMIZ	(LUPIN) 10: Rs.10.81	ایسی مز
ACEMIZ SUSP	(LUPIN) 60ml: Rs.10.70	ایسی مز سرپ
ALERZOLE	(THEMIS PHARMA) 10: Tabs: Rs.13.71	الرزول
ALERZOLE SUSP	(THEMIS PHARMA) 60ml: Rs.15.50	الرزول سرپ
ALESTOL	(INDOCO) 10: Rs.12.00	اے لسٹول
ASTELONG	(TORRENT) 10: Rs.17.90	ایسٹی لانگ
ASTELONG SUSP	(TORRENT) 60ml: Rs.23.90	ایسٹی لانگ سرپ
ASTEM	(MEDLEY) 10: Rs.14.50	ایس ٹیم
HISTALONG	(STANGEN) 10: Rs.15.47	ہسٹالانگ
HISTEESE. TAB,SUSP		ہس ٹیز ٹبلٹ، سرپ
HZAX TABS	(KANPHA) 10: Rs.13.01	ہی زاکس
PERIONE	(MERIND) 10: Rs.16.00	پری یون



STEMIZ

(CADILA) 10:Rs.17.10

اٹے مز

STEMIZ SUSP

(CADILA) 50ml: Rs.12.56

اٹے مز سرپ

**AZATADINE MELEATE**

ازاٹاڈین میلی ایٹ

افعال و منافع: مزمن نزلہ زکام ناک بہنا، امراض جلد، پتی اچھلنا، (ارٹی کیریا) جلد پر چکے پڑنا جلد کا ورم Odema، الرجک ایگزیم، کیڑے مکوڑوں کا کاٹنا، مقعد اور رحم کی کھجلی، دوؤں اور سیرم کاری ایکشن۔

مقدار و ترکیب: اٹلی گرام دن میں ۲ بار بچوں کو ۰.۲۵ سے ۰.۵ ملی گرام۔

منفی اثرات: نومولود کمزور اور دوا سے حساس مریضوں کو نہیں دینا چاہیے۔

احتیاط: گلوکوما۔ آنکھوں میں دباؤ، زخم معدہ، فم معدہ کا تسد، امراض قلب ہائی بلڈ پریشر عظم غدہ در قیہ میں اور دماغی کاموں کے دوران احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، باربی ٹون، دافع انجماد خون اور نظام عصبی کو متاثر کرنے والی ادویہ۔

**تجارتی مرکبات**

ZADINE

(FULFORD)

زاڈین ٹبلٹ سرپ

10: Rs.23.50; 50ml syrup Rs.12.60

**CETRIZINE HCL**

سائٹری زین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: موسمی خرابی، مزاج کی خرابی غذائی بے احتیاطی سے ہونے والی الرجی، پتی اچھلنا، ناک بہنا، جسم پر دوڑے پڑنا Oedema کھجلی اور بے چینی میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ ملی گرام دن میں ۱ بار ۶ سال سے کم عمر بچوں کو نہ دیں۔

مضر اثرات: خشکی محسوس ہوتی ہے۔ درد سر، چکر آنا، ہاضمہ کی خرابی، بکواس کرنا۔

احتیاط: حالت حمل، ایام رضاعت اور گردوں کے امراض میں احتیاط برتنا چاہیے۔



## تجارتی مرکبات

ALDAY	(SOL PHARMA) 10mg: caps.	ال ڈے
ALERID	(CIPLA) 10 tabs Rs.25.00	الرڈ
ALERID SYRUP	(CIPLA) 30ml: Rs.12.80	الرڈ سرپ
ALLERZINE	(JENBURKT) 10: Rs.12.00	الر زین
CETIHIST	(BDH)	سی ٹی ہسٹ
CETIRIZ	(ALKEM) 10 tabs: Rs.19.90	سی ٹی رز
CETRIZET	(SUN PHARMA) 10: Rs.27.50	سیٹ ری زیٹ
CETZINE	(GLAXO) 10 tabs Rs.27.50	سیٹ زائن
CETZINE SYRUP	(GLAXO)	سیٹ زائن سرپ
CEZIN SYRUP	(DEE PHARMA)	سی زن سرپ
CITRAZAN	(MAC) 10: Rs.24.00	سٹرا زان
EKON- D.T.	(BLUE CROSS) 10: Rs.18.80	ای کون
HISNOFIL	(CROSSLANDS) 10: Rs.15.00	ہس نو فل
HIZTIGO	(GUARDIAN (CROSLANDS) 10: Rs.24.50	ہس ٹائی گو
RHIZIN	(RECON) 5: Rs.25.00	رہائی زن
SIZON	(SYSTOPIC) 10mg: tabs:10:Rs.25.00	سائی زون
SIZON SYRUP	(SYSTOPIC) 50ml:Rs.22.50	سائی زون سرپ
TRIZ	(INDOCO) 10: Rs.14.00	ٹریز
TRIZ SYRUP	(INDOCO) 30ml: Rs.12.50	ٹریز سرپ
XERO-SED	(MAX) 10: Rs.25.00	زیرو سینڈ
ZETOP	(CADILA) 10: Rs.23.10	زی ٹوپ
ZIRLON	(WAVE) 10: Rs.24.50	زیر لون
ZIRTIN	(TORRENT) 10: Rs.24.50	زیر ٹن
ZYNCET	(UNICHEM) 10:Rs.27.50	زائن سیٹ
ZYRTEC	(UNI-UCB) 10 tabs Rs.27.50	زائر ٹیک
ZYRTEC SYRUP	(UNI-UCB) 60 ml: Rs.25.50	زائر ٹیک سرپ

**CHLORPHENIRAMINE MALEATE** کلور فینی رامن مائل ایٹ

افعال و منافع: یہ ایک دریا دافع حساسیت انٹی الرجک دوا ہے ہر قسم کی الرجی ناک بہنا، پتی اچھلنا، ارٹی کیریا، جسم پر چکے پڑنا Oedema، غذائی الرجی دواؤں اور سیرم سے ہونے والی الرجی، رحم اور



مہلی کی کھجلی، کیرے کوڑوں کا کاشنا وغیرہ میں مفید ہے۔  
 مقدار خوراک: ۳ ملی گرام دن میں ۳-۴ بار بچوں کو ۲ ملی گرام۔  
 مضر اثرات: خشکی چکر آنا۔  
 احتیاط: دوا کے دوران استعمال ڈرائیونگ اور مشنری چلانا نہیں چاہیے۔

### تجارتی مرکبات

D-ALER	(LIFE) 10x10 Rs.126.90	ڈی اے لے
HEPASULFOL AA	(FRANCO INDIAN) 25: Rs.30.72	ہیپاسلفول
FLUCOLD	(WALLACE) 10:Rs.8.00	فلو کولڈ
FLURID	(KLAR SEHEN) 10:Rs.5.99	فلورڈ
PIRITON EXPECTORANT	(GLAXO) 460ml: Rs.22.59	پری ٹون کف سرپ
PIRITON TABS	(GLAXO) 500: Rs.16.06	پری ٹان ٹبلیٹ

### CLEMASTIN

### کلی ماسٹین

افعال و منافع: جلد متورم اور سرخ ہونا، ناک بہنا، پتی اچھلنا جلد پر چکے پڑنا Oedema دواؤں کی  
 الرجی وغیرہ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱ ملی گرام دن میں ۲ بار بچوں کو عمر کے مطابق۔

مضر اثرات: خشکی، چکر آنا، منہ خشک، دل دھڑکنا، ہاضمے کی خرابی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: دوا کے استعمال کے بعد ڈرائیوری کرنا، مشنری چلانا نہیں چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، نظام عصبی کو سن کرنے والی ادویہ کے ساتھ اس کا استعمال مضر  
 ہے۔

### تجارتی مرکبات

TAVEGYL	(SANDOZ) 10: Rs.46.00	ٹے وی گل ٹبلیٹ
TAVEGYL SYRUP	(SANDOZ) 60ml: Rs.38.00	ٹے وی گل سرپ
TAVIST	(WANDER) 6: Rs.31.00	ٹے ویسٹ
TAVIST SYRUP	(WANDER) 50ml: Rs.32.67	ٹے ویسٹ سرپ



## CYPRO HEPTADIN

## سائپر وہپٹاڈین

افعال و منافع: ہر طرح کی الرجی کھجلی، جلد کا متورم ہونا، الرجی کے سبب نزلہ زکام درد سر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۴ ملی گرام دن میں ۳ بار بچوں کو نصف خوراک ۲ سال سے کم عمر والوں کو نہیں دینا چاہیے۔

منفی افعال: گلوکوما، جس بول، زخم معدہ، معدہ کا منہ بند ہونے میں ورم غدہ قدامیہ مثانے میں رکاوٹ میں ایام رضاعت اور نو مولود کو دینا خطرناک ہے۔

مضر اثرات: منہ خشک، چکر آنا، نیند نہ آنا اور خشکی محسوس ہوتی ہے۔

احتیاط: پھیپھڑوں کے امراض خصوصاً دمہ میں، دوا کے استعمال کے بعد ڈرائیوری اور مشنری چلانا منع ہے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، نظام عصبی کو کمزور کرنے والی ادویہ کے ساتھ اس کا استعمال مضر ہے

## تجارتی مرکبات

CIPLACTIN	(CIPLA) 100ml: Rs.10.75	سپلا شین سرپ
CIPLACTIN TABS	(CIPLA) 10: Rs.2.77	سپلا شین ٹبلیٹ
CYDINE	(CFL) 200ml: Rs.30.80	سائی ڈین سرپ
CYPROWAL	(WALLACE) Rs.27.55	سائی پرو وال سرپ
PERITOL TABS	(THEMIS CHEMICAL) 10: Rs.7.01	پیری ٹال ٹبلیٹ
PERITOL SYRUP	(THEMIS CHEMICAL) 200ml: Rs.27.83	پیری ٹال سرپ
PRACTIN	(MERIND) 10: Rs.4.70	پراکٹین ٹبلیٹ
PRACTIN SYRUP	(MERIND) 100ml: Rs.11.38	پراکٹین سرپ

The effective answer from an anti-histamine

**COSZIN**   
(Cetirizine)



## ڈیکس کلور فینی رامن میلی ایٹ

### DEXCHLOR PHENIRAMINE MELEATE

افعال و منافع: الرجی کی مختلف حالتوں میں مفید ہے۔ دیگر انٹی الرجک دواؤں کے مقابلے میں مضر اثرات اس میں کم ہیں، موسمی نزلہ، ناک بہنا، آنکھیں دکھنا، پتی اچھلنا جلد پر چکلتے ابھار اور Oedema میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲ ملی گرام دن میں ۳ بار بچوں کو عمر کے مطابق۔

مضر اثرات: متلی تے معمولی خشکی محسوس ہوتی ہے۔

احتیاط: دوا استعمال کرنے کے بعد ڈرائیوری اور مشنری چلانا نہیں چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، انٹی ڈپریشن، باربی ٹون، نظام عصبی کو مفلوج کرنے والی دوائیں دافع انجماد خون خوردنی کا استعمال نقصان دہ ہے۔

### تجارتی مرکبات

POLARAMINE (FULFORD) 2mg 10 tabs Rs. 7.60 پولارامین ٹبلیٹ

POLARAMINE REPEATABS (FULFORD) پولارامین ری پی ٹیب

6mg 10 tabs Rs. 16.00

POLARAMINE PEAD SYRUP (FULFORD) پولارامین بچوں کا سرپ

0.5mg per 5ml syrup 50ml Rs. 16.94

### DIMETHIDINE

### ڈائی می تھی ڈین

افعال و منافع: یہ ایک زبردست دافع الرجی دوا ہے۔ ہر قسم کی الرجی، حساسیت کے لئے مفید ہے پتی اچھلنا، جلد پر دوڑے پڑنا، کھجلی، دواؤں کی الرجی، فرج و مقعد کی کھجلی، موسمی و وبائی نزلہ نزلہ لاوی بخار میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۶ سال سے زائد عمر والوں کو ۱ ملی گرام دن میں ۳ بار۔

منفی افعال: مرگی، جس بول کی تکالیف میں اس کا استعمال ممنوع ہے۔

مضر اثرات: معمولی نشہ محسوس ہوتا، خشکی، دست آنا (اسہال) متلی ابکائی، نیند نہ آنا، بے چینی چکر



آنا۔ درد سر، مٹانے اور آنتوں میں بے چینی محسوس ہونا۔  
احتیاط: دوا کے استعمال کے دوران ڈرائیوری اور مشنری چلانا خطرناک ہے۔

## تجارتی مرکبات

**FORISTAL** (HIND. CIBA GEIGY) 1mg tabs 10: Rs.4.80 فورسٹال  
**FORISTAL LONTABS** (HIND. CIBA GEIGY) 10: Rs.7.50 فورسٹال لان ٹیب

ڈائی فین ہائیڈرامین ہائیڈروکلورائیڈ

**DIPHEN HYDRAMINE HCL**

افعال و منافع: یہ دوا دافع حساسیت اور دافع درد شکم ہے۔ الرجی کی علامات مثلاً جلد پر چکھتے دوڑے پڑنا، ناک بہنا، نزلہ، پتی اچھلنا، الرجک ایگزیم یا معدہ آنتوں میں بے چینی، حیض کا تکلیف سے آنا اور پارکنسنز ڈیزیز میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار علامات میں کمی ہونے پر دن میں صرف ابار دیں۔  
منفی افعال: نومولود بچوں کو دینا منع ہے۔ گلوکوما میں بھی مضر ہے۔

مضر اثرات: خشکی، الجھن، عصبی کمزوری، بے چینی، متلی قے اسہال۔ بصارت میں فرق، کبھی دو تصاویر دکھائی دینا، قبض، ناک بند، خفقان، درد سر نیند نہ آنا، خون کی کمی، معدہ میں بے چینی، منہ خشک، سینہ میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔

احتیاط: حمل، رضاعت کے دوران، ڈرائیوری اور مشنری چلانے سے پہلے اس کا استعمال مضر ہے زیادہ مقدار میں دینے سے دورہ اور موت بھی ہو سکتی ہے۔

## تجارتی مرکبات

**BENADRYL** (PARKE-DAVIS) 50: Rs.12.74 بناڈرل  
**BENADRYL SYRUP** (PARKE-DAVIS) Rs.41.27 بناڈرل سرب  
**DIMIRIL** (CHOGULE HIND) 25mg tabs 30 Rs.11.50 ڈی می ریل ٹیبلیٹ



## ام برامین ہائیڈروکلورائیڈ EMBRAMINE HCL

افعال و منافع: فوری اثر کرنے والی زبردست دافع حساسیت انٹی الرجی دوا ہے پتی اچھلنا جلد کا متورم ہونا Oedema، الرجک ایگزیمیا چھاجن، نزلہ دوی بخار، ناک بہنا اور کھجلی میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۱۲ سال سے زائد عمر کے لئے ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار آرام آنے پر ۲۵ ملی گرام دن میں ابار دینا چاہیے۔

منفی افعال: دوا سے حساس مریضوں کو، نو مولود، بچوں، ایام رضاعت، گلوکوما، مرگی میں دینا مضر ہے۔  
مضر اثرات: خشکی چکر آنا، منہ خشک ہو جاتا ہے۔

احتیاط: دوا کے استعمال کے بعد ڈرائیوری کرنا اور مشنری چلانا خطرناک ہے۔

### تجارتی مرکب

MEBRYL

(SMITHKLINE) 10: Rs.12.45

میرائل

## ہالوپائی رامین ہائیڈروکلورائیڈ HALO PYRAMINE HCL

افعال و منافع: ایک اہم دافع حساسیت دوا ہے، شدید الرجی، آنکھ ناک کان اور جلد پر الرجی کا اثر، شدید نزلہ زکام، نزلہ دوی بخار، ورم غارالانف پتی اچھلنا، دواؤں کی الرجی ایگزیمیا، کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار ۵ سے ۱۰ سال کے بچوں کو صرف ۲۵ ملی گرام یومیہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے انجکشن ۲۰ ملی گرام عضلاتی یا دیریدی بہت آہستہ لگائیں، مرہم ۱ فیصدی دن میں ۳-۴ بار لگائیں۔

منفی افعال: دوا سے حساس مریضوں کو نہ دیں۔

مضر اثرات: خشکی، چکر آنے کی شکایت ہو سکتی ہے۔



## LORATADINE

## لوراناڈین

افعال و منافع: ناک حلق، جلد، آنکھوں پر ہونے والے الرجی کے اثرات میں مفید ہے۔  
 مقدار و ترکیب: ۱۰ ملی گرام یومیہ ایک خوراک میں۔  
 منفی افعال: خمل، ایام رضاعت۔ ۲ سال سے کم عمر بچوں میں دینا نقصان دہ ہے۔  
 مضر اثرات: بے چینی، متلی، درد سر ہو سکتا ہے۔  
 احتیاط: جگر کے امراض، ۱۲ سال سے کم عمر کے بچوں کو استعمال کرنے میں احتیاط برتیں۔

## تجارتی مرکبات

LORFAST  
LORIDINE

(CADILA) 10mg tabs; 10 tabs 36.10  
(HEALTH CARE) 10 tabs 22.20

لورافاسٹ  
لوریڈین

## LOVASTATIN

## لوو اسٹین

افعال و منافع: ہر قسم کی الرجی میں مفید ہے۔  
 مقدار و ترکیب: ۲۰ سے ۴۰ ملی گرام دن میں ۲-۳ بار  
 مضر اثرات: خشکی پیدا کرتی ہے۔  
 احتیاط: دوا استعمال کرنے کے بعد ڈرائیوری کرنا اور مشنری چلانا خطرناک ہے۔

## تجارتی مرکبات

CALCILUVIN (BOEHRINGER) 10 dragees: Rs. 8.66  
 CALCILUVIN SYRUP (BOEHRINGER)  
 100ml: Rs. 17.48

کیلیس لوون ٹبلٹ  
کیلیس لوون سرپ

## میب ہائیڈرالیٹ ناپا ڈی سائی لیٹ

## MEB HYDRALIN NAPA DISYLATE

افعال و منافع: ہر قسم کی الرجی پتی اچھلتا، جلد پر چکے دوورے پڑنا، کھجلی الرجک ایگزیریا، غذاؤں اور  
 دواؤں سے الرجی، ناک بہنا، حساسیتی (آنکھ دکھنا)، کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے وغیرہ میں مفید ہے۔



مقدار و ترکیب: ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار بچوں کو عمر کے مطابق۔

منفی افعال: درم غده قدامیہ، گلوکوما، میں مضر ہے۔

مضر اثرات: خشکی، چکر آنا۔

احتیاط: دوا کے استعمال کے بعد ڈرائیوری کرنا اور مشنری چلانا خطرناک ہے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، نظام عصبی کو کمزور کرنے والی، ادویہ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

### تجارتی مرکبات

INCIDAL TABS

(BAYER) 10: Rs. 5.50

ان سی ڈال

**METHDILAZINE-HCL** میٹڈلازین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: انٹی ہشامین اور دافع حساسیت دوا ہے ہر قسم کی الرجی کو دور کرتی ہے، ناک بہنا، اور

حساسیتی پتی اچھلنا، دواؤں کاری ایکشن کیڑے مکوڑوں کا کاشنا اور کھجلی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۸ ملی گرام دن میں ۲ بار بچوں کو ۴ ملی گرام۔

منفی افعال: مخدر اور مسکن اعصاب ادویہ کے ساتھ اس کا استعمال مناسب نہیں۔

مضر اثرات: خشکی چکر آنا۔

احتیاط: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں۔ دوا استعمال کے بعد ڈرائیوری اور مشنری چلانا منع ہے۔

### تجارتی مرکبات

DILOSYN TABS

(ALENBURYS) 10: Rs. 7.19

ڈلو سائن ٹبلٹ

DILOSYN SYRUP

(ALENBURYS) 120ml: Rs. 17.74

ڈلو سائن سرپ

**PHENIRAMINE MELEATE** فینی رامین میلی ایٹ

افعال و منافع: ہر قسم کی الرجی، نزلہ زکام، ناک بہنا، کیڑے مکوڑوں کا کاشنا پتی اچھلنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵ ملی گرام دن میں ۲ یا ۳ بار بچوں کو عمر کے مطابق انجکشن ۲۲، ۷۵ سے ۲۵ ملی گرام

عضلاتی۔



منفی افعال: ورم غدہ قدامیہ، حمل اور ایام رضاءت میں خراب اثرات رونما ہو سکتے ہیں۔  
مضر اثرات: خشکی کرتی ہے۔

احتیاط: دوا کے استعمال کے دوران ڈرائیوری کرنا اور مشنری چلانا منع ہے۔  
دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، عصبی نظام کو کمزور کرنے والی ادویہ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

### تجارتی مرکبات

AVIL 25/50	(CASSELLA MED) 50mg 10: Rs.2.03	ایول ٹبلٹ ۲۵/۵۰
AVIL INJ	(CASSELLA MED)	ایول انجکشن
2ml: Rs.2.17 ; 10ml vial: Rs.6.21		
AVIL SYRUP	(CASSELLA MED) 100ml: Rs.8.24	ایول سیرپ
PHENAMIN INJ	(P&B LABS) amp. Rs.2.40	فینی رامن انجکشن

### PHENYL EPHRINE HCL

### فینائل ایفرین

افعال و منافع: ناک کی جھلی متورم ہونا ناک بند ہونا، آپریشن کے بعد ناک کی تکالیف میں مفید ہے۔  
مقدار ترکیب: ۱۰ ملی گرام دن میں ۳ بار۔ عموماً یہ دوسری دواؤں کے ساتھ دی جاتی ہے۔  
منفی افعال: جگر گردوں کی خرابی میں، اثرات خراب رونما ہوتے ہیں۔

### تجارتی مرکبات

CINARYL DROPS	(THEMIS PHARMA) 15ml Rs.8.78	سارائل ڈراپس
CINARYL LIQUID	(THEMIS PHARMA) 60ml Rs.10.60	سارائل لکوڈ
CINARYL TABS	(THEMIS PHARMA) 10: Rs.5.34	سارائل ٹبلٹ

### فینائل پروپانولامین ہائیڈروکلورائیڈ

### PHENYL PROPANOLAMINE HCL

افعال و منافع: عروق میں تنگی کے سبب ناک بند ہونا، ناک بہنا، چھینکیں زیادہ آنا، ناک میں کھجلی  
چھین، حلق پر نزلہ کرنا، آنکھوں سے پانی بہنا، نزلہ، ورم غار الانف، انفلوآنزہ میں مفید ہے۔  
مقدار ترکیب: ۵۰ ملی گرام ہر ۱۲ گھنٹہ بعد استعمال کرائیں۔



منفی افعال: C/1 ہائی بلڈ پریشر میں شرائین الریہ کے امراض میں زخم معدہ اور مثانہ کے تسد میں حمل اور ایام رضاعت میں منع ہے۔

مضر اثرات: خشکی، چکر آنا، منہ خشک ہونا۔

احتیاط: گلوکوما، امراض قلب، ہائی بلڈ پریشر، ورم غدہ قدامیہ میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: نظام عصبی کو مفلوج کرنے والی ادویہ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

اے لیکس کف فارمولہ (LYKA) ALEX COUGH FORMULA

50ml: Rs. 19.75

CALMCOLD	(PHARMACIA) 10: Rs. 7.60	کام کولڈ ٹبلٹ
CALMCOLD CAPS	(PHARMACIA) 10: Rs. 14.26	کام کولڈ کپسول
CALMCOLD SUSP	(PHARMACIA) 60ml: Rs. 13.41	کام کولڈ سرپ
CONTAC-CC	(SMITHKLINE) 10: Rs. 9.25	کان ٹیک
CORICIDIN-F	(FULFORD) 10x10: Rs. 42.60	کوری سیڈین
COSOME	(MERCK) 100ml Rs. 25.31	کوسوم
ESKOLD	(SMITHKLINE) 10: Rs. 14.10	ایس کولڈ
ESKOLD EXPECT.	(SMITHKLINE) 60ml: Rs. 14.95	ایس کولڈ سرپ
FEBREX PLUS	(INDOCO) 10.tabs Rs. 8.03	فیبریکس ٹبلٹ
FEBREX PLUS SYRUP	(INDOCO) 60 ml: Rs. 11.06	فیبریکس پلس سرپ
TIXYLIX	(RHONEPOULENC) 500ml: Rs. 37.55	ٹیکسی لکس

## پرومی تھازین ہائیڈروکلورائیڈ PROMETHAZINE HCL

افعال و منافع: الرجی، حساسیت، دوا یا غذا کا ری ایکشن، نزلہ و بخار ناک بہنا، نزلہ زکام پتی اچھلنا جلد پر چلتے پڑنا کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: براہ دہن ۲۵ سے ۷۵ ملی گرام سوتے وقت اباریا ۱۰ سے ۲۰ ملی گرام دن میں ۳ بار بذریعہ انجکشن ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام گہرا عضلاتی انجکشن لگائیں بچوں کو عمر کے مطابق۔

منفی افعال: نومولود چھوٹے بچوں ایام رضاعت گلوکوما، اور حساس مریضوں کو استعمال کرنا منع ہے۔



مضر اثرات: خشکی چکر آنے کی شکایت ہو سکتی ہے۔  
احتیاط: دوا کے استعمال کے بعد ڈرائیوری کرنا اور مشنری کا استعمال ممنوع ہے۔

## تجارتی مرکبات

PHENA KID	(SWIFT)	115ml: Rs.11.98	فینا کڈ
PHENA -P	(SWIFT)	50ml: Rs.15.98	فینا-پی
PHENA INJ	(SWIFT)	2ml amp: Rs.3.10	فینا انجکشن
PHENERGAN	(RHONE POULINC)		فینرگان
10mg: 10: Rs.2.53; 25mg: 10: Rs.4.35			
PHENERGAN ELIXER	(RHONE POULINC)		فینرگان الکسر
100mg: Rs.11.62			
PROMETHAZINE HCL INJ	(RHONE POULINC)		پرومی تھازین انجکشن
10x2ml: Rs.33.40			
PROMASUN	(SUN PHARMA)	10 tabs Rs.2.05	پروماسن

## TERFINADIN

## ٹرفی ناڈین

افعال و منافع: ہر قسم کی الرجی اور حساسیت میں مفید ہے۔  
مقدار و خوراک: ۶۰ ملی گرام دن میں ۲ بار یا ۱۲ ملی گرام دن میں ابار۔ بچوں کو عمر کے مطابق۔  
منفی اثرات: دوا سے حساس مریضوں کو نہ دی جائے۔  
مضر اثرات: درد سر، پسینہ کی کثرت، ہاضمہ کی خرابی، سانس میں تنگی، جلد پر داغ پڑنا۔  
احتیاط: حالت حمل اور ایام رضاعت میں، پیچھے پڑوں کے امراض اور جگر کی خرابی میں E.C.G. کے غیر طبعی ہونے میں احتیاط برتیں۔  
دواؤں کے ساتھ رد عمل: کیٹا کینازول اور ارائی تھرومائی سین کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

HISTAFEN	(DEYS)	10: Rs.22.50	ہسٹافین
HISTERF	(MAX)	50ml: Rs.21.30	ہسٹرف
HISTERNA TABS	(P&B LABS)	10: Rs.22.45	ہسٹرنا



<b>HISTERNA SUSP</b>	(P&B LABS) 50ml: Rs.16.62	ہسٹرناسرپ
<b>TEDIN</b>	(GUFIC) 10: Rs. 41.30	ٹےڈن
<b>TEDIN SYRUP</b>	(GUFIC) 60ml: Rs.20.90	ٹےڈن سرپ
<b>TEFICON</b>	(MODI-MUNDIPHARMA) 10: Rs.41.00	ٹےفی کون
<b>TERDANE</b>	(INTAS) 10: Rs.23.00	ٹرڈین
<b>TERDANE SUSP</b>	(INTAS) 50ml: Rs.14.00	ٹرڈین سرپ
<b>TERF</b>	(LUPIN) 120mg: 10: Rs.37.08	ٹرف
<b>TERF SUSP</b>	(LUPIN) 50ml: Rs.20.15	ٹرف سرپ
<b>TERFAX-60</b>	(KOPRAN) 10x10 Rs.239.72	ٹرفیکس ۶۰
<b>TERFAX SUSP</b>	(KOPRAN) 60ml: Rs.26.55	ٹرفیکس سرپ
<b>TERFED SUSP</b>	(CIPLA) 60ml: Rs.21.31	ٹرفڈ سرپ
<b>TERFED TABS</b>	(CIPLA) 10: Rs.43.33	ٹرفڈ ٹبلٹ
<b>TERIGON</b>	(MEJDA) 60ml: Rs.19.05	ٹریگان
<b>TERIGON TAB</b>	(MEJDA) 10: Rs.19.56	ٹریگان ٹبلٹ
<b>TERIN</b>	(WOCKHARDT) 10 tabs Rs.21.11	ٹیرن
<b>TERIN SUSP</b>	(WOCKHARDT) 50 ml: Rs.19.10	ٹیرن سرپ
<b>TOFRIN</b>	(TORRENT) 10: Rs.43.50	ٹوفرین
<b>TOFRIN SUSP</b>	(TORRENT) 50ml: Rs.23.90	ٹوفرین سرپ
<b>TREXYDIN</b>	(RANBAXY) 10: Rs.50.00	ٹرکسیڈین
<b>TREXYL</b>	(RANBAXY) 10 tabs Rs. 43.95	ٹرکسائل
<b>TREXYL SUSP</b>	(RANBAXY) 50 ml: Rs. 21.30	ٹرکسائل سرپ
<b>ZENAD</b>	(DABUR) 10 tabs Rs.22.95	زیناڈ
<b>ZENAD SUSP</b>	(DABUR) 50 ml: Rs.19.95	زیناڈ سرپ
<b>ZOTER</b>	(ALLIDAC) 10: Rs.44.30	زوتر
<b>ZOTER SUSP</b>	(ALLIDAC) 50ml: Rs.24.50	زوتر سرپ

## TRIMEPRAZINE TARTRATE ٹرائی می پرازین ٹارٹریٹ

افعال و منافع: پتی اچھلنا، کھلی، بچوں کو تسکین دینے کے لئے۔ بیہوشی کی دوا سے قبل اس کے اثرات دیرپا ہوتے ہیں۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ ملی گرام ۳-۴ بار یومیہ، بچوں کو ۲.۵ سے ۵ ملی گرام دن میں ۳ بار، بچوں کو



سکون پہنچانے اور نیند لانے کے لئے ۵۷ ملی گرام سے ۶۰ ملی گرام یومیہ دی جاسکتی ہے۔ بیہوشی سے قبل ۲ سے ۴ ملی گرام / کلو گرام کے حساب سے آپریشن سے ۲ گھنٹہ قبل عضلاتی لگائیں۔

**منفی افعال:** ایام رضاعت، جگر گردوں کے امراض میں، مرگی، پارکنسن ڈیزیز، غده درقہ کے افراد کی کمی گلوکوما، ورم، غده قدامیہ اور ضعف میں استعمال کرنا مناسب نہیں۔

**مضر اثرات:** خشکی، ڈپریشن، الرجی، صفرا کی تولید میں کمی، قلب کے فعل کی غیر طبعی حالت، لو بلڈ پریشر سانس لینے میں وقت، جلد پرداغ پڑنا، سر گھومنا، دورے پڑنا، دودھ میں زیادتی، لیو کو سائیٹ میں کمی روشنی سے نفرت پیدا ہو سکتی ہے۔

**احتیاط:** دوا کے استعمال کے دوران مشنری چلانا، ڈرائیوری کرنا منع ہے۔

**دواؤں کے ساتھ رد عمل:** شراب، نظام عصبی کو کمزور کرنے والی ادویہ، دافع ذیابیطیس اور بلڈ پریشر کم کرنے والی دواؤں کے ساتھ اس کا استعمال خطرناک ہے۔

## ٹرائی پرولی ڈین ہائیڈرو کلورائیڈ TRIPROLIDINE HCL

**افعال و منافع:** ہر قسم کی الرجی، ناک بہنا، الرجک آشوب چشم، پتی اچھلنا، جلد پر پھٹتے دوڑے پڑنا۔  
**مقدار و ترکیب:** ۱۲ سال سے زائد عمر والوں کو ۵، ۲ سے ۵ ملی گرام دن میں ۳ بار ۶ سے ۱۲ سال کی عمر میں ۵، ۲ ملی گرام ۱ سے ۶ سال کی عمر میں ۲، ۵ ملی گرام سے ۲ ملی گرام۔

**مضر اثرات:** جلد پرداغ پڑ سکتے ہیں۔

**احتیاط:** جگر اور گردوں کی خرابی میں احتیاط برتنا چاہیے۔ بچوں کی پہونچ سے دور رکھیں۔

## تجارتی مرکبات

ACTIFED	(BURROUGHS WELLCOME) 10: Rs.8.64	اکٹی فنڈ
ACTIFED PLUS	(BURROUGHS WELLCOME) 10: Rs.10.67	اکٹی فنڈ پلس
DELETUS TABS	(NICHOLAS) 10: Rs.10.38	ڈی لی ٹبس
DELETUS-D	(NICHOLAS) 100ml: Rs.26.07	ڈی لی ٹبس-ڈی



## دورہ روکنے والی دوائیں

### ANTI CONVULSANTS

#### ACETAZOLAMIDE

#### ایسی ٹازولامیڈ

افعال و منافع: یہ کاربونک انزائم کے اثر کو روک کر دورہ روکنے میں مدد پہنچاتی ہیں۔ آنکھ کی رطوبت بیضہ Aqueous Humor کی پیدائش میں رکاوٹ پیدا کر کے آنکھ کے تناؤ کو کم کرتی ہے۔ ہر قسم کے گلوکوما، آنکھ میں دباؤ، شدید درد میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: گلوکوما میں ۲۵۰ ملی گرام سے اگر ام یومیہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے مرگی میں ۸ سے ۳۰ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے یومیہ ماؤنٹین سکنس Mountain Sickness میں ۵۰۰ ملی گرام سے اگر ام یومیہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے۔

منفی افعال: سلفونامائیڈ سے الرجی میں غیر گلوکوما کی حالت میں اور زیادہ دن استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔

مضر اثرات: جلد پر داغ پڑنا، پیشاب میں رسوب آنا، گردے میں پتھری بننے اور خون کی غیر طبعی کیفیت پیدا کرنے میں مدد پہنچاتی ہے۔

احتیاط: حالت حمل میں اس کا استعمال منع ہے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: فولک ایسڈ، دافع ذیابیطس اور خوردنی مانع انجماد خون ادویہ کے ساتھ خراب اثر ہوتا ہے۔

#### تجارتی مرکب

DIAMOX

(LEDERLY) 10: Rs.5.11

ڈایاموکس



# CARBAMAZEPINE

## کاربامازی پائن

افعال و منافع: مرگی میں یہ فین ٹائن کی طرح کام کرتی ہے لیکن یہ زیادہ موثر نہیں ہے مرگی کی مختلف حالتوں میں درد شقیقہ میں نفسیاتی الجھنوں، شراب نہ ملنے کے اثرات بد، ذیابطیسی عصبی درد عضلات چہرہ کی آٹھن وغیرہ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ابتدائی خوراک ۱۰۰ سے ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار ضرورت پر ۱۲۰۰ ملی گرام کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے دے سکتے ہیں۔ بچوں کو ۱۰ ملی گرام / فی کلو گرام کے حساب سے دی جائے۔  
منفی افعال: C/1 جگر کے شدید امراض، حمل اور ایام رضاعت میں مخ العظام کی خرابی میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: دو تصاویر دکھائی دینا، بصارت میں فرق خشکی حرکات غیر ارادی متلی ابکائی پر قان۔  
احتیاط: حمل اور ایام رضاعت میں قلب و جگر اور گردوں کے امراض میں ضعیفوں میں احتیاط برتیں۔  
دواؤں کے ساتھ رد عمل: ڈاکسائیکلین، خوردنی مانع حمل ادویہ، آکسونیازائیڈ، ارائی تھرومائی سین، سی می ٹی ڈین، لی تھیم، ڈیکسٹرو پروپاکسائی فین ڈل ٹی زم، کارٹی سون، ویراپا مل اور فین ٹائن کے ساتھ استعمال مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

CARBADAC 200	(ALIDAC) 6: Rs.9.65	کارباڈیک ۲۰۰
CARBATOL	(TORRENT)	کارباٹول
100mg 10: Rs.10.12; 200mg 10: Rs.17.82; 400mg 10: Rs.30.57		
CARMAZ 100/200	(NATCO)	کارماز
100mg: 10: Rs.11.20; 200mg: 10: Rs.24.00		
EPITOL	(INTAS)	اے پی ٹول
100mg: 10: Rs.7.00; 200mg, 10: Rs.13.71; 400mg: 10: Rs.26.00		
EPITOL SYRUP	(INTAS) 50ml: Rs.11.50	اے پی ٹول سرپ
FAZEPINE TABS	(FALMA) 200mg tabs; 10: Rs.18.80	فیری پائن ٹبلیٹ
MAZETOL	(S G PHARMA)	مے زے ٹول
100mg: 10: Rs.9.25; 200mg 10: Rs.17.96; 400mg: 10: Rs.35.05		



<b>MEZAPIN</b>	(LA PHARMA) 200mg 10: Rs.16.55	میزاپن
<b>TEGRETOL</b>	(HIND. CIBA GEIGY)	نگرے ٹال
100mg: 10: Rs.9.18; 200mg: 10: Rs.17.93; 400mg: 10: Rs.34.80		
<b>TEGRETOL</b>	(HIND. CIBA GEIGY) 100ml: Rs.36.84	نگرے ٹال
<b>TEGRETOL SYRUP</b>	(HIND. CIBA GEIGY)	نگرے ٹال سِرپ
100ml: Rs.36.84		
<b>VERSIZUR</b>	(MICRO LABS)	ورسی زور
Carbamazepine 200mg tabs; price N/A.		
<b>ZEN-200</b>	(INTAS) 200mg 10: Rs.13.50	زین ۲۰۰
<b>ZEN RETARD</b>	(INTAS) 400mg: 10: Rs.31.90	زین ریٹارڈ
<b>ZEPTOL</b>	(SUN PHARMA)	زیپ ٹال
100mg 10: Rs.10.00 200mg 10: Rs.19.18; 400mg: 10: Rs.37.10		

## CLONAZEPAM

## کلونازپیام

افعال و منافع: مرگی، دماغ کے سبب ہونے والی مرگی، بچوں کی شدید مرگی، بچوں کے بار بار دورے پڑنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵ء ملی گرام یومیہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے ۵ء ملی گرام / ہفتہ کے حساب سے بڑھائی جائے مستقل مرض کی روک تھام کے لئے ۴ سے ۸ ملی گرام یومیہ، بچوں کو عمر کے حساب سے۔  
منفی اثرات: پھیپھڑوں کے امراض، ایام حمل اور رضاعت میں نہ دی جائے۔

مضر اثرات: لو بلڈ پریشر ہونا، شراب کے ساتھ بصارت زائل ہونا، خون کی حالت غیر طبعی خشکی، نیند کی کمی، بے چینی چکر آنا، بھوک کی کمی، بد ہضمی نیند اور بصارت میں فرق، ضعف باہ نامردی، جلد کی رنگت میں تبدیلی، جلد پر داغ پڑنا جلد پر تھج ورم ہو سکتا ہے۔

احتیاط: نومولود، پھیپھڑوں کی کمی کمزوری، جگر اور گردوں کی خرابی اور زائد عمر والوں میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: فینوباربیٹون، ہائیڈن ٹائن اور شراب کے ساتھ اس کے فعل میں تیزی آتی ہے۔



## تجارتی مرکبات

CLONOTRIL	(TORRENT) 2mg: 10: Rs. 29.50	کلونوٹرل
LONAZEP	(SUN PHARMA) 10: Rs. 29.70	لونازپ
RIVOTRIL	(PIRAMAL HEALTH CARE)	ریوٹرل

## PHENYTOIN SODIUM فین ٹائسن سوڈیم

### DIPHENYL HYDANTOIN SODIUM ڈائی فینائل ہائیڈنٹائن سوڈیم

افعال و منافع: مرگی کی یہ ایک منتخب دوا ہے، دماغ کو ماؤف نہیں کرتی، مرگی کے شدید دورے قلبی حرکات کا بے ترتیب ہونے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: بچوں کو ۱۵۰ سے ۳۰۰ ملی گرام بالغوں کو ۳۰۰ سے ۶۰۰ ملی گرام کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے قلبی حرکات کی بے ترتیبی میں ۱۰۰ ملی گرام پہلے دن دوسرے تیسرے دن سے نصف خوراک کر دینا چاہیے۔

متفی افعال: قلب میں رکاوٹ، حمل اور ایام رضاعت میں، الرجی کے دوران استعمال نہ کرائیں۔  
مضر اثرات: ہضم کی خرابیاں، نیند نہ آنا، سستی کاہلی، الرجی، بالوں کی کثرت، خون میں خرابی، غدہ لفافہ متورم، چشم کی حرکات غیر ارادی، Nystagmus لین العظام ہو سکتا ہے۔

احتیاط: جگر کی خرابی میں، خون کے سرخ ذرات کی کمی میں، بوڑھوں اور ضعیفوں میں احتیاط برتیں۔  
دوا آہستہ آہستہ بند کریں، دوران استعمال E.C.G. چیک کراتے رہیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: مانع انجماد خون ادویہ، آئی سو نیازائیڈ، کلورم فینی کال مانع حمل گولیاں، کارنی سون، گوانی ڈین، وٹامن ڈی ڈیجی ٹیلز ری فام پی سین ڈاکسائیڈ، کلکلین اور فروسی مائیڈ کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

## تجارتی مرکبات

EPSOLIN	(CADILA) 100mg tabs 100: Rs. 44.29	ایپ سولن
EPSOLININJ	(CADILA) 50mg/ml. 2ml. 4.13	ایپ سولن انجکشن
DILANTIN-SUSP	(PARKE-DAVIS) 114ml: Rs. 8.84	ڈائی لین ٹین سرب



<b>EPTOIN</b>	(BOOTS) 100mg tabs 100: Rs. 42.25	ایپٹون
<b>GAROIN</b>	(RHONE POULENC)	گروئن
Phenyton sod 100mg Phenobarbitone sod 50mg tabs 10:	Rs. 5.59	
<b>PHENYTAL 50</b>	(INTAS)	فینائی ٹال ۵۰
Phenobarbitone 50mg, Phenyton sod. 100mg tabs; 10: tabs :	Rs. 5.50	
<b>PHENYTAL-30</b>	(INTAS)	فینائی ٹال ۳۰
Phenobarbitone 30mg: Phenyton sod. 100mg tabs: 10 tabs	Rs. 5.20	

## ETHOSUXIMIDE

ای تھو سکسی مائیڈ

افعال و منافع: ابتدائی مرگی میں مفید ہے مرگی کی دیگر دواؤں کے ساتھ دوسری قسم کی مرگی میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۶ سال سے کم عمر میں ۲۵۰ ملی گرام پہلی خوراک ۶ سال سے زائد عمر والوں کو ۵۰۰ ملی گرام۔ مریض کے حالات کے مطابق مقدار خوراک کا تعین کیا جائے۔

مضر اثرات: نظام ہضم اور عصبی نظام کو کمزور کرتی ہے۔ جلد پر داغ پڑنا، خون میں غیر طبعی تغیر ہو سکتا ہے۔

احتیاط: جگر کے افعال کی جانچ کراتے رہیں، حمل اور ایام رضاعت میں جگر اور گردوں کی خرابی میں، احتیاط برتیں، دوا آہستہ آہستہ بند کریں۔

## تجارتی مرکبات

<b>ETHOSUXIMIDE</b>	(PARKE-DAVIS) 114ml, Rs. 45	ای تھو سکسی مائیڈ
<b>ZARONTIN</b>	(PARKE-DAVIS) 114ml: Rs. 47.39	زارن ٹین

## GABAPANTIN

گاباپین ٹین

افعال و منافع: مرگی اور دیگر اسباب سے دورہ پڑنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۲ سال سے زائد عمر والوں کو ۹۰۰ سے ۱۸۰۰ ملی گرام یومیہ ۳ خوراکیں میں تقسیم کر کے۔

منفی افعال: دوا سے حساس مریضوں کو، الرجی، ۱۲ سال سے کم عمر والوں کو دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: غنودگی چکر آنا، حرکات غیر ارادی، الجھن گھبراہٹ، درد سر، مقلہ چشم کا مسلسل حرکت کرنا،



ہاتھ کا پٹنا، متلی اڑکائی، دو آتساویر دکھائی دینا، ناک بہنا۔  
احتیاط: حمل اور ایام رضاءت میں احتیاط برتیں۔

## تجارتی مرکب

NEURONTIN

(PARKE DAVIS)

نیورن ٹین

PHENOBARBITONE

فینوباربیٹون

افعال و منافع: مرگی کے دوروں کو روکنے، بے خوابی، درد، بے چینی تسکین درد، شقیقہ، چکر آنا،  
ناچنا کودنا، کالی کھانسی، دماغی اور جسمانی بے چینی اور کھجلی میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: مرگی میں ۳۰ ملی گرام سوتے وقت اور صبح کو، تسکین درد کے لئے ۳۰ ملی گرام دن  
میں ۳ بار نیند کے لئے ۶۰ سے ۱۰۰ ملی گرام سوتے وقت۔  
منفی افعال: حمل، جگر کی خرابی، خون کی کمی، ضعف قلب و اعصاب میں دینا مضر ہے۔  
مضر اثرات: سستی کا ہلی پیدا کرتی ہے۔ مریض عادی ہو جاتا ہے۔  
احتیاط: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں احتیاط برتیں۔  
دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، نظام عصبی کو مفلوج کرنے والی ادویہ، وال پورک ایسڈ، پیتھو  
ٹریکسیٹ گرائی سو فل وین کے ساتھ دینا مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

BEETAL	(INTAS) 10: Rs.2.60	بی ٹال
GARDENAL	(RHONE POULENC)	گارڈی ٹال
30mg: 10: Rs.4.88; 60mg: 10: Rs.6.72		
GAROIN	(RHONE POULENC) 10: Rs.6.85	گے روان
LUMINAL	(BAYER) 250: Rs.21.59	لومی ٹال
LUMINALET	(BAYER) 500: Rs.10.11	لومی ٹالیٹ
PHENOBARB 30/60	(INTAS) 60mg: 10: Rs.3.80	فینوبارب ۳۰/۶۰



## PRIMIDONE

## پرائی می ڈون

**افعال:** یہ فینوباربیٹون کی طرح اثر کرتی ہے۔ ہر قسم کی مرگی کا دورہ روکنے اور دوسری تھکین دینے اور نیند لانے میں مفید ہے۔ دورے پڑنا جھٹکنے لگنا عصبی درد کو روکنے میں مفید ہے۔

**مقدار:** ۱۲۵ ملی گرام سوتے وقت ہر تیسرے دن مقدار بڑھائی جائے ۵۰۰ ملی گرام تک دے سکتے ہیں۔ مقدار کا تعین مرض اور مریض کے حالات کے مطابق کیا جائے۔

**مضر اثرات:** سستی کا ہلی، نظام عصبی میں خلل، عادی ہونا، خون کی حالت غیر طبعی، خون کی کمی ہونا۔

**احتیاط:** حمل، ایام رضاعت، جگر، گردوں اور پھیپھڑوں کے امراض میں احتیاط برتیں۔

**دواؤں کے ساتھ رد عمل:** دیگر دورہ روکنے والی دوائیں، کیو مارین مانع انجماد خون، مانع حمل گولیاں اور شراب کے ساتھ دینا مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

MYSOLINE

(ICI) 10: Rs.20.30

مائی سولین

## ✓ SODIUM VALPORATE

## سوڈیم وال پوریٹ

**افعال:** اس دوا سے گاما امینو بیوٹارک ایسڈ (Gaba) میں اضافہ ہو جاتا ہے جس سے دورہ پڑنے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ ہر طرح کی مرگی کے دورے کو روکنے میں مفید ہے۔

**مقدار:** بالغوں کے لئے ۶۰۰ ملی گرام پومیہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے، مریض کے حالات اور مرض کے حساب سے ۲۰۰ ملی گرام ہر تیسرے دن اضافہ کر سکتے ہیں۔ بچوں کو ۲۰ سے ۵۰ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔

**منفی افعال:** C/1 جگر کے امراض اور حاملہ عورتوں میں اس کا استعمال مضر ہے۔

**مضر اثرات:** وزن میں اضافہ، بالوں کا گرنا، جسم کا پھول جانا، ورم ہانقراس، جگر فیل ہونا، اور عصبی امراض ہو سکتے ہیں۔

**احتیاط:** شدید مرگی میں Grand Mal، بچوں کو، دماغی طور سے کمزور اور ماؤف مریضوں کو بڑے



آپریشن کے دوران احتیاط برتیں، جگر کے افعال کی جانچ کراتے رہنا چاہیے، شکر کی جانچ کا نتیجہ غلط نکلنے پر احتیاط برتنا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: باربی ٹون اور دوسری دورہ روکنے والی دواؤں، دافع ذہن پریشن دواؤں کے ساتھ استعمال نہیں کرانا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

ENCORATE	(SUN PHARMA)	10: Rs.14.95	ان کوہرٹ
EPILEX	(RECLITT & COLMAN)	10: Rs.14.50	اے پی لیگس ٹبلٹ
EPILEX ORAL SOLN.	(RECLITT & COLMAN)	100ml: Rs.32.00	اے پی لیگس سرپ
✓ VALPARIN 250	(TORRENT)	10: Rs.12.90	وال پارن
VALPARIN LIQUID	(TORRENT)	110ml: Rs.35.10	وال پارن لکوز
VALPARIN ALKAETS	(TORRENT)	500mg: 10: Rs.35.90	وال پارن الکاٹ
VALPROL	(INTAS)	200mg tabs 10: Rs.12.90	وال پرول

## TRIMETHADIONE

## ٹرائی می تھادیون

افعال و منافع: شدید مرگی میں مفید ہے۔ اچانک گر جانا، دورہ پڑنا منہ سے جھاگ نکلنا، فینو باربی ٹون اور فین ٹائن کے ساتھ استعمال کرائی جاسکتی ہے۔

مقدار ترکیب: بالغوں کو ۹۰۰ ملی گرام سے ۲۱۰۰ ملی گرام تک ۳-۴ خوراکیوں میں تقسیم کر کے ضرورت پر ۳۰۰ ملی گرام ۴ دن کے وقفہ سے اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ بچوں کو ۳۰۰ ملی گرام ۶ سال سے زائد عمر میں ۶۰۰ ملی گرام یومیہ ۳ خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔

منفی افعال: C/1 جگر اور گردوں کی خرابی میں۔ عصب باصرہ کی تکلیف میں استعمال نہ کرائیں۔  
مضر اثرات: جلد پرداغ، معدہ میں بے چینی اور تکلیف، بصارت میں فرق، حلق میں خراشیں پڑ سکتی ہیں۔

احتیاط: خون کی جانچ خصوصاً ہیموگلوبین کی جانچ کراتے رہنا چاہیے۔



## دافع قے اور چکر روکنے والی ادویہ

### ATI EMETICS & ANTI VERTIGO DRUGS

#### بٹاہسٹین ڈائی ہائیڈرو کلورائیڈ

#### BITAHISTINE DIHYDROCHLORIDE

افعال: یہ دوا کان میں خون کی رسد میں اضافہ کرتی ہے جس سے تغلغ اور کان کے اندرونی حصہ کی عروق اور ساختوں میں زیادہ خون پہنچ کر کان کی اندرونی تکالیف کو دور کرتی ہے۔ یہ دوا چکر آنے کان بجنے، کم سنائی دینے، قے متلی کان کے درد اور منہ علامیہ میں مفید ہے۔  
مقدار: ۸ ملی گرام دن میں ۳ بار مرض کے حالات کے مطابق دوا کی مقدار دیں۔ ۴۸ ملی گرام تک دے سکتے ہیں۔

منفی افعال: لینس کی خرابی اور آنکھ میں پھلی پیدا ہونے میں نہیں دینا چاہیے۔  
مضر اثرات: زخم معده اور ہضم کی خرابی ہو سکتی ہے۔  
احتیاط: حاملہ اور زخم معده کے مریضوں کو استعمال نہ کرائیں۔

#### تجارتی مرکبات

VERTIN

(DUPHAR) 8mg tabs 50: Rs. 105.00

ورٹین

#### CINNARIZINE

#### سنارائی زین

افعال: یہ کان کے پردے اور متعلقہ اعضاء پر مسکن اثر کرتی ہے۔ چکر آنے، کان بجنے طنین و دوی Tinnitus، سر گھومنا، سفری قے متلی Motion Sickness میں مفید ہے۔  
مقدار: ۱۲ سال سے زائد عمر والوں کو ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام بچوں کو ۱۲.۵ ملی گرام ۳ بار۔  
منفی افعال: C/1 دوا سے الرجک مریضوں میں اور حمل میں اس کا استعمال مناسب نہیں  
مضر اثرات: جلد پر داغ پڑنا، بے چینی، غنودگی، ہاضمہ کی خرابی، زیادہ دن استعمال سے دماغ ماؤف ہونا خشکی۔  
احتیاط: لو بلڈ پریشر میں، دوا کے دوران ڈرائیوری اور مشنری سے پرہیز۔



## تجارتی مرکبات

CINTIGO	(WALLACE)	25mg tabs 10	Rs. 9.00	سن ٹائی گو
CINZAN	(FDC)	10	Rs. 11.00	سن زان
CINZAN 75MG	(FDC)	75mg tabs 20	Rs. 30.55	سن زان ۷۵ ملی گرام
DIZIRON	(GLENMARK)	25mg tabs 10	Rs. 9.19	ڈائی زی ران
STUGERON	(ETHNOR)	25mg tabs 25	Rs. 37.50	اسٹوگران
STUGERON FORTE	(ETHNOR)	75mg tabs 20	Rs. 66.00	اسٹوگران فورٹ
VERTIGON	(GENO)	25mg tabs 10	Rs. 9.42	ورٹی گان
VERTIGON-75	(GENO)	75mg tabs 10	Rs. 19.15	ورٹی گان ۷۵

## CYCLIZINE

## سائی کلی زین

افعال: سفری قے Motion Sickness، چکر آنے، منرڈیزیز، کان میں ورم آپریشن سے قبل مخدرات، مسکنات اور منومات کے سبب ہونے والی قے متلی، ورم جگر، ورم معدہ کی بے چینی کو دور کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ سال سے زائد عمر میں ۵۰ ملی گرام ۵ سے ۱۰ سال میں ۲۵ ملی گرام ۱ سے ۵ سال میں ۱۲.۵ گرام دن میں ۳ بار سفری قے میں سفر سے اگھٹہ قبل کھلائیں۔

منفی افعال: C/1 دوا سے حساس مریضوں کو نہ دیں۔

مضر اثرات: جسم کپکپانا، جگر میں ورم، وریڈی انجکشن سے صدماتی کیفیت ہونا۔

احتیاط: حالت حمل میں احتیاط برتیں، دوا کے دوران ڈرائیوری اور مشنری چلانا نہیں چاہیے۔

## تجارتی مرکب

MARZINE	(BURROUGHS WELLCOME)	50mg tabs 10	Rs. 5.55	مارزائن
---------	----------------------	--------------	----------	---------

## DIMENHYDRINATE

## ڈائی من ہائیڈری نیٹ

افعال و منافع: چکر آنا، سفری قے، متلی ابکائی، بجلی کا جھٹکا لگنے سے ہونے والی قے، آپریشن یا بیہوشی



کی دوا سے ہونے والی قے کان کی خرابی سے ہونے والی قے چکر آنا وغیرہ میں مفید ہے۔  
 مقدار و ترکیب: بالغوں کو ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام ۶ سے ۱۲ سال کی عمر میں ۳۰ سے ۶۰ ملی گرام ۲ سے ۶ سال میں ۱۵ سے ۳۰ ملی گرام دن میں ۳ بار سفری قے کے لئے سفر سے اگھنٹہ قبل۔  
 منفی افعال: C/1 دوا سے حساس افراد کو، حاملہ اور دودھ پلانے والی کو نہ دیں۔  
 مضر اثرات: خشکی کرتی ہے۔

احتیاط: دوا کے استعمال کے بعد ڈرائیوری کرنا اور مشنری چلانے سے آگاہ کر دیں۔  
 دواؤں کے ساتھ رد عمل: انٹی بائیوٹک دواؤں کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

### تجارتی مرکبات

DRAMAMINE	(SEARLE) 50mg tabs 10: Rs.10.45	ڈرامامین ٹبلیٹ
DRAMAMINE LIQUID	(SEARLE) 30ml Rs.6.65	ڈرامامین لکویڈ
GRAVOL	(WALLACE) 50mg tabs 10: Rs.9.95	گرے دول ٹبلیٹ

### DOMPERIDONE

### ڈوم پیری ڈون

افعال: دافع قے، معدہ کی تیزابیت کو معتدل کرنے والی دوا ہے، حرکات دودیہ کو ست کرتی ہے،  
 ندہ کی تیزابیت سے پیدا ہونے والی متلی ابکائی اور دوسری تکلیف کو آرام پہونچاتی ہے۔ ذیابیطیس کے  
 سبب ہونے والی بد ہضمی، آپریشن، انفکشن، دواؤں غذاؤں نیز ریڈیو تھیراپی سے ہونے والی قے متلی  
 میں مفید ہے۔

مقدار: ۱۰ ملی گرام دن میں تین بار کھانے سے ۱۵-۲۰ منٹ قبل اور سوتے وقت دی جائے۔  
 منفی افعال: C/1 حالت حمل اور ایک سال سے کم عمر کے بچوں کو نہ دی جائے۔  
 مضر اثرات: معمولی درد شکم محسوس ہو سکتا ہے۔

### تجارتی مرکبات

DOMPERON	(ALIDAC) 10mg tabs 10: Rs.16.70	ڈوم پران
DOMPERON DROPS	(ALIDAC) 30ml:Rs.16.50	ڈوم پران ڈراپس
DOMSTAL	(TORRENT) 10mg tabs 10: Rs.19.90	ڈومسٹال



DOMSTAL SUSP	(TORRENT) 30ml : Rs.20.90	ڈومسٹال سرپ
ENDOPACE	(THEMIS PHARMA)	انڈوپیس
10mg tabs 10 tabs: Rs.18.16		
ENDOPACE SUSP	(THEMIS PHARMA)	انڈوپیس سرپ
GASTRACTIVE	(ETHNOR) 50ml: Rs.118.00	گیس ٹریک ٹو
GASTRIUM	(MICRO LABS)	گیس ٹریم
GASTRIUM SUSP	(MICRO LABS)	گیس ٹریم سرپ
MOTINORM	(MEDLEY) 10mg tabs 10: Rs.17.60	موٹی نارم
MOTINORM SYRUP	(MEDLEY) 30ml: 16.80	موٹی نارم سرپ
NAUSIDOME	(BOOTS) 10mg tabs 10: Rs.20.00	نازی ڈوم ٹبلیٹ
NAUSIDOME SUSP	(BOOTS) 30ml: Rs.15.00	نازی ڈوم سرپ
NORMETIC	(LUPIN) 10mg tabs 10: Rs.15.90	نارمے ٹک
NORMETIC SUSP	(LUPIN) 30ml:Rs.16.90	نارمے ٹک سرپ
NORMODIL	(MEJDA) 10mg tabs 10: Rs.14.85	نارم موڈل
NORMODIL SUSP	(MEJDA) 30ml: Rs.11.65	نارم موڈل سرپ
PERIM	(KANPHA)	پیریم ٹبلیٹ سرپ
10: Rs.14.22; 30ml: Rs.17.03		

## MECLIZINE HCL میک لائی زین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال: یہ مسکن اور دافع حساسیت اثر رکھتی ہے۔ حاملہ کی قے روکنے کی مخصوص دوا ہے۔ صبح کو ہونے والی قے، حمل کے سبب خرابی ہضم مزعلامیہ آپریشن کے بعد ہونے والی قے، متلی ابکائی، ریڈیو تھیراپی کے بعد ہونے والی قے، سفری قے دماغی الجھن کے سبب ہونے والی قے متلی ابکائی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام سوتے وقت کھلائیں۔

منفی افعال: C/1 بچوں کو دینا مناسب نہیں۔

مضر اثرات: خشکی کرتی ہے۔

احتیاط: اس کے استعمال کے بعد ڈرائیوری کرنا اور مشنری چلانا منع ہے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب کے ساتھ مضر ہے۔



## تجارتی مرکبات

<b>DILIGAN</b>	(UNI-UCB)	ڈالی گان
Meclizine Hcl 12.5mg Nicotinic acid 50mg tabs 10: Rs.7.75		
<b>PREGNIDOXIN</b>	(UNI-UCB)	پریگنی ڈاکسن
Meclizine Hcl 25mg Caffeine 20		
<b>PREGNIDOXIN</b>	(UNI-UCB)	پریگنی ڈاکسن
Meclizine Hcl 25mg Caffeine 20mg tabs 10: Rs.7.50		

## METOCLOPRAMIDE

میٹاکلوپرورامائیڈ

افعال: یہ دوا غذائی نالی کی حرکات کو کنٹرول کرتی ہے۔ شدید قے، متلی ابکائی اور معدہ کے درد میں مفید ہے آنتوں سے فضلات کو جلد خارج کرتی ہے۔

مقدار: بالغوں کو ۱۰ ملی گرام یومیہ دن میں ۳ بار بچوں کو آدھ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے۔

منفی افعال: C/1 معدہ آنتوں سے جریان خون تسد، یا سوراخ ہونا، مرگی، بصارت میں فرق اور دوا سے حساس مریضوں کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: خشکی پتی اچھلنا، منہ خشک ہونا، حرکات غیر ارادی، چہرے اور گردن کی عجیب و غریب حرکات جڑوں کا بند ہونا، دودھ کی پیدائش میں زیادتی۔

احتیاط: حمل، ایام رضاعت اور گردوں کی خرابی میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: جگر کے انزائم کو روکنے والی ادویہ، Anti Cholinergic, Mao, Inhibitor اور فینوتھیزین کے ساتھ نہ دی جائے۔

## تجارتی مرکبات

<b>EMENIL</b>	(ASTRA-IDL) 10ml: Rs.5.93	ایمی ٹل انجکشن
<b>MATOCOL MPS</b>	(PFIMEX) 100ml: Rs.18.75	میٹوکول ایم۔ پی۔ ایس
<b>MAXERON</b>	(WALLACE) 10ml vial: Rs.7.25	میکسی ران
<b>MAXERON MPS</b>	(WALLACE) 10 tabs: Rs.7.55	میکسی ران ایم پی ایس



METOCONTIN	(MODI-MUNDI PHARMA)	میٹو کون ٹین
10: Rs.10.55		
METOPAR	(CFL PHARMA) tabs: Rs.4.90	میٹوپار
METOPAR SUSP	(CFL PHARMA) 60ml: Rs.8.75	میٹوپار سرپ
NAUSIFAR-MPS	(INFAR) 100ml gel: Rs.24.85	نوسی فار ایم پی ایس
PARAMET	(WALLACE) 10: Rs.48.85	پیرامٹ
PARAMET SUSP	(WALLACE) 60ml: Rs.8.75	پیرامٹ سرپ
PERINORM	(IPCA) 10mg: 10: Rs.4.75	پیری نارم
PERINORM INJ	(IPCA) 10ml: Rs.4.75	پیری نارم انجکشن
PERINORM LIQUID	(IPCA) 30ml: Rs.6.81	پیری نارم لکھوڈ
PROPAMID MPS	(CFL) 10: Rs.7.75	پروپامڈ ایم پی ایس
PROPAMID MPS GEL	(CFL) 100ml: Rs.23.60	پروپامڈ ایم پی ایس جیل
REGLAN	(CFL) 10mg: tabs 10: Rs.4.55	ریگلان
REGLAN INJ	(CFL) 10ml: Rs.7.95	ریگلان انجکشن
REGLAN SYRUP	(CFL) 30ml: Rs.6.90	ریگلان سرپ
SIGMET	(SIGMA LABS)	سیگ میٹ ٹبلیٹ
10mg: tabs: 10: Rs.4.82		
SIGMET INJ	(SIGMA LABS)	سیگ میٹ انجکشن
10ml vial: Rs.7.50		
TAGRID	(CORE) 10mg tabs 10: Rs.4.20	ٹاگ ریڈ
TOMID	(GUFIC)	ٹومڈ
10mg tabs; 10: Rs.4.: syrup 5mg per ml 30ml Rs.5.25		

## اون ڈان سٹرون ہائیڈروکلورائیڈ ONDAN SETRON HCL

افعال: قے متلی، ریڈیو تھیراپی، اور انٹی ٹاکسین سے ہونے والی قے و متلی میں مفید ہے۔  
 مقدار و ترکیب: ۸ ملی گرام وریدی انجکشن آہستہ آہستہ لگائیں، یا ۳۲ ملی گرام ۱۰۰ ملی لیٹر نارمل سیالمن میں ملا کر آہستہ آہستہ ۱۵ منٹ میں چڑھائیں خوردنی طور سے ۸ ملی گرام دن میں ۲ بار۔  
 منفی افعال: C/1 حساس مریضوں کو اور ایام رضاعت میں استعمال نہ کرائیں۔  
 مضر اثرات: قبض درد سر، چہرہ سرخ ہونا، جگر کے افرازات میں اضافہ۔



احتیاط: حالت حمل میں احتیاط برتنا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

EMESET	(CIPLA) 8mg: 6 tabs Rs.84.00
EMESET INJ	(CIPLA) 4ml: Rs.40.10
ONCODEN	(TIDE) 8mg: 10: Rs.126.90
ONCODEN INJ	(TIDE) 2ml: Rs.22.00

ایمی سیٹ  
ایمی سیٹ انجکشن  
آن کوڈین  
آن کوڈین انجکشن

## PROCHLORPERAZINE

پروکلورپیرازین

افعال: درد شقیقہ منرڈیزیز، کان کے اندرونی حصہ کی خرابی، نفسیاتی الجھن اس کا نزو فرینیا Schizo Phrenia تنہائی پسندی، شدید قے، متلی ابکائی میں مفید ہے۔

مقدار: ۵ ملی گرام دن میں ۳ بار یا ۵، ۲ ملی گرام کا گہرا عضلاتی انجکشن لگائیں۔

منفی اثرات: C/1 کمزور نحیف لاغر مریضوں اور جگر کی خرابی میں استعمال نہ کرائیں۔

مضر اثرات: لو بلڈ پریشر، خشکی، نیند کی کمی، جلد پر داغ پڑنا کبھی حرکات غیر ارادی کرنا۔

احتیاط: لو بلڈ پریشر میں مرگی، جگر کی خرابی، حمل، ایام رضاعت، امراض قلب، تسدد امعاء میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، عصبی نظام کو نقصان پہنچانے والی ادویہ اور الفا بلا کر کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

## تجارتی مرکبات

EMIDOXYN	(KALLIS) 5mg tabs 10: Rs.7.86
STEMETIL	(RHONE POULENC)
5mg: 10: Rs.7.10; 25mg: 10: Rs.11.44	
STEMETIL INJ	(RHONE POULENC)
10 amps: Rs.41.00 10ml vial Rs.20.07	

ایمی ڈاکسن  
اسٹی ٹیل ٹبلیٹ  
اسٹی ٹیل انجکشن



## پرومیٹھازین تھیوکلایٹ PROMETHAZINE THEOCLATE

افعال: سفری تے متلی ابکائی، بد ہضمی کانوں میں خرابی کے سبب ہونے والی تے، درد شقیقہ ریڈیو تھیراپی کے سبب ہونے والی تے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ سال سے زائد عمر والوں کو ۲۵ ملی گرام سوتے وقت ۱۰ سے کم عمر والوں کو نصف مقدار سفری تے کے لئے گھنٹہ قبل از سفر کھلائیں۔

منفی افعال: C/1 حساس مریضوں کو نہ کھلائیں۔

مضر اثرات: خشکی پیدا کرتی ہے۔

احتیاط: دوا کے استعمال کے بعد مشنری چلانا ڈرائیوری کرنا منع ہے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب نظام عصبی کو کمزور کرنے والی دواؤں کے ساتھ نہ دیں۔

### تجاتی مرکبات

AVOMINE	(RHONE POULENC)	اے وومن
25mg tabs 10 tabs Rs.7.56		
PHENA KID	(SWIFT) 115ml Rs.11.98	فینا کڈ
PHENA P	(SWIFT) 50ml Rs.16.98	فینا پی
PHENA INJ	(SWIFT) 2ml amp: Rs.3.90	فینا انجکشن
PROMASUN	(SUN PHARMA)	پرو ماسن

## ٹرائی فلو پرومے زائن ہائیڈروکلورائیڈ

### TRIFLUO PROMAZINE HCL

افعال: تے متلی بے چینی، تناؤ نفسیاتی الجھن اور تسکین کے لئے مفید ہے۔

مقدار: ۲۰ سے ۵۰ ملی گرام روزانہ وریڈی ۱ سے ۳ ملی گرام عضلاتی ۵ سے ۱۰ ملی گرام لگائیں۔

منفی افعال: C/1 غنودگی کی حالت، بے ہوشی جگر کی خرابی اور دماغ کے ماؤف ہونے میں استعمال نہ کرائیں۔

مضر اثرات: نظام عصبی میں خلل، سستی کاہلی، لو بلڈ پریشر خون کے تناسب میں فرق بصارت میں



فرق جگر کے افرازات میں کمی ہو سکتی ہے۔ گہری نیند آنا۔

احتیاط: معمر افراد میں، امراض قلب میں، پارکنسن ڈیزیز میں حمل رضاعت اور مرگی میں اور زیادہ مقدار میں دینے سے احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، نظام عصبی کوست کرنے والی دواؤں کے ساتھ دینا مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

SIQUIL

(SARABHAI) 10mg: 10: Rs.7.43

سکوئل ٹبلٹ  
سکوئل انجکشن

SIQUIL INJ

(SARABHAI)

1ml: Rs.4.93 10ml vial: Rs.13.93

دافع پارکنسنز دوائیں

**ANTI PARKIN SON DRUGS**

**AMANTA DIN**

امان ٹاؤن

افعال: پارکنسن علامیہ ہاتھ پیر کپکپانا، چہرہ بے رونق، اواز باریک اور آہستہ نکلنا، عضلات پھڑکنا، سر اور جسم آگے کو جھک جانا انگوٹھے ہتھیلی سے لگ جانا گھٹنے مڑ جانا، مریض کا لڑکھڑا کر چلنا کبھی گر جانا، جسم میں سونیاں چبھنا، گرمی کا احساس ہونا، دماغی ورم Ince Phalitis کے بعد ہونے والا پارکنسن علامیہ میں مفید ہے۔

مقدار: ۱۰۰ ملی گرام روزانہ ناشتہ کے بعد ۵ سے ۷ دن بعد کوئی افاقہ نہ ہو تو دوپہر کے کھانے کے بعد ۱۰۰ ملی گرام اور دینا چاہیے۔

منفی افعال: C/1 دوا سے حساس مریضوں کو اور حالت حمل میں نہ دی جائے۔

احتیاط: اگر دماغی عروق میں تسد ہو، نفسیاتی بیماریاں اور مرگی کی ہسٹری پائی جاتی ہو تو اس کو استعمال نہ کرائیں۔



## تجارتی مرکب

AMANTREL

(PROTEC) 10: Rs.30.00

امان ٹرل

**BENZ HEXOL HCL**

بنز ہکسول ہائیڈروکلورائیڈ

افعال: جسم کانپنا، غیر ارادی حرکات، ناچنے کودنے ریسرپین، فینو تھیازین کی خراب علامات میں مفید ہے۔

منفی افعال: کوما، غنودگی، بے ہوشی، جگر کے امراض، مخ العظام کی خرابی ضعف و اضمحلال میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: خشکی، بصارت میں فرق، چکر آنا متلی، الجھن گھبراہٹ۔

احتیاط: معمر افراد میں شرائین کی سختی، وجع القلب میں اور طویل مدت تک علاج سے احتیاط برتنا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

BENZYDOL-5

(LA PHARMA)

بنزائی ڈول-۵

Haloperidol 5mg Benzhexol 2mg tabs 10: Rs.12.91

PARNON

(SIGMA LABS) 2mg: tabs: 10: Rs4.54

پارن

**BIPERIDEN HCL**

بائی پری ڈین

افعال: نظام عصبی پر دباؤ، پارکنسن علامیہ، دواؤں کے اثرات سے ہونے والی غیر ارادی اور غیر طبعی حرکات دماغی چوٹ، صدمات سے ہونے والی غیر ارادی حرکات درد شقیقہ نکوٹین کے اثرات بد میں مفید ہے۔

مقدار: اعلیٰ گرام ۲ سے ۳ مرتبہ یومیہ رفتہ رفتہ مقدار بڑھائی جائے ۴ ملی گرام تک دے سکتے ہیں ۲ سے

۵ ملی گرام عضلاتی یا آہستہ وریدی شدید حالتوں میں ۱۰ سے ۲۵ ملی گرام عضلاتی یا وریدی بہت آہستہ۔

منفی افعال: C/1 گلوکوما اور آنتوں کی خرابی میں نہ دی جائے۔

مضر اثرات: خشکی، بصارت میں فرق پیشاب میں کمی یا رکاوٹ ورم غدہ قدامیہ منہ خشک رہنا۔



احتیاط: وجع القلب، دورہ پڑنے کا رجحان، حمل، ورم غدہ قدامیہ میں احتیاط برتیں۔  
دواؤں کے ساتھ رد عمل: نظام عصبی کو کمزور کرنے والی ادویہ پارکنسن دواؤں کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

<b>DYSKINON</b>	(BOEHRINGER-M) 10: Rs. 16.50	ڈس کے نن ٹیبلٹ
<b>DYSKINON INJ</b>	(BOEHRINGER-M)	ڈس کے نن انجکشن
5mg per ml; Rs. 9.86		

## BROMOCRIPTINE

## برومو کریپ ٹین

افعال: پارکنسن ڈیزیز، بندش حیض، دودھ کی زیادتی عورتوں کی بانجھ پن میں مفید ہے۔  
مقدار: ۲۵ ملی گرام روزانہ ہمراہ غذا، ۱۴ سے ۲۸ دن بعد ۵۵ ملی گرام کر دینا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ ۱۰۰ ملی گرام یومیہ دے سکتے ہیں۔

منفی افعال: دوا سے حساس مریضوں کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: قے متلی، درد سر، قبض چکر آنا، لو بلڈ پریشر اور خشکی۔

احتیاط: جو عورتیں حاملہ ہونا نہ چاہتی ہوں، حمل کے دوران، زخم معده ذیابیطیس جگر اور گردوں کے امراض میں اس کا استعمال احتیاط سے کریں دوا کے دوران ڈرائیوری کرنا مشنری چلانا نہیں چاہیے۔  
دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب اور ارگٹ کے مرکبات کے ساتھ اس کا استعمال نہ کریں۔

## تجارتی مرکبات

<b>BROM-INGA</b>	(INGA) 10: Rs. 70.77	بروم انگا
<b>PRAVIDEL</b>	(SANDOZ)	پراویڈل
<b>PROCTINAL</b>	(BIDDLE SAWYER)	پراکٹینال
2.5mg: 10: Rs. 107.50		
<b>SEROCRYPTIN</b>	(SERUM INSTITUTE)	سرو کریپ ٹین
2.5mg tabs 2x5; 110.00		



## CARBIDOPA

## کاربی ڈوپا

افعال: پارکنسنز کی علامات میں مفید ہے۔

مقدار: بالغوں کو ۲۵ ملی گرام ۱۰۰ گرام لووڈوپا کے ساتھ دی جائے عموماً دونوں کا مرکب ملتا ہے۔

منفی اثرات: گلوکوما میں اور جلد کے امراض میں دینا نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: متلی، قے، بھوک کی کمی، بلڈ پریشر کم ہونا، حرکات غیر ارادی ہونا پیشاب کی رگت میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: دواؤں کے امراض میں مزمن گلوکوما میں۔ بیہوشی کی حالت میں دمہ بلغمی میں جگر گردوں کے امراض میں، زخم معدہ کی ہسٹری میں، حمل ایام رضاعت میں ۱۸ سال سے کم عمر میں، احتیاط رکھیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: بلڈ پریشر کم کرنے والی ادویہ، فیرس سلفیٹ کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

SYNDOPA 275	(SUN PHARMA) 10: Rs.60.21	سن ڈوپا ۲۷۵
SYNDOPA 110	(SUN PHARMA) 10: Rs.31.50	سن ڈوپا ۱۱۰
SYNDOPA PLUS	(SUN PHARMA) 10: Rs.53.97	سن ڈوپا پلس
TIDOMET FORTE	(TIDE) 10: Rs.52.55	ٹڈومت فورٹ
TIDOMET PLUS	(TIDE) 10: Rs.49.20	ٹڈومت پلس
TIDOMET L.S.	(TIDE) 10: Rs.32.00	ٹڈومت ایل ایس

## LEVODOPA

## لووڈوپا

## L. DI HYDROXY PHENYL ALAMINE

## ایل ڈی ہائیڈروکسائی فینائل ایلامین

افعال: ہر قسم کے پارکنسن سین علامیہ میں دماغی ورم انسفلائی ٹس تسد عروق دواؤں کے اثر سے ہونے والی پارکنسن کی علامات میں مفید ہیں۔

مقدار: پہلی خوراک ۵۰۰ ملی گرام یومیہ ہر ہفتہ ۲۵۰ ملی گرام کا اضافہ کیا جائے ۳ گرام تک دے سکتے ہیں۔



منفی افعال: C/1 شدید عوارض میں، گلوکوما اور مہلک رسولیوں میں دینا منع ہے۔  
 مضر اثرات: متلی قے، عدم اشتہا، لو بلڈ پریشر نظام عصبی میں خلل، حرکات غیر ارادی پیشاب کا  
 رنگین ہونا۔  
 احتیاط: قلب و جگر گردوں اور پھیپھڑوں اور امراض غدو میں، زخم معدہ گلوکوما، اور حمل میں احتیاط  
 برتن۔  
 دواؤں کے ساتھ رد عمل: بلڈ پریشر کم کرنے والی ادویہ، پائی ری ڈاکسن اور فیرس سلفیٹ کے  
 ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

### تجارتی مرکبات

<b>BENSPAR</b>	(ALIDAC) 10: Rs.45.22	بن سار
<b>BIDOPAL</b>	(BIDDLE SAWYER)	بڈوپال
500mg tabs 10: Rs.24.48		
<b>LEVODOPA AND CARBIDOPA TABS</b>	(NEON)	لووڈوپا اینڈ کاربی ڈوپا
<b>LEVOPA</b>	(WALLACE) 500mg 10: Rs.26.00	لووڈوپا
<b>PARKIMET 275</b>	(BIDDLE SAWYER) 10: Rs.59.85	پارکی میٹ ۲۷۵
<b>SYNDOPA 275</b>	(SUN PHARMA) 10: Rs.60.21	سن ڈوپا ۲۷۵
<b>SYNDOPA 110</b>	(SUN PHARMA) 10: Rs.31.50	سن ڈوپا ۱۱۰
<b>SYNDOPA PLUS</b>	(SUN PHARMA) 10: Rs.53.97	سن ڈوپا پلس
<b>SYNDOPA CR</b>	(ALBERT DAVID) 10: Rs.100.00	سن ڈوپا سی آر
<b>TIDOMET FORTE</b>	(TIDE)	ٹڈومیٹ فورٹ
Levodopa 250mg carbidopa 25mg tabs; 10: Rs.52.55		
<b>TIDOMET L.S.</b>	(TIDE) 10: Rs.32.00	ٹڈومیٹ ایل ایس
<b>TIDOMET PLUS</b>	(TIDE) 10: Rs.49.20	ٹڈومیٹ پلس

### ORPHENADRINE HCL آر فیناڈرین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال: پارکنسن ڈیزیز، دواؤں کے اثر سے ہونے والی پارکنسن علامیہ میں مفید ہے۔  
 مقدار: ۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار، تیسرے دن ۵۰ ملی گرام کا اضافہ کیا جائے زیادہ سے زیادہ ۴۰۰ ملی  
 گرام دے سکتے ہیں۔



منفی افعال: گلوکوما، ضعف و نقاہت، ورم غدہ قدامیہ میں دینا مضر ہے۔  
 مضر اثرات: جگر اور معدہ کی رطوبات کی پیدائش میں کمی، دماغی الجھن غصہ زیادہ مقدار میں نقصان دہ ہے۔ جلد پر داغ پڑ سکتے ہیں۔  
 احتیاط: معدہ اور امعاء کے تسد میں، اور امراض قلبیہ میں احتیاط برتیں، دوا آہستہ آہستہ بند کریں۔  
 دواؤں کے ساتھ رد عمل: فینوتھیزین، دافع حساسیت، مسکن دماغ ادویہ کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

### تجارتی مرکبات

ORPHAMOL (TORRENT) 10: Rs.7.50 ارفامول  
 ORPHAMOL FORTE (TORRENT) 10: Rs.10.50 ارفامول فورٹ  
 ORPHIPAL (BIDDLE SAWYER) 50mg tabs 10: Rs.12.90 آر پی پال

**PROCYCLEDINE HCL** پرو سائیکلی ڈین ہائیڈرو کلورائیڈ

افعال: یہ ایک مانع افزا دوا ہے ہر قسم کے پارکنسن میں مفید ہے۔  
 مقدار: ۵ء ۲ ملی گرام ۳ بار کھانے کے بعد ۳ دن بعد ۵ء ۲ ملی گرام کے حساب سے اضافہ کیا جائے  
 زیادہ سے زیادہ مقدار خوراک ۳۰ ملی گرام  
 منفی افعال: C/1 حرکات ارادی خلل

مضر اثرات: مانع افزا معدہ و جگر، زیادہ مقدار میں دینا مضر ہے۔

احتیاط: گلوکوما، حمل ورم غدہ قدامیہ، امراض قلبیہ میں۔ دوا آہستہ آہستہ بند کریں۔  
 دواؤں کے ساتھ رد عمل: فینوتھیزین، انٹی ہسٹامین اور مسکن دماغ کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

### تجارتی مرکبات

KEMADRIN (BURROUGHS WELLCOME) کیماڈرین  
 2.5mg, 10: Rs.7.11



## SELEGILENE HCL

## سیلی گی لین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: پارکن سن ڈیزیز میں مفید ہے۔ اس کو تنہا یا لووڈوپا کے ساتھ استعمال کرایا جاتا ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۱۰ ملی گرام صبح کو ایک خوراک ناشتہ کے بعد یا دو خوراکیوں میں تقسیم کر کے ناشتہ اور  
دوپہر کے کھانے کے بعد۔

منفی افعال: C/1 وہ مریض جن کو دورے پڑتے ہوں، اور بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔  
مضر اثرات: لو بلڈ پریشر، حرکات غیر ارادی، متلی الجھن گھبراہٹ نفسیاتی عوارض۔  
احتیاط: حمل، ایام رضاعت اور ۱۶ سال سے کم عمر والوں کو نہیں دینا چاہیے۔  
دواؤں کے ساتھ رد عمل: مہر یڈین اور Maol کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

ELDEPRYL	(THEMIS CHEMICALS)	ایل ڈپرائل
10mg: 10: Rs.65.80		
ELEGELIN	(SUN PHARMA) 5mg tabs: 10; Rs.35.00	ایلی گے لن
JUMEX	(TORRENT) 5mg tabs 10: Rs.39.00	جو میکس
SELGIN TABS	(INTAS) 5mg 10: Rs.35.30	سیل گن ٹبلیٹ
SELERIN-5	(PROTEC) 5mg: tabs: 10: Rs.24.00	سیل رین

## ٹرائی ہگزائی فینائیڈل ہائیڈروکلورائیڈ

## TRIHXY PHENIDYL HCL

افعال: پارکن سن ڈیزیز کے علاج میں دوسری دواؤں کے ساتھ ملا کر دی جاتی ہے۔  
مقدار: پہلے دن ۱۰ ملی گرام ہر تیسرے دن ۱۰ ملی گرام کا اضافہ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ۶ سے ۱۰ ملی گرام  
کھانے کے ساتھ استعمال کرائی جائے۔

منفی افعال: C/1 گلوکوما میں آلات ہضم اور آلات بول کے تسد دورم غده قدامیہ میں دینا منع ہے۔  
مضر اثرات: منہ خشک، بصارت میں فرق، چکر آنا، معمولی متلی بے چینی، قبض پیشاب میں تنگی یا  
رکاوٹ، وجع القلب پتلی کا پھیل جانا، آنکھوں میں تناؤ دوسر، الجھن بکواس کرنا



احتیاط: معمر افراد میں، تصلب شرائین کے مریضوں اور وجع القلب کے مریضوں میں احتیاط برتنی۔  
دواؤں کے ساتھ رد عمل: فینوتھیزین انٹی ہشامین اور مسکن دماغ ادویہ کے ساتھ اس کا استعمال  
مضر ہے

## تجارتی مرکبات

BEXOL	(INTAS) 2mg tabs 10: Rs.3.50	بکسول
COMBIDOL -1.5	(INTAS) 10: Rs.5.20	کبھی ڈول ۱.۵
COMBIDOL -5	(INTAS) 10: Rs.11.00	کبھی ڈول ۵
COMBIDOL -10	(INTAS) 10: Rs.18.00	کبھی ڈول ۱۰
EMETIL PLUS	(LA PHARMA) 10 tabs; Rs.11.40	ایمی ٹل پلس
EMETIL DS	(LA PHARMA) 10 tabs; Rs.18.00	ایمی ٹل ڈی ایس
HEXIDOL	(TORRENT) 10: Rs.6.90	ہیکسی ڈول
HEXIDOL PLUS	(TORRENT) 10: Rs.18.90	ہیکسی ڈول پلس
HEXIDOL FORTE	(TORRENT) 10: Rs.21.31	ہیکسی ڈول فورٹ
HEXINAL	(TORRENT) 10: Rs.2.73	ہیکسی نال
LACALM PLUS	(LA PHARMA) 10: tabs: Rs.5.00	لاکالم پلس
LACALM FORTE	(LA PHARMA) 10: tabs: Rs.8.50	لاکالم فورٹ
LAHEXY	(LA PHARMA) 10: Rs.3.00	لاہیکسی
NEOCALM PLUS	(INTAS) 10 tabs Rs.3.80	نیوکالم پلس
NEOCALM FORTE	(INTAS) 10 tabs Rs.9.60	نیوکالم فورٹ
PACITANE	(LEDERLE) 10: Rs.7.40	پاسی ٹین
PARKIN	(MICRO LABS)	پارکن
TRAZINE-H	(SUN PHARMA) 10 tabs Rs.3.19	ٹرازائن ایچ
TRAZINE-SC	(SUN PHARMA) 10 tabs Rs.7.99	ٹرازائن ایس سی
TRINICALM PLUS	(TORRENT) 100 tabs Rs.39.00	ٹرائیکالمنی کام پلس
TRINICALM FORTE	(TORRENT) 100 tabs Rs.55	ٹرائیکالمنی کام فورٹ
TRINORM-1.5	(SUN PHARMA)	ٹرائیکالمنی نارم ۱.۵
Trihexyphenidyl hcl 2mg, haloperidol 1.5mg tabs; 10 tabs Rs.9.55		ٹرائیکالمنی نارم ۵
TRINORM-5	(SUN PHARMA) 10 tabs Rs.19.50	ٹرائیکالمنی نارم ۱۰
TRINORM-10	(SUN PHARMA) 10 tabs Rs.28.00	ٹرائیکالمنی نارم ۱۰
TRIPHEN	(SUN PHARMA) 10 : Rs.3.06	ٹرائیکالمنی فین



TRIPHENAZIN (SUN PHARMA) 10:Rs.7.67

ٹرائی فینازین

PIRIBEDIL

پائی ری بی ڈل

افعال: پارکنسن ڈیزیز میں مفید ہے۔ دماغ اور حافظہ کی کمزوری چکر آنا، دماغی چوٹ صدمات میں مفید ہے۔

مقدار: ۵۰ سے ۲۰۰ ملی گرام روزانہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے، مرض کی کیفیت اور دوا کے اثرات کے مطابق دوا کی مقدار میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔

منفی افعال: C/1 شدید قلبی دباؤ، وجع القلب، ہارٹ ایک حالت حمل میں نہیں دینا چاہیے۔  
مضر اثرات: نظام ہضم میں معمولی خلل

دواؤں کے ساتھ رد عمل: ڈوپامائی نرجک اور اینٹاگونسٹ دواؤں کے ساتھ نہ دی جائے۔

تجارتی مرکبات

TRIVASAL L.A.

(SERDIA)

ٹرائی وصال۔ ایل۔ اے

Piribedil 50mg; tabs 10: Rs.130.81

دافع بخار اور مسکن درد دوائیں

**ANTIPYRETICS and ANALGESIC**

دافع درد وہ ادویہ ہیں جو اپنی خاصیت سے دماغ کے درد محسوس کرنے والے حصے کے احساس کو کم کر دیتی ہیں۔ دافع بخار ادویہ جسم کے درجہ حرارت کو قائم رکھنے والے مرکز پر اثر انداز ہو کر اس کی زائد حرارت کو دور کرتی ہیں۔

ANALGIN

انالجنین

افعال: ایک دافع بخار مسکن درد دوا ہے ہر قسم کے درد، بخار، درد سر جسم کے کسی حصہ میں ہونے والے درد گتھیائی بخار اور عصبی درد کمر کے درد میں مفید ہے۔



مقدار: ۵۰۰ ملی گرام سے اگر ام ہر ۸ گھنٹہ بعد انجکشن عضلاتی اگر ام دن میں ۲ بار۔  
 منفی افعال: پائی روزنوں سے حساس مریضوں میں نبض ضعیف دور ان خون ست اور جگر کی کمزوری  
 میں، ۳ ماہ یا ۵ کلو وزن سے کم بچوں کو نہ دی جائے۔  
 مضر ماثرات: خون میں سفید ذرات کی کمی، صدمہ کی کیفیات، ری ایکشن پیشاب سرخ، بلڈ پریشر کم  
 ہونے کی کیفیت ہو سکتی ہے۔  
 احتیاط: خون کے سفید ذرات کی جانچ کراتے رہیں۔ حمل اور نفٹ الدم (خون تھوکنے) میں نہیں دینا  
 چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب اور سائیکلو سپورین کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

### تجارتی مرکبات

COMPAIN TABS	(REMEDIES (INDIA) 10: Rs.4.76	کم پین
CENOLGIN SYRUP	(CARMINOL) 60ml 7.50	سی نو جین سرپ
DOLOPAR	(MICRO LABS) 10: Rs.5.60	ڈولوپار
DOLOPAR SYRUP	(MICRO LABS) 60ml: Rs.13.80	ڈولوپار سرپ
KANAMOL	(KENT)	کنامول
OXALGIN	(CADILA) 10: Rs.7.62	اوکسالجین
PROMALGIN	(UNILOIDS) tabs; 10: Rs.2.76	پرومال جین
TOLAGIN	(PHARMED) 10: Rs.6.80	ٹولاجین
TROMALGIN	(LA PHARMA) 10: Rs.4.71	ٹرومال جین
ULTRAGIN SYRUP	(MANNERS) 60ml: Rs.8.39	الٹرا جین سرپ
ZIMALGIN	(RALLIS) 10: Rs. 5.49	زیمالجین

## OPIOIDS

## افیون کے مرکبات (دافع درد)

بوپری نارفین ہائیڈروکلورائیڈ BUPRENORPHINE HCL

افعال: وجع القلب ہر قسم کے درد، آپریشن سے قبل اور بعد کو ہونے والے درد میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۳ ملی گرام عضلاتی یا بہت آہستہ وریدی لگائیں، انجکشن ۸ گھنٹہ بعد دوبارہ



لگا سکتے ہیں زبان کے نیچے رکھ کر چوسنے والی گولی ۵۰۲ ملی گرام ہر ۸ گھنٹہ بعد، گولی چبا کر یا نگل کر نہیں لینا چاہیے۔

مضر اثرات: خشکی متلی قے چکر آنا، پسینہ کی کثرت سانس لینے میں کبھی کبھی تکلیف ہونا۔  
احتیاط: نظام تنفس کی کمزوری میں کمزور اور ناتواں مریضوں میں، دوا کے دوران ڈرائیوری اور مشنری چلانے سے احتیاط برتیں۔  
دواؤں کے ساتھ رد عمل: مرکزی نظام عصبی کو کمزور کرنے والی اور Maol کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

### تجارتی مرکبات

NORPHIN	(UNICHEM) 2ml Rs.8.49	نارفین انجکشن
PENTOREL	(KHANDELWAL) 2ml: Rs.72.65	پن ٹورل
TIDIGESIC	(TDPL) 10: Rs.21.22	ٹائی ڈی جے سک

### CODIEN PHOSPHATES

### کوڈین فاسفیٹ

افعال: ہر طرح کے درد سر کا درد دانت درد پیٹھ کا درد عصبی اور عضلاتی درد اور خشک کھانسی کو روکنے میں مفید ہے۔

مقدار: ۱۵ ملی گرام دن میں ۳-۴ بار۔  
مضر اثرات: غنودگی خشکی، قبض، بے چینی، الجھن، گھبراہٹ قے متلی ہو سکتی ہے۔  
احتیاط: دوا کے دوران مشین چلانا اور ڈرائیوری منع ہے۔

### DEXTRO PROPOXYPHENE

### ڈیکسٹرو پروپاکسی فین

افعال: افیون کے جز سے تیار کردہ مسکن درد دوا ہے مرکزی نظام عصبی پر اثر کر کے درد کو سکون پہونچاتی ہے۔ معمولی اور شدید دردوں پیٹھ کے درد، درد سر، درد شقیقہ، دانتوں کے درد، موج، چوٹ، فریکچر، ہڈیوں کے درد آپریشن کے بعد ہونے والے درد کینسر کے درد اور عضلات کے درد میں مفید ہے۔  
مقدار: بالغوں کو ۶۵ ملی گرام دن میں ۳ سے ۴ بار۔



منفی افعال: حمل، جگر گردوں کے امراض میں استعمال نہ کرائیں۔

مضر اثرات: چکر آنا، نیند آنا، غنودگی، قے، متلی، قبض درد شکم جلد پرداغ کمزوری بصارت میں فرقہ احتیاط: دورہ روکنے والی انٹی ڈپریشن، وارفین، منوم مخدر اور نظام عصبی کو مفلوج کرنے والی دواؤں کے ساتھ احتیاط برتیں۔

## تجارتی مرکبات

ANADEx	(CONCEPT) 12: Rs.7.82	اناڈیکس
BREN-PX	(KOPRAN) 10: Rs.12.48	برین پی ایکس
BUTAPROXYVON	(WOCKHARDT) caps 8: Rs.8.40	بیوٹا پراکسیون
CORBUTYL	(ROUSSEL) 20 tabs: Rs.18.72	کاربوٹائل
PARVON	(JAGSONPAL) caps: 10: Rs.10.75	پارون
PARVON-N	(JAGSONPAL) 100: Rs.50.00	پارون-این
PARVON SPAS	(JAGSONPAL) caps: 10: Rs.12.30	پارون اسپاس
PARVON FORTE	(JAGSONPAL) 10: Rs.17.30	پارون فورٹ
PROXYTAB	(WOCKHARDT) tabs: 10: Rs.6.71	پراسکی ٹیب
PROXYVON	(WOCKHARDT) 8: Rs.9.05	پراسکیون
SPASMO PROXYVON	(WOCKHARDT) 8: Rs.9.70	اسپازمو پراسکیون
SUBDU	(U.S. VITAMIN) 8: Rs.7.02	سب ڈیو
SUDHINOL	(RANBAXY) tabs 10: Rs.11.50	سدھی نال
SYSTAFLAM	(SYSTOPIC) 10: Rs.14.00	سیسٹا فلیم
WALAGESIC	(WALLACE) 10: Rs.11.30	ولے جے سک
WYGESIC	(WYETH) 10: Rs.7.04	وائے جے سک

## PANTANIL

## پنٹائل

افعال: افیون کا مصنوعی مرکب ہے۔ افیون کی طرح مسکن درد اور نیند آور ہے۔ قلب کے آپریشن سے قبل استعمال کرائی جاتی ہے۔

مقدار: بیہوشی کے لئے ۵ سے ۱۵۰ انکمروگرام / فی کلو وزن کے حساب سے درد روکنے کے لئے ۱۰۰ انکمروگرام زیر جلد انجکشن لگایا جائے۔ آپریشن سے قبل ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام عضلاتی انجکشن لگائیں۔



**منفی اثرات:** نظام تنفس کی کمزوری میں، سانس کی نالیوں میں رکاوٹ، دماغ میں بھاری پن لو بلڈ پریشر، ضعف و نقاہت، حساسیت میں اس کے اثرات خراب رونما ہوتے ہیں۔  
**مضر اثرات:** متلی قے سانس میں تنگی، لو بلڈ پریشر، کھجلی سانس رکنا، ہوائی نالی تشنج، سینہ میں درد، پیشاب کم ہونا یا رکنا کبھی دورے پڑنا۔  
**احتیاط:** نظام تنفس پر نگاہ رکھیں، سانس کی تنگی لو بلڈ پریشر اور سینہ کے درد میں احتیاط برتیں۔  
**دواؤں کے ساتھ رد عمل:** مرکزی نظام عصبی (C.N.S.) کو کمزور کرنے والی، دواؤں کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

## تجارتی مرکب

**TROFENTYL (TROIKAA) 5x10ml amp: Rs 625.00** ٹروفین ٹائل  
**MORPHIN SULPHATE** مارفین سلفیٹ

**افعال:** شدید درد، شدید بے چینی، نیند نہ آنے میں مفید ہے۔  
**مقدار:** ۵ ملی گرام عضلاتی انجکشن لگائیں۔  
**مضر اثرات:** خشکی، قے، متلی، ابکائی چکر آنا۔  
**احتیاط:** آلات تنفس کی تکالیف بلغمی ذمہ میں احتیاط برتیں۔  
**دواؤں کے ساتھ رد عمل:** شراب، نظام تنفس کوست کرنے والی ادویہ۔

## تجارتی مرکبات

**MORCONTIN 10/30/60/100 (MODI MUNDI PHARMA)** مارکونٹن  
 10: Rs. 154.00

**MORPHINE INJ. (DEYS) 100x2ml amp. Rs. 250.00** مارفین انجکشن

## PENTAZOCINE

## پنٹازو کین

**افعال:** مارفین کی طرح فوری اثر کرنے والی زبردست دافع درد دوا ہے جو ۴ سے ۶ گھنٹہ تک اپنا اثر رکھتی ہے۔  
**شدید درد عضلاتی درد چوٹ ورم موج آپریشن کے بعد ہونے والا درد قوی لچ اور کینسر کے درد زچگی**



کے درد میں مفید ہے۔

مقدار: خوردنی طور سے ۱۵ سے ۳۰ ملی گرام ہر گھنٹہ بعد عضلاتی انجکشن ۳۰ سے ۶۰ ملی گرام۔ وریڈی ۳۰ ملی گرام بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مفتی اثرات: C/1 دماغی دباؤ بھاری پن سانس کی کمزوری نشہ کے عادی اور سر کی چوٹ میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: نشہ پیدا کرتی ہے۔ چکر آنا، متلی اور بے چینی پیدا کرتی ہے۔

احتیاط: حمل، پھیپھڑوں جگر اور گردوں کی تکالیف میں قلبی درد قبل از ولادت اور نارمل سیلان کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، نشلی ادویہ، اور MAOI کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

## تجارتی مرکبات

CINEPAR	(DEEPHARMA) tabs 6: Rs.11.50	سائی نی پر
DYMIC	(GLENMARK) caps 6: Rs.10.59	ڈائی مک
EXPERGESIC	(WIN MEDICARE) 10: Rs.49.50	ایکسپر جے سک
FORACET	(RANBAXY) 12: Rs.18.13	فوراسٹ
FORTAGESIC	(WIN MEDICARE) 10: Rs.49.50	فورٹا جے سک
FORTWIN	(RANBAXY) 8x1 ml amps: Rs.53.77	فورٹون انجکشن
FORTWIN TABS	(RANBAXY) 12 tabs: Rs.27.25	فورٹون ٹبلیٹ
PENTALGIN INJ	(P&B LABS) amp Rs.10.20	پن ٹال جن انجکشن
PENTAWIN	(BIOCHEM) 1ml: Rs.7.00	پنٹا وین
PENTAVON	(JAGSONPAL) 1ml: Rs.4.15	پنٹا وون
PENTAZOCINE INJ	(PREMPHARMA) 1ml: Rs.7.15	پنٹازو کین انجکشن
PENZYL	(SIGMA LABS) 10ml vial: Rs.72.98	پن زائل
SOSEGON TABS	(WIN MEDICARE)	سوسی گن ٹبلیٹ
25mg tabs 10: Rs.20.89		



**PETHIDINE HCL****پیتھی ڈین ہائیڈروکلورائیڈ**

افعال: درد دور کرنے بیہوشی کی دوا استعمال کرنے سے قبل، زچگی کے درد کو دور کرنے دمہ کا دورہ روکنے میں مفید ہے۔

مقدار: ۲۵ سے ۱۰۰ ملی گرام زیر جلد یا عضلاتی انجکشن لگائیں وریڈی ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام۔

**PARACETAMOL****پیرا سیٹامول**

افعال و منافع: دافع درد و بخار دوا ہے، سردرد، شقیقہ عضلاتی درد دانت کے درد، حلق کی خراش، وجع الفاصل نزلہ زکام ایام حیض کے درد میں مفید ہے۔

مقدار: بالغوں کو ۵۰۰ ملی گرام سے اگر ام تک دن میں ۲-۳ بار زیادہ سے زیادہ دن بھر میں ۴ گرام بچوں کو عمر کے مطابق ۳ ماہ سے کم عمر کے بچوں کو نہ دی جائے۔

منفی افعال: پیرا سیٹامول سے حساس مریضوں کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: بد ہضمی، متلی، جلد پر داغ پڑنا، خون میں غیر طبعی تبدیلیاں۔

احتیاط: جگر اور گردوں کے مریضوں میں احتیاط لازم ہے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: دافع انجماد خون دواؤں کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

**تجارتی مرکبات**

APYRIN	(LIFE) 60ml: Rs.7.48	اپائی رین
BEPAMOL TABS	(BIOLOGICAL E) 10: Rs.3.10	بپامول ٹبلیٹ
BEPAMOL SYRUP	(BIOLOGICAL E) 60ml: Rs.8.50	بپامول سرپ
CENOLGIN SYRUP	(CARMINOL)	سینال جن سرپ
Paracetamol I.P. 62.5mg & Analgin I.P. 62.5mg per 5ml; 60ml	Rs.7.50	
COFAMOL SYSP	(CFL) 60ml Rs.13.93	کوفامول
DYMIC	(GLENMARK) 6 caps: Rs.10.59	ڈائی مک
FAL 650	(FALMA) 10: Rs.5.46	فال ۶۵۰
FALMADOL	(FALMA) 10: Rs.3.51	فال ماڈول
FALMADOL SUSP	(FALMA) 450ml: Rs.30.10	فال ماڈول سرپ



FEBREX	(INDOCO) 10: Rs.4.00	فیبریکس
FEBREX SUSP	(INDOCO) 60ml bottle: Rs.11.30	فیبریکس سرپ
FEBREX 250 SUSP	(INDOCO) 60ml: Rs.12.95	فیبریکس سرپ ۲۵۰
FEBRINIL INJ	(SIGMA LABS) 15ml vial: Rs.15.29	فیبریئل
FEVASTIN SUSP	(TABLETS INDIA) 60ml bottle	فیواستین
FORACET	(RANBAXY) 12: Rs.18.13	فوراسیٹ
HORMOPIRIN	(J & J DECHANE) 500: Rs.95.00	ہارموپائیرین
MALIDENS	(NICHOLAS) 10: Rs.4.31	مالیڈین
METAMOL	(BDH) 10: Rs.6.00	مینامول
METAMOL SYRUP	(BDH) 450ml: Rs.41.00	مینامول سرپ
METOPAR	(CFL) 10: Rs.4.90	میناپار
METOPAR SYRUP	(CFL) 60ml: Rs.8.75	میناپار سرپ
MOLIN	(PHARMACIA) 450ml: Rs.24.25	مولین
NEOFEBRINTABS	(NEO PHARMA) 10: Rs.9.95	نیو فیبرین ٹیبلٹ
NEOMOL INJ	(NEON) 10x2ml amps; Rs.55.00	نیو مول انجکشن
PHERIMOL TABS	(P & B LABS) 10: Rs.6.05	فیبری مول
PROXYTAB	(WOCKHARDT) 10: Rs.6.63	پراکسی ٹیب
PYRIGESIC	(EAST INDIA) 60ml: Rs.9.95	پائیری جے سک
PYROSED	(PFIMEX) 60ml: Rs.11.25	پائیریوسڈ
SINUMOL TABS	(P & B LABS) 10: Rs.9.08	سائینی مول
SOPARIN-KID	(KLARSEHEN) 10: Rs.2.35	سوپارین
TWC30	(ETHNOR) 6: Rs.24.68	ٹی ڈبلوسی
WALAGESIC	(WALLACE) 10: Rs.11.30	ولے جے سک
WYGESIC	(WYETH) 10: Rs.7.04	وائی جے سک
ZIMALGIN	(RALLIS) 10: Rs.5.49	زیمالجین

## TRAMODOL HCL

## ٹراموڈول ہائیڈروکلورائیڈ

افعال: معمولی اور شدید دردوں کو روکنے، آپریشن کے درد کو روکنے اور کسی بھی طرح کے درد کو سکون دینے کے لئے مفید ہے۔

مقدار: ۱۴ سال سے زائد عمر والوں کو ۱۰۰ ملی گرام عضلاتی یا زیر جلد یا وریدی آہستہ آہستہ لگائیں۔



بوہل میں ملا کر بھی دے سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ۴۰۰ ملی گرام تک دے سکتے ہیں۔  
**منفی افعال:** شراب کے نشے کی حالت میں، بے چینی الجھن دور کرنے والی دواؤں کے بعد دینا مضر ہے۔  
**مضر اثرات:** پسینہ کی زیادتی، چکر آنا، متلی قے، منہ خشک، بے چینی کبھی دورے پڑنا سانس اور قلب میں تکلیف محسوس ہونا عادت پڑنا۔  
**احتیاط:** دوا سے حساس مریضوں کو دورہ کی ہسٹری میں حمل اور ایام رضاعت میں، دوا کے بعد ذرا بیوری کرنے اور مشنری چلانے سے احتیاط برتیں۔  
**دواؤں کے ساتھ رد عمل:** ڈپریشن دور کرنے والی ادویہ MAOI ادویہ کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

**CONTRAMAL**

(S.G.PHARMA)

کانٹرامل

1ml: Rs.13.91; 2ml: Rs.25.68

**TRAMAZAC**

(CADILA) 1ml amp Rs.8.10

ٹرامازیک انجکشن

**TRAMAZAC CAPS**

(CADILA) caps 10: Rs.58.10

ٹرامازیک کپسول

**TRASIC**

(KOPRAN) caps 10x10 Rs.550.10

ٹراسک کپسول

مرکزی نظام عصبی کو متحرک کرنے والی ادویہ

**C.N.S. STIMULANTS**

**CODERGO CRINE MESYLATE** کوڈرگو کرائن می سائی لیٹ

**افعال و منافع:** معمر لوگوں کے ضعف دماغ اور اضمحلال میں مفید ہے حافظہ کی کمزوری دماغی صلاحیت میں کمی، موڈ کی خرابی، غیر مہذب حرکات کرنا اور معمولات میں فرق ذاتی بے توجہی چکر آنے درد سر، دماغی امراض، درد شقیقہ اور ہائی بلڈ پریشر کی علامات میں مفید ہے۔  
**مقدار و ترکیب:** ۳ سے ۶ ملی گرام کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے کھانے سے قبل استعمال کرائیں۔



ڈرپ کے ذریعہ ۰.۳ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے چڑھائیں ۰.۳ ملی گرام عضلاتی یا زیر جلد لگائیں۔

منفی افعال: دوائے حساس مریض اور پرانے مالنحو لیا کی مریضوں میں استعمال نہ کرائیں۔

مضر اثرات: ہاضمہ کی خرابی، جلد کا سرخ ہونا، ناک بند ہونا، ہاتھ پیر اینٹھنا، درد سر۔ چکر آنا، کھانے کے ساتھ دوا استعمال کرنے سے مضر اثرات میں کمی۔

احتیاط: سینہ کے شدید درد میں

دواؤں کے ساتھ رد عمل: کیفین کے ساتھ خراب رد عمل ہوتا ہے۔

### تجارتی مرکبات

HYDERGINE (SANDOZ) 3x10: tabs Rs.344.00 ہائیڈر جین ٹبلیٹ

HYDERGINE INJ (SANDOZ) 6x1ml Rs.90.00 ہائیڈر جین انجکشن

### ERGOLOID MESYLATE ارگولائیڈ میسائی لیٹ

افعال: دماغی افعال میں سستی کاہلی، موڈ کی کیفیت طاری ہونا، دماغ کے نارمل حالت میں نہ ہونے پر یہ دوا فائدہ پہنچاتی ہے۔

مقدار: اٹلی گرام دن میں ۳ بار

منفی اثرات: دوائے حساس اور الجھنوں میں مبتلا مریضوں کو استعمال کرانا مضر ہے۔

احتیاط: خون میں اور فائبرین کی زیادتی میں احتیاط برتنا چاہیے۔

### تجارتی مرکب

CERELOID (SUN PHARMA) 10 tabs Rs.90.10 سیری لائیڈ

### PIRACETAM پائی راسی ٹام

افعال: یہ دوا دماغی نظام Metabolism کو درست کر کے نظام عصبی میں تیزی پیدا کرتی ہے۔

دماغی کمزوری، بچوں کی یادداشت میں کمی معمر لوگوں کی دماغی کیفیات میں خرابی، دماغی چوٹ صدمات



دماغی پوٹ سے ہونے والی بے ہوشی، حرکی اعصاب کے فعل میں کمی، دماغی کمزوری نفسیاتی الجھنوں میں مفید ہے۔

مقدار: ہانگوں میں پہلی خوراک ۸۰۰ ملی گرام پھر ۴۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار بچوں کو ۲۰۰ ملی گرام / فی کلو گرام کے حساب سے ۳ خوراکوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔

منفی افعال: حمل جگر گردوں اور قلب کے امراض میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: نفسیاتی خرابیاں، ضدی، جھٹ کرنا جنسی تحریک پیدا ہونا۔

احتیاط: گردوں جگر اور قلب کے مریضوں میں احتیاط برتیں۔

## تجارتی مرکبات

CERECETAM	(INTAS) 10: Rs.16.50	سیری سی نام
NOOTROPIL	(UNI-UCB) 5x5ml amp: Rs.133.15	نوٹروپیل
NORMABRAIN	(TORRENT) 100ml: Rs.70.90	نورما برین
PIRATAM	(BIDDLE SAWYER) 60ml: Rs.61.20	پائی رائٹام

## PIRIBEDIL

## پائی ری بیڈل

افعال: معمر لوگوں میں دماغی کمزوری، ضعف، واضمحلال، یادداشت اور کام کرنے کی صلاحیت میں کمی، دماغی کام میں کوتاہی کان بچنا، سستی چکر آنا حادثات سے ہونے والے دماغ پر خراب اثرات میں مفید کام انجام دیتی ہے۔ پارکنسن ڈیزیز میں مفید ہے۔

مقدار: ۵۰ ملی گرام دن میں ۱ بار شدید حالتوں میں دن میں ۲ بار کھانے کے ساتھ۔

منفی افعال: امراض قلب غشی، حمل میں دینا نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: ہضم میں خرابی

دواؤں کے ساتھ رد عمل: نظام عصبی کو تحریک پہنچانے والی ادویہ کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

## تجارتی مرکب

TRIVASTA L.A.	(SERDIA)	ٹری وسٹا ایل اے
Piribedil 50mg tabs 10: Rs.130.81		



## پائی ری ٹی نال ڈائی ہائیڈرو کلورائیڈ مونو ہائیڈریٹ

### PYRITINAL DIHYDROCHLORIDE MONOHYDRETE

افعال: بچوں میں دماغی نشوونما کی کمی، دماغی صدمات، دماغ میں آکسیجن کی رسید کم ہو چکنا، دماغی افعال کو متحرک کرنے میں مفید و معاون ہے۔

مقدار: ۱۰۰ ملی گرام سے ۲۰۰ ملی گرام بچوں کو عمر کے مطابق علاج کئی ہفتوں جاری رکھنا چاہیے۔  
مضر اثرات: جلد پر داغ پڑنا، جگر کے افرازات کی زیادتی بھوک کی زیادتی نیند میں خلل اور کبھی کبھلی محسوس ہوتی ہے۔

احتیاط: چھوٹے بچوں سے احتیاط رکھیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: لوامی سول، گولڈ کے مرکبات اور ڈی پینسلامین کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

### تجارتی مرکبات

ENCEPHABOL

(MERCK) 10: Rs.75.01

این سی قابول

ENCEPHABOL INFUSION

(MERCK)

این سی قابول انفیوژن

2ml twin pack Rs.16.05

ENCEPHABOL SUSP

(MERCK) 100ml: Rs.81.82

این سی قابول سرب

نشہ کی عادت چھڑانے والی ادویہ

DRUGS FOR DRUG DEPENDENT

DI SULFIRAM

ڈائی سلفی ریم

افعال: یہ دوا شراب کو خون میں جذب ہونے سے روکتی ہے۔ شراب کی عادت چھڑانے میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: ڈاکٹر کی نگرانی میں دوا دینی چاہیے پہلے پیٹ کی صفائی کریں پہلے دن ۱ گرام دوسرے دن ۳/۴ گرام تیسرے دن ۵/۶ گرام چوتھے دن ۵/۶ گرام دی جائے پھر اس کی شراب کی خواہش



نوٹ کی جائے اگر ضرورت ہو ۵۰ گرام روزانہ جب تک مریض ٹھیک نہ ہو جائے۔

منفی افعال: C/1 علاج کے دوران الکحل کا کسی بھی صورت میں ٹانک کف سرپ میں بھی استعمال نہ کیا جائے، ذیابیطیس، تھائرایڈ ایکسٹریکٹ کی کمی، مرگی، دماغی کمزوری ورم گردہ اور جگر کی خرابی میں استعمال نہ کرائیں۔

مضر اثرات: الجھن، بے چینی، جنسی قوت میں کمی الرجی، چکر آنے کی شکایت ہو جاتی ہے دوا جاری رکھنے سے علامات ختم ہو جاتی ہیں۔

احتیاط: دوران علاج شراب سے قطعی پرہیز کریں۔

### تجارتی مرکبات

ANTADICT	(INTAS) Disulfiram 250mg 10: Rs.6.88	نٹاڈکٹ
DISULFIRAM	(INTAS) 10: Rs.11.00	ڈائی سلفی رام
ESPERAL	(TORRENT) 10: Rs.10.82	پسیرال

### ٹٹرائی تھائل تھایورم ڈائی سلفائیڈ

### TETRA ETHYL THIURAM DISULPHIDE

تھال: یہ دوا شراب کے عادی مریضوں کی عادت چھڑانے میں کام کرتی ہے۔ اس سے مریض پر سانس بے خودی طاری ہو جاتا ہے۔

نڈار: ابتدائی خوراک اسے ۵۰ گرام روزانہ ۲-۳ دن تک پھر حالات اور مزاج کے لحاظ سے ۵۰۰ ملی ام روزانہ یہ دوا ڈاکٹر کی نگرانی میں استعمال کرائیں۔

فی افعال: شدید قلبی امراض، حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں نفسیاتی عوارض میں مبتلا افراد کو استعمال نہ کریں۔

مضر اثرات: جلد پر داغ پڑنا، خشکی، کاپلی، پھر تیلے پن کی کمی درد سر، مہاسے ٹکنا، ذائقہ لہسن یا کسی دوا کی بو محسوس ہونا، لمبے عرصے تک استعمال سے عضلات و اعصاب میں درد۔

نیاٹ: شراب کے اثرات کی حالت میں اور شراب چھوڑنے کی خواہش نہ ہو ایسے افراد میں یہ دوا مال نہ کرائیں۔



# نفسیاتی الجھن دور کرنے والی ادویہ

## PSYCHO TROPIC DRUGS

### AL PRAZOLAN

### آل پروزولان

افعال: دماغی الجھن، گھبراہٹ، مانجھ لیا کی مریضوں، تنہائی سے ڈرنے والوں میں مفید ہے۔  
 مقدار: ۲۵ ملی گرام سے ۰.۵ ملی گرام دن میں ۳ بار کھانے کے بعد ۲ دن تک پھر ۰.۵ ملی گرام  
 دوسرے تیسرے دن مقدار خوراک بڑھائی جائے زیادہ سے زیادہ ۲ سے ۳ ملی گرام دینا چاہیے۔  
 منفی افعال: دوا سے الرجک مریض، گلوکوما، حمل ایام رضاعت میں نہیں دینا چاہیے۔  
 مضر اثرات: خشکی سر میں ہلکا پن، منہ خشک متلی ابکائی الرجی وجع القلب، ضدی پن۔  
 احتیاط: دوا چانک بند نہ کریں، دوا کے دوران مشنری چلانے ڈرائیوری کرنے سے احتیاط برتیں۔  
 دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب نظام عصبی کو مفلوج کرنے والی ادویہ دورہ روکنے والی دواؤں  
 کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

### تجارتی مرکبات

ALPRAX	(TORRENT) 1mg: 10: Rs.17.95	آل پراکس
ALZOLAM	(SUN PHARMA) 1mg:10:Rs.16.58	آل زولام
ALZOMAX	(KAMRON) 10: Rs.19.95	آل زومیکس
ALZOPAX	(LA PHARMA) 1mg: 10: Rs.15.76	آل زوپاکس
ANXIT	(MICRO LABS) 1mg:10:Rs.18.00	اینکسٹ
ANXYL	(WAVE) 10: Rs.15.00	اینکسل
PLAXID	(SIGMA LABS) 1mg: 10: Rs.14.36	پلاکسڈ
POISE	(SYSTOPIC) .5mg: 10: Rs.11.00	پوائس
QUIET	(SWIFT) 1mg: 15x10: Rs.228.00	کوائٹ
RETYL	(PROTEC) 1mg: 10 : Rs.15.00	ریسٹائل
TRANISOL	(GLENMARK) 1mg: 10: Rs.15.50	ٹرانسول
TRIKA	(UNISEARCH) 1mg: 10: Rs.19.75	ٹرائیکا



ZENAX	(STANGEN) 1mg: 10: Rs.170	زی ٹیکس
ZENOPRAX	(PACE (SOL) 0.5mg: 10: Rs.10.50	زی ٹوپراکس
ZOLAM	(STADMED) 1mg: 10: Rs.16.50	زولام
ZOLAX	(INTAS) 1mg: tabs 0.25mg: 10: Rs.6.20	زولاکس

## BUSIPRONE HCL بوسی پرون ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: نفسیاتی عوارض، بے چینی، گھبراہٹ کو دور کرتی ہے۔ حیض آنے سے قبل کے دور بے چینی اور الجھن کو دور کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ابتدائی خوراک ۵ ملی گرام دن میں ۲-۳ بار رفتہ رفتہ مقدار خوراک بڑھا دینا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ ۴۵ ملی گرام کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے دیں۔

منفی افعال: مرگی، جگر اور گردوں کے امراض میں، حمل ایام رضاعت میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: چکر آنا، سینہ میں درد، درد سر، منہ خشک ہو جاتا ہے۔

احتیاط: جگر و گردوں کی بیماری کی ہسٹری میں اور بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

ANXIPAR	(TIDE) 10mg: 10: Rs.12.53	این کسی پار
BUSACTIL	(MEJDA) 10mg: 10: Rs.10.40	بوسا کٹل
BUSCALM	(MERIND) 10mg: 10: Rs.13.70	بس کام
BUSON	(KOPRAN) 10mg: 10x10: Rs.150.34	بوسان
BUSPIDAC	(ALIDAC) 10mg: 10: Rs.14.00	بس پی ڈیک
BUSPIN	(INTAS) 10mg: 10: Rs.16.60	بس پن



Alprazolam 0.25, 0.50 & 1 mg.



# گھبراہٹ دور کرنے والی دوائیں

## ANTI DEPRESENT

### AMINOEPTIN HCL امینو ایپ ٹین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: دل کی گھبراہٹ نفسیاتی الجھن موڈ کی خرابی خلوت پسند افراد میں فائدہ کرتی ہے۔  
مقدار: ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار پہلی خوراک ناشتہ کے بعد دوسری دوپہر کے بعد لینی چاہیے۔  
منفی اثرات: چکر آنے سر گھومنے میں استعمال نہ کرائیں۔

مضر اثرات: حرکات قلب تیز ہونا، نیند نہ آنا، وزن کم ہونا بے چینی اور جگر میں خرابی چہرے پر مہاسے نکلتا۔

احتیاط: مریض کو سخت نگرانی میں رکھیں مریض خود کشی کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ حمل اور آپریشن سے ۳۸ گھنٹہ قبل دوا بند کر دیں۔

### تجارتی مرکب

SURVECTOR (SERDIA)

سر ویکٹر

Amineptine hcl. 100mg tabs 10: Rs.146.53

### AMITRIPTYLINE

### ایمی ٹریپ ٹائی لین

افعال: دل کی گھبراہٹ، پریشانی، بے چینی ضد، ہٹ دھرمی، نیند میں خلل شرابیوں کی بے چینی، بچوں کے بستر پیشاب کرنے میں مفید ہے۔

مقدار: ۱۰ سے ۲۵ ملی گرام دن میں ۳ بار ہر تیسرے دن مقدار خوراک بڑھائی جاسکتی ہے۔

منفی افعال: گلوکوما قلب میں کسی قسم کا تسد جگر کے امراض حمل میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: خشکی، چکر آنا، بے چینی متلی ابکائی منہ خشک، بصارت میں فرق بلڈ پریشر کم ہونا، حرکات قلب بے ترتیب ہونا، سستی کاہلی، خصلوں کا متورم ہونا، پیشاب رکنا۔



احتیاط: امراض قلب کے مریضوں میں غده درقہ کے بڑھ جانے میں جگر کی خرابی، مرگی گلو کو ماورم غده قداسیہ میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: MAOI، باربی ٹون کے مرکبات دیگر مسکن دماغ اور دافع ڈپریشن دواؤں کے ساتھ شراب بلڈ پریشر کم کرنے والی ادویہ اور سن کرنے والی دواؤں کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کرانا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

AMILINE	(TORRENT) 10: Rs.13.35	ایمیلین
AMITONE	(INTAS) 10: Rs.11.25	ایمی ٹون
AMITROL	(TORRENT) 10: Rs.3.25	ایمی ٹرول
AMITROL-DS	(TORRENT) 10mg 10: Rs.4.85	ایمی ٹرول ڈی ایس
AMIXIDE	(SUN PHARMA) 10mg 10: Rs.11.00	ایمی کسائیڈ
AMIXIDE-S	(SUN PHARMA) 10: Rs.10.00	ایمی کسائیڈ ایس
AMIXIDE-H	(SUN PHARMA) 10: Rs.6.50	ایمی کسائیڈ ایچ
ELIWEL	(SUN PHARMA) 10: Rs.14.72	ایلی ویل
LATILIN 25/50/75	(LA PHARMA) 10: Rs.13.30	لے ٹیلین
LIBOTRYP	(MERIND) 10: Rs.8.50	لیبو ٹریپ
LIBOTRYP DS	(MERIND) 10: Rs.12.50	لیبو ٹریپ ڈی ایس
LIMBICON	(SYSTOPIC) 10: Rs.6.00	لمبی کون
LIMBICON FORTE	(SYSTOPIC) 10: Rs.10.00	لمبی کون فورٹ
SAROTENA	(CFL) 10: Rs.17.00	سرو ٹینا
TRIDEP	(TORRENT) 10: Rs.13.35	ٹرائی ڈیپ
TRYPTOMER	(MERIND) 10: Rs.23.30	ٹرائپ ٹومر

## AMOXAPINE

## اموکساپین

افعال و منافع: ڈپریشن، دل گھبرانا، وحشت طاری ہونے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰۰ سے ۱۵۰ ملی گرام یومیہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے زیادہ سے زیادہ ۳۰۰ ملی گرام معمر افراد میں ۲۵ ملی گرام ابتدا میں دن میں ۲ بار رفتہ رفتہ مقدار بڑھائیں ۵۰ ملی گرام سے زیادہ نہ



دیں۔ بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

**منفی افعال:** وجع القلب، عروق قلبیہ میں تسدد، قلبی حرکات کا بے ترتیب ہونا سکتا، جگر کے شدید امراض میں نہیں دینا چاہیے۔

**مضر اثرات:** خشکی، منہ خشک، بلڈ پریشر کم ہونا، سینہ میں درد، جلد پر داغ پڑنا، ضدی مزاج حرارت جسمانی کم ہونا۔

**احتیاط:** حمل میں احتیاط برتنا چاہیے۔

## تجارتی مرکب

ڈی مولاکس DEMOLOX 50.100 (LEDERLE) 100mg. 10: Rs. 50.00

**CLOMI PRAMINE HCL** کلومی پرامین ہائیڈروکلورائیڈ

**افعال:** ڈپریشن اور دل گھبرانے کی مختلف حالتوں میں مفید ہے نیند لانے سکون پہنچانے، انجانے خوف و ڈر کو دور کرنے میں استعمال کرائی جاتی ہے۔

**مقدار:** ۵۷ ملی گرام سے ۱۵۰ ملی گرام ۳ خوراکیوں میں تقسیم کر کے۔

**منفی افعال:** قلب کے شدید امراض میں۔

**مضر اثرات:** ضعف، بے چینی، جگر کے افرازات میں کمی ہونا، درد سر، ہاتھ پیر کا پھلنا، چکر آنا، وزن بڑھنا، متلی ابکائی، سستی کاہلی، عضلات میں ایٹھن اور سوجنا، بکواس کرنا، ضد مہذب حرکات کرنا ذائقہ خراب، نیند میں خلل، بولنے میں فرق یادداشت میں کمی، پاگلوں جیسی حرکتیں کرنا، ہاتھ پیر سن ہونا سینہ میں درد، ای سی جی ECG میں فرق، دودھ کی پیدائش زیادہ ہونا چھاتیاں بڑھنا، کان بجنا، عضلات کی کمزوری، غیر ارادی حرکات خفقان بلڈ پریشر میں اضافہ جگر کے فعل میں خلل، خون کے سفید ذرات میں کمی۔

**احتیاط:** قلبی امراض، گلوکوما، پیشاب کی کمی میں شدید جگر اور گردوں کے امراض میں لو بلڈ پریشر، غدہ درقیہ کے بڑھنے میں تھائرائیڈ کے مرکبات کے دوران، حمل اور ایام رضاعت میں شراب سے احتیاط برتن۔



## تجارتی مرکبات

ANAFRANIL	(HIND.CIBA GEIGY)	اینافرانل
25mg: 10x10: Rs.244.20		
CLOFRANIL	(SUN PHARMA) 25mg 10: Rs.29.02	کلو فرائل
CLOMOZIL	(GUFIC) 25mg: 15: Rs.35.25	کلو موزل
CLONIL	(INTAS) 10mg: 10: Rs.12.60	کلونل
CLOMIFRIL	(TORRENT) 25mg: 10: Rs.29.51	کلومی فرل
OCIFRIL	(LA PHARMA) 50 mg: 10x10: Rs.57	اوسی فرل

## CLOZAPINE

## کلوزاپائن

افعال: اسکازوفریزیا، نظام عصبی میں خلل، وہ عصبی بیماریاؤں جن پر دوسری دوائیں کارگر نہ ہوں۔  
 مقدار: پہلے دن ۵، ۱۲ ملی گرام دوسرے دن ۲۵ ملی گرام دن میں ۱ یا ۲ بار روزانہ ۲۵ ملی گرام بڑھائی  
 جائے یہاں تک کہ ۳۰۰ ملی گرام کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے روزانہ دی جائے مرض پر قابو پانے کے  
 بعد ۱۵۰ سے ۳۰۰ ملی گرام روزانہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے معمر لوگوں میں نصف خوراک  
 سے ابتدائی جائے بچوں کو یہ دوا نہ دی جائے۔

منفی اثرات: عصبی کمزوری، اعصابی بیماریاں، خون کی غیر طبعی حالت، جگر اور گردوں کے شدید  
 امراض ضعف قلب حمل اور ایام رضاعت میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: عصبی کمزوری، بلند پریشکم ہو جانا، قلب و نظام تنفس پر دباؤ، دورے پڑنا، ورم غلاف  
 القلب، گرم سم ربنا، عضو تناسل میں سختی، جنسی خواہش کا غیر متوازن ہونا، ہاضمہ میں خرابی، ای سی جی کا  
 غیر طبعی ہونا، پیشاب میں شکر کی مقدار زیادہ ہونا۔

احتیاط: علاج سے قبل خون کے سفید ذرات کی جانچ کریں، اگر سفید ذرات W.B.C. ۳۰۰ سے کم  
 ہوں تو دوا فوراً روک دیں، عورتوں کو مانع حمل دوائیں ساتھ میں ضرور دیں، مرگی ورم غدہ قدامیہ،  
 گلوکوما، مفلوج اور جگر کے مریضوں میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: نظام عصبی کو مفلوج کرنے والی ادویہ، شراب، ڈایازپام، لی تھیم، انٹی،  
 ہٹامین ٹائن، کے ساتھ یہ دوا دینا مناسب نہیں۔



## تجارتی مرکبات

<b>IZAPIN</b>	(TORRENT)	لو زاپین
5mg: 10: Rs.13.00; 100mg: 10: Rs.48.00		
<b>IZORIL</b>	(INTAS)	سکائی زورل
5mg: 10: Rs.15.00; 100mg: 10: Rs.45.00		
<b>IZOPIN</b>	(SUN PHARMA)	سی زوپین
5mg: 10: Rs.13.00; 100mg: 10: Rs.48.00		

## DOTHIEPIN HCL

## ڈو تھائی پن ہائیڈرو کلورائیڈ

افعال: ڈپریشن، بے چینی، گھبراہٹ اور دماغی الجھن پریشانی کے لئے مفید ہے۔

مقدار: ۷۵ ملی گرام کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے یا ۱۵۰ ملی گرام سوتے وقت ۲۵ ملی گرام کے حساب سے مقدار خوراک میں اضافہ کیا جاسکتا ہے زیادہ سے زیادہ ۹۰۰ ملی گرام کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

منفی اثرات: امراض قلب میں، قلبی حرکات کی بے ترتیبی میں، پاگلپن جگر کے شدید امراض، حمل اور ایام رضاعت میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: نظام عصبی میں خلل کاہلی، سستی، گرم سم رہنا، نظام ہضم اور نظام دوران خون میں خلل ہو سکتا ہے۔

احتیاط: معمر افراد، مرگی، قلبی امراض، گلوکوما، ورم غدہ قدامیہ گردوں کی خرابی، میں احتیاط برتنا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: نظام عصبی کو کمزور کرنے والی ادویہ، شراب MAOI گوانی تھ ڈین اور مانع افراز جگر ادویہ کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

## تجارتی مرکب

<b>PROTHIADEN</b>	(BOOTS)	پرو تھیاڈین
25mg: 10: Rs.12.60; 75mg: 10: Rs.33.50		



## DOXEPIN HCL ڈوکسی پن ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: ڈپریشن، عصبی خلل دماغی، مایخولیا، میں مفید ہے۔  
 مقدار و ترکیب: ۷۵ سے ۱۰۰ ملی گرام ۳-۴ خوراکیوں میں تقسیم کر کے شدید حالتوں میں ۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار۔ دن بھر میں ۱۵۰ ملی گرام سے زیادہ نہیں دینا چاہیے۔  
 منفی افعال: گلوکوما میں، پیشاب بند ہونے یا رکنے اور دوا سے الرجی میں نہیں دینا چاہیے۔  
 مضر اثرات: منہ خشک، قبض، بصارت میں فرق، چکر آنا اور خشکی ہو سکتی ہے۔  
 احتیاط: حاملہ اور ۱۲ سال سے کم عمر بچوں کو نہ دی جائے۔  
 دواؤں کے ساتھ رد عمل: نظام عصبی کو مفلوج کرنے والی ادویہ۔  
 ٹرانکولانٹز شراب MAOI کے ساتھ دینا مضر ہے۔

### تجارتی مرکبات

DOXETAR	(TORRENT)	ڈوکسی ٹارکپسول
10mg 10: Rs.12.90; 25mg 10: Rs.23.90		
DOXETAR FORTE	(TORRENT)	ڈوکسی ٹار فورٹ کپسول
75mg caps 6: Rs.29.00		

## FLUOXETINE فلوکسے ٹین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال: ڈپریشن کے مریض، بے چینی، الجھن، گھبراہٹ، ذہنی پریشانی میں مفید ہے۔ ایسے مریض جن کو ہلکی مسکن دوا کی ضرورت ہو مفید ہے۔  
 مقدار و ترکیب: ۲۰ ملی گرام روزانہ زیادہ سے زیادہ ۸۰ ملی گرام یومیہ معمر لوگوں میں ۲۰ ملی گرام، بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔  
 منفی افعال: C/1 گردوں کے فیل ہونے میں، ایام رضاعت میں خراب اثرات رونما ہوتے ہیں۔  
 مضر اثرات: متلی قے، اسہال، درد سر، نیند کی کمی، بے چینی، خشکی چکر آنا، کمزوری بخار، جلد پر داغ پڑنا، الرجی، دورے پڑنا، دماغ میں خلل ہو سکتا ہے۔



احتیاط: مرگی میں جگر کے فیل ہونے میں، گردوں کی خرابی، حمل امراض قلب ذیابیطیس میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: ثائی ٹوفان، لیتھیم کے مرکبات اور MAOI کے ساتھ دینا منفر ہے۔

## تجارتی مرکبات

DWANEX	(MICRO LABS) 20g caps 10: Rs.11.95	ڈوانیکس
FLOXETIN	(WAVE) 20mg: caps:10: Rs.25.00	فلو کے ٹین
FLUDAC	(ALIDAC) 20mg caps 10: Rs.25.00	فلو ڈیک
FLUFAN	(UNIQUE) 20mg caps 10: Rs.25.00	فلو فران
FLUGEN	(LA PHARMA) 20mg caps 10: Rs.25.10	فلو جین
FLUNIL	(INTAS) 20mg tabs 10: Rs.18.30	فلوئل
FLUPAR	(MEJDA) 20mg caps 10: Rs.29.95	فلوپار
NODEP	(PACE) 20mg caps 10: Rs.25.95	نوڈیپ
OXADEP	(TORRENT) 20mg : caps: 10: Rs.23.50	اوکساڈیپ
PRODAC	(SEARLE) 20mg : caps	پروڈیک
PRODEP	(SUN PHARMA) 20mg caps 6: Rs.25.10	پروڈیپ
TRIZAC	(UNISEARCH) 20mg caps 10: Rs.18.00	ٹرائی زیک

## ایمی پرامین ہائیڈروکلورائیڈ

## IMIPRAMINE HCL

افعال: ڈپریشن، دل شکستگی، پڑمردگی، عزم و حوصلے کی کمی، چکر آنا، موڈ کی خرابی، نیند میں خلل، بستر پر پیشاب نکل جانا۔

مقدار: ۷۵ ملی گرام سوتے وقت یا کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے ۱۲ سال سے کم عمر بچوں کو ۲۵ ملی گرام سونے سے اگھنٹہ قبل، دوا صحت ہونے تک جاری رکھنا چاہیے، دوا آہستہ آہستہ ادن کا وقفہ دے کر بند کرنا چاہیے۔

منفی افعال: C/1 قلبی امراض میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: منہ خشک بصرات میں فرق، الجھن بے چینی، پیشاب کارکنا، لو بلڈ پریشر وجع القلب، خفتان کبھی قلبی حرکات کا بے ترتیب ہونا۔



احتیاط: ۱۲ سال سے کم عمر والوں کو حاملہ اور مرضہ کو دینے میں احتیاط برتیں۔  
دواؤں کے ساتھ رد عمل: MAOI گوانی تھی ڈین، بتھانڈین میتھائل ڈوپا، شراب، نظامِ عصبی کو  
مفلوج کرنے والی ادویہ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

<b>ANTIDEP</b>	(TORRENT)	انٹی ڈیپ
25mg: 10: Rs.4.40; 75mg: 10: Rs.11.28		
<b>DEPRANIL</b>	(LA PHARMA)	ڈپرائل
25mg 10: Rs.4.90; 75mg 10: Rs.12.00		
<b>DEPRANIL PLUS</b>	(LA PHARMA) tabs 10: Rs.5.90	ڈپرائل پلس
<b>DEPSOL</b>	(INTAS)	ڈپ سول
25mg 10: Rs.4.90; 75mg: 10: Rs.10.95		
<b>DEPSOL PLUS</b>	(INTAS) 10: Rs.5.40	ڈپ سول پلس
<b>DEPSOL FORTE</b>	(INTAS) 10: Rs.5.60	ڈپ سول فورٹ
<b>DEPSONIL</b>	(S.G.PHARMA) 25mg 10: Rs.4.23	ڈپ سونل
<b>DEPSONIL-DZ</b>	(S.G.PHARMA) 10: Rs.4.82	ڈپ سونل ڈی زیڈ
<b>DEPSONIL DZ FORTE</b>	(S.G.PHARMA)	ڈپ سونل ڈی زیڈ فورٹ
tabs: 10: Rs.5.35		
<b>DEPSONIL-PM</b>	(S.G.PHARMA)	ڈپ سونل پی ایم
75mg caps 10: Rs.16.05		
<b>IMIPAM</b>	(LA PHARMA) tabs 10: Rs.5.50	ایمپام
<b>IMPRAMINE</b>	(SUN PHARMA)	ایمپرامن
25mg tabs 10: Rs.4.48		
<b>IMPRAMINE 75</b>	(SUN PHARMA) 5mg caps 6: Rs.7.22	ایمپرامن ۷۵
<b>IMPREL</b>	(SIGMA LABS)	ایمپریل
Imipramine 25mg : tabs: 10: Rs.4.63		
<b>PRAZEP-2</b>	(SUN PHARMA) 10: Rs.5.86	پرازپ ۲
<b>PRAZEP</b>	(SUN PHARMA) 10: Rs.6.32	پرازپ
<b>TANCODEP-2</b>	(TORRENT) 10: Rs.5.50	ٹن کوڈپ ۲
<b>TANCODEP</b>	(TORRENT)	ٹن کوڈپ
Imipramine hcl 25mg Diazepam 5mg tabs 10: Rs.5.90		



## LOXAPINE

## لوکسا پائن

افعال: اسکازوفرینیا، شدید خلل دماغی، مایجولیا، بچوں کی خراب عادتیں دور کرنے میں مفید ہے۔  
مقدار: ۲۰ ملی گرام دن میں ۳ بار زیادہ سے زیادہ ۱۰۰ سے ۲۰۰ ملی گرام عضلاتی انجکشن ۱۲.۵ سے ۵۰ ملی گرام خوردنی طور پر۔

منفی افعال: قلب کے افعال میں خرابی، گرم سم رہنے والے افراد میں استعمال نہ کرائیں۔  
مضر اثرات: خشکی، لو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے۔  
احتیاط: حمل اور ایام رضاعت میں احتیاط برتیں۔

### تجارتی مرکبات

LOXAPAC 10/25

(LEDERLE)

لوکسا پیک کپسول

10mg 10: Rs.27.50; 25mg 10: Rs.54.25

LOXAPAC-C LIQUID

(LEDERLE)

لوکسا پیک سی۔ لکوڈ

60ml: Rs.200.25

## MIAN SERIN HCL

## مانی این سیرین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال: ڈپریشن، نفسیاتی الجھن، عصبی ڈپریشن میں مفید ہے۔  
منفی افعال: C/1، حمل اور ایام رضاعت میں، قلبی امراض میں عمر اور ذیابیطیس کے مریضوں جگر اور گردوں کے امراض میں استعمال نقصان دہ ہے۔  
مضر اثرات: خشکی، منہ خشک، بصارت میں فرق قبض، خون میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔  
دواؤں کے ساتھ رد عمل: MAOI ادویہ، شراب، باربی ٹون کے مرکبات ہائی بلڈ پریشر روکنے والی ادویہ بنز وڈایاز پائن کے ساتھ یا اس کے ۴ دن بعد تک دینا نقصان دہ ہے۔

### تجارتی مرکبات

DEPNON

(INFAR)

ڈیپ نون

10mg: 10: Rs.20.90; 30mg: 10: Rs.54.60

SERIDAC

(ALIDAC) 10 mg tabs 10: Rs.17.20

سیری ڈیک

TETRADEP

(TORRENT) 30mg: 10: Rs.54.54

ٹترا ڈیپ



## NITROXAZEPINE

## نائٹروکسازپیپائن

افعال: مختلف اسباب سے ہونے والا ڈپریشن، بستر پر پیشاب نکل جانا موڈ کی خرابی۔  
 مقدار: ڈپریشن میں ۲۵ ملی گرام دن میں ۳ بار یا ۵۰ ملی گرام دن میں ۱ بار ۳ ہفتہ تک، شدید حالتوں میں ۳۲۵ ملی گرام تک دی جاسکتی ہے بول بستر میں ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام سوتے وقت۔  
 مضر اثرات: منہ خشک، قبض، چکر آنا، درد سر، جسم میں گرمی کا احساس، بے چینی، جلد پر داغ پڑنا، ہاتھ پیر کا نپٹنا، دل دھڑکنا۔  
 احتیاط: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ، مرگی جگر اور گردوں کے فیل ہونے میں، امراض قلب، گلوکوما پیشاب کی کمی یا رکنے میں، خودکشی کے رجحان میں احتیاط برتیں۔

## تجارتی مرکب

SINTAMIL

(HIND.CIBA-GEIGY)

سن ٹائل

25 mg: 10: Rs.7.40

## NORTRYPTYLINE HCL

## نارٹریپٹیلین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال: جسم کی اندرونی خرابی سے پیدا ہونے والا ڈپریشن نفسیاتی الجھنوں کے سبب ہونے والا ڈپریشن، بستر پر پیشاب نکل جانا حساسیت، پتی اچھلنا اور الرجی میں مفید ہے۔  
 مقدار: ۵۰ سے ۱۵۰ ملی گرام ایک خوراک سوتے وقت یا کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے۔  
 منفی افعال: C/1 گلوکوما پیشاب رکنے میں درم غده قدامیہ میں امراض قلب کے مریضوں میں۔  
 مضر اثرات: منہ خشک قبض بصارت میں فرق پیشاب رکنا، لو بلڈ پریشر چکر آنا حرکات قلبیہ کا بے ترتیب ہونا۔

احتیاط: ایام حمل اور ایام رضاعت میں استعمال نہ کرائیں۔

## تجارتی مرکبات

PRIMOX

(SUN PHARMA) 10: Rs.9.10

SENSIVAL

(WALLACE)

10: Rs.9.10

پرائی سوکس  
 نیٹکسی وال



## CHLOR PROMAZINE کلور پرومازین ہائیڈروکلورائیڈ

**افعال و منافع:** یہ ایک زبردست مانع افراز اور ڈوپامین کو روکنے والی دوا ہے یہ اسکیزوفریینیا، ہنگی آنے، بے چینی، الجھن، دماغی الجھن و گھبراہٹ کو دور کرتی ہے

**مقدار و ترکیب:** فوری طور پر ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار ضرورت پر مقدار بڑھائی جاسکتی ہے شدید نفسیاتی الجھنوں میں اگر ام تک دی جاسکتی ہے۔

**منفی افعال:** پارکنسنز ڈیزیز، جگر کے امراض، صاحب فراش کو نہیں دینا چاہیے۔

**احتیاط:** امراض قلب و جگر، یرقان کی ہٹری، حمل اور ایام رضاعت میں احتیاط لازم ہے۔

### تجارتی مرکبات

EMETIL PLUS	(LA PHARMA) 10: Rs. 1.40	ایمی ٹیل پلس
EMETIL DS	(LA PHARMA) 10: Rs. 18.00	ایمی ٹیل ڈی ایس
MEGATIL	(INTAS) 200mg: 10 Rs. 19.50	میگا ٹیل
MEGATIL INJ	(INTAS) 2ml amp Rs. 4.26	میگا ٹیل انجکشن
NEOCALM FORT	(INTAS) 10 tabs Rs. 9.60	نوکالم فورٹ
SUNPRAZIN	(SUN PHARMA) 200mg, 10, Rs. 14.81	سن پرازین
TRAZINE-SC	(SUN PHARMA) 10 tabs Rs. 7.99	ٹرازین ایس سی
TRINICALM FORTE	(TORRENT)	ٹرائیکالمنی کام فورٹ
Chlopromazine Hcl I.P. 50mg, Trifluoperazine 2hcl 5mg and Trihexyphenidyl USP 2mg tabs 10: Rs. 6.90 100 Rs. 55.00		

## FLUPENTHIXOL

### فلوپین تھی کسال

**افعال و منافع:** معمولی اور درمیانی درجے کے ڈپریشن اور اس کا نزو فریوینیا میں مفید ہے۔

**مقدار و ترکیب:** ڈپریشن میں آدھی ملی گرام دن میں ۲ بار عام طور پر آدھی سے ۳ ملی گرام تک دی جاتی ہے۔ اسکیزوفریینیا Schizo Phrenia میں ۳ ملی گرام یومیہ دوا آہستہ آہستہ بڑھانا چاہیے

مرض پر قابو رکھنے کے لئے ۳ سے ۱۲ ملی گرام یومیہ دی جاسکتی ہے۔

**منفی افعال:** شدید ڈپریشن زیادہ ذکی الحس۔ غشی حمل ایام رضاعت، صاحب فراش کو دینا مضر ہے۔



مضر اثرات: زیادہ مقدار میں دینے سے مریض گم سم رہتا ہے۔ بے چینی، نیند نہ آنا، وزن بڑھنا  
احتیاط: پارکنسن ڈیزیز میں شراکین کی سختی میں بڑھاپے، جگر و گردوں کی خرابی، امراض قلب اور  
پھیپھڑوں کی تکالیف میں احتیاط برتنا چاہیے  
دواؤں کے ساتھ رد عمل: مرکزی نظام عصبی کو کمزور کرنے والی دواؤں کے ساتھ خراب رد عمل  
ہوتا ہے۔

شراب لوڈوپا، مینا کلو پر اما نیڈ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

### تجارتی مرکبات

FLUANXOL (CFL) 10:Rs. 70.55

FLUANXOL DEPOT INJ (CFL)

Rs. 80.00 40mg / 2ml: Rs.155.00

فلوئیکسال  
فلوئیکسال ڈیپاٹ انجکشن

### FLUPHENAZINE HCL فلو فینازین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: بے چینی، دماغی الجھن، گھبراہٹ، سن یاس کی تکالیف، ہضم کی خرابیاں معمولی ہائی بلڈ  
پریشر، بد مزاجی، درد سر، نفسیاتی الجھن، معمر افراد میں مزاج کی خرابی وغیرہ میں مفید ہے  
مقدار و ترکیب: الجھن و گھبراہٹ میں ۱۰ ملی گرام دن میں ایک بار شدید حالتوں میں ۱۰ ملی گرام دن  
میں ۲ بار، دماغی خرابی اور بکواس کرنے والے مریضوں میں ۵ء ۲۰ ملی گرام سے ۱۰ ملی گرام کئی خوراکیوں  
میں تقسیم کر کے ۶ سے ۸ گھنٹہ کے وقفہ سے دی جائے مرض پر قابو پانے اور نارمل حالت برقرار رکھنے  
کے لئے ۵ سے ۱۰ ملی گرام ایک خوراک یومیہ دینا چاہیے۔

منفی افعال: دماغ کے ماؤف ہونے میں، نیند کی گولیاں استعمال کرنے والے افراد میں، دردوں کے  
مریضوں کو فینو تھیزین سے حساس مریضوں کو دوا نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: پارکنسن کی علامات، عضلات میں انقباضی حرکات کی کمی، سستی کاہلی، آنکھ کے  
گوٹے میں غیر معمولی حرکات، خون کی غیر طبعی حالت ہونا جلد پر داغ پڑنا، پتی اچھلنا، دودھ کی پیدائش  
میں زیادتی، تھوک کی کثرت، پیشاب زیادہ آنا۔



احتیاط: کلاہ گردہ کے ٹیومر، دماغ اور گردوں کی بیماریاں اور لو بلڈ پریشر میں احتیاط برتنا چاہیے

## تجارتی مرکبات

ANATENSOL (SARABHAI)

اناٹن سال

Fluphenazine 1 mg tabs. 10.: Rs.7.00

ANATENSOL INJ (SARABHAI) 1ml vial: Rs. 29.81 اناٹن سال انجکشن

FLUDECAN INJ (SIGMA LABS)

فلوڈی کان انجکشن

10x1ml amp: Rs.185.50

PROLINATE INJ (SUN PHARMA)

پروڈی نیٹ انجکشن

25mg/ml Vial Rs. 24.10

## LITHIUM CARBONATE

لیتھیم کاربو نیٹ

افعال و منافع: شدید خلل دماغی، پاگل پن، ڈپریشن اور دماغ کے ناکارہ ہونے میں مفید ہیں جسم میں پانی اور نمکیات کے توازن اور دماغ کے نظام پر اثر ڈالتے ہیں  
مقدار و ترکیب: ۴۰۰ سے ۱۶۰۰ ملی گرام ایک خوراک یا دو خوراکیوں میں تقسیم کر کے یومیہ دی جائے رفتہ رفتہ مقدار خوراک میں اضافہ کیا جاسکتا ہے

منفی افعال: حمل، ایام رضاعت گردوں کے فیل ہونے، غدہ درقیہ کے افراز کی کمی میں نہیں دینا چاہیے  
مضر اثرات: معمولی متلی، ہاتھوں کا کپکپانا، درد شکم، بھوک کی کمی، قے اسہال بد ہضمی، پیاس کی زیادتی، پیشاب زیادہ آنا، عضلات پھڑکنا، ضعف، غیر طبعی حرکات ہوش و حواس گم ہونا، دورے پڑنا غشی اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔

احتیاط: ہائی بلڈ پریشر امراض قلب اور ذیابیطس میں احتیاط برتن  
دواؤں کے ساتھ رد عمل: پیشاب آور ادویہ، دافع ورم و درد ادویہ NSAIDS فین ٹائن، فلوپین تھکسال، ہالوپری ڈال، ڈایازی پام میتھائل ڈوپا، اور نٹراسا نکلین کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

LALITHIUM —(LA PHARMA)

300mg tabs 10, Rs.6.08

لالی تھیم

LICAB

(TORRENT)

300mg tabs 10, Rs.8.90

لی کیب



لی کیب ایکس ایل

LICAB XL (TORRENT)

Lithium carbonate 400mg 10, Rs. 13.50

LITBON (PACE) 300mg tabs 10, Rs. 6.95

LITHOCAP (INTAS) 300mg 10 Rs. 7.00

LITHOSUN (SUN PHARMA) 300mg 10 Rs. 6.67

LITHOSUN-SR (SUN PHARMA)

400mg S-R tabs 10, Rs. 14.00

لیٹ بون

لی تھو کیپ

لی تھو سن

لی تھو سن ایس آر

## PENFLURIDOL

پین فلوری ڈول

افعال و منافع: اسکازوفریجیا دماغ کی حالت درست نہ ہوتا، سماج سے بیزاری دماغی صلاحیت میں کمی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰ سے ۱۲۰ ملی گرام ہفتہ میں ایک بار حالات کے مطابق دی جائے

مضر اثرات: دوائے حساس مریضوں کو نہ دی جائے، منہ خشک قبض پیشاب رکنا، تکی پھیل جانا، نیند نہ آنا مزاج میں تشدد پیدا ہونا، ڈپریشن، دورے پڑنا ناک بند ہونا، الرجی، گرم سم رہنا

احتیاط: حمل ایام رضاعت اور بچوں میں اس کا استعمال خارج از نقصان نہیں

دواؤں کے ساتھ رد عمل: نظام عصبی کو کمزور کرنے والی ادویہ، شراب، پروپرانولول، نرائی سائی کلک، انٹی ڈپریشن، گوانی تھی ڈین کے مرکبات کے ساتھ خراب رد عمل ہو سکتا ہے

## تجارتی مرکب

FLUMAP

20mg - 10 Rs. 79.90

فلومیپ

## PIMOZIDE

پائی موزائیڈ

افعال و منافع: یہ ایک ڈوپامین، ری سپر بلا کر دوا ہے، شدید اسکازوفریجیا، خلل دماغی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱ سے ۲ ملی گرام روزانہ شدید ضرورت کے تحت ۳-۸ ملی گرام

منفی اثرات: قلبی حرکات کی بے ترتیبی میں، ای سی جی غیر طبعی ہونے کی حالت میں نہیں دینا چاہیے

مضر اثرات: قلبی حرکات میں تبدیلی آ سکتی ہے



احتیاط: ڈپریشن، پارکن سنز غلامیہ، مرگی جسم میں پانی کی کمی جگر و گردوں کی خرابی میں احتیاط برتیں۔  
دواؤں کے ساتھ رد عمل: محرک قلب اور محرک اعصاب دواؤں کے ساتھ رد عمل خراب ہوتا ہے

## تجارتی مرکبات

LARAP-2/4	(LA PHARMA) 4mg: 10 Rs. 17.45	لاریپ ۴/۲
MOZEP	(INTAS) 4mg: 10 Rs. 17.00	موزیپ
NEURAP	(TORRENT) 4mg: 10: Rs. 39.90	نوریپ
ORAP	(ETHNOR) 4mg: 10: Rs. 45.40	اورپ

## PROCHLOR PERAZINE

## پروکلور پیرازین

افعال و منافع: درد شقیقہ Migrain منرڈیزیز، اندرونی کان کی خرابیاں نفسیاتی، اسکائی زوفیرینا،  
شدید متلی اور تے میں مفید ہے

مقدار و ترکیب: ۵ ملی گرام دن میں ۳ بار

منفی افعال: غنودگی کی حالت میں، مخ العظام کی خرابی میں، جگر کی خرابی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے  
مضر اثرات: لوبلڈ پریشربوڑھوں اور کمزور مریضوں میں، خشکی، نیند نہ آنا، جگر کے افراز میں  
رکاوت، الرجی، خاموشی

احتیاط: S/P خاموش اور گرم سم رہنے والے مریضوں میں، لوبلڈ پریشربوڑھوں، مرگی جگر کی خرابی، حمل، ایام  
رضاعت میں، امراض قلب، آنتوں کی رکاوت میں احتیاط برتنا چاہیے  
دوا کی ساتھ رد عمل: شراب، مرکزی نظام عصبی C.N.S مفلوج کرنے والی ادویہ، الغابلا کر کے  
ساتھ دینا مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

EMIDOXYN (RALLIS) 5mg tabs 10x10: Rs. 78.63	ایمی ڈاکسن
STEMETIL (RHONE-POULENC) 25mg: 10, Rs. 11.31	اسٹیمی ٹیل ٹبلٹ
STEMETIL INJ (RHONE-POULENC)	اسٹیمی ٹیل انجکشن
1ml, Rs. 4.60: 10ml vial, Rs. 30.48	



## پرومازین ہائیڈروکلورائیڈ PROMAZINE HCL

**افعال و منافع:** قے متلی، نفسیاتی الجھن آپریشن اور زچگی کے درد کو دور کرنے کے لئے شراب کا جنوں اور شراب کے اثرات بد کو دور کرنے کے لئے مفید ہے

**مقدار و ترکیب:** قے روکنے کے لئے ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام عضلاتی یا ویدی ۴ سے ۶ گھنٹہ کے وقفہ سے دیا جائے شدید حالتوں میں ۵۰ سے ۱۵۰ ملی گرام سرجری یا زچگی کی تکالیف میں ۵۰ ملی گرام پیٹھی ڈین کے ساتھ ملا کر دی جائے بچوں کو ۲.۵ ملی گرام / فی کلو گرام کے حساب سے کئی خوراکوں میں تقسیم کر کے دی جائے

## تھیوریدازین THIORIDAZINE HCL

**افعال و منافع:** بے چینی، ڈپریشن، گھبرانے، دماغی تناؤ ضدی مزاج نفسیاتی عوارض، دماغی الجھن، نیند میں خلل، جھگڑالو دماغی صلاحیت میں کمی، خلاف عادت حرکات کرنا بلاوجہ بولنا حرکت کرنا، جلد بازی، سوتے میں ڈرنا پیشاب نکل جانے میں مفید ہے

**مقدار و ترکیب:** بچوں کو ۵ سے ۱۵ ملی گرام روزانہ کئی خوراکوں میں تقسیم کر کے، بالغوں کو ۵ ملی گرام دن میں ۳ بار ضرورت کے مطابق مقدار ۲۰ سے ۲۵ ملی گرام یومیہ دی جاسکتی ہے

**منفی افعال:** C/1 غنودگی اور کمزوری میں، شدید ڈپریشن خون کی خرابی نظام عصبی کی کمزوری میں نہیں دینا چاہیے

**مضر اثرات:** نشہ کرتی ہے، منہ خشک، چکر آنے بلڈ پریشر کم، ناک بند، دودھ کی افزائش زیادہ الرجی، روشنی سے نفرت، پیشاب بلا ارادہ نکل جانا، انزال دیر سے ہونا

**احتیاط:** دوا کے دوران ڈرائیوری کرنا مشنری چلانا منع ہے۔ علاج کے دوران خون کی جانچ کراتے رہیں حمل اور ایام رضاعت میں احتیاط رکھیں

**دواؤں کے ساتھ رد عمل:** دافع درد دواؤں کے ساتھ، نیند آور اور انٹی ہسٹامین دواؤں کے ساتھ استعمال نہ کرائیں



## تجارتی مرکبات

MELLERETS	(SANDOZ)	میلی ریش
Thioridazine hcl 5mg tabs 5x20: Rs. 54.50		
MELLERIL	(SANDOZ) 100mg: 10 Rs.72.80	میلی رل
MELOZINE	(INTAS) 100mg: 10: Rs. 52.00	میلو زائن
RIDAZIN	(SUN PHARMA) 100mg: 10: Rs. 34.40	رڈازن
TENSARIL	(LA PHARMA) 100mg: 10, Rs. 36.00	ٹن سارل
THIORIL	(TORRENT) 100mg:10:Rs. 28.78	تھیورل

## THIOPROPERAZONE

### تھاپرو پرو پیرازین

افعال و منافع: خلل دماغی، بکواس کرنا، مارنا پیٹنا چیخنا چلانا، اسکازو فرینیا میں مفید ہے  
 مقدار و ترکیب: ۵۷ ملی گرام عضلاتی انجکشن پھر ۵ سے ۱۰ ملی گرام براہ دہن دن میں ۳ بار شدید حالت  
 میں ۵۷ ملی گرام دن میں ۲ بار انجکشن لگائیں کنٹرول ہونے پر خوردنی دوا شروع کر دیں  
 احتیاط: دمہ جلد مشتعل ہونے والے مریض دماغی بے چینی، آنٹوں کی رکاوٹ میں

## TRIFLUOPERAZINE

### ٹرائی فلو پیرازین

فعال و منافع: بکواس کرنے والے چیخ پکار لڑائی جھگڑے کرنے والے مریض اسکازو فرینیا کے  
 مریضوں میں یہ دوا مفید رہتی ہے  
 مقدار و ترکیب: ۲ سے ۶ ملی گرام روزانہ ۶ سے ۱۲ سال کے مریضوں کو ۴ ملی گرام کئی خوراکیوں میں  
 تقسیم کر کے ۶ سال سے کم عمر بچوں کو نہیں دینا چاہیے  
 منفی افعال: بے ہوشی اور غنودگی کی حالت، خون کی خرابی میں جگر کی خرابی، ورم غدہ قداسیہ، گلوکوما  
 میں نقصان دہ ہے

احتیاط: پارکنسن کے مریض مرگی، حمل ایام رضاعت، دماغی امراض معمر افراد میں دماغ کو سن  
 کرنے والی ادویہ کے ساتھ استعمال نہ کریں



## تجارتی مرکبات

LACALM FORTE	(LA PHARMA) 10: Rs. 8.50	لاکام فورٹ
LACALM PLUS	(LA PHARMA) Rs. 5.00	لاکام پلس
NEOCALM	(INTAS) 10mg: 10: Rs. 5.00	نیوکام
NEOCALM PLUS	(INTAS) 10:Rs.3.80	نیوکام پلس
NEOCALM FORTE	(INTAS) 10:Rs.9.60	نیوکام فورٹ
SIGMAZINE	(SIGMA LABS) 10mg: 10:Rs. 7.05	سگمازین
TRAZINE	(SUN PHARMA) 10mg: 10: Rs. 7.22	ٹرازین
TRAZINE-H	(SUN PHARMA) 10: Rs.3.19	ٹرازین ایچ
TRAZINE-S	(SUN PHARMA) 10: Rs. 5.33	ٹرازین ایس
TRAZINE-SC	(SUN PHARMA) 10: Rs. 7.80	ٹرازین ایس سی
TRINICALM	(TORRENT) 10: Rs.3.90	ٹرائی نی کام
TRINICALM FORT	(TORRENT) 100: Rs.55.00	ٹرائی نی کام فورٹ
TRINICALM PLUS	(TORRENT) 100: Rs.39.00	ٹرائی نی کام پلس
TRIPHENAZIN	(SUN PHARMA) 10:Rs. 7.67	ٹرائی فینازین

## TRI FLUPRAMAZINE

## ٹرائی فلوپرومے زین

افعال و منافع: غصہ کرنے والے جھگڑالو اور بکواس کرنے والے۔ اسکاٹی زوفیرینیا میں قے و متلی ابکائی روکنے کے لئے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ سے ۲۵ ملی گرام دن میں ۲ بار

منفی افعال: بیہوشی و غنودگی کی حالت میں خون کی غیر طبعی حالت میں جگر کی خرابی و ریم غدہ قدامیہ، گلوکوما، ڈپریشن اور لو بلڈ پریشر میں نہیں دینا چاہیے

احتیاط: S/P پارکن سن ڈیزیز، مرگی حمل ایام رضاعت، دماغی امراض، معمر افراد میں اور دماغ کو سکون دینے والی ادویہ کے ساتھ۔



## تجارتی مرکبات

SIQUIL (SARABHAI) 10mg tabs 10: Rs. 7.43 سکونل ٹیبلٹ  
SIQUIL INJ (SARABHAI) 1ml Rs. 4.93 10ml vial: 13.93 سکونل انجکشن

## TRI FLUOPERIDOL

## ٹرائی فلوپری ڈول

افعال و منافع: اسکازوفیرینا، خلل دماغی، ڈپریشن، نفسیاتی عوارض خود پسندی Autism میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ابتدا میں آدھی ملی گرام روزانہ تیسرے دن آدھی ملی گرام مقدار بڑھائی جائے زیادہ سے زیادہ ۸ ملی گرام تک دے سکتے ہیں۔

منفی افعال: C/1 دوا سے حساس مریضوں میں گلوکوما، امراض قلب، جگر کے امراض میں مضر ہے  
مضر اثرات: خشکی قبض، جس بول، خفقان، وجع القلب، بے چینی، چکر آنا بصارت میں فرق۔  
احتیاط: S/P امراض قلب مرگی، ہائی بلڈ پریشر، ورم غدہ قدامیہ، پیشاب کی کمی یا بند ہونے میں۔

## تجارتی مرکبات

TRIPERIDOL (ETHNOR) 0.5mg tabs 10: Rs. 15.50 ٹرائی پیری ڈول ٹیبلٹ  
TRIPERIDOL INJ (ITHNOR) ٹرائی پیری ڈول انجکشن  
2.5mg per ml inj. 6x1ml: Rs. 28.24

## HALOPERIDOL

## ہالوپری ڈول

اس دوا کے افعال و منافع، مقدار خوراک، منفی افعال، مضر اثرات، احتیاط اور تحریر کردہ ٹرائی فلوپری ڈول کی طرح ہیں۔

## تجارتی مرکبات

BENZYDOL (LA PHARMA) بنزائی ڈول  
Haloperidol 5mg benzhexol 2mg tabs 10: s. 12.91 بنزائی ڈول ۵ ملی گرام  
BENZYDOL-10mg (LA PHARMA) 10: Rs. 23.58 بنزائی ڈول ۱۰ ملی گرام  
BENZYDOL 1.5mg (LA PHARMA) 10: Rs. 6.74 بنزائی ڈول ۱.۵ ملی گرام



<b>COMBIDOL</b>	(INTAS) 10mg: 10: Rs.18.50	کبھی ڈول
<b>DEPIDOL</b>	(TORRENT) 10mg: 10: Rs. 24.04	ڈی پی ڈول
<b>DEPIDOL L.A. (TORRENT) inj. 1ml amp:</b>	Rs.110.00	ڈی پی ڈول ایل اے
<b>DEPIDOL DROPS (TORRENT)</b>		ڈی پی ڈول ڈراپس
Haloperidol 2mg/ml 30ml: Rs.17.49		
<b>HALORID</b>	(PACE) 10mg: 10: Rs.31.00	ہالورڈ
<b>HALOPLUS</b>	(PACE) 10: Rs. 32.50	ہالوپلس
<b>HEXIDOL</b>	(TORRENT) 10: Rs.6.90	ہکسی ڈول
<b>HEXIDOL FORTE</b>	(TORRENT) 10: Rs.22.90	ہکسی ڈول فورٹ
<b>HEXIDOL PLUS</b>	(TORRENT) 10: Rs.18.90	ہکسی ڈول پلس
<b>LARENASE</b>	(LA PHARMA) 10MG: 10: Rs. 22.46	لاری نیس
<b>SENORM</b>	(SUN PHARMA) 20mg: 10: Rs. 42.41	سی نارم
<b>SENORM-S INJ</b>	(SUN PHARMA)	سی نارم ایس انجکشن
Haloperidol 5mg per ml inj 1 amps Rs. 4.40		
<b>SENORM LA INJ (SUN PHARMA) 50mg inj. 1ml vial</b>		سی نارم ایل اے
<b>SERADOL (SIGMA LABS) 10: Rs. 23.10</b>		سی راڈول
<b>SERADOL INJ (SIGMA LABS) 10x1ml amp:</b>	Rs. 44.00	سی راڈول انجکشن
<b>SERADOL PLUS (SIGMA LABS)</b>	Rs.13.81	سی راڈول پلس
<b>SERENACE (SEARLE) 5mg: per ml inj 1ml,</b>	Rs.4.56	سیری نیس
<b>TRANCODOL (INTAS) 20mg: 10,</b>	Rs. 34.00	ٹرانکوڈول
<b>TRANCODOL INJ. (INTAS) 1ml amp</b>	Rs. 4.50	ٹرانکوڈول انجکشن
<b>TRINORM (SUN PHARMA) 10mg, 10,</b>	Rs. 28.20	ٹرائی نارم

## TRAZODONE HCL

ٹرازوڈون

افعال و منافع: ڈپریشن، دل بیٹھنا، گھبراہٹ، بے چینی، نیند نہ آنا، وہم اسکازوفیرینیا، شراب کا ڈپریشن الجھن پریشانی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰ ملی گرام سوتے وقت پہلے ۳ دن تک پھر ۱۰۰ ملی گرام تک دے سکتے ہیں۔

منفی افعال: حمل، ایام رضاعت، نرسنگ خواتین کو نہیں دینا چاہیے

مضر اثرات: خشکی، چکر آنا، درد سر



احتیاط: فریسوس Periapism میں امراض قلب مرگی جگر اور گردوں کے امراض میں احتیاط برتنیں

دواؤں کے ساتھ رد عمل: D/1 مرخی عضلات Relaxant سوگھا کر بے ہوش کرنے والی ادویہ، شراب، نظام عصبی کو مفلوج کرنے والی ادویہ Maol، کلونی ڈین کے ساتھ دینا خطر ہے۔

### تجارتی مرکبات

DEPRYL-25/50/100	(PROTEC) 100mg 10: Rs.23.00	ڈپرائل
TRAZALON	(SUN PHARMA) 100mg 10:Rs.44.45	ٹرازالون
TRAZE 25/50/100	(LA PHARMA) 100mg 10: Rs. 40.52	ٹرازی
TAZODAC	(ALIDAC) 50mg 10: Rs. 20.60	ٹرازوڈیک
TRAZODEP	(TORRENT) 100mg: 10: Rs. 41.53	ٹرازوڈیپ
TRAZONIL	(INTAS) 100mg 10: Rs. 36.80	ٹرازونیل

### مسکّنات و منومات (نیند آور)

## SEDATIVES - HYPNOTICS

### کلورڈایازی پاکسائیڈ CHLORDIAZEPOXIDE

افعال و منافع: بے چینی، تناؤ، آپریشن سے قبل اور بعد کی الجھن عادت بد، نیند کی کمی بد مزاجی میں مفید ہے

مقدار و ترکیب: بالغوں کو ۱۰ ملی گرام دن میں ۲ سے ۴ مرتبہ بچوں کو بوڑھوں کو صرف ۱۰ ملی گرام دن بھر میں یا ضرورت کے مطابق

منفی افعال: یہ قان ہاتھ پیروں کی کمزوری، نفاہت، امراض قلب کے بعد صحیحیابی اور حساریضوں کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: نظام عصبی میں خلل، عادت پڑنا، خون میں تبدیلی ہونا سستی کاہلی



احتیاط: بوڑھے کمزور اور کم عمر بچوں، نشہ، حمل اور ایام رضاعت میں احتیاط برتیں

## تجارتی مرکبات

AMITROL	(TORRENT) 10: Rs.3.25	اے مٹرول
AMITROL D.S.	(TORRENT) 10: Rs.4.85	اے مٹرول ڈی ایس
AMIXIDE	(SUN PHARMA) 10: Rs.11.00	اے ماکسائیڈ
AMIXIDE-5	(SUN PHARMA) 10: Rs.10.00	اے ماکسائیڈ ۵
EQUILIBRIUM	(JAGSONPAL)	ایکویلبریم
Chlordiazepoxide 10mg tabs, 10	Rs.8.00	
EQUIREX	(JAGSONPAL) 10: Rs. 9.50	ای کیوریکس
LIMBICON	(SYSTOPIC) 10: Rs. 6.00	لی بی کون
LIBRIUM	(ROCHE)	لبریم
Chlordiazepoxide 10mg Tabs 10:	Rs. 6.00 25mg 10: Rs. 9.19	

## DIAZE PAM

## ڈایازپام

افعال و منافع: نیند نہ آنا گھبراہٹ، پریشانی اور تناؤ کو دور کرتی ہے نفسیاتی عوارض، شراب چھڑانے کے بعد کی علامات میں، عضلات کے تناؤ اور درد کو دور کرنے کے لئے مفید و موثر ہے

مقدار و ترکیب: ۱۰ سے ۳۰ ملی گرام ایک خوراک میں سوتے وقت

منفی افعال: عضلات کی نفاہت، بچوں کو، شدید گلو کو ما میں نہیں دینا چاہیے

مضر اثرات: مرکزی نظام عصبی میں خلل، مستعدی میں کمی، ہاضمہ میں خرابی ہو سکتی ہے

احتیاط: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں جگر اور گردوں کی خرابی، دماغی خرابی، اعضاء تنفس کی خرابی میں احتیاط برتنا چاہیے

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، مرخی اور مفلوج کرنے والی ادویہ سی می ٹی ڈین فین ٹائن بیہوش کرنے والی ادویہ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

ANXOL	(SIGMA LABS) 10mg: 10: Rs. 8.70	این کسول مپلیٹ
ANXOL INJ.	(SIGMA LABS) 10ml: vial: Rs. 11.90	این کسول انجکشن



CALMOD	(IDPL) 5mg tabs: 10: Rs. 6.65	کالموڈ
CALMPOSE	(RANBAXY) 5mg tabs 10: Rs. 8.00	کالمپوز ٹبلٹ
CALMPOSE INJ (RANBAXY) 10x2ml amps.	Rs. 70.10	کالمپوز انجکشن
CALMPOSE SUSPENSION (RANBAXY) 60ml:	Rs. 16.80	کالمپوز سرب
CAMRELEASE-TR (NATCO) 15mg: 10: Rs. 15.00		کیمری لیزنی آر
DIZEP	(INTAS) 10mg: 10: Rs. 3.70	ڈائی زیپ
DIZEP -P INJ (PREM PHARMA) 2ml: Rs. 5.00		ڈائی زیپ پی انجکشن
ELCION CR (RANBAXY) 10mg e-r caps: 10 Rs. 11.98		الکون کری آر
LORI INJ (NEON) 10x2ml amps; Rs. 65.00		لوری انجکشن
NEOMESMAR TABS (DEYS) 10mg tabs: 10: Rs. 3.50		نیو میس مار ٹبلٹ
PAXUM (EST INDIA) 5mg: tabs 10 Rs. 5.61		پاکسوم
PAXUM INJ (EST INDIA) 2ml, Rs. 2.85		پاکسوم انجکشن
PEACIN (LA PHARMA) 5mg tabs 10: Rs. 2.81		پی سین
PLACIDOX (LUPIN) 10mg: 10's: Rs. 10.69		پلاکسی ڈاکس
VALIUM-2,5,10 (ROCHE) 10: Rs. 10.24		والمیم ۱۰-۵-۲

## FLURAZEPAM

## فلورازی پام

افعال و منافع: نیند نہ آنا، بے خوابی سہر Insomnia بے چینی میں مفید ہے

مقدار و ترکیب: ۱۵ سے ۲۰ ملی گرام سوتے وقت

مضر اثرات: کالی وستی، چکر آنا، خشکی، عادت پڑنا ضدی

احتیاط: طویل عرصہ استعمال کرنے، اچانک دوا بند کرنے لو بلڈ پریشر، عضلات کی کمزوری، قلب و جگر گردوں کی خرابی، نفسیاتی الجھنوں، گلوکوما، اسکائرزوفیرینیا، مرگی، ڈپریشن حمل اور ۱۵ سال سے کم عمر میں احتیاط برتن

دواؤں کے ساتھ رد عمل: مرکزی نظام عصبی کو مفلوج کرنے والی ادویہ، شراب، ڈائی سلفوریم، سی می ٹی ڈین اور دودھ روکنے والی دواؤں کے ساتھ استعمال نہ کرائیں

## تجارتی مرکبات

نندرال (TORRENT) Flurazepam 15mg caps 10: Rs. 16.70



## HYDROXYZINE

## ہائیڈروکسائی زین

افعال و منافع: چکر بے چینی، ڈر خوف، آپریشن سے پہلے اور بعد کی الجھن گھبراہٹ کے لئے، نیند نہ آنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ڈھائی سے ۵ ملی گرام دن میں ۳ بار کھانے کے بعد

منفی افعال: c/1 حالت حمل میں دینا منع ہے

مضر اثرات: خشکی، جگر اور معدہ کی رطوبات میں کمی، زیادہ مقدار میں استعمال سے حرکات غیر ارادی کرنا

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، نظام عصبی کو خراب کرنے والی ادویہ، مانع انجماد خون ادویہ، کے ساتھ استعمال مضر ہے

## تجارتی مرکبات

ATARAX TABS	(UNI-UCB) 25mg: 10, Rs. 9.80	اتاریکس ٹبلٹ
ATARAX SYRUP	(UNI-UCB) 100ml Rs. 26.05	اتاریکس سیرپ
ATARAX DROPS	(UNI-UCB) drop; 15ml Rs. 16.50	اتاریکس ڈراپس
ATARAX INJ	(UNI-UCB) 2ml Rs. 6.51	اتاریکس انجکشن
VESPARAX	(UNI-UCB) 4: Rs. 4.50	ویس پاریکس

## LORAZEPALM

## لورازی پام

افعال و منافع: بے چینی، ڈر خوف، آپریشن سے پہلے اور بعد کی الجھن اور گھبراہٹ کے لئے اور نیند نہ آنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: معمولی حالت میں ۱ سے ۴ ملی گرام روزانہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے شدید حالتوں میں ۱۰ ملی گرام کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے آپریشن کی گھبراہٹ کے لئے ۲ سے ۳ ملی گرام نیند نہ آنے کے لئے ۱ سے ۲ ملی گرام سوتے وقت

منفی افعال: c/1 لورازی پام سے حساس مریضوں اور گلوکوما کے مریضوں کو نہ دی جائے  
مضر اثرات: گھبراہٹ خلق خشک سونے سے اٹھنے پر درد سر، چکر آنا بصارت میں فرق متلی،



احتیاط: جگر اور گردوں کے مریضوں نچیف و لاغر مریض، حمل ایام رضاعت کے دوران احتیاط برتیں دوا کے دوران ڈرائیوری اور مشنری چلانے سے باز رہیں۔

## تجارتی مرکبات

ATIVAN	(WYETH) 2mg: 10: Rs. 7.90	اے ٹی وان
CALMESE	(THEMIS CHEMICALS) 2mg: 10: Rs. 7.36	کالمنس ٹبلٹ
CALMESE INJ	(THEMIS CHEMICALS) 2ml: 10: Rs. 7.36	کالمنس انجکشن
LARPOSE	(CIPLA) 2mg: 10: Rs. 8.25	لارپوز
TRAPEX	(SUN PHARMA) 2mg 10, Rs. 7.00	ٹراپیکس

## NITRAZEPALM

## نائٹرازی پام



افعال و منافع: ہر قسم کی بے خوابی، نیند غائب ہونے میں مفید ہے  
مقدار و ترکیب: ۵ سے ۱۰ ملی گرام سوتے وقت

منفی افعال: عضلات کی کمزوری اور کمزور مریضوں میں استعمال نہ کرائیں  
مضر اثرات: کاپی، سستی، حرکات غیر ارادی مرکزی نظام عصبی میں خلل  
احتیاط: نظام تنفس کی کمزوری میں حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں احتیاط برتیں  
دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، نظام عصبی کو مفلوج کرنے والی ادویہ کے ساتھ نہیں دینا  
چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

DORMIN-5/10	(MICRO LABS)	ڈورمن
NIPAM	(LA PHARMA) 10mg tabs 10: Rs. 8.50	نیپام
NITAVAN 5/10	(STADMED) 10mg: 10: Rs. 9.40	نٹاوان ۵-۱۰
NITRAVET	(ANGLO FRENCH) 10mg: 10: Rs. 10.40	نائٹراویٹ
NITRAVET KID TABS	(ANGLO FRENCH) 2.5mg: 10: Rs. 4.50	نائٹراویٹ بچوں والی
NITROSUN	(SUN PHARMA) 10mg: 10: Rs. 10.40	نائٹروسن
RESTOREM	(BDH) 10mg: 10: Rs. 7.20	ریسٹورم



## OXAZEPAM

آکسازپیام

افعال و منافع: بے چینی، تناؤ، ضدی پن، نفسیاتی دباؤ میں مفید ہے

مقدار و ترکیب: ۱۵ سے ۳۰ ملی گرام دن ۲-۳ بار

منفی افعال: خلل دماغی اور ۶ سال سے کم عمر بچوں کو نہ دی جائے

احتیاط: جگر اور گردوں کی خرابی، مرگی، حمل اور ایام رضاعت میں احتیاط برتیں

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، نظام عصبی کو مفلوج کرنے والی ادویہ انجماد خون کو روکنے والی

خوردنی ادویہ کے ساتھ رد عمل خراب ہوتا ہے۔

### تجارتی مرکبات

SEREPAX (WYETH) Oxazepam 15mg tabs 10, Rs. 5.90 سیری پیکس

SEREPAX 30 TABS (WYETH) سیری پیکس ۳۰

Oxazepam 30mg tabs 10, Rs. 9.80

## PHENOBARBITONE

فینوباربیٹون

افعال و منافع: بے خوابی، درد کو روکنے، مرگی، زچگی کے دوروں میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۳۰ سے ۲۱۰ ملی گرام یومیہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے شدید مرگی کے لئے ۴۰۰

۸۰۰ ملی گرام زچگی کے دوروں میں ۲۰ ملی گرام دینا چاہیے

منفی افعال: c/1 خلل دماغی گردوں اور جگر کی خرابی، قلب کی خرابی شدید ضعف میں نہیں دینا چاہیے

مضر اثرات: سستی کا بلی، ڈر خوف سے جلد متاثر ہونا، عادی ہونے کا خطرہ

احتیاط: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں، اچانک دوا بند کرنے میں احتیاط برتیں۔

### تجارتی مرکبات

GARDENAL (RHONE POULENC)

30mg: 10: Rs. 4.88, 60mg: 10: Rs. 6.72

LUMINAL (BAYER) 100mg: 50 Rs. 5.25

گارڈی نال

لومی نال



LUMINALETES

(BAYER)

لومی نالیٹ

Phenobarbitone 15mg tabs 30 Rs. 1.33

PHENOBARB 30/60 (INTAS) 10: Rs. 3.80

PHENOBARBITONE SOD. INJ (RHONE POULENC) ۶۰/۳۰ فینو بارب ۱۰/۳۰

10x1 ml: Rs. 121.28

TRICLOFOS SODIUM

ٹرائی کلوفوس سوڈیم

افعال و منافع: نیند آور منوم دوا ہے۔ نیند کے عمل کو تیز کر کے جلد نیند لاتی ہے

مقدار و ترکیب: سونے سے ۳۰ منٹ قبل بچوں کو ۲۵۰ سے ۵۰۰ ملی گرام عمر کے حساب سے دی

جائے۔ تسکین درد کے لئے ۵۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار۔

منفی اثرات: جگر اور گردوں کے امراض، قلب کے شدید امراض میں نہیں دینا چاہیے

مضر اثرات: معمولی درد سر، ہاضمے کی خرابیاں جسم پر داغ پڑنا۔

احتیاط: شوگر ٹسٹ کا نتیجہ غلط برآمد ہونے پر، دوا کے استعمال کے بعد ڈرائیوری اور مشنری چلانے

سے احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: MAOI؟ شراب، باربیٹون کے مرکبات مانع انجماد خون ادویہ۔

تجارتی مرکبات

TRICLORYL SYRUP

(GLAXO)

ٹرائی کلورائل

Triclofos Sodium BP 500mg per 5ml liquid 50 ml: Rs. 33.10

جراثیم کش ادویہ (انٹی بائیوٹک)

ANTIBIOTICS

AMIKACIN

امی کاسین

افعال و منافع: شدید انفکشن، متعدد امراض، گرام مثبت Gram-Positive گرام منفی

Septice mia Gram- Negative جراثیم سے پیدا ہونے والے امراض مثلاً تعفن الدم



آلات تنفس کے انفکشن، سرسام، آنتوں کی سوزش، ورم، آپریشن کے بعد کے زخم، جلنے کے زخم ایسے جراثیم جو دوسری انٹی بائیوٹک سے ختم نہ ہو سکیں بار بار ہونے والے انفکشن، آلات بول کے انفکشن وغیرہ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۵ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے دن میں ۲ بار تقسیم کر کے عضلاتی یا وریدی انجکشن لگائیں۔ نو مولود بچوں کو ۱۰ ملی گرام وزن کے حساب سے دن میں ۲ بار۔ خطرناک اور مہلک انفکشن جس میں زندگی کو خطرہ لاحق ہو ۵۰۰ ملی گرام ہر ۸ گھنٹہ بعد دینا چاہیے زیادہ سے زیادہ ڈیرہ ۱۰ گرام یومیہ ۱۰ دن سے زیادہ علاج جاری نہ رکھیں۔

منفی افعال: ۱/ حمل ایام رضاعت اور گردوں کی خرابی میں دینا نقصان دہ ہے۔

احتیاط: جسم میں پانی کی کمی Dehydration میں مقدار خوراک کم دیں علاج سے پہلے پانی کی کمی کو پورا کرنا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

<b>AMIBIOTIC INJ 500/250/100</b>	(NEON)	ایمی بائیوٹک انجکشن
100mg: 2ml vial Rs. 16.00		
<b>AMICIN</b>	(BIOCHEM)	ایمی سین
250mg: vial Rs. 38.00: 500mg: vial Rs. 62.00		
<b>AMIKACIN INJ</b>	(PREM PHARMA)	ایمی کاسین
500mg: 2ml vial: Rs. 62.00		
<b>AMIRON</b>	(KAMRON) 500mg: 2ml vial: Rs. 54.00	ایمی ران
<b>ARKACIN</b>	(MICRO LABS)	ارکاسن
<b>IVIMICIN</b>	(FDC) 500mg: 2ml vial Rs. 60.05	ایوی مائی سین
<b>MIKAJECT</b>	(TROIKAA) (500mg: 2ml vial: Rs. 58.67	می کاجیکٹ
<b>MIKACIN</b>	(ARISTO) 500mg vial Rs. 62.00	می کاسین
<b>PRIMIKACIN</b>	(HIND ANTIBIOTICS)	پرائی می کاسن
• URTI • Sinusitis • Otitis media • UTI Uncomplicated		





# AMOXYCILLIN

## ایموکسایسلین

افعال و منافع: آلات بول U.T.I.، آلات تنفس R.T.I. آلات ہضم G.T.I. کے انفکشن، سرسام، ورم غلاف القلب، صفرا کی نالی کا انفکشن جلد اور نرم ساختوں کے انفکشن سوزاک کان ناک حلق E.N.T کے انفکشن سے حفاظت اور علاج کے لئے مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: معمولی اور اوسط درجے کے انفکشن میں ۲۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار شدید انفکشن میں ۵۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار بچوں کو ۲۰ سے ۴۰ ملی گرام وزن کے حساب سے روزانہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے ہر ۸ گھنٹہ بعد سوزاک میں اگر ام کی ایک خوراک دی جائے۔

منفی افعال: اپنی سیلین سے الرجک افراد میں  
مضر اثرات: نظام ہضم کی خرابی، اسہال کی شکایت ہو سکتی ہے  
احتیاط: الرجک ری ایکشن میں، مونونیو کلو سس کے انفکشن میں احتیاط برتیں۔

## تجارتی مرکبات

AMBROX (DEE PHARMA)	ایم براکس
250mg: 10: Rs.28.50; 500mg: 10:Rs.52.50	
AMOKID (DEE PHARMA) 250mg:10:Rs.29.50	ایموکڈ
AMONATE (DEE PHARMA) 125mg: caps 6: Rs. 138.00	ایمو نیٹ
AMOTID (DOLPHIN)	ایمو ٹیڈ
250mg: 6: Rs.15.09; 500mg: 6: Rs. 29.07	
AMOTID BR (DOLPHIN)	ایمو ٹیڈ بی آر
250mg: 6: Rs.17.59 500mg: 6: Rs.33.23	
AMOXIL (GERMAN REMEDIES)	ایمو سیل
250mg: 6: Rs. 18.21; 500mg: 6: Rs.34.70	
AMOXIVAN (KHANDELWAL) 500mg: 6, Rs. 32.40	ایمو کی وان
AMOXIVAN DRY SYRUP (KHANDELWAL)	ایمو کی وان سیرپ
60ml: Rs. 25.17	
AMOXYBID (BIDDLE SAWYER)	ایمو کی بیڈ
250mg: 6: Rs.18.02; 500mg: 6: Rs.34.30	



<b>AMOXYBID DRY SYRUP</b> (BIDDLE SAWYER)	ایموکسی بڈسیرپ
60ml Rs.23.40	
<b>AMOXYCILLIN CAPS</b> (LYKA)	ایموکسی سیلین کپسول
250mg: Caps: 100's Rs.220.00	
<b>BIOMOX DRY SYRUP</b> (BIOCHEM) 30ml: Rs. 13.20	بیو موکسی سیرپ
<b>BIOMOX CAPS</b> (BIOCHEM)	بیو موکسی کپسول
250mg: 10caps Rs. 30.95; 500mg: 10caps Rs. 58.90	
<b>BIOMOX PAED. DROPS</b> (BIOCHEM) 10ml:Rs. 14.40	بیو موکسی ڈراپس
<b>BLUMOX 250/500</b> (BLUE CROSS)	بلو موکس
250mg: 10:Rs.32.00, 500mg:6:Rs.33.00	
<b>BLUMOX-P</b> (BLUE CROSS)	بلو موکسی پی
125mg, disp. kid tabs.10, Rs.20.00	
<b>BLUMOX BH</b> (BLUE CROSS) 10's: Rs.33.00	بلو موکسی بی ایچ
<b>BLUMOX BH DT 250/500</b> (BLUE CROSS)	بلو موکسی ڈی ٹی
250mg: 10: Rs. 33.00: 500mg: 6 Rs. 35.00	
<b>BROMOLIN CAPS</b> (PROTEC)	برو مولن کپسول
250mg : 15: Rs. 46.20: 500mg: 6: Rs.35.30	
<b>BROMOLIN D.T.</b> (PROTEC)	برو مولن کپسول
125mg: 6: Rs.12.00; 250mg: 6: Rs. 18.60	
<b>BROMOLIN SYRUP</b> (PROTEC) 30ml: Rs.20.30	برو مولن کپسول
<b>BROMOXYL FORTE</b> (CONCEPT)	برو موکسی ایل فورٹ
250mg: 10: Rs.31.20, 500mg: 10: Rs.59.40	
<b>CARBOMOX 250/500</b> (WIN MEDICARE)	کاربو موکس
250mg: 6: Rs.29.70; 500mg: 6: Rs.46.80	
<b>CIDOMEX</b> (ROUSSEL)	سی ڈو میکس
250mg: 6, Rs.16.86; 500mg: 6, 33.78	
<b>CIDOMEX DRY SYRUP</b> (ROUSSEL) 60ml: Rs.21.11	سی ڈو میکس
<b>CIDORESP 250</b> (ROUSSEL) 250mg: 6: Rs.20.27	سی ڈو ریسپ
<b>CLAVUNATE</b> (MAX) 6: Rs.165.00	کلاوونیت
<b>DAMOXY DRY SYRUP</b> (DABUR) 60ml Rs.21.26	ڈاموکسی سیرپ
<b>DAMOXY PAED DROPS</b> (DABUR) 10ml Rs.13.89	ڈاموکسی ڈراپس



<b>DANEMOX</b>	(SOL)	ڈانی موکس
Amoxycillin 250mg 10x10: Rs. 224.50, Amoxycillin 500mg 10x10: Rs. 429.70		
<b>DANEMOX FORTE</b>	(SOL)	ڈانی موکس فورٹ
Amoxycillin trihydrate 250mg dispersible tabs 10x10: Rs. 224.50		
<b>DANEMOX-KID</b>	(SOL)	ڈانی موکس کڈ
Amoxycillin trihydrate 125mg tabs 25x10: Rs. 375.00		
<b>DELAMIN</b>	(HIND ANTIBIOTICS)	ڈی لامن
250mg: 6: Rs. 16.51; 500mg: 6: Rs. 31.37		
<b>DELAMIN DISTABS</b>	(HIND ANTIBIOTICS)	ڈی لامن ڈس ٹبلٹ
Amoxycillin trihydrate 125mg dis. tabs 10: Rs. 11.09		
<b>DELAMIN ORAL SUSP</b>	(HIND ANTIBIOTICS)	ڈی لامن سرپ
40ml Rs. 14.66		
<b>DICIMOX</b>	(INDOCO)	ڈی سی موکس
250mg: 4: Rs. 11.83, 500mg: 4: Rs. 19.95		
<b>DICIMOX KID</b>	(INDOCO)	ڈی سی موکس کڈ
Amoxycillin 125mg: disp. tabs: 10: Rs. 15.96		
<b>FALMOX (FALMA)</b>	125mg: 10: Rs. 26.50; 500mg: 10: Rs. 49.20	فالموکس
<b>FALMOX DRY SYRUP (FALMA)</b>	60ml: Rs. 18.95	فالموکس سرپ
<b>FALMOX DISTAB (FALMA)</b>	250mg: 10: Rs. 28.95	فالموکس ڈسٹبلٹ
<b>FLEMICLOX</b>	(MEJDA)	فلے می کلاکس
Amoxycillin 250mg cloxacillin 250mg caps 6: Rs. 25.60		
<b>FLEMIPEN</b>	(MEJDA)	فلے می پن کپسول
250mg: 15: Rs. 40.69 500mg: 6: Rs. 31.01		
<b>FLEMIPEN DROPS</b>	(MEJDA) 10ml: Rs. 14.10	فلے می پن ڈراپس
<b>FLEMIPEN DRY SYRUP (MEJDA)</b>	40ml: Rs. 24.86	فلے می پن سرپ
<b>FLEMOXIN</b>	(EAST INDIA) 40ml Rs. 14.27	فلے موکسن
<b>GUTENFLOX</b>	(MERCK) 500mg: 6: Rs. 33.01	گوٹن فلوکس
<b>HYCIMOX</b>	(PHARMED)	ہائی سی موکس
250mg : 10: Rs. 26.26 : 500mg: 10: Rs. 49.92		
<b>HYKIL</b>	(REMEDIES (INDIA)	ہائی کل
250mg: 10: Rs. 26.50; 500mg: 10: Rs. 49.90		



<b>HYKIL DRY SYRUP</b>	(REMIDIES (INDIA)	ہائی کل سرپ
60ml Rs.19.46		
<b>HYKIL PLUS CAPS</b>	(REMIDIES (INDIA)	ہائی کل پلس
Amoxycillin 250mg cloxacillin 250mg caps 6	Rs. 29.61	
<b>IDIMOX</b>	(IDPL)	آئی ڈی موکس
250mg: 6: Rs.15.88; 500mg: 6: Rs.30.18		
<b>IDIMOX DRY SYRUP</b>	(IDPL) 60ml Rs. 19.60	آئی ڈی موکس سرپ
<b>IMOX</b>	(IPCA)	آئی موکس
250mg: 6: Rs. 16.25; 500mg: 6: Rs. 30.95		
<b>IMOX-CLO</b>	(IPCA) 250mg: caps: 6:Rs.31.22	آئی موکس کلو
<b>LAMKLOX</b>	(LYKA) caps 6: Rs.36.42	لیم کلاکس
<b>LAMOXY</b>	(LYKA) 250mg: 3: Rs.8.01 500mg: 3: Rs.15.50	لاموکسی
<b>LAMOXY DRY SYRUP</b>	(LYKA) 40ml:Rs.23.68	لاموکسی ڈرائی سرپ
<b>LAMOXY DISP. TAB</b>	(LYKA) 250mg: 10: Rs.20.77	لاموکسی ڈسپلٹ
<b>LAMOXY-BX</b>	(LYKA) caps 6: Rs.19.50	لاموکسی بی۔ایکس
<b>MATA-PX 250/500</b>	(NATCO)	ماتا پی ایکس
250mg: 10: Rs.22.45, 500mg: 10: Rs. 43.15		
<b>MAXMOX</b>	(MAX)	میکس موکس
250mg: 6, Rs. 16.23; 500mg: 6, Ra. 30.14; Syrup 40ml, Rs.14.00;		
Drops: 10ml, Rs.13.24		
<b>METAMOX</b>	(BDH) 250mg: caps: 10: Rs.25.52	میٹاموکس
<b>METAMOX DRY SYRUP</b>	(BDH) 60ml: Rs. 19.80	میٹاموکس سرپ
<b>METACLOX</b>	(BDH) 250mg: caps: 10: Rs. 51.00	میٹاکلاکس
<b>MINOXIL DRY SYRUP</b>	(P&B LABS) 40ml Rs. 14.90	میناکسل سرپ
<b>MOCLOX</b>	(KIPRAN) 250mg: caps 6: Rs. 33.10	موکلاکس
<b>MOCLOX DRY SYRUP</b>	(KOPRAN) 40ml: Rs. 25.88	موکلاکس سرپ
<b>MOX</b>	(GUFIC) 250mg: 15:Rs. 40.64, 500mg: 15:Rs.74.92	موکس
<b>MOX DRY SYRUP</b>	(GUFIC) 60ml :Rs.35.49	موکس سرپ
<b>MOX INJ.</b>	(GUFIC)	موکس انجکشن
250mg vial,Rs.11.70, 500mg vial, Rs.19.20		
<b>MOXILUM</b>	(BIOCHEM)	موکسی لم
250mg: 10: Rs. 26.95, 500mg: 4: Rs. 48.90		



<b>MOXILUM DRY SYRUP</b> (BIOCHEM) 40ml: Rs. 15.31	موکسی لم سرپ
<b>MOXILUM PAED. DROPS</b> (BIOCHEM) 20ml: Rs. 10.31	موکسی لم ڈراپس
<b>MOXYCARB</b> (NICHOLAS)	موکسی کارب
250mg: 10: Rs. 38.79; 500mg: 10: Rs. 63.30	
<b>MOXYDIL</b> (DUPHAR)	موکسی ڈل
250mg: 6: Rs. 16.29, 500mg: 6: Rs. 31.02	
<b>MOXYDIL INJ</b> (DUPHAR)	موکسی ڈل انجکشن
250mg 5 ml vial Rs. 13.32; 500mg: 5ml vial; Rs. 22.62	
<b>MOXYDIL SYRUP</b> (DUPHAR) 40ml: Rs. 23.66	موکسی ڈل سرپ
<b>MYCOCIN</b> (CFL) 10: Rs. 31.82	مائی کو سین
<b>MYCOCIN FORTE CAPS.</b> (CFL) caps 10: Rs. 54.42	مائی کو سین کپسول
<b>MYCOCIN DRY SYRUP</b> (CFL) 30ml: Rs. 21.14	مائی کو سین سرپ
<b>NATAMOX</b> (NATCO) 250mg: 15: Rs. 40.15	ناٹو موکس
<b>NATAMOX PAEDIATRIC DROPS</b> (NATCO)	ناٹو موکس ڈراپس
10ml: Rs. 15.62	
<b>NOVACLOX</b> (CIPLA) caps 9: Rs. 43.75	نو واکلاکس
<b>NOVACLOX PED TABS</b> (CIPLA) tabs 15: Rs. 40.11	نو واکلاکس ٹیبلٹ
<b>NOVAMOX</b> (CIPLA)	نو واکس
caps: 250mg: 15: Rs. 54.00, 500mg: 6: Rs. 39.00	
<b>NOVAMOX DRY SYRUP</b> (CIPLA)	نو واکس سرپ
syrup 30ml: Rs. 14.50, 60ml: Rs. 26.00	
<b>NOVAMOX DT</b> (CIPLA) 250mg: 15: Rs. 48.15	نو واکس ڈی ٹی
<b>NUMOX 250</b> (JENBURKT) 2ml vial; Rs. 17.50	نو موکس ۲۵۰
<b>NUMOX 500</b> (JENBURKT) 2ml vial; Rs. 23.90	نو موکس ۵۰۰
<b>NUMOX 1000</b> (JENBURKT)	نو موکس ۱۰۰۰
500mg, inj. 3ml vial; Rs. 35.00	
<b>OMNIPEN</b> (PHARMED) 250mg caps : 10: Rs. 53.50	اوم نی پن
<b>OPTIMOX-B</b> (TROIKAA)	آپٹی موکس بی
Amoxycillin 250mg & bromhexine hcl 8mg: tabs: 10: Rs. 32.50	
<b>OPTIMOX</b> (TROIKAA)	آپٹی موکس
200mg: 10: Rs. 30.00, 500mg: 10: Rs. 56.00	
<b>OPTIMOX INJ</b> (TROIKAA) 500mg 1 vial: Rs. 21.20	آپٹی موکس انجکشن



<b>PHENOXYL (RECON)</b>	250mg: 10: Rs. 29.00, 500mg: 10: Rs. 52.00	فینوکسل کپسول
<b>PHENOXYL DRY SYRUP (RECON)</b>	60ml: Rs. 23.00	فینوکسل سیرپ
<b>RESPIMOX (WOCKHARDT)</b>	caps; 250mg: 6, Rs.21.10; 500mg: 6, Rs. 36.00; Syrup Amoxycillin 125mg, 250mg, bromhexine hcl; 4mg & 8mg per 5ml, 125mg: 30ml: Rs. 15.70; 250mg: 30ml, Rs. 22.90	ریسپی موکسل
<b>SUPRIMOX (GUFIC)</b>	250mg: caps 12: Rs. 59.90	سپری موکسل
<b>SUPRIMOX INJ (GUFIC)</b>	500mg vial: Rs.19.10	سپری موکسل انجکشن
<b>SYMOXYL (SARABHAI)</b>	250mg: 6: Rs. 17.95; 500mg: 6: Rs. 34.80	سائی موکسل
<b>SYMOXYL DRY SYRUP (SARABHAI)</b>	60ml Rs.20.57	سائی موکسل سیرپ
<b>SYMOXYL BR (SARABHAI)</b>	250mg: 6:Rs.18.36, 500mg:6:Rs. 33.82	سائی موکسل بی آر
<b>SYMOXYL BR SUSP (SARABHAI)</b>	30ml: Rs.14.28	سائی موکسل بی آر سیرپ
<b>TRESMOX (SARABHAI)</b>	Amoxycillin 250mg Cloxacillin 250 caps; 6, Rs. 24.79	ٹریس موکسل
<b>TORMOXIN (TORRENT)</b>	250mg: 6: Rs. 19.50; 500mg: 6: Rs. 37.50	ٹار موکسن
<b>TORMOXIN DRY SYRUP (TORRENT)</b>	300ml: Rs.11.38	ٹار موکسن
<b>WARCILIN (PARKE DAVIS)</b>	250mg: 3: Rs. 6.50; 500mg: 3: Rs. 12.98	وار سیلین کپسول
<b>WARCILIN DRY SYRUP (PARKE DAVIS)</b>	30ml Rs. 9.00 60ml Rs. 15.51	وار سیلین کپسول
<b>XYTID (KAMRON)</b>	250mg:10:Rs.29.27, 500mg:10:Rs.58.39	زائی ٹڈ
<b>XYTID DRY SYRUP (KAMRON)</b>	30ml: Rs.11.95	زائی ٹڈ سیرپ
<b>ZAMOX 250/500 (PFIMEX)</b>	caps 250mg: 10: Rs. 25.00 500mg: 10: Rs. 45.00	زاموکس کپسول
<b>ZAMOX DISPERSIBLE TABS (PFIMEX)</b>	125mg: 10: Rs. 14.50mg: 10: Rs. 27.50	زاموکس ٹبلیٹ



# AMPICILLIN

## ایمپی سیلین

افعال و منافع: گرام مثبت Gram Positive اور گرام منفی Gram Negative جراثیم (بکٹیریا) سے پیدا ہونے والے امراض پھیپھڑوں کے انفیکشن، پیشاب کی نالی UTI غذائی نالی (G.I.T.I.) ناک کان حلق E.N.T. انفیکشن، نمونیہ، سوزاک کے لئے مفید ترین دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵۰ ملی گرام سے ۱ گرام ہر ۶ گھنٹہ بعد، بچوں کو ۱۵۰ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے روزانہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔

منفی افعال: اپنی سیلین سے حساس مریضوں میں الرجی ہو سکتی ہے۔

مضر اثرات: نظام ہضم میں خلل واقع ہوتا ہے۔

احتیاط: مونونیوکلوسس، گردوں کی خرابی، اور حمل میں احتیاط برتنا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: پروبنیڈ کے ساتھ اس کے اثرات خون میں دیر تک قائم رہتے ہیں۔

## تجارتی مرکبات

<b>ADILOX</b>	(ALBERT DAVID)	اے ڈی لاکس
Ampicillin 250mg cloxacillin 250mg caps; 10, Rs. 44.92		
<b>ALBERCILIN</b>	(HOECHST)	البر سیلین
250mg: 4: Rs. 6.97 500mg: 4: Rs. 12.96		
<b>ALBERCILIN DROPS</b>	(HOECHST) 10ml	البر سیلین
<b>ALBERCILIN INJ</b>	(HOECHST)	البر سیلین
250mg; vial; Rs. 6.99, 500mg; Rs. 9.63		
<b>AMCLOX</b>	(WALTER BUSHNELL) 250mg: caps 8:	ایم کلاکس
Rs. 52.25		
<b>AMCLOX INJ</b>	(WALTER BUSHNELL) 1 vial:	ایم کلاکس
Rs. 14.50		
<b>AMPIDIL</b>	(DUPHAR) 250mg caps 100:	ایمپی ڈل
Rs. 196.00		
<b>AMPIDIL SYRUP</b>	(DUPHAR) 40ml	ایمپی ڈل سرپ
Rs. 8.82		
<b>AMPILIN</b>	(LYKA) 250mg: 16, Rs. 42.35; 500mg; 8,	ایم پی لین
Rs. 41.90		
<b>AMPILIN DRY SYRUP</b>	(LYKA) 40ml:	ایم پی لین سرپ
Rs. 25.25		
<b>AMPILIN TABS</b>	(LYKA) 10:	ایمپی لین ٹبلیٹ
Rs. 15.33		



<b>AMPILIN INJ</b>	(LYKA)	اپنی لین انجکشن
250mg: 1: Rs. 9.80 500mg: 1: Rs. 11.94 1g: Rs. 18.95		
<b>AMPILOX</b>	(BIOCHEM) 250mg caps 10: Rs. 52.50	اپنی لاکس
<b>AMPILOX DRY SYRUP</b>	(BIOCHEM) 40ml: Rs. 27.00	اپنی لاکس سیرپ
<b>AMPILOX DS INJ</b>	(BIOCHEM)	اپنی لاکس ڈی ایس انجکشن
Ampicillin 500mg, Cloxacillin 500mg inj Vial: Rs. 19.84		
<b>AMPILOX INJ</b>	(BIOCHEM)	اپنی لاکس انجکشن
Ampicillin 250mg Cloxacillin inj vial Rs. 13.92		
<b>AMPILOX PAEDIATRIC INJ</b>	(BIOCHEM) (بچوں والا)	اپنی لاکس انجکشن
Ampicillin 125mg: cloxacillin 125mg inj vial Rs. 10.25		
<b>AMPLUS</b>	(JAGSONPAL)	ایم پلس
Ampicillin 250mg Cloxaacillin 250mg lactobacillus sporogenes 60million caps 10, Rs. 58.80		
<b>AMPLUS INJ</b>	(JAGSONPAL)	ایم پلس انجکشن
Ampicillin 250mg Cloxacillin 250mg vial Rs. 14.20		
<b>AMPIPEN</b>	(WYETH) 250mg: 10: Rs. 26.59; 500mg: 10: Rs. 50.24	ایم پی پن
<b>AMPIPENDRY POWDER</b>	(WYETH) 60ml: Rs. 20.25	ایم پی پن سیرپ
<b>AMPISYN</b>	(CIPLA) Inj. 5ml vial Rs. 5.42	ایم پی سائن
<b>AMPISYN CAPS</b>	(CIPLA)	ایم پی سائن کپسول
250mg: 4: Rs. 6.72 500mg: 4: Rs. 12.69		
<b>AMPISYN SYRUP</b>	(CIPLA) 40ml Rs. 9.54	ایم پی سائن سیرپ
<b>AMPITUM</b>	(FDC) 1.5g vial inj Rs. 93.30	ایم پی ٹم
<b>AMPITUM 750 INJ</b>	(FDC) 0.75g vial inj Rs. 50.65	ایم پی ٹم ۷۵۰ انجکشن
<b>AMPOXIN</b>	(UNICHEM)	ایم پاکسن
250mg: 10: Rs. 26.95; 500mg: 10 Rs. 49.90		
<b>AMPOXIN DRY SYRUP</b>	(UNICHEM)	ایم پاکسن سیرپ
30ml Rs. 22.90, 60ml: Rs. 41.00		
<b>ANTIBIOTICS</b>	(PREM PHARMA) 500mg 10ml vial Rs. 11.50	انٹی بائیوٹک
<b>ARISTOCILLIN</b>	(ARISTO) 250mg: 4: Rs. 10.36, 500mg: 8: Rs. 45.02	ارٹھوسیلین
<b>ARISTOCILLIN INJ</b>	(ARISTO)	ارٹھوسیلین انجکشن
250mg: vial Rs. 9.57, 500mg: vial, Rs. 13.14		
<b>BACIPEN</b>	(ALEMBIC) 250mg: 4: Rs. 11.50; 500mg: 4: Rs. 21.50	باسی پن



<b>BACIPEN INJ</b>	(ALEMBIC)	باسی پن انجکشن
250mg: vial: Rs.8.00; 500mg: vial: Rs.11.50		
<b>BAXIN</b>	(LYKA) 250mg caps 8: Rs. 39.50	باکسن کپسول
<b>BAXINSYRUP</b>	(LYKA) 24g: Rs. 27.64	باکسن سیرپ
<b>BAXIN INJ</b>	(LYKA)	باکسن انجکشن
250mg: 1 vial: Rs.11.76 500mg: 1 vial: Rs. 15.09 1000mg: 1 vial: Rs.21.03		
<b>BETAMAP</b>	(TORRENT) 1vial Rs. 78.10	بتامپ انجکشن
<b>BETAMAP ORAL</b>	(TORRENT) tabs: 4: Rs.170.00	بتامپ اورل
<b>BICLOPEN CAPS</b>	(P&B LABS) 250mg caps; 10 caps Rs. 49.50	بکلوپین کپسول
<b>BICLOPEN INJ</b>	(P&B LABS) 1vial Rs. 14.14	بکلوپین انجکشن
<b>BILACTAM FORTE</b>	(CFL) 250mg: caps 4: Rs. 19.80	بی لاکٹام فورٹ
<b>BILACTAM DRY SYRUP</b>	(CFL) 60ml: Rs. 40.10	بی لاکٹام سیرپ
<b>BIOCILIN</b>	(BIOCHEM) 250mg: 10 Rs. 30.75, 500mg: 10: Rs. 56.95	بایوسیلین
<b>BIOCILIN DROPS</b>	(BIOCHEM) 10ml: Rs.15.50	بایوسیلین ڈراپس
<b>BIOCILIN DRY SYRUP</b>	(BIOCHEM) 30ml: Rs.15.50	بایوسیلین سیرپ
<b>BIOCILIN INJ</b>	(BIOCHEM)	بایوسیلین انجکشن
250mg: Rs.10.75, 500mg: Rs.15.00, 1g: Rs.20.95		
<b>BLUCILLIN TABS</b>	(BLUE CROSS)	بلوسیلین ٹبلٹ
Ampicillin 250mg tabs; 10: Rs. 26.80		
<b>BLUCILLIN INJ</b>	(BLUE CROSS)	بلوسیلین انجکشن
Ampicillin 500mg/3ml inj. 1 amp: Rs.12.10		
<b>BLUCLOX 500/250</b>	(BLUE CROSS)	بلوکلاکس ۵۰۰/۲۵۰
Ampicillin 250mg, cloxacillin 250mg/3ml inj Rs. 12.50, Ampicillin 125mg & cloxacillin 125mg/2ml inj: Rs.9.00		
<b>BLUCLOX 500</b>	(BLUE CROSS)	بلوکلاکس ۵۰۰
Ampicillin (as sod.) 500mg, cloxacillin (sod.) 500mg: caps: 6: Rs.26.25		
<b>BROACIL</b>	(IDPL) 250mg: 4: Rs.9.85; 500mg: 4: Rs. 18.68	بروسل
<b>BROACIL DRY SYRUP</b>	(IDPL) 40ml: Rs.22.61	بروسل سیرپ
<b>BROACIL INJ</b>	(IDPL) 1vial: Rs. 10.22	بروسل انجکشن
<b>BROADICILIN</b>	(ALKEM)	بروڈسیلین
250mg: 10: Rs.28.80: 500mg: 10: Rs. 50.30		



<b>BRODICLOX</b>	(ALKEM)	بروڈی کلاکس
caps 250mg: 10: Rs. 26.45 ; 500mg: 10: Rs. 50.90		
<b>CAMPICILLIN</b>	(CADILA)	کمپی سیلین
250mg: 10: Rs.31.50, 500mg: 10: Rs. 59.50		
<b>CAMPICILLIN SYRUP</b>	(CADILA) 60ml: Rs. 18.89	کمپی سیلین سیرپ
<b>CAMPICILLIN INJ</b>	(CADILA)	کمپی سیلین انجکشن
250mg vial: Rs. 8.70, 500mg vial: Rs. 12.10 1g vial: Rs. 20.50		
<b>CINICILLIN</b>	(CINICILLIN)	سینی سیلین
250mg: 10: Rs.29.40; 500mg:4:Rs.19.60		
<b>CINICILLIN INJ</b>	(CINICILLIN)	سینی سیلین انجکشن
250mg vial Rs. 11.62, 500mg vial Rs. 14.81		
<b>CLACIN</b>	(INGA)	کلا سین
Ampicillin (as trihydrate) 250mg, Cloxacillin 250mg: Tabs 10, Rs.42.74		
<b>CLAMP CAPSULES</b>	(SOL)	کلیمپ کپسول
Ampicillin trihydrate 250mg Cloxacillin sod. 250mg caps 15x8: Rs.629.55		
<b>COPEN</b>	(MERCURY)	کوپن
Ampicillin (as trhyd.) 250mg, cloxacillin (as sod.) 250mg: caps: 25x4: Rs.499.00		
<b>DABCILOX</b>	(DABUR)	ڈاب کلاکس
Ampicillin 250mg Cloxacillin 250mg: caps 10, Rs.47.72: SYRUP: Ampicillin 125mg, Cloxacillin 125mg per 5ml, 40ml, Rs. 24.58; inj. Ampicillin 250mg Cloxacillin 250mg per vial, Rs. 13.95		
<b>DEPLIN CAPS</b>	(DEYS)	ڈیپ لین کپسول
250mg: 4: caps Rs. 10.25; 500mg: 4: caps Rs. 19.24		
<b>DEPLIN SYRUP</b>	(DEYS) 40ml Rs. 13.04	ڈیپ لین سیرپ
<b>DEPLIN DROPS</b>	(DEYS) 10ml: Rs. 11.95	ڈیپ لین ڈراپس
<b>DIACILIN</b>	(DEE PHARMA)	ڈیاسیلین
250mg: 6 Rs. 10.86; 500mg: 6 Rs. 20.46		
<b>DIACILIN DRY SYRUP</b>	(DEE PHARMA) 40ml: Rs. 9.50	ڈیاسیلین سیرپ
<b>DIACILIN PEAD DROPS</b>	(DEE PHARMA) 10ml: Rs. 9.35	ڈیاسیلین ڈراپس



<b>DIACILIN PLUS</b> (DEE PHARMA) caps:10: Rs.25.10	ڈیا سیلین پلس
<b>DUOCLOX</b> (FDC)	ڈیو کلاکس
Ampicillin 250mg, Cloxacillin 250mg: caps: 10: Rs. 49.19	
<b>DUOCLOX DRY SYRUP</b> (FDC) 60ml: Rs.40.69	ڈیو کلاکس سیرپ
<b>DUOCLOX-250</b> (FDC) caps 10, Rs. 27.25	ڈیو کلاکس ۲۵۰
<b>DUOCLOX INJ</b> (FDC)	ڈیو کلاکس انجکشن
250mg: 5ml inj: vial: Rs. 11.64, 500mg Rs. 18.95	
<b>ELCLOX</b> (ELDER)	ایل کلاکس کپسول
Ampicillin 250mg cloxacillin 250mg : caps 10: Rs. 48.35	
<b>EMDICILLIN</b> (MALLADI) 500mg: 10x10 Rs.450	ایم ڈی سیلین
<b>EMDICILLIN DRY SYRUP</b> (MALLADI)	ایم ڈی سیلین سیرپ
40ml: Rs.12.57	
<b>EMDICLOX CAPS</b> (MALLADI)	ایم ڈی کلاکس کپسول
Ampicillin trihydrate 250mg, cloxacillin 250mg caps; 10x10 Rs.495.00	
<b>FALCLOX CAPSULES</b> (FALMALABS)	فال کلاکس کپسول
Ampicillin 250mg: Cloxacillin 250mg: cap: 10: Rs. 49.32	
<b>HUMILIN</b> (FALMA) 500mg: 10: Rs.43.03	ہیومی لین
<b>HUMILIN DRY SYRUP</b> (FALMA) 60ml: Rs.17.30	ہیومی لین سیرپ
<b>LUPILIN</b> (LUPIN) 250mg: 4: Rs.6.51 500mg: 4:Rs.12.04	لیوپی لین
<b>LUPILIN INJ</b> (LUPIN) 500mg: inj: 1 vial: Rs. 7.68	لیوپی لین انجکشن
<b>MEGAPEN</b> (ARISTO) caps 8: Rs.49.90	میگاپن
<b>MEGAPEN INJECTION</b> (ARISTO)	میگاپن انجکشن
250mg: vil: Rs.9.16 500mg vial: Rs. 13.30 1000mg vial Rs. 19.21	
<b>MINILIN</b> (BDH) 250mg: 10: Rs. 23.49, 500mg: 10: Rs. 45	منی لین
<b>MINILIN DRY SYRUP</b> (BDH) 60ml: Rs. 23.00	منی لین سیرپ
<b>MINOCILLIN</b> (P&B LABS)	منوسی لین
Ampicillin (as trihydrate) 250mg & 500mg caps: 250mg: 10, 18.90 500mg: 10, 35.70	
<b>MIXOPEN</b> (BIOGENICS)	مکسوپن
Ampicillin cloxacillin caps: 10: Rs 52.00	



<b>PARACLOX CAPS</b>	(MAC)	پیراکلاکس
Ampicillin 250mg, Cloxacillin 250mg caps; 6 caps Rs. 30.60		
<b>PARACLOX INJ</b>	(MAC)	پیراکلاکس انجکشن
Ampicillin 250mg, Cloxacillin 250mg inj; 1 vial Rs. 13.29		
<b>PENMIX</b>	(DEE PHARMA) 24g Rs. 18.90	پین مکس سرپ
<b>PENMIX FORTE CAPS</b>	(DEE PHARMA)	پین مکس فورٹ کپسول
Ampicillin trihydrate 250mg, Cloxacillin 250mg caps; 10 Rs. 36.10		
<b>PENMIX FORTE INJ</b>	(DEE PHARMA)	پین مکس فورٹ انجکشن
Ampicillin 250mg Cloxacillin 250mg per vial 13.60		
<b>PREMICILLIN INJ</b>	(PREM PHARMA) Rs. 12.50	پریم سیلین انجکشن
<b>PREMOCLOX INJ</b>	(PREM PHARMA)	پریم کلاکس انجکشن
250mg: 5ml Rs. 11.25; 500mg: 5ml Rs. 14.50; 1000mg 10ml Rs. 19.50		
<b>PREMOCLOX 250</b>	(PREM PHARMA)	پریم کلاکس کپسول ۲۵۰
caps; 10 Rs. 27.50		
<b>PREMOCLOX 500</b>	(PREM PHARMA)	پریم کلاکس کپسول ۵۰۰
caps; 10 Rs. 52.50		
<b>PROMPICIN</b>	(GENO)	پرام پیسن
Ampicillin (as trihydrate) 250mg, probenedcid 250mg caps 8: Rs. 32.10		
<b>REMCLOX CAPS</b>	(INDIA)	رم کلاکس کپسول
Ampicillin 250mg Cloxacillin 250mg caps; 10 Rs. 49.90		
<b>REMCLOX DRY SYRUP</b>	(INDIA) 40ml Rs. 24.10	رم کلاکس سرپ
<b>ROSCILLIN INJ</b>	(RANBAXY)	روسی لین انجکشن
250mg vial Rs. 6.96; 500mg vial: Rs. 9.58		
<b>ROSCILLIN PAED DRPS</b>	(RANBAXY) 10ml: Rs. 11.65	روسی لین ڈراپس
<b>ROSCILLIN</b>	(RANBAXY)	روسی لین کپسول
250mg: 8: Rs. 24.60; 500mg: 8: Rs. 46.25		
<b>SULBACIN 750</b>	(UNICHEM)	سلباکس ۷۵۰
Sulbactum 250mg Ampicillin 500mg per cial inj; 1 vial Rs. 43.10		



## AZITHROMYCIN

## ایزو تھرو مائی سین

افعال و منافع: بالائی وزیریں آلات تنفس کے انفکشن (R.T.I.) جراثیمی ورم لوز تین اور ورم حجرہ، نرم ساختوں اور جلد کے انفکشن آلات بول (U.T.I.) تناسلی اعضاء کے انفکشن میں بہت مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۵۰۰ ملی گرام دن میں ایک بار ۳ دن تک آلات بول اور تناسلی اعضاء کے انفکشن میں اگر ام واحد خوراک دی جائے۔

منفی افعال: دوا کے حساسیتی اثرات ظاہر ہونے پر نہ دی جائے۔

مضر اثرات: متلی، تے، درد شکم، اسہال، جلد پر داغ، خفقان، سینہ میں درد بد ہضمی، نفخ شکم چکر درد سر، بے خوابی، الجھن، روشنی سے نفرت ہو سکتی ہے۔

احتیاط: جگر اور گردوں کی خرابی میں، حمل اور ایام رضاعت میں اور بچوں کے استعمال میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: دافع تیزابیت دوائیں الو منم اور میکینیشیم کے مرکبات مضر ہیں۔

## تجارتی مرکبات

AZITHRAL (ALEMBIC) 250mg cap 6: Rs. 168.00

ایزی تھرال

AZIWOK (WOCKHARDT)

ایزی واک

Azithromicin 250mg caps 6: Rs. 120.00

ZITHROMAX (PFIZER)

زائی تھرو میکس

Azithromicin (as dihydroxide) 250mg: caps: 6: Rs. 590.01

## BACAMPICILLIN HCL باکام پی سیلین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: آلات تنفس (R.T.I.) تناسلی اعضاء کان ناک حلق (E.N.T.) کے انفکشن نرم ساختوں اور جلد کے زخم و انفکشن و سوزاک میں مفید و مجرب ہے۔

مقدار و ترکیب: ۴۰۰ سے ۸۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار سوزاک میں ۱۶۰۰ ملی گرام ایک بار

منفی افعال: پنی سیلین اور سینفالو سپورین سے الرجک مریضوں میں مونو ایک لیوس کے انفکشن میں نہیں دینا چاہیے۔



مضر اثرات: نظام ہضم کی خرابیاں، کبھی غشاء مخاطی اور زیر جلد نرف الدم بھی ہو جاتا ہے۔  
احتیاط: جگر اور گردوں کی خرابی میں دوران علاج خون کی جانچ کراتے رہنا چاہیے۔  
دواؤں کے اثرات: سوزاک میں پروبے نی سڈ کے ہمراہ دینے سے اثر دیر تک قائم رہتا ہے

## تجارتی مرکبات

بایوپنس انجکشن

**BIOPENCE** (BIOCHEM)

1g vial ; Rs. 24.22 5g vial; Rs. 99.00

**PYOPEN** (GERMAN REMEDIES)

1g: 10: vial Rs. 226.53; 5g: 1 vial Rs. 96.27

پایوپن

## CEFACLOR

سیفاکلور

افعال و منافع: درمیانی کان میں درم، آلات بول کے انفکشن (U.T.I.) آلات تنفس (R.T.I.) کے انفکشن، نرم ساختوں اور جلد کے انفکشن میں بہترین کام کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵۰ ملی گرام ہر ۶ گھنٹہ بعد زیادہ سے زیادہ ۴ گرام دن بھر میں بچوں کو ۲۰ سے ۴۰ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے۔

مضر اثرات: حساسیت، نظام ہضم میں خلل ہو سکتا ہے۔

احتیاط: اپنی سیلین سے حساس مریضوں میں اور گردوں کے افعال کے خرابی میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: دافع انجماد خون ادویہ کے ساتھ استعمال کرنا مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

**KEFLOR** (RANBAXY) Cefaclor 250mg caps 10, Rs. 151.50 کیف لور

**KEFLOR GRANULES** (RANBAXY) 30ml: Rs. 54.00 کیف لور گرینول

**KEFLOR POWDER** (RANBAXY) 30ml :Rs. 65.00 کیف لور پوڈر

## CEFADROXIL

سیفاڈروکسیل

افعال و منافع: جلد اور نرم ساختوں کے انفکشن، آلات بول کے انفکشن (U.T.I.) میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب، منفی اثرات، مضر اثرات، احتیاط، سیفا لکسن کی طرح ہیں۔



سیفالاکسین کا بیان آگے درج ہے۔

## تجارتی مرکبات

BID (KOPRAN) 500mg; caps 10x4	Rs. 520.10	بڈ کپسول
BID DRY SYRUP (KOPRAN) 60ml	Rs. 46.50	بڈ سیرپ
CEDROX (DEE PHARMA) 500mg; caps: 3x10	Rs. 375.00	سڈروکس کپسول
CEDROX DRY SYRUP (DEE PHARMA) 60ml	Rs. 44.00	سڈروکس سیرپ
CEFADUR SUSP (PROTEC) 30ml	Rs. 44.65	سیفاڈور سیرپ
CEFADUR DT (PROTEC)	Rs. 26.00	سیفاڈور ڈی۔ ڈی
CEFADUR (PROTEC) 500mg; caps 4:	Rs. 51.25	سیفاڈور
DROXYBID (HIND ANTIBIOTICS) 500mg; tabs 4:	Rs. 43.46	ڈراکسی بڈ
DROXYL (TORRENT) 500mg; 4:Rs.56.80; 1g:2: Rs.56.50		ڈراکسائل
DROXYL SUSP (TORRENT) 30ml	Rs.45.90	ڈراکسائل سیرپ
KEFLOXIN (STANCARE) 500mg; caps: 6,	Rs. 84.00	کیف لاکسن
KEFLOXIN POWDER (STANCARE) 30ml	Rs. 23.80	کیف لوکسن پوڈر
LYDROXIL (LYKA) 500mg; 4:	Rs. 54.80	لائی ڈروکسل
LYDROXIL SYRUP (LYKA) 40ml	Rs. 53.78	لائی ڈروکسل سیرپ
NEPHLEX 125/250/500 (NEO PHARMA)		نیف لیکس
125mg; 4: Rs.14.00; 250mg; 4: Rs. 26.00, 500mg; 4:	Rs. 50.00	
ODOXIL (LUPIN)		اوڈاکسل
500mg; 4: Rs. 58.00 1000mg; 6:	Rs.117.60	

## CEFIXIME

## سیفیکسیم

افعال و منافع: آلات تنفس (R.T.I.) آلات بول گردے مشانے (U.T.I.) و پٹہ کے انفکشن اور ورم میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰۰ سے ۴۰۰ ملی گرام روزانہ ایک خوراک میں یا دو خوراکیوں میں تقسیم کر کے ۷ سے ۱۴ دن تک دی جائے، بچوں کو ۸ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے ایک یا دو خوراکیوں میں تقسیم کر کے ۶ ماہ سے کم عمر والوں کو نہ دی جائے۔

منفی افعال: دوا سے حساس الرجک مریضوں کو نہ دی جائے۔



مضر اثرات: ہاضمہ کی خرابیاں، درد سر، چکر آنا، جلد پر داغ کبھی قولون میں سوزش۔  
احتیاط: اپنی سیلین سے حساس مریضوں کو، گردوں کی شدید بیماریوں میں حمل، اور ایام رضاعت میں  
آنتوں معدہ کے امراض کی ہسٹری میں احتیاط برتیں۔

## تجارتی مرکبات

CEFSPAN (BURROUGHS WELLCOME)

سیف اسپان

Cefixime 100mg: caps 4: Rs. 203.00

TOPCEF (TORRENT) 400mg: 2: Rs. 320.00

ٹاپ سیف

## CEFOPERAZONE SODIUM سیفو پیرازوسوڈیم

افعال و منافع: آلات تنفس (R.T.I.) کان ناک حلق E.N.T. جلد اور نرم ساحتوں ہڈیوں،  
جوڑوں، پتے کی نالی، آلات ہضم G.I.T. معدہ آنتوں، آلات بول U.T.I. گردے مٹانے کے انفکشن  
میں مفید و مجرب ہے۔ تسمم الدم Septicaemia سرسام، ایسے مریض جن پر دوسری انٹی بائیوٹک  
کارگر نہ ہوں یہ مفید رہتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱ سے ۶ گرام روزانہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے ہر ۸ سے ۱۲ گھنٹہ بعد  
عضلاتی انجکشن لگایا جائے بچوں کو ۳۰ سے ۱۰۰ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے ۲-۳ خوراکیوں  
میں تقسیم کر کے دی جائے۔ ایک سال سے کم عمر کے بچوں کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: ہاضمہ کی خرابیاں، کنڈیڈا انفکشن، اسنو فیلیا، نیوٹروفیل، لیوکوسائٹ کی کمی و تھرامبین  
کی کمی، ہو جاتی ہے، خون میں یوریا اور جگر کے افرازات، بڑھ جاتے ہیں، کومب ٹیسٹ کا نتیجہ  
Positive ہوتا ہے قولون میں سوزش انجکشن کی جگہ درد ہوتا ہے۔

احتیاط: اپنی سیلین سے حساس مریضوں، جگر اور گردوں کی کمزوری میں زیادہ عرصہ تک استعمال سے  
بچوں، حاملہ اور مرضہ کو استعمال سے احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: امینو گلائک کو سائیڈ، پیشاب آور ادویہ اور کلورم فینی کال کے ساتھ  
اس کا استعمال مضر ہے۔



## تجارتی مرکبات

**CEFAZID (BIOCHEM)** 250mg Rs. 105.00 ; 500mg Rs. 336.00 سیفازڈ فورٹم  
**FORTUM (GLAXO-ALLENBURYS)**  
 250mg Rs. 111.00; 500mg Rs. 192.00, 1g Rs. 352.00

## CEFTRIAZONE

## سیف ٹراکسون

افعال و منافع: زیرین آلات تنفس کے انفلکشن، آلات بول گردے مٹانے کے انفلکشن ورم العانہ، سوزاک، جلد کے انفلکشن جراثیمی تسمم الدم Septicaemia سرسام آپریشن سے پہلے اور بعد کو حفاظت و علاج کے لئے ہڈیوں جوڑوں کے انفلکشن میں بہترین کام کرتا ہے۔

مقدار و ترکیب: اسے ۲ گرام عضلاتی یا وریدی ایک خوراک میں یا دو برابر خواراکوں میں تقسیم کر کے دی جائے دن بھر میں ۴ گرام سے زیادہ نہ دی جائے بچوں کو ۵۰ سے ۵۷ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے ہر ۱۲ گھنٹہ بعد دی جائے۔

منفی افعال: سفالوسپورین سے حساس مریضوں پر خراب اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

مضر اثرات: آنٹوں کے غشاء مخاطی میں سوزش، اسہال، مقامی ری ایکشن خون میں خرابی، جلد پر داغ پڑنا۔

احتیاط: جگر اور گردوں کے امراض میں مقدار خوراک ۲ گرام زائد نہ ہو حاملہ اور مرضہ کو احتیاط برتیں۔

## تجارتی مرکبات

**CEFAXONE I.M/I.V (LUPIN)**  
 500mg: 1: Rs. 106.76; 1000mg 1: Rs. 213.52  
**CEFTRAX INJ (DEE PHARMA)**  
 250mg vial: Rs. 53.00, 1g vial: Rs. 208.00  
**MONOCEF I.V (ARISRO)**  
 250mg vial Rs. 53.00; 1g: vial Rs. 213.07

سیفکسون

سیف ٹراکس

مونو سیف



<b>NOSOCEF</b>	(MERIND)	نوسوسف
vial: 250mg: vial : Rs. 53.30; 1g vial: Rs. 214.10		
<b>OFRAMAX</b>	(RANBAXY)	اوفرامیکس
250mg:Rs.56.00; vial 1g: Rs.225.10		
<b>TOROCEF</b>	(TORRENT)	ٹوروسیف
250mg: Rs. 56.10: vial 1g: Rs. 225.10		
<b>ZEFONE</b>	(ZELTA (CADILA)	زی فون
inj. 250mg Rs. 56.25, 1g Rs. 225.00		

## CEFAZOLINE SODIUM

سیفازولین سوڈیم

افعال و منافع: آلات تنفس (R.T.I.) تناسلی اعضاء اور سرسام اعضاء بول کے انفکشن میں جلد اور اندرونی ساختوں، ہڈی، جوڑوں کے ورم اور انفکشن میں، تسمم الدم Septicaemia ورم غلاف القلب، گرام مثبت اور گرام منفی بیکٹیریا سے پیدا ہونے والے امراض انتہائی باریک جراثیموں سے پیدا ہونے والے، انفکشن کی بہترین اور مانی ہوئی دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰۰ سے ۱۰۰۰ ملی گرام ۸ سے ۱۲ گھنٹہ بعد دیں بچوں کو ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے ایک دن میں ۲ سے ۴ خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔

منفی اثرات: سیفالوسپورین گروپ سے حساس مریضوں میں مضر ہے۔

مضر اثرات: جلد پر داغ پڑنا، بخار ہونا، لیو کو سائیٹ اور تھرامبو سائٹ کی کمی اسٹوفیلیا، متلی قے

بھوک کی کمی S.G.O.T.، S.P.O.T. لیکٹائٹ یا قاسفیٹ میں اضافہ، جگر کے فعل کا ست ہونا

احتیاط: حالت حمل جگر کے امراض اور ایک سال سے کم عمر بچوں کو نہ دیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: پیشاب آور دواؤں Diuretics کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

<b>ALCIZON</b>	(ALEMBIC)	ال سی زون
inj 250mg: vial: Rs. 29.25, 500mg vial, Rs. 51.50, 1g vial: 92.50		
<b>AZOLIN</b>	(BIOCHEM)	ای زولین
500mg: vial Rs. 49.95 1g: vial: Rs.98.00		



**CEFAMEZIN** (RALLIS) سی فامی زین  
inj 250mg: Rs. 42.12 500mg: Rs. 54.74 1000mg: Rs. 90.87

**CEZOLIN** (LUPIN) سی زولین  
250mg: vial : Rs. 14.06, 500mg vial : rs. 22.36, 100mg: vial: Rs. 39.75

**LYZOLIN** (LYKA) لائی زولین  
500mg vial Rs. 46.18, 100mg vial Rs. 86.14

**ORIZOLIN** (ALIDAC) اوری زولین  
inj; 125mg vial Rs. 9.28; 250mg vial: Rs. 15.27, 500mg: vial Rs. 27.52; 1g: vial Rs. 51.82

**PREZOLIN** (PREM PHRMA) پری زولین  
500mg vial: Rs. 27.00 100mg vial: Rs. 50.00

**PRILEX INJ** (IND ANTIBIOTICS) پرائی لیکس انجکشن  
500mg: vial Rs. 45.67; IG vial Rs. 81.82

**REFLIN** (RANBAXY) ریفلین  
250mg vial Rs. 26.16, 500mg vial Rs. 45.76, 1g: vial Rs. 83.63

## CEFOTOXIME SODIUM

سیفو ٹا کسیم سوڈیم

افعال و منافع: تسمم الدم Cepticaemia آلات بول و تناسلی اعضاء کے شدید انفکشن  
Acute infection زیریں آلات تنفس، کان ناک حلق، جلد اور نرم ساختوں، جوڑوں اور ہڈیوں  
کے انفکشن ورم سرسام وغیرہ میں بہترین کام کرتا ہے۔

مقدار و ترکیب: بالغوں کو اسے ۲ گرام عضلاتی یا ویدی ہر ۱۲ گھنٹہ بعد زیادہ سے زیادہ ۳ گرام ہر ۸  
گھنٹہ بعد ۱۲ سال سے کم عمر بچوں کو ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے ہر ۱۲ گھنٹہ بعد  
دی جائے۔

منفی افعال: دوا سے حساس مریضوں کو حمل کے دوران، بار بار ہونے والے انفکشن میں نہیں دینا  
چاہیے۔

مضر اثرات: خون میں غیر طبعی تبدیلی، پیٹ میں خرابی متلی تے، اسہال سوزش امعاء زیادہ مدت  
استعمال سے سوزش اعصاب اور نومولود بچوں میں استعمال سے جسم سفید Grey syndrome



ہو جاتا ہے۔

احتیاط: خون کی کمی میں، زیادہ مدت استعمال کرانے سے، ایام رضاعت گردوں اور جگر کی خرابی میں احتیاط رکھنا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: مانع انجماد خون ادویہ، دورہ روکنے والی ادویہ اور پیراسیٹامول کے ساتھ خراب اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

## تجارتی مرکبات

<b>BIOTAX</b>	(BIOCHEM)	بایوٹاکس
inj: 250mg vial : Rs. 24.99, 500mg vial: Rs. 50.69, 1g vial ; Rs. 84.24		
<b>BLUCEF-TM</b>	(BLUECROSS)	بلیوسیف۔ ٹی ایم
inj: 250mg vial: s. 25.10, 500mg vial Rs. 46.50, 1g vial Rs. 84 70		
<b>CEFTEX INJ</b>	(PREM PHARMA)	سیف ٹیکس
250mg vial Rs. 27.00, 500mg vial: Rs. 50.00, 1gm vial : Rs. 85.00		
<b>CEFATOX-250</b> (P&B LABS) 250mg vial Rs. 25.90		سیفٹاکس ۲۵۰
<b>CEFATOX-GM</b> (P&B LABS) 1gm vial Rs.87.31		سیفٹاکس اگرام
<b>STERILE CEFOTAXIME</b> (P&B LABS) 1gm vial Rs.90		سیفٹاکس ایم
<b>CLAFORAN</b>	(ROUSSEL)	کلافوران
inj 1gm: vial Rs. 99.00; 2gm: vial : Rs. 180.00; 250mg: Rs. 29.00		
<b>EVACEF INJ</b>	(NEON)	ایو اسیف
250mg vial Rs. 26.00 1gm vial Rs.98.00		
<b>HALTAX</b>	(HINDANTIBIOTICS)	ہال ٹاکس
inj. 250mg vial Rs. 25.39; 1g vial, Rs. 85.60		
<b>OMNATAX</b>	(HOECHST)	او منٹاکس
inj 250mg vial Rs. 29.00; 1g vial, Rs. 99.00		
<b>OMNICEF</b>	(ARISTO)	او منی سیف
inj: 250mg vial: Rs. 24.95, 500mg vial: Rs. 48.75, 1g vial: Rs.95.00		
<b>TAXCEF</b>	(J K PHARMA)	ٹاکس سیف
inj: 250mg vial Rs. 25.75: 500mg vial Rs.51.50: 1g vial Rs. 99.00		
<b>TAXIM</b>	(ALKEM)	ٹاکسیم
inj. 250mg vial Rs. 26.95; 1g vial, Rs. 99.10		



**TROYCEF**

(TROIKAA)

inj. 250mg vial: Rs. 25.13, 1g vial: Rs. 84.72

رالی سیف

**CEFUROXIME**

سیفوروکسائیم

افعال و منافع: آلات تنفس اور نرم سانسوں کے انفلہن، شدید تعدیہ Acute Infection، سرسام، سر جری سے قبل جراثیم سے حفاظت کے لئے آلات بول (U.T.I.) کے انفلہن، سوزاں ہڈیوں جوڑوں کے انفلہن و ورم، زچگی اور نسوانی اعضاء کے انفلہن اور تعدیہ کے لامانی انجکشن ہیں۔  
مقدار و ترکیب: ۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار مضامتی لگائیں، شدید انفلہن میں ڈیرھ گرام وریہی ۳ خوراکیں میں تقسیم کر کے لگائیں بچوں کے سرسام میں ۲۰۰ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے وریہی ۳ خوراکیں میں تقسیم کر کے لگائیں۔

منفی افعال: سہلاو سپورین سے حساس مریضوں کو نہ لگائیں۔

مضر اثرات: انجکشن کے مقام پر درد، الرجی، نظام ہضم میں خرابی کنڈیڈ کے اثرات اسٹوفیلیا نیوٹروپیا لیوکوپیا، خون کی کمی، تھرامبو سائیف کی کمی، جگر کے انزائم اور یوریا میں اضافہ کو مب شت ہو سکتا ہے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: امینو گلائیکوسائیڈ کے ساتھ اس کے فعل میں تیزی آتی ہے۔

**تجارتی مرکبات****CEFOGEN**

(ZELTA)

سی فوجن

250mg: vial Rs. 50.60; 750mg: vial Rs. 127.30

**CEFTUM**

(GLAXO)

سیف ٹم

125mg: 4: Rs. 84.04; 250mg: 4: Rs. 162.70

**FUROXIL**

(TORRENT)

فیوروکسل

250mg vial: Rs. 56.50, 750mg vial: Rs. 127.90

**SUPACEF**

(GLAXO ALLENBURYS)

سوپا سیف

I.M/I.V. inj.: 250mg vial Rs. 55.85; 750mg: vial Rs. 128.10



## CEFTIZOXIME

## سیفٹی زوکسائم

افعال و منافع: آلات تنفس کے زیریں اعضاء کے انفکشن (L.R.T.I.) سہٹی سیما، تسمم الدم، شدید انفکشن، آلات بول اور تناسلی اعضاء کے انفکشن سوزاک ورم باریطون Peritonitis آپریشن کے بعد زخموں کے اندمال اور سرسام وغیرہ کی مفید دوا ہے،

مقدار و خوراک کا تعین مریض کی حالت اور مرض کی شدت کے حساب سے کیا جاتا ہے۔

منفی افعال: سیفالوسپورین سے حساس مریضوں کو نہیں دینا چاہیے

مضر اثرات: نظام ہضم میں خلل، کنڈید کے اثرات، اسنو فیلیانیو ٹروفل لیو کو سائیٹ، تھرامبو سائیٹ کی کمی ہو سکتی ہے جگر کے افراز اور بلڈ یوریا میں اضافہ، کومب ٹسٹ کا نتیجہ مثبت، انجکشن کے مقام پر درد ہونا

احتیاط: گردوں کی حرا بی میں، پنی سیلین سے حساس مریضوں میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: پروینی سڈ کے ساتھ دوا کا اثر دیر تک قائم رہتا ہے۔ امینو گلائی کو سائیڈ اور مدر بول ادویہ کے ساتھ اس کے اثر میں تیزی اور اثر جلد ختم ہو جاتا ہے۔

## تجارتی مرکبات

**CEFIZOX**

(BURROUGHS WELLCOME)

سیفی زا کس

500mg: vial: Rs. 123.01; 1g: vial Rs. 217.55

**EPOCELIN**

(RALLIS)

ای پوس لین

500mg: 10ml Rs. 123.01: 1g: 10ml Rs. 217.55

## CEPHALEXIN

## سیفا لکسین

افعال و منافع: ہڈیوں کے فریکچر، جوڑوں کے ورم درد، اسٹفلو کا کل انفکشن جلد اور نرم ساختوں کے انفکشن زیریں اور بالائی آلات تنفس کے انفکشن آلات بول اور تناسلی اعضاء کے انفکشن اور کان کے اندرونی ورم کی لاثانی دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: اگر ام ہر گھنٹہ بعد بچوں کو ۴۰ سے ۶۰ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے



۴ خوراکیوں میں تقسیم کر کے ہر ۶ گھنٹہ بعد۔  
 منفی افعال: سیفالوسپورین گروپ سے حساس مریضوں کو نہ دی جائے۔  
 مضر اثرات: اسہال آنا، متلی، قے، بد ہضمی، درد شکم، جلد پر داغ پڑنا پتی اچھلنا الرجی، شاک مدد  
 پہنچنا۔

احتیاط: اپنی سیلین سے حساس مریضوں کو گردوں کی خرابی، کومب شٹ کے نتیجہ پر احتیاط برتیں۔  
 دواؤں کے ساتھ رد عمل: مدرات بول ادویہ کے ساتھ عمل میں تیزی اور اثرات جلد ختم  
 ہو جاتے ہیں۔

## تجارتی مرکبات

ALCEPHIN	(ALEMBIC)	ال سے فن کپسول
caps 250mg 4: Rs. 18.65; 500mg: 4: Rs. 34.73		
ALCEPHIN DRY SYRUP	(ALEMBIC) 40ml:Rs.22.32	ال سے فن سرپ
ALEXIN	(DABUR)	الکسن
caps: 250mg: 10:Rs.44.58; 500mg: 10:Rs.83.14		
ALEXIN DRY SYRUP	(DABUR) 40ml Rs.22.76	الکسن سرپ
ALSPORIN	(HOECHST)	ال سپورین
caps 250mg: 4: Rs. 14.38; 500mg: 4:Rs.27.73		
BETASPORE	(ARISTO) 250mg: 4:Rs.18.47;500mg:Rs.34.92	بیٹا سپور
BETASPORE DRY SYRUP	(ARISTO) 40ml:Rs.23.24	بیٹا سپور سرپ
BICEF	(SUN PHARMA)	بائی سیف
caps: 250mg:: 20: Rs. 46.50: 500mg: 4: Rs. 35.20		
BLUCEF TABS	(BLUE CROSS)	بلو سیف
tabs 250mg: 10:Rs.48.00: 500mg:10: Rs.88.30		
CEFAMAX	(MAS) 250mg: 4:Rs.18.07; 500mg:4: Rs.34.15	سیفا میکس
CEFAMAX DRY SYRUP	(MAS) 60ml: Rs.31.83	سیفا میکس سرپ
CEFAMAX PAED. DROPS	(MAS) 10ml: Rs.23.45	سیفا میکس ڈراپس
CEFAX CAPS	(INGA)	سیفاکس کپسول
250mg: 4: Rs.18.12; 500mg: 4: Rs.34.08		
CEFAX SYRUP	(INGA) 60ml: Rs.34.10	سیفاکس سرپ



<b>CEFF (LUPIN)</b> 20x4 Rs.433.60 ; 500mg: 15x4 Rs.605.40	سیف
<b>CEFF DRY SYRUP (LUPIN)</b> 30ml: Rs.20.21	سیف سرپ
<b>CEFF KID TABS (LUPIN)</b> 125mg: tabs 10: Rs.26.14	سیف کڈ ٹبلٹ
<b>CEFF -250 D.S. (LUPIN)</b> 30ml: Rs.34.99	سیف ۲۵۰ ڈی ایس سرپ
<b>CEPHADIL (DUPHAR)</b>	سیفائل
caps 250mg: 4: Rs. 18.46; 500mg: 4: Rs.34.17	
<b>CEPHALKEM (ALKEM)</b>	سیفال کم
caps 250mg: 10: Rs.40.00 ; 500mg: 10: Rs.75.00	
<b>CEPHAXIN (BIOCHEM)</b>	سیفاکسین
250mg: 10: Rs. 49.00 ; 500mg: 10: Rs.92.50	
<b>CEPHAXIN INJ (BIOCHEM)</b>	سیفاکسین انجکشن
500mg: Rs.90.00 1g: Rs. 175.00	
<b>CEPHAXIN DRY SYRUP (BIOCHEM)</b> 40ml: Rs.25.95	سیفاکسین سرپ
<b>CESPOR DRY SYRUP (WIN MEDICARE)</b>	سیس پور سرپ
40ml: Rs.22.84	
<b>FACTAGARD (DEE PHARMA)</b>	فیکٹا گارڈ
caps: 250mg: 10: Rs.49.00; 500mg: 10: Rs.87.00	
<b>FACTAGARD DRY SYRUP (DEE PHARMA)</b> 40ml: Rs.16.60	فیکٹا گارڈ
<b>MAFEXIN CAPS (MALLADI)</b>	میفاکسین
caps: 250mg: 10x10 Rs. 448.53; 500mg: 10x10 Rs.835.74	
<b>MAFEXIN DRY SYRUP (MALLADI)</b> 40ml: Rs.22.57	میفاکسین
<b>NEOCEF (GLAXO ALENBURYS)</b>	نوسیف
caps 250mg: 4: Rs.18.65, 500mg: 40: Rs.34.73	
<b>NUFEX (SEARLE)</b> 250mg: 4: Rs.21.00; 500mg: 4: Rs.39.50	نوفیکس
<b>NUFEX DRY SYRUP (SEARLE)</b> 40ml: Rs.22.74	نوفیکس
<b>ORIPHEX (ALIDAC)</b>	اوری فیکس
caps 250mg: 10: Rs. 59.00, 500mg: 10: Rs.99.00	
<b>ORIPHEX DRY SYRUP (ALIDAC)</b> 40ml: Rs.29.77	اوری فیکس سرپ
<b>PHEXIN (GLAXO)</b>	فیکسین
caps 250mg: 4: Rs.24.17; 500mg: 4: Rs.45.04	
<b>PREMSPOR (TATA PHARMA)</b>	پریم اسپور
caps 250mg: 4: Rs.17.50; 500mg: 4: Rs.33.80	



<b>PRILEX</b>	(HIND ANTIBIOTICS)	پرائی لیکس
caps; 250mg: 10: Rs.41.12; 500mg: 10: Rs. 76.34		
<b>RALCEF</b>	(RALLIS)	رال سیف
<b>RESPORIDEX</b>	(STANCARE)	ریس پوری ڈیکس
caps: 250mg: 8: Rs. 63.62, 500mg: 8: Rs. 83.75		
<b>ROCEPH</b>	(J&K PHARMA)	رو سیف
caps: 250mg:4: Rs. 17.80: 500mg: 4: Rs. 33.16		
<b>ROCEPH DRY SYRUP</b>	(J&K PHARMA) 30ml: Rs.18.00	رو سیف سِرپ
<b>SEPHEXIN</b>	(LYKA)	سی پے کسن
caps 250mg: 10: Rs.62.20, 500mg: 10 : Rs. 115.50		
<b>SEPHEXIN DRY SYRUP</b>	(LYKA) 60ml: Rs.41.50	سی پے کسن سِرپ
<b>SPOREN CAPS</b>	(DAYS) 250mg caps: 4: Rs.18.46	اسپورین کپسول
<b>SPOREN 500 CAPS</b>	(DAYS) 500mg caps: 4: Rs.34.37	اسپورین ۵۰۰ کپسول
<b>SPORIDEX</b>	(RANBAXY)	اسپوری ڈیکس
250mg: 10: Rs.54.25, 500mg: 10: Rs.87.95		
<b>SPORIDEX SUSP</b>	(STAN CARE) 40ml: Rs.37.62	اسپوری ڈیکس سِرپ
<b>ULTRASPORIN</b>	(STANGEN)	الٹراسپورین
10, Rs.18 : 250mg: caps, 10, Rs.32.50; 500mg: caps, 10, Rs.61.25.		

## CEPHALORIDIN

## سیفالورائیڈین

افعال و منافع: حاد و مزمن سعال بلغمی Acute Chronic Bronchitis پھیپھڑوں میں  
 انفکشن، جراثیمی نمونیہ، برونکو نمونیہ، آپریشن کے بعد کا نمونیہ پھیپھڑوں کا پھوڑا۔ پھیپھڑوں میں پیپ پڑنا  
 پیشاب کی نالی کا انفکشن U.T.I. جلد اور نرم ساختوں کا انفکشن تسمم الدم Cepticaemia جراثیمی ورم  
 غلاف القلب، اسقاط جراثیمی، سوزاک، آتشک حمی وجع المفاصل ہڈیوں کا ورم اور انفکشن میں مفید ہے۔  
 مقدار و ترکیب: ۲ سے ۴ گرام یومیہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے ۶ گرام سے زیادہ ایک دن میں نہ  
 دیں بچوں کو ۳۰ سے ۵۰ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے ۴ خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے  
 گردوں کی خرابی میں ۵۰۰ سے ۲ گرام روزانہ ورم غلاف القلب میں ۱ سے ۳ گرام ہر ۶ گھنٹہ بعد وریڈی  
 آہستہ آہستہ لگائیں۔



منفی افعال: سیفالو سپورین سے حساس مریضوں کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: فعل ہضم میں خلل واقع ہو سکتا ہے۔

احتیاط: گردوں کی خرابی میں تیز مدربول ادویہ کے ساتھ اور حالت حمل میں احتیاط برتیں۔

## تجارتی مرکبات

CEPORAN

(GLAXO)

سپوران

Cephaloridine inj. 0.5g: Rs. 30.57 1g: Rs. 57.87

## CHLORAMPHENICOL

## کلورم فینی کال

افعال و منافع: سرسام تعفی و جراثیمی رکٹ سیل انفکشن ٹائی فائیڈ فیور (تپ محرقہ) آنکھ کے انفکشن، گرام منفی جراثیم سے ہونے والا تسم الدم (سپٹی سیما) جراثیمی پیچش، اسٹفلو کاکل انفکشن، جراثیمی نمونیہ، بچوں میں آنتوں کی سوزش ورم خجرہ، مالٹا فیور (بروسی لوسس) ٹراکوما کالرا، آنکھ، کان اور جلد کے انفکشن میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے ۴ خوراکیوں میں تقسیم کر کے ہر ۶ گھنٹہ بعد دی جائے۔

منفی اثرات: بار بار ہونے والے انفکشن، زچگی کے ایام میں حساسیت کے مریضوں میں خراب اثرات رونما ہوتے ہیں۔

مضر اثرات: خون میں فساد ہونا، فعل ہضم میں خرابیاں، عصبی خرابیاں، عصب باصرہ میں درد، نومولود بچوں کا جسم سفید ہونا، ہڈیوں کا نرم ہونا۔

احتیاط: وقفہ وقفہ سے خون کی جانچ کراتے رہیں، ایام رضاعت، گردوں اور جگر کی خرابی میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: مانع انجماد خون ادویہ، دردوں کو روکنے والی اور پیراسیٹامول کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔



## تجارتی مرکبات

<b>CATILAN</b> (HOECHST) 250mg caps 10: Rs.7.17	کیٹی ان
<b>CHLOROMYCETIN</b> (PARKE DAVIS)	کلورومائی شین کپسول
250mg: 10: Rs. 20.10 ; 500mg: 6, Rs. 22.30	
<b>CHLOROMYCETIN SUSP</b> (PARKE DAVIS)	کلورومائی شین سرپ
60ml: 26.75	
<b>CHLOROMYCETIN I.M.</b> (PARKE DAVIS)	کلورومائی شین انجکشن
Chloramphenicol 1g vial inj: 1g vial: Rs.3.20	
<b>ENTEROMYCETIN</b> (DEYS)	انترومائی شین کپسول
caps: 250mg: 10, Rs.14.50; 500mg: 6, Rs. 16.20	
<b>ENTEROMYCETIN SYRUP</b> (DEYS)	انترومائی شین سرپ
60ml: Rs.12.94	
<b>ENTEROMYCETIN INJ.</b> (DEYS)	انترومائی شین انجکشن
8ml: vial Rs. 12.50	
<b>KEMICETINE CAPS</b> (MAC)	کیمی شین کپسول
250mg: 10: caps Rs.14.15; 500mg: 6caps Rs. 15.70	
<b>KEMICETINE SUSP</b> (MAC)	کیمی شین سرپ
60ml Rs. 21.15	
<b>KEMICETINE INJ</b> (MAC)	کیمی شین انجکشن
1g of chloramphenicol, Rs. 25.40	
<b>PARAXIN</b> (BOEHRINGER) 250mg: 10: Rs. 16.30	پراکسن
<b>RECLOR</b> (SARABHAI)	رنگ لور
caps : 250mg: 10: Rs.15.24 ; 500mg: 6: Rs.16.92	
<b>TYDE-S INJ</b> (NEON) 1g vial Rs.29.00	ٹائیڈ-ایس انجکشن
<b>VENPHENICOL INJ</b> (P&B LABS) 5ml vial Rs.26.98	ون فینی کال انجکشن
<b>VITAMYCETIN</b> (WYETH) 250mg caps; 8caps Rs. 5.14	وٹامائی شین کپسول
<b>VITAMYCETIN SYRUP</b> (WYETH)	وٹامائی شین سرپ
40ml: Rs. 7.89; 80ml Rs. 12.27	



CHLORO TETRACYCLINE	کلورو ٹترا سائیکلین
DEMETHYL CHLOR	ڈیمی تھائل کلور
TETRACYCLINE	ٹترا سائیکلین
OXYTETRACYCLINE	آکسی ٹترا سائیکلین

افعال و منافع: ہر طرح کے انفکشن رکٹ سیل انفکشن کج ران کے غدو کا متورم ہونا، تناسلی اعضاء کے انفکشن، نمونیہ، روہے لگرے Trachoma رمد چشم آنکھ دکھنا ورم غدو جراثیمی پچش، پیشاب کی نالی انفکشن، آلات تنفس کا انفکشن، امراض خبیثہ اور مہاسوں میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ٹترا سائیکلین ۲۵۰ سے ۵۰۰ ملی گرام ہر ۶ گھنٹہ بعد دن بھر میں ۴ گرام سے زائد نہ دی جائے۔

منفی اثرات: دوا سے حساس، حمل کے آخری ۴ ماہ اور ایام رضاعت میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: دانتوں کی رنگت میں تبدیلی، پیر کی لمبی ہڈی Fibula کی نمو اور افزائش میں کمی ہاضمہ کی خرابیاں، الرجی ہو سکتی ہے ۸ سال سے کم عمر والوں کو نہیں دینا چاہیے۔

احتیاط: جگر اور گردوں کی خرابی میں احتیاط رکھنا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: دودھ، دافع تیزابیت Antacid منرل ادویہ، خوردنی مانع حمل ادویہ

### تجارتی مرکبات

ACHROMYCIN (CYANAMID) 250mg caps 10: Rs.12.23	ایکرومائی سین
DICICLYCLINE (INDOCO)	ڈائی سی سائی سائیکلین
caps 4, Rs.4.55; 500mg: 4, Rs.7.15	
HOSTACYCLINE (HOECHST)	ہوسٹا سائیکلین
250mg: 10, Rs.10.00; 500mg: 4, Rs.7.72	
IDILIN (IDPL) 250mg: 10, Rs.11.88; 500mg: 4, Rs.7.29	آئی ڈی لین
LEDERMYCIN (CYANAMID)	لیڈر مائی سین
150mg: 10, Rs.13.50; 300mg: 10, Rs.31.92	



<b>LINEMETT-333 (MERCURY)</b> 333mg 20x6 tabs Rs.194.74	لنی میٹ ۳۳۳
<b>LINEMETT-500 (MERCURY)</b> 500mg 20x6 tabs Rs.251.09	لنی میٹ ۵۰۰
<b>OXYSTECLIN (SARABHAI)</b>	آکسی اسٹیکلین
inj, 2ml Rs.1.17; 20ml Rs.10.92	
<b>OXYTET INJ (BIOGENICS)</b>	آکسی ٹیٹ
<b>RESTECLIN (SARABHAI)</b>	ریسٹی ٹیکلین
inj. 30ml vial: Rs.10.23	
250mg: 10 caps Rs.12.78; 500mg: 4 tabs Rs.8.16	
<b>SUBAMYCIN (DEYS)</b> 250mg: caps 10 : Rs.10.95	سوبا مائی سین کپسول
<b>SUBAMYCIN TABLETS 500 (DEYS)</b>	سوبا مائی سین ٹیبلٹ
500mg: sugar coated tabs:4 : Rs.6.90	
<b>TERRAMYCIN SF CAPS (PFIZER)</b>	ٹیرامائی سین ایس۔ ایف کپسول
4caps Rs. 4.33	
<b>TERRAMYCIN I.M (PFIZER)</b> 10ml Rs.8.23	ٹیرامائی سین انجکشن
<b>TETRACYCLINE HCL (SARABHAI)</b>	ٹٹراسائیکلین کپسول
500mg caps Rs. 436.90	
<b>TETRAMAC CAPS (MAC)</b>	ٹٹرامیک
250mg: 8 caps Rs.7.68; 500mg: 4caps Rs.6.53	
<b>THREOCYCLINE (IDPL)</b>	ٹھروسائیکلین
Tetracycline hcl 333mg: caps: 6: Rs. 8.47	

## CIPROFLOXACIN

## سائپروفلوکساسین

افعال و منافع: آلات بول گردے مٹانے کے انفکشن U.T.I. کان ناک حلق ENT کے انفکشن، نرم ساختوں اور ہڈیوں کے انفکشن آلات ہضم کے انفکشن ورم سوزاک اور شدید انفکشن میں بہترین کام کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: آلات بول اور آلات ہضم کے انفکشن میں ۲۵۰ سے ۵۰۰ ملی گرام ہر ۱۲ گھنٹہ بعد سوزاک میں ۵۰۰ ملی گرام ایک خوراک دیگر جراثیمی امراض میں ۵۰۰ سے ۷۵۰ ملی گرام ہر ۱۲ گھنٹہ بعد۔  
منفی افعال: حمل ایام رضاعت اور دوائے حساس مریضوں کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: خفقان، نظام ہضم میں خلل، چکر آنا، درد سر، ہاتھ کانپنا، الجھن دورے پڑنا، جلد پر داغ پڑنا، بصارت میں فرق، جوڑوں میں درد، قوت ارادی میں کمی، آنٹوں میں سوزش اسٹیون جانسن علامہ



(زخم قرنیہ قلاع وغیرہ) خون میں تبدیلیاں، جگر اور گردوں میں خرابی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: ۱۲ سال سے کم عمر بچوں کو، مرگی، شدید گردوں کی خرابی، دوروں کی بیماری جسم میں پانی کی کمی، G6PD غیر طبعی ہونے میں احتیاط رکھنا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: تھیوفانیلین، سائیکلو سپورین، دافع تیزابیت شراب اور مانع انجماد خون ادویہ کے ساتھ رد عمل خراب ہوتا ہے۔

## تجارتی مرکبات

<b>ABACT</b>	(SARABHAI)	اے بی کٹ
tabs: 250mg: 4: Rs.17.39; 500mg: 4: Rs.32.03		
<b>ABACT INFUSION</b>	(SARABHAI) 100ml Rs.41.18	اے بی کٹ بوتل
<b>ALCIPRO</b>	(ALKEM)	ال سپرو ٹبلٹ
250mg: 10: Rs.42.50; 500mg: 10: Rs.77.90; 750mg: 10: Rs.115.00		
<b>ALCIPRO I.V</b>	(ALKEM) 100ml: Rs.37.50	ال سپرو بوتل
<b>BAYCIP</b>	(BAYER) 250mg:10: Rs.43.14; 500mg:10:Rs.85	بے سیف
<b>BEKAYCIN</b>	(BOEHRINGER-M)	بی کایا سن
250mg: 10: Rs.40.00; 500mg: 10: Rs.70.10		
<b>BIOCIPTABS</b>	(BIOCHEM)	بایوسپ
250mg: 10: Rs. 43.75; 500mg: 10: Rs.79.00		
<b>BIOCIP INFUSION</b>	(BIOCHEM) 100ml Rs. 29.00	بایوسپ بوتل
<b>CEBRAN-250/500</b>	(BLUE CROSS)	سب ران
250mg: 10: Rs.35.10; 500mg: 10:Rs.65.10		
<b>CEBRAN INFUSION</b>	(BLUE CROSS) 100ml Rs. 34.00	سب ران
<b>CFX</b>	(REMEDIES (INDIA)	سی ایف ایکس
250mg: 10, Rs. 36.90; 500mg: 10, Rs.67.50		
<b>C-FLOX INJ</b>	(PREM PHARMA) 100ml bottle Rs.40	سی فلاکس انجکشن
<b>C-FLOX TABS</b>	(PREM PHARMA)	سی فلاکس ٹبلٹ
250mg: 10: Rs.36.00; 500mg: 10: 65.00		
<b>CIFOMED</b>	(AGLOWMED)	سی فومڈ
250mg: 10: Rs. 41.00; 500mg: 10: Rs.75.10		



<b>CIFRAN</b>	<b>(RANBAXY)</b>	سائی فران ٹبلٹ
250mg: 10: Rs.53.00; 500mg: 10: Rs.89.00	750mg: 2: Rs.38.00	
<b>CIFRAN INFUSION</b>	<b>(RANBAXY)</b>	سائی فران بوتل
50ml: Rs.50; 100ml: Rs.50.00		
<b>CIPAD</b>	<b>(ALBERT DAVID)</b>	سی پاڈ
250mg: 10: Rs.60.00; 500mg: 10: Rs.119.50		
<b>CIPIC-250/500</b>	<b>(BIOLOGICAL E)</b>	سی پک
250mg: 10: Rs.73.00; 500mg: 10: Rs.126.50		
<b>CIPLOX</b>	<b>(CIPLA)</b>	سپ لاکس
250mg: 10: Rs.44.00; 500mg: 10: Rs.78.90	750mg 4: Rs.46.00	
<b>CIPLOX I.V. INFUSION</b>	<b>(CIPLA)</b>	سپ لاکس
50ml: vial Rs.33.45; 100mgL Rs.47.85		
<b>CIPROBID</b>	<b>(CADILA)</b>	سائپرو بڈ کپسول
250mg: 10: Rs.40.50; 500mg: 10: Rs.77.70; 750mg: 2: Rs.56.88		
<b>CIPROBID TABS</b>	<b>(CORE)</b>	سائپرو بڈ ٹبلٹ
250mg: 10: 40.00; 500mg: 10: Rs.75.00		
<b>CIPROBID I.V</b>	<b>(CORE)</b>	سائپرو بڈ بوتل
100ml: 100ml: Rs.30.00		
<b>CIPRODAC</b>	<b>(ALIDAC)</b>	سائپرو ڈیک
250mg: 10: Rs.40.50; 500mg: 10: Rs.77.70		
<b>CIPRODAC INFUSION</b>	<b>(ALIDAC)</b>	سائپرو ڈیک بوتل
100ml bottle Rs.34.00		
<b>CIPROFLOX</b>	<b>(DEE PHARMA)</b>	سائپرو فلاکس
250mg: 4, Rs.49.50; 500mg: 4: Rs.79.80		
<b>CIPROFLOX INFUSION</b>	<b>(DEE PHARMA)</b>	سائپرو فلاکس بوتل
100ml: Rs.53.10		
<b>CIPROFLOXACIN TABS</b>	<b>(PREMPHARMA)</b>	سائپرو فلاکس سین ٹبلٹ
250mg: 1 tab: Rs.3.60; 500mg: 1 tab: Rs.6.50		
<b>CIPROGLEN</b>	<b>(GLENMARK)</b>	سائپرو گلن
250mg: 10: Rs.69.95; 500mg: 10: Rs.125.00		
<b>CIPROLET</b>	<b>(STANGEN)</b>	سائپرو لٹ
250mg: 10: Rs.40.00; 500mg: 10: Rs.71.50		
<b>CIPROLET INFUSION</b>	<b>(STANGEN)</b>	سائپرو لٹ بوتل
100ml: Rs.58.00		



<b>CIPROMYCETINE</b> (MAC)	سائپرومائی شین
Ciprofloxacin 500mg tabs: 4: Rs.33.00	
<b>CIPROSOL</b> (SOL)	سائپروسول
250mg: 10x10 Rs.595.00; 500mg: 10x4: Rs.438.00	
<b>CIPROSOLS INFUSION</b> (SOL) 100ml: Rs.35.00	سائپروسول بوتل
<b>CIPROQUIN</b> (KOPRAN)	سائپروکوئن
250mg: 10x10: Rs.415.00; 500mg: 10x2: Rs.250.10	
<b>CIPROVA</b> (LUPIN)	سائپرووا
250mg: 4: Rs.24.10; 500mg: 10x10: Rs.720.00	
<b>CIPROWIN</b> (ALEMBIC)	سائپروون
250mg: 10: Rs.45.00; 500mg: 10: Rs.89.00	
<b>CIPROWIN INFUSION</b> (ALEMBIC) 100ml:Rs.44.50	سائپروون بوتل
<b>CIPROXAN I.V. INJ</b> (BIOGENICS)	سائپروکسان بوتل
100ml bottle: Rs.35.00	
<b>CONFLOX</b> (CONCEPT)	کن فلاکس ٹیلیٹ
250mg: 10: Rs.43.00; 500mg: 10: Rs.77.50	
<b>CONFLOX INFUSION</b> (CONCEPT)	کن فلاکس بوتل
100ml: vial Rs.31.00	
<b>CONSFLOX</b> (CFL)	کاس فلاکس
250mg: 10: Rs.39.00; 500mg: 10: Rs.72.00	
<b>FLOCY</b> (NATCO)	فلوسی
250mg: 10: Rs.70.00; 500mg: 10: Rs.120.00	
<b>FLOCY INFUSION</b> (NATCO) 100ml: Rs.40.00	فلوسی بوتل
<b>FLOXAQUIN-C</b> (THEMIS CHEMICALS)	فلاکساکوئن سی
caps: 250mg: 4: Rs.15.00; 500mg: 4: Rs.29.50	
<b>FLOXIP</b> (MAX)	فلاکسپ
250mg: 10: Rs.32.50; 500mg: 10: Rs.63.00; infusion 200mg, per 100ml, Rs.43.00	
<b>IFICIPRO I.V</b> (UNIQUE) infusion 100ml:Rs.41.79	ای فی سائپرو بوتل
<b>LYPRO</b> (LYKA)	لائپرو ٹیلیٹ
250mg: 4: Rs.117.60; 500mg: 4: Rs.31.56	



<b>MICROFLOX</b>	(MICRO LABS)	مائکرو فلاکس
250mg: 6: Rs.38.40; 500mg: 6: Rs.70.80		
<b>ORACIP-500</b>	(MERCURY)	اوراسپ
500mg tabs:10: Rs.79.00		
<b>ORPIC 250/500</b>	(DYES)	آرپک
250mg: 4: tabs Rs. 16.00; 500mg: 4: Rs.28.00		
<b>PANFLOX</b>	(PFIMEX)	پن فلاکس
250mg: 4: Rs. 30.00; 500mg:4: Rs.48.00		
<b>PENQUIN</b>	(HIND ANTIBIOTICS)	پین کوئن
250mg: 4: Rs.22.00; 500mg: 4: Rs.24.04		
<b>Q-BID</b>	(KAMRON)	کیو بیڈ
250mg: 10: Rs.36.90, 500mg: 10: Rs.69.50, 750mg: 10: Rs.104.90		
<b>QCBI</b>	(PHARMED)	کیو سی بی آئی
250mg: 10: Rs.43.50; 500mg: 10: Rs.79.50		
<b>QUEP 250 FORTE</b>	(NEO PHARMA)	کیو پ ۲۵۰
250mg: 4: Rs.16.93; 500mg: 4: Rs.30.78		
<b>QUINOBACT</b>	(NICHOLAS)	کیو نو بیگٹ
250mg: 5: Rs.41.96; 500mg: 5: Rs.70.66		
<b>QUINTOR</b>	(TORRENT)	کوئنٹور
250mg: 10: Rs.31.90; 500mg: 4: Rs.31.50		
<b>QUINTOR INFUSION</b>	(TORRENT) 100ml: Rs.26.00	کوئنٹور بوتل
<b>RAFLOX</b>	(RALLIS) 500mg: 10:Rs.129.10	راف لکس
<b>RECOCIF</b>	(RECON)	ریکوسف
250mg: 10: Rs.40.00; 500mg: 10: Rs.75.00		
<b>SEFLOX</b>	(JAGSON PAL)	سیف لاکس
250mg: 10: Rs.45.00; 500mg: 10: Rs.85.00; infusion 200mg, per 100ml, Rs.31.00		
<b>STROX</b>	(DABUR)	اسٹراکس
250mg: 10: Rs.69.90; 500mg: 10: Rs.119.95; infusion 200mg per 100ml, Rs.39.95		
<b>SUPRAFLOX</b>	(KHANDELWAL)	سپرافلاکس
250mg: 4: Rs. 23.50; 500mg: 2: Rs. 22.95		



**WYSERIN** (WYETH)  
250mg: 4: Rs.26.10; 500mg: 2: Rs.23.10  
**ZIPCIN** (GUFIC)  
250mg: 4: Rs.29.20; 500mg: 4: Rs.48.80  
**ZOXAN** (FDC)  
250mg: 10: Rs.45.35; 500mg: 10: Rs.81.00

والی سیرین

زپ سن

زو کسان

## CLARITHROMYCIN

## کلار تھرومائی سین

افعال و منافع: آلات تنفس کے انفکشن R.T.I. جلد اور نرم ساختوں کے انفکشن میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۲۵ ملی گرام ہر ۱۲ گھنٹہ بعد ۷ دن تک کھلائیں شدید انفکشن میں ۵۰۰ ملی گرام تک دی جاسکتی ہے دن میں ۲ بار ۱۲ دن تک ۱۲ سال سے کم عمر بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔  
منفی افعال: C/1 یرقان کی ہٹری رکھنے والے اور ارائی تھرومائی سین ایزی تھرومائی سین کلار تھرومائی سین سے حساس مریضوں کو نہیں دینا چاہیے۔

احتیاط: ورم جگر، جگر کی غیر طبعی حالت، حمل اور ایام رضاعت میں احتیاط برتیں۔  
دواؤں کے ساتھ رد عمل: تھیوفائی لین ڈیجاکسن، کاربامازی پائن، خوردنی مانع انجماد خون ادویہ۔

## تجارتی مرکب

**CLARIBID** (ABBOTT)  
Clarithromycin 250mg: tabs: 4: Rs.140.00

کلاری بڈ

## CLOXACILLIN

## کلاکسا سیلین

افعال و منافع: یہ دوا گرام مثبت Gram Positive جراثیم سے پیدا ہونے والے انفکشن، اسٹریپٹوکوکائی انفکشن آلات تنفس تناسلی اعضاء کے انفکشن اعضاء بول کے انفکشن U.T.I. جلد اور نرم ساختوں کے انفکشن آپریشن کے بعد کا انفکشن ہڈیوں کے ورم اور دیگر انفکشن میں بہت مفید کام کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: معمولی انفکشن میں ۲۵۰ ملی گرام ہر ۶ گھنٹہ بعد شدید انفکشن میں ۳۰۰ ملی گرام ہر ۶



گھنٹہ بعد بچوں کو ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام / فی کلو گرام کے حساب سے ۴ خورا کوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔  
منفی افعال: اپنی سیلین سے حساس مریضوں کو الرجک دمہ پتی، اچھلنے، نزلہ دوی بخار میں نہیں دینا چاہیے۔  
مضر اثرات: ہضم کی خرابیاں ہو سکتی ہیں۔

## تجارتی مرکبات

<b>BIOCLOX</b>	(BIOCHEM)	بایو کلاکس
250mg: 10: Rs.26.75 ; 500mg: 10: Rs.49.10		
<b>BIOCLOX INJ</b>	(BIOCHEM)	بایو کلاکس انجکشن
250mg: vial: Rs.8.60: 500mg: vial: Rs.12.35 1g: Rs. 13.00		
<b>CLACIN INJ</b>	(INGA) 1 vial Rs. 12.85	کلا سین انجکشن
<b>CLOXACILLIN INJ</b>	(PREMPHARMA)	کلاکسا سیلین انجکشن
500mg: inj. 5ml vial: Rs.12.50		
<b>KLOX</b>	(LYKA) caps 250mg: 12: Rs.29.28; 500mg: 12.89	کلاکس
<b>KLOX DRY SYRUP</b>	(LYKA) 24g: Rs.14.36	کلاکس سیرپ
<b>KLOX INJ</b>	(LYKA) 500mg: vial: Rs.11.43	کلاکس انجکشن
<b>STAPHNIL</b>	(INGA)	اسٹافنل کپسول
250mg: 12: Rs.24.27, 500mg: 12: Rs.41.30		
<b>STAPHNIL INJ.</b>	(INGA) 500mg vial: Rs.12.50	اسٹافنل انجکشن

## COLISTIN SULPHATE

کولسٹین سلفیٹ

## SODIUM COLISTIN

سوڈیم کولسٹین

## METHANE SULFONATE

میٹھین سلفونیٹ

افعال و منافع: آلات بول کے انفکشن U.T.I. ورم گردہ و مثانہ، ورم نازہ Urethritis کان ناک حلق کے انفکشن E.N.T. آنکھوں کے متعدی امراض، اور گرام نگیٹو جراثیم سے پیدا ہونے والے امراض میں مفید ہے۔ زخم قرنیہ، ورم باریطون آنتوں کے انفکشن، آپریشن کے انفکشن سے حفاظت کے لئے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰ لاکھ یونٹ سے ۸۰ لاکھ یونٹ بچوں کو ۵۷ ہزار سے ڈیڑھ لاکھ یونٹ / فی کلو گرام



وزن کے حساب سے چار خوراکیوں میں تقسیم کر کے دن میں ۴ بار انجکشن گہرا عضلاتی لگائیں۔  
مضر اثرات: جسم میں جھنجھناہٹ یا سوجن کی چھنا، دوا بند کرنے پر یہ اثر ختم ہو جاتا ہے۔  
احتیاط: انجکشن گہرا عضلاتی لگائیں۔

## تجارتی مرکب

WALAMYCIN SUSPENSION (WALLACE) دے مائی سین  
30ml: Rs. 17.00; 60ml Rs.30.00

## Co-TRIMOXAZOLE

## کو-ٹرائی موکسازول

افعال و منافع: یہ ہمیشہ ٹرائی میتھامپرم اور سلفا میتھامپرم کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے۔ بالائی اور  
زیریں آلات تنفس کے انفکشن، مردانہ و زنانہ تناسلی اعضاء کے انفکشن، ولادت و زچگی کے دوران  
ہونے والے انفکشن، تسمم الدم Toxaemia شدید ورم الاذن ورم غار الانف میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۲۰۰ سے ۴۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار۔ بچوں کو ۱۰ ملی گرام / کلو گرام وزن کے  
حساب سے دن میں ۲ بار۔

منفی افعال: C/1 جگر کی خرابی میں، خون کی غیر طبعی حالت میں اور دوا سے حساس مریضوں کو  
نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: باضے کی خرابیاں۔ جلد پر داغ پڑنا۔

احتیاط: جگر اور گردوں کے امراض میں، دودھ پلانے والی عورتوں کو نہ دی جائے۔

## DOXYCYCLINE

## ڈاکسائیکلین

افعال و منافع: بالائی آلات تنفس کے انفکشن U.R.T.I. سعال بلغمی Bronchitis پھیپھڑوں  
کی نالیوں کے ورم، نمونیہ، پھیپھڑوں کے پھوڑے، ورم زرخرہ، ورم قصۃ الریہ کان ناک حلق کے  
انفکشن، ورم لوز تین، ورم غار الانف، ورم الاذن، ورم پستان Mastitis تناسلی اعضاء، و آلات بول  
کے انفکشن ورم نائزہ ورم غدہ قدامیہ ورم مثانہ ورم حوض الکلیہ، ورم گردہ، پیڑوکا ورم و دبیلہ، نسوانی  
اعضاء و زچگی کا انفکشن حمی انفاسیہ نرم ساختوں کا انفکشن جلنے کٹنے پھوڑے وغیرہ کے متعدی زخم، جنسی



امراض متعدی S.T.D. مسوڑوں کا ورم دانتوں کی تکالیف میں مفید و موثر ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۱۰۰ ملی گرام ہر ۱۲ گھنٹہ بعد، مرض کچھ بڑھ چکا ہو جانے پر ۱۰۰ ملی گرام یومیہ۔  
منفی افعال: دوا سے حساس مریضوں کو حمل اور ایام رضاعت میں ۸ سال سے کم عمر بچوں کو نہ دی جائے

مضر اثرات: دانتوں کی رنگت میں تبدیلی، پیر کی پتلی ہڈی Febula کی افزائش میں کمی فور ہضم،  
الرجی  
احتیاط: جگر کی خرابیاں، خون کی غیر طبعی کیفیت، علاج کے دوران خون کی جانچ کراتے رہیں۔ زیادہ  
مدت تک استعمال سے احتیاط برتیں۔

### تجارتی مرکبات

<b>BIODOXI</b>	(BIOCHEM)	باپوڈاکسی
100mg caps 10: Rs.28.90	100: Rs.289.00	
<b>DOPAMYL</b>	(P&B LABS)	ڈوپائل
100mg per ml inj: 20ml vial	Rs.35.00	
<b>DOXT</b>	(DOLPHIN) 100mg caps 4: Rs.9.07	ڈاکسٹ
<b>DOXY-1</b>	(U.S.VITAMIN) 100mg: caps 8, Rs.19.92	ڈاکسی ۱
<b>DOXY-24</b>	(U.S.VITAMIN) caps 6, Rs.16.60	ڈاکسی ۲۴
<b>DOXYPAL</b>	(JAGSON PAL) 100mg; caps 10, Rs.29	ڈاکسی پال
<b>DOXYTERA CAPS</b>	(P&B LABS) 100mg caps; 6, Rs.15.74	ڈاکسی ٹیرا کپس
<b>DURACYCLIN</b>	(UNICHEM) 100mg caps 4: Rs.6.87	ڈیوراسا نکلین
<b>GINADOX</b>	(PHARMASIA) 100mg: caps: 10: Rs.46.00	گناڈاکس
<b>LYDOX</b>	(LYKA) 100mg: caps 4: Rs. 8.03	لائی ڈاکس
<b>MICRODOX</b>	(MICRO LABS) 100mg caps 10: Rs.25.80	مائی کروڈاکس
<b>TETRADOX</b>	(RANBAXY)	ٹٹراڈاکس
100mg caps 10: Rs.32.65; tabs: 3: Rs.9.80		
<b>VIBAZINE DT</b>	(PFIZER)	وائی بازین
100mg: tabs: 6: Rs.60.11; 200mg: 10: Rs. 185.39		
<b>VIVOCYCLINE</b>	(IDPL) 100mg caps 4: Rs. 8.12	ویووسائیکلین



## ERYTHROMYCIN

## ارائی تھرومائی سین

افعال و منافع: بالائی آلات تنفس کے انفکشن، شدید نمونیہ، ٹرائی کو مونا س اور کلائی مائی ڈیا انفکشن کے سبب ہونے والے انفکشن، چھاجن، ایگزیم، مہاسے گنج، سرفہ بالوں کی جڑ میں ہونے والے انفکشن میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵۰ سے ۵۰۰ ملی گرام ہر ۶ گھنٹہ بعد ۶ سے ۱۲ سال کے بچوں کو ۱۰۰ سے ۲۰۰ ملی گرام ہر ۶ گھنٹہ بعد ۶ سال سے کم عمر بچوں کو ۲۰ سے ۴۰ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے ۳ خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔

منفی اثرات: دوا سے حساس مریضوں کو، یرقان کی ہٹری والے مریضوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

مضر اثرات: باضمہ کی خرابیاں، الرجی،

احتیاط: درم جگر، جگر کے افعال کی خرابی، طویل عرصہ تک، جگر کے امراض کی ہٹری میں حمل اور ایمرضاعت میں احتیاط برتنا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

**ALTHROCIN** (ALEMBIC) ال تھرو سین ٹبلٹ

250mg: 10: Rs. 36.10; 500mg: 10: Rs. 69.84

**ALTHROCIN CHEWABLE** (ALEMBIC) ال تھرو سین چھو اے ٹل

100mg tabs: 10: Rs. 15.52

**ALTHROCIN PAED DROPS** (ALEMBIC) ال تھرو سین ڈراپس

Drops 10ml: Rs. 18.28

**ALTHROCIN LIQUID** (ALEMBIC) 60ml: Rs. 26.99 ال تھرو سین لکوڈ

**ALTHROCIN FORTE LIQUID** (ALEMBIC) ال تھرو سین فورٹ لکوڈ

30ml: Rs. 23.79

**ELTOCIN** (IPCA) ال ٹوسن

250mg: 10: Rs. 35.56; 500mg: 10: Rs. 67.34

**ELTOCIN SUSP** (IPCA) 60ml: Rs. 23.03 ال ٹوسن سرپ



<b>ELTOCIN LIQUID</b> (IPCA) 60ml: Rs.21.98	ال ٹوسن لکوڈ
<b>ELUCN</b> (SWIFT)	الوسن
333mg: 10x10 Rs.s 575.00; 500mg: 10x10 Rs.680.00	
<b>ELUCN SUSP</b> (SWIFT) 50ml: Rs.29.98	الوسن سرپ
<b>E-MYCIN</b> (THEMIS PHARMA)	ای مائی سین
tabs 100mg: Rs. 11.84 (10) 250mg: Rs. 36.01 (10)	
<b>E-MYCIN DRY SYRUP</b> (THEMIS PHARMA)	ای مائی سین سرپ
syrup 30ml: Rs. 9.74 60ml: Rs.16.77	
<b>EMTHROCIN</b> (RHONE POULENC) 10: Rs.33.08	ام تھرو سین ٹبلٹ
<b>ERO-B 250/500</b> (LUPIN) 500mg: 10x4: Rs.267.70	ارو بی ۵۰۰/۲۵۰
<b>ERO-B SYRUP</b> (LUPIN) 60ml: Rs.2.73	ارو بی سرپ
<b>EROATE-250/500</b> (LUPIN)	ارو ایٹ ۵۰۰/۲۵۰
250mg: 10: Rs.35.64; 500mg: 10: Rs.67.50	
<b>EROATE-SUSP</b> (LUPIN) 60ml: Rs.27.07	ارو ایٹ سرپ
<b>ERYBEST-250</b> (BLUE CROSS)	ارائی بیسٹ ۲۵۰
250mg:tabs: 10, Rs.35.64	
<b>ERYC</b> (BDH) 250mg: tabs: 10: Rs. 36.00	ارائیک سرپ
<b>ERYC 50</b> (BDH) 250mg: tabs: 10: Rs. 31.95	ارائیک ۵۰
<b>ERYC DRY.SYRUP</b> (BDH)	ارائیک ٹبلٹ
125mg:per 5ml 60ml: Rs.25.50	
<b>ERYMERTAB</b> (MERCURY)	ارائی مر ٹبلٹ
250mg: tabs 10, Rs.35.60	
<b>ERYMERSUSP</b> (MERCURY) 45ml: Rs.20.51	ارائی مر سرپ
<b>ERYNATE</b> (HIND ANTIBIOTICS)	ارائی نیٹ
45ml:Rs.13.00	
<b>ERYSAFE</b> (U.S.VITAMIN)	ارائی سیف
250mg: 10: Rs. 33.06 ; 500mg: 6: Rs. 33.10	
<b>ERYSTER</b> (HIND ANTIBIOTICS)	ارائی سٹر ٹبلٹ
250mg:tabs: 10tabs 33.42	
<b>ERYTHROCIN-FT</b> (ABBOTT)	ارائی تھرو سین ایف ٹی
100mg: 10: Rs.13.48; 250mg: 10: Rs.34.85; 500mg:6:Rs.38.57	



**ERYTHROCIN GRANULES (ABBOTT)**

125mg: granules. 4sachets Rs. 12.70

**ERYTHROCIN DRY SYRUP (ABBOTT)**

45ml: Rs. 21.28

**ERYTHROCIN DROPS (ABBOTT)**

**THROMYCIN TAB. SYP (IDPL)**

**GENTAMYCIN SULPHATE**

ارائی تھرو سین گرینول

ارائی تھرو سین سرپ

ارائی تھرو سین ڈراپس

تھرو ماسین ٹبلٹ سرپ

جنٹامائی سین سلفیٹ

افعال و منافع: گرام منفی Gram- Negative جراثیم سے پیدا ہونے والے امراض، آلات بول کے انفکشن U.T.I.، تسمم الدم Toxaemia دیگر شدید انفکشن جلد ہڈی اور نرم ساختوں کے انفکشن سرسام Meningitis، آلات ہضم کے انفکشن جلنے کٹنے کے انفکشن کی مفید دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: بالغوں کو ۸۰ ملی گرام ہر ۸ گھنٹہ بعد بچوں کو ۶ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے ۳ خوراکیوں میں تقسیم کر کے۔

منفی اثرات: گردوں کی خرابی خون میں پیشاب کی سمیت Uraemia اور حمل میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: کان کے اور گردوں کے فعل میں خلل واقع ہو سکتا ہے۔

احتیاط: پارکنسن ڈیزیز، گردوں کی خرابی ضعف عضلات میں نہیں دینا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: D/1- مندرات، فروسی مائیڈا، تھاکرائی ٹک ایسڈ، اور مرخی عضلات

ادویہ کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

## تجارتی مرکبات

**BIOGARACIN**

(BIOCHEM) 80mg 2ml vial Rs. 8.45

**GARAMYCIN**

(FULFORD) 2ml vial Rs. 5.95

**G-MYCIN INJ**

(BPL) 800mg: 20ml vial Rs. 39.20

**G-MYCIN INJ PAED**

(BPL)

جی مائی سین انجکشن (بچوں والا)

0.2mg: 6ml: Rs. 7.60

**GENMAC**

(MAC)

جین میک Rs. 8.52; 800mg vial: Rs. 41.47

بایو گراسین

گیرامائی سین

جی مائی سین انجکشن

جی مائی سین انجکشن (بچوں والا)



GENTARIL (ALKEM)	80mg: inj 2ml: vial, Rs. 8.21	جنٹارل
GENTASPORIN (PCI)		جنٹاسپورین
40mg per ml inj; 2ml Rs. 7.68; 10ml Rs. 48.03		
GENTYN (BIOGENICS)		جن ٹائن
40mg of gentamicin base per ml inj. 2ml vial: Rs. 8.40		
GENTASWIFT (SWIFT)	80mg vial Rs. 8.15	جنٹاسوئفٹ
GENTICYN INJ (NICHOLAS)	80mg: 2ml: Rs. 6.72	جنٹی سائن
GEROCIN INJ (P&B LABS)	1x2ml vial Rs. 8.13	جیرو سین انجکشن
LYRAMYCIN (LYKA)	2ml Rs. 6.90	لائی رامائی سین
MERIGENTA INJ (MERCURY)	2.5ml amp: Rs. 6.30	میری جنٹا انجکشن
PRIMICIN INJ (HIND ANTIBIOTICS)	2ml Rs. 7.10	پرائی مائی سین

## KANAMYCIN

## کینامائی سین

افعال و منافع: آلات بول (گردہ مثانہ، حالبین) کے انفکشن U.T.I. (پھیپھڑوں، ہوائی نالیوں) کے انفکشن R.T.I. ورم، زخم نرم ساختوں کے انفکشن، اسٹفلو کاکس سے پیدا ہونے والے انفکشن۔  
 نومولود کے جراثیمی امراض، تسمم الدم Septicaemia وغیرہ کے لئے بہترین مانی ہوئی دوا ہے۔  
 مقدار و ترکیب: ۵۰۰ ملی گرام سے اگرام روزانہ عضلاتی انجکشن دو خوراکیوں میں تقسیم کر کے۔  
 منفی افعال: کینامائی سین سے حساس مریضوں کو، حمل اور ایام رضاعت میں دینا مضر ہے۔  
 مضر اثرات: گردوں اور کان میں خراب اثرات پیدا ہوتے ہیں۔

احتیاط: ضعف عضلات میں، پارکن سن، ڈیزیز میں، گردوں کی خرابی میں احتیاط برتیں۔  
 دواؤں کے ساتھ رد عمل: سن کرنے اور بیہوش کرنے والی ادویہ، فروسی مائیڈ، ایتھا کرائی ٹک ایسڈ مرخی عضلات ادویہ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

## کینامائی سین انجکشن

KANAMYCIN (BIOCHEM)		کان سن
500mg; Rs. 7.95; 1g, Rs. 14.10		
KANCIN (ALEMBIC)	0.5g, Rs. 13.70, 1g Rs. 23.00	کان سلف
KANSULF (BIOCHEM)	.5g, vial: Rs. 7.58, 1g, vial: Rs. 13.10	



## LINCOMYCIN HCL لنکومائی سین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: بالائی آلات تنفس کے انفکشن U.R.T.I. کان کے ورم، کھانسی Bronchitis، نمونیہ، جلد اور زیر جلد نرم ساختوں کے انفکشن، ہڈیوں اور مخ العظام کا ورم، تسمم الدم Septi caemia ورم غلاف القلب وغیرہ میں مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: ۶۰۰ ملی گرام عضلاتی یا بوتل میں ملا کر وریڈی دن میں ۱ سے ۲ بار، بچوں کو ۱۰ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے عضلاتی انجکشن دن میں ۱-۲ بار خوردنی طور سے ۵۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار بچوں کو ۳۰ سے ۶۰ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے دی جائے۔

منفی اثرات: کلن ڈائائی سین اور لنکومائی سین سے حساس مریضوں کو معمولی جراثیمی اور وائرل انفکشن میں نو مولود کو گردوں اور جگر کے مریضوں میں مینا با لزم یعنی عمل انجذاب کی خرابیوں میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: اسہال، ورم و سوزش امعاء، ہو سکتا ہے۔

احتیاط: شدید ورم امعاء میں، معمر افراد سوء ہضمی کے مریضوں دمہ اور الرجی، جگر کے امراض حمل اور ایام رضاعت میں، طویل عرصہ تک، دوران علاج خون کی جانچ کراتے ہیں۔  
دواؤں کے ساتھ رد عمل: عضلات و اعصاب کے افعال میں رکاوٹ پیدا کرنے والی دواؤں کے ساتھ دینا مضر ہے۔

### تجارتی مرکبات

LINCOCIN	(MAX) 2ml amp. Rs.31.00	لنکوسن انجکشن
LINCOCIN CAPS	(MAX) 500mg: caps: 6: Rs.60.00	لنکوسن کپسول
LYNX CAPS	(WALLACE) 500mg: caps: 10: Rs.80	لنکس کپسول
LYNX SYRUP	(WALLACE)	لنکس سرپ
125mg per 5ml syrup: 60ml: Rs.45.00		
LYNX INJ.	(WALLACE)	لنکس انجکشن
1ml: Rs.13.00, 2ml: Rs.22.50		



## LOME FLOXACIN

## لومی فلاکسائین

افعال و منافع: آلات بول (گردہ مثانہ)، آلات تنفس کے انفکشن، پیچیدہ اور غیر پیچیدہ امراض متعدیہ پرانی کھانسی Chronic Bronchitis آپریشن سے ہونے والے جراثیمی انفکشن تناسلی اعضاء اور زچگی کے متعدی امراض، جلد اور نرم ساختوں کے انفکشن، امراض خبیثہ S.T.D. مثلاً سوزاک ورم نازہ ہڈیوں جوڑوں کے ورم و انفکشن کی مفید و موثر دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۴۰۰ ملی گرام صرف ایک خوراک ۲۴ گھنٹہ میں مرض کے مطابق ۷ سے ۱۴ دن تک منفی اثرات: دوا سے حساس مریض کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: متلی قے، درد سر، روشنی سے نفرت چکر آنا، اسہال

احتیاط: آنکھوں میں کوئی تکلیف نہ تو دوا بند کر دی جائے ۱۸ سال سے کم عمر بچوں کو نہ دی جائے دوا کے دوران مشنری چلانے ڈرائیوری کرنے سے احتیاط برتیں۔

دوا کے ساتھ رد عمل: D/1 الومنم اور میکینیشیم سے تیار کردہ دافع تیزابیت ادویہ کے ساتھ نہ دی جائے۔

## تجارتی مرکبات

FLOXADAY	(CROSLANDS)	فلاکساڈے
400mg tabs : 6:	Rs. 115.00	
FOXIL	(SARABHAI) 400mg: tabs: 5:	فوکسل
LOMADAY	(DR. REDDY) 400mg: tabs: 10:	لوماڈے
LOMEF-400	(TORRENT) 400mg: tabs: 4:	لومیف ۴۰۰
LOMEWON	(MAX) 400mg: tabs: 5:	لومی ون
LOMFLOX	(IPCA) 400mg: tabs: 4:	لومی فلاکس
LOMITAS	(INTASS) 400mg: tabs: 4:	لومی ٹاس
MAHAQUIN	(SEARLE) 400mg: tabs: 4:	مہا کوئن
ONTOP	(SYSTOPIC) 400mg: tabs: 4:	اون ٹاپ



## مینوسائیکلین ہائیڈروکلورائیڈ MINOCYCLINE HCL

افعال و منافع: ورم عانہ ورم رحم، ورم قاذفین، تناسلی اعضاء کے ورم اور انفکشن سوزاک، آتشک مجازی Syphilitic شانکroid آتشک حقیقی Syphilis جنگاسوں کا ورم، ورم غدہ قدامیہ، جلد اور نرم ساختوں کے ورم و انفکشن حاد اور مزمن سعال Bronchitis پھیپھڑوں کے پھوڑے اور دیگر جراثیمی امراض میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: تناسلی اعضاء کے ورم و انفکشن میں ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار ۱۴ سے ۲۱ دن تک، سوزاک میں ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار ۵ دن تک، آتشک میں ۱۰۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار ۶ دن تک کچھ دن کے ورم میں ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار جب تک آرام نہ آجائے کھلائیں۔

منفی اثرات: دوا سے حساس مریضوں کو گردوں اور جگر کے مریضوں کو حمل کے نصف آخری ایام میں ۸ سال سے کم عمر بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: ہاضمے کی خرابیاں، روشنی سے نفرت، ورم قولون، جلد پر داغ پڑنا، جگر میں خرابی ہونا ہڈیوں کی نشوونما میں کمی دانتوں کا کمزور ہونا وید میں انجکشن لگانے سے خون چھنے کا خطرہ۔

احتیاط: طویل عرصہ استعمال سے جگر اور گردوں کی جانچ کراتے رہیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: دودھ سے بنی اشیاء فولاد کے مرکبات اور دافع تیزابیت ادویہ پینی سیلین، دوروں کو روکنے والی ادویہ، کاربامائیڈ پائین، فین ٹائین، لیتھیم، ڈیجاکسن کے ساتھ استعمال کرانے سے دوا کے فعل میں سستی اور کمی آجاتی ہے۔

### تجارتی مرکبات

CYNOMYCIN-100

(LEDERLE)

سائی نو مائی سین ۱۰۰

Minocycline 100mg caps; 4: caps Rs.60.45

CYNOMYCIN-50

(LEDERLE)

سائی نو مائی سین ۵۰

Minocyclin 50mg caps: 6: caps Rs. 47.60



## NORFLOXACIN

## نار فلاکساسین

افعال و منافع: اعضاء بول (گردہ مثانہ) و آلات تناسل کے انفکشن، سوزاک، جراثیمی آنتوں کی سوزش، معیادی بخار، آتشک مجازی وغیرہ کی بہت مفید دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: آلات بول کے انفکشن میں ۴۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار ۳ دن تک سوزاک میں ۸۰۰ ملی گرام کی ایک خوراک، آنتوں کے شدید ورم میں ۴۰۰ ملی گرام ۲-۳ بار ۳ دن تک، ٹائی فائیڈ میں ۴۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار ۴ دن تک آتشک مجازی Chancroid میں ۸۰۰ ملی گرام کی ایک خوراک۔  
متنی افعال: C/1 حساس مریضوں، حمل اور بچوں کو استعمال نہ کرانا چاہیے۔

مضر اثرات: متلی، درد سر چکر آنا، جلد پر داغ پڑنا، قم معدہ پر جلن درد شکم، اسہال، بھوک کم، خند میں خلل، بے چینی، الجھن، کبھی دورہ پڑنا۔

احتیاط: ایام رضاعت میں، گردوں کی خرابی میں، دورے آنے کی ہسٹری میں احتیاط برتیں۔  
دواؤں کے ساتھ رد عمل: D/1 نائٹرو فورن ٹائن، خوردنی مانع انجماد خون ادویہ، تھیوفائی لین، سائیکلو سپورین، دافع تیزابیت اور پروبے نی سڈ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

ALFLOX	(ALKEM)	الفلاکس
200mg: 10: Rs.23.00; 400mg: 10: Rs.45.00		
ANQUIN	(LYKA)	این کوئن
400mg: 4: Rs.18.66; 800mg: 1, Rs. 9.82		
BIOFLOXIN	(BIOCHEM)	بایو فلاکسین
400mg, tabs 10: Rs.38.50		
EMFLOX-400	(MALLADI)	ایم فلاکس ۴۰۰
400mg: tabs 10x10, Rs. 440.00		
MERIFLOX	(MERIND)	میری فلاکس
400mg, tabs 10, Rs. 44.20		
NEONOX 200	(NEOPHARMA)	نیوناکس ۲۰۰
200mg: dispersible uncoated tabs: 4: Rs.12.00		
NORBACTIN	(RANBAXY)	نار بیکسین
200mg: 10: Rs.32.65, 400mg 10: Rs. 41.10; 800mg: 4: Rs.46.08		



<b>NORBID</b>	<b>(ALEMBIC)</b>	نارپڈ
200mg: 10: Rs. 25.10; 400mg: 10: Rs. 45.00		
<b>NORFLOX</b>	<b>(CIPLA)</b>	نارفلکس
100mg, 10: Rs. 15.10; 200mg: 10: Rs. 26.20; 400mg: 10: Rs. 47.00;		
800mg: 4: Rs. 36.10		
<b>NORILET</b>	<b>(STANGEN)</b>	نارلیٹ
400mg: 10: Rs. 47.50; 800mg: 1 tab Rs. 8.00		
<b>NORMAX</b>	<b>(IPCA) 400 mg tabs 10: Rs. 45.65</b>	نارمیکس
<b>NOR-U (HIND ANTIBIOTICS)</b>	<b>400mg tabs 4x10: Rs. 142.10</b>	ناریو
<b>NORZED</b>	<b>(DEE PHARMA)</b>	نارزید
400mg, tinidazole 600mg: tabs: 10: Rs. 60.83		
<b>OBAX</b>	<b>(WOCKHARDT) 400mg tabs: 10: Rs. 49.50</b>	اوبیکس
<b>QUINOLOX</b>	<b>(KOPRAN) 400mg tabs 10: Rs. 32.50</b>	کیونولاکس
<b>SURFLOX TABS</b>	<b>(KANPHA) 400mg tabs 10: Rs. 37.50</b>	سرفلاکس
<b>URIBEN</b>	<b>(CFL) 400mg : tabs 10 39.50</b>	یوریبن
<b>UROFLOX</b>	<b>(TORRENT)</b>	یوروفلاکس
400mg: 10, Rs. 40.90; 800mg: 1, Rs. 9.00		
<b>UTIBID</b>	<b>(LUPIN)</b>	یوٹیڈ
400mg: 10: Rs. 45.10; 800mg: 1: Rs. 9.00		

## PEFLOXIN

## پیفلواکسین

افعال و منافع: گرام منفی Gram Negative اور اسٹفلوکاکائی سے پیدا ہونے والے انفکشن مثلاً نائی فائیڈ فیور جراثیمی پیچش۔ Bascilary Dysentery، طاعون، سرسام، آتشک، سوزاک، نمونیہ، کالرا وغیرہ میں مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: بالغوں کو پہلی خوراک ۸۰۰ ملی گرام پھر ۴۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار جگر کے امراض، یرقان، جلدھر (استقاء) میں ۴۰۰ ملی گرام دن میں ابار گردوں کی خرابی یا فیل ہونے پر ۴۰۰ ملی گرام ہر گھنٹہ بعد و ریدی انجکشن گلوکوز سیلوشن میں ملا کر آہستہ آہستہ چڑھائیں۔

منفی افعال: ۱۶ سال سے کم عمر بچوں کو، دوا سے حساس مریضوں کو حمل، ایام رضاعت میں نہیں دینا چاہیے۔



مضر اثرات: سر درد، درد شکم، متلی تے، الرجی، روشنی سے نفرت، عضلات میں درد خون کو بھانے والے مادے کی کمی۔

احتیاط: علاج کے دوران تیز روشنی سے الٹرا ویمیلیٹ شعاعوں سے احتیاط برتیں۔  
دواؤں کے ساتھ رد عمل: سوڈیم کلورائیڈ کی بوتل کے ساتھ استعمال نہیں کرانا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

IFIPEF	(UNIQUE) 400mg tabs: 4: Rs.19.00	ای فی پیف
IFIPEF INFUSION	(UNIQUE)	ای فی پیف بوتل والا
400mg per 5ml inj. 5ml amp.	Rs.48.00	
PEBACT	(SARABHAI) 400mg: tabs: 10: Rs.32.71	پی بی کٹ
PEFBID	(ALEMBIC) 400mg: tabs: 10: Rs.47.50	پیف بیڈ
PEFCIN	(TIDE (TORRENT) 400mg: tabs: 4: Rs.18.95	پیف سن
PEFLOBID	(CADILA) 400mg: tabs: 10: Rs.45.00	پیف لو بیڈ
PEFLOBID INFUSION	(CADILA) 100ml bottle: Rs.36.90	پیف لو بیڈ بوتل
PEFOCIN	(PHARMASIA)	پی فوسن
400mg: film coated tabs: 10: Rs.39.50		
PEFOXAN	(P&B LABS) 400mg: tabs: 10x10T: Rs.450.	پی فوکسان
PELOX	(WOCKHARDT) 400mg: tabs: 10: Rs. 47.50	پی لاکس
PELOX INJ	(WOCKHARDT) 400mg: per 5ml amp Rs.40	پی لاکس انجکشن
PELOX INFUSION	(WOCKHARDT)	پی لاکس بوتل
PIF	(UNICHEM)	پیف
PENTIN	(KANPHA) 400mg: tabs: 10: Rs.3.74	پن ٹین
PIFLASYN TABS	(RHONE POULENC)	پیف لاسائن ٹبلیٹ
Pefloxacin 400mg: tabs: 4: Rs.18.12		
PIFLASYN I.V.	(RHONE POULENC)	پیف لاسائن بوتل
110ml bottle: Rs.36.00		
PROFLOX	(PROTEC) 400mg: tabs: 4: Rs.15.60	پروفلاکس
QUCIN	(ARISTO) 400mg tabs: 10: Rs.45.00	کوئی سین
ROLOX	(RECON)	رولوکس
400mg of Pefloxacin. 10 film coated tabs: 10: Rs. 45.00		



**PENICILLINS****پنی سیلین کے مرکبات****BENZATHIN PENICILLIN-G** بنزاتھین پنی سیلین جی**BENZYL PENICILLIN** بنزائل پنی سیلین**PENICILLIN-G-SODIUM** پنی سیلین جی سوڈیم**PENICILLIN (V)** پنی سیلین وی**PHENOXY-METHYL-PENICILLIN** فینوکسائل می تھائل پنی سیلین**PROCAIN PENICILLIN** پروکین پنی سیلین

افعال و منافع: پنی سیلین ایک زبردست دافع جراثیم دوا ہے یہ بیکٹیریا کی نمو اور افزائش کو روکتی ہے۔ اسٹفلوکاکائی، سٹریپٹوکاکائی، سٹریموکاکائی، منیجوکاکائی، خناق، Diphtheria سوزاک، آتشک، بچوں کی موروثی آتشک میں مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: مقدار خوراک کا تعین مرض اور مریضوں کے حالات انفلکشن کے اثرات انفلکشن پیدا کرنے والے جراثیم پر منحصر ہے۔ عموماً ۱۲ سے ۲۴ لاکھ یونٹ کئی خوراکوں میں تقسیم کر کے ہر ۸ گھنٹہ بعد دی جاتی ہے۔ کم از کم ۱۰ دن تک دینا چاہیے موروثی آتشک بالغوں میں ۲ لاکھ یونٹ / فی کلو گرام وزن کے حساب سے ۲-۳ خوراکوں میں تقسیم کر کے بچوں میں ۲۵ سے ۵۰ ہزار یونٹ / فی کلو گرام وزن کے حساب سے ۲ خوراکوں میں عضلاتی انجکشن لگایا جائے۔

منفی افعال: پنی سیلین سے حساس اور الرجک مریضوں کو استعمال نہیں کرانا چاہیے۔  
مضر اثرات: ہاضمے کی خرابی، ری ایکشن ہو سکتا ہے۔

احتیاط: گردوں کی خرابی میں، لگانے سے پہلے ٹسٹ کر لیں، ری ایکشن کے خطرے کے پیش نظر بنی سال، ڈی کازرون، ایڈرینالین تیار رکھیں۔



## تجارتی مرکبات

<b>BISTREPEN</b>	(ALEMBIC)	بسز پین
1 vial Rs. 8.98; 5 dose vial Rs. 24.44		
<b>CRYSTAPEN V TABS</b>	(GLAXO)	کرشاپین ٹبلیٹ
250mg: tabs 10, Rs.6.74		
<b>DICRYSTICIN-S-FORTE</b>	(SARABHAI)	ڈائی کرشاسین فورٹ
1 dose vial, Rs.11.54		
<b>FORTIFIED PROCAINE PENICILLIN INJ</b>	(SARABHAI)	پروکین پینی سیلین
1 dose vial Rs.4.78		
<b>KAYPEN</b>	(HIND ANTIBIOTICS)	کایپن
125mg: 10: Rs.8.37; 250mg: 10: Rs. 15.83		
<b>LONGACILLIN</b>	(HIND ANTIBIOTICS)	لانگاسیلین
12 lakh units vial Rs.11.82; 24 lakh units vial Rs.24.34		
<b>PENCOM</b>	(ALEMBIC)	پین کام
12 lakh units: 5 vials, Rs.59.10		
<b>PENIDURE AP</b>	(WYETH) vial inj; vial Rs.5.15	پینی ڈیورائے پی
<b>PENIDURE LA6/LA12/LA24</b>	(WYETH) ۲۴/۱۲/۶	پینی ڈیورائے اے ۶
Benzathine Penicillin G 600,000, 1,200,000 & 2,400,000 u inj LA6		
vial: Rs. 7.28, LA 12 vial: Rs. 11.44, LA24 vial Rs.20.34		
<b>PENIVORAL</b>	(FRANCO INDIAN)	پین وورال
Penicillin V pot (equiv to 100,000iu) 65mg; tabs 10: Rs. 4.92; 50 tabs ,		
Rs.30.80		
<b>PENIVORAL FORTE</b>	(FRANCO INDIAN)	پین وی رال فورٹ ٹبلیٹ
130mg, tabs 50: Rs. 57.56. 10: Rs.11.12		
<b>PENTIDS</b>	(SARABHAI)	پنڈ
Penicillin G pot 2,00,000u, 4,00,000u & 8,00,000u tabs; pentids 200:		
6 Rs.5.50; 400: 6: Rs.11.25; 800: 4 Rs.13.40		



## PIPERACILLIN

## پائپر اسی لین

افعال و منافع: یہ ایک نیم مصنوعی پینی سیلین ہے جو بذریعہ وریڈی یا عضلاتی انجکشن استعمال کی جاتی ہے۔ آلات تنفس، شکم، ہڈیوں اور جوڑوں کے انفکشن میں مفید ہے۔ خطرناک انفکشن زنانہ تناسلی اعضاء (رحم اور متعلقات) کے انفکشن میں مفید موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: بالغوں کے لئے ۶-۸ گرام یومیہ عضلاتی یا وریڈی شدید انفکشن میں ۱۲ سے ۱۸ گرام یومیہ بچوں کو ۱۰۰ سے ۲۰۰ ملی گرام / فی کلو گرام کے حساب سے دی جائے۔

منفی افعال: پینی سیلین اور سیفالو سپورین سے حساس اور الرجک مریضوں کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: الرجک ری ایکشن، نظام ہضم میں خرابیاں، ہیلمیٹم کی کمی جگر اور گردوں کی خرابی ہو سکتی ہے احتیاط: حالت حمل میں احتیاط برتیں

## تجارتی مرکبات

PIPRAPEN INJ

(FDC)

پاپی پراپن

Piperacillin (as sod) 1g. and 2G per 10ml; inj. 1G 10 ml vial Rs.80.00  
2G vial Rs.149.00

## POLYMXIN - B

## پالی مکسین

افعال و منافع: سرسام، آلات بول (گردہ مثانہ) کے انفکشن U.T.I. خون میں جراثیمی آلودگی، آنکھوں میں تعدیہ پھیپھڑوں کے وہ انفکشن جہاں دوسری دوائیں بے اثر ہو جائیں مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: سرسام میں ۲ سال سے زائد عمر والوں کو ۵۰ ہزار یونٹ کو لھے پر لگائیں ۲ سال سے کم عمر والوں کو ۲۰ ہزار یونٹ یومیہ عضلاتی انجکشن ۳ خوراکیوں میں تقسیم کر کے لگائیں۔

منفی اثرات: دوا سے حساس مریضوں کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: بخار، جلد پر داغ، پتی اچھلنا، الرجی، انجکشن کے مقام پر درد، گردوں میں زہریلے اثرات، اعصاب و عضلات کے فعل میں رکاوٹ جسم میں پانی کے تناسب میں فرق، اسنو فیلیا ہو سکتی ہے۔



احتیاط: گردوں کی خرابی میں، علاج ڈاکٹر کی نگرانی میں کرائیں۔  
دواؤں کے ساتھ رد عمل: مرخی عضلات ادویہ، بیہوش کرنے والی تھیراپی کے دوران دینا مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

**AEROSPORIN** (BURROUGHS WELLCOME) ایروسپورین  
Polymyxin B sulph 500,000u per vial sterile powder; inj vial  
Rs.269.60

## PRIMAXIN

## پرائی ماکسن

افعال و منافع: آلات بول (گردہ مثانہ نالیاں) کے انفکشن U.T.I. زیریں آلات تنفس کے انفکشن L.R.T.I. شکم کے اندرونی حصے تناسل اعضاء نسوانی جلد نرم ساختوں، ہڈیوں جوڑوں کے انفکشن کی مفید و موثر دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰۰ ملی گرام وریدی ہر ۶ گھنٹہ بعد وریدی لگائیں

منفی اثرات: دوا سے حساس مریضوں کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: متلی تے، دورے آسکتے ہیں۔

احتیاط: گردوں کے فعل کی خرابی میں احتیاط رکھیں۔

## ROSOXACIN

## روسوکساکسین

افعال و منافع: مردوں کے تناسلی اعضاء (ورم نائزہ، سوزاک) کے انفکشن، عورتوں میں سوزاک سے ہونے والا ورم العانہ مقعد اور قصبۃ الریہ میں سوزاک کی اثرات نیز سوزاک کے جراثیم کے دفعیہ کے لئے مفید دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۳۰۰ ملی گرام صرف ایک خوراک دی جائے۔

احتیاط: گردوں اور جگر کی خرابی میں، منوم و مسکن دماغ ادویہ کے ساتھ احتیاط برتیں۔



## ROXITHROMYCIN

## راکسی تھرومائی سین

افعال و منافع: نمونیہ شدید کھانسی، ورم غارالانف، ورم حنجرہ، ورم لوزتین اور تناسلی اعضاء کے انفکشن کی مفیہ ترین دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۵۰ ملی گرام دن میں ۲ بار

مضر اثرات: متلی قے، درد فم معدہ، اسہال، جلد پر داغ پڑنا عظم جگر ہو سکتا ہے۔

احتیاط: جگر کی خرابی حمل اور ایام رضاعت میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: ارگو میٹیرین کے مرکبات کے ساتھ دینا مضر ہے۔

### تجارتی مرکبات

<b>BD-ROX</b>	(PANACEA) 150mg: tabs: 10: Rs.105.00	بی۔ڈی راکس
<b>ODIROX</b>	(PROTEC)	اوڈی راکس
	150mg: 10: Rs.97.30, 300mg: 5: Rs. 95.00	
<b>ROXIBID</b>	(ZELTA (CADILA) 150mg: tabs:4: Rs.58	راکسی بڈ
<b>ROXID</b>	(ALEMBIC)	راکسڈ
	150mg: 10: Rs.109.50, 300mg: 4: Rs.85.50	
<b>ROXIMOL</b>	(TORRENT) 150mg: tabs:10: Rs.109.90	راکسی مول
<b>ROXYROL</b>	(CONCEPT) 150mg: tabs: 4: Rs.36.75	راکسی رول
<b>ROXITEM</b>	(KOPRAN) 150mg: tabs: 10x6 Rs.585.00	راکسی ٹم
<b>RULIDE</b>	(ROUSSSEL) 150mg: 4: tabs Rs.112.50	رولائیڈ

## SISOMYCIN

## سسومائی سین

افعال و منافع: تسمم الدم Septicaemia آلات تنفس و آلات بول کے انفکشن میں بہترین کام کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۳ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے ۳ خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔

مضر اثرات: پیشاب میں پروٹین کا اخراج، خون میں نائٹروجن کا اضافہ پیشاب میں کمی، کان بچنا،



حرکات غیر ارادی، چکر آنا، بہرہ پن، نظام عصبی میں خلل، دورے پڑنا آنکھوں کے ڈھیلے ہلا کر اور حرکت کرنا Nystigma ہو سکتا ہے  
احتیاط: گردوں کی خرابی میں احتیاط برتیں۔  
دواؤں کے ساتھ رد عمل: امینو گلائے کو سائیڈ، سیفالو سپورین وان کو مائی سین، ایمفو ٹراسین، سپلا شین میتھو کسائی فیورین، مدر بول، بیہوش کرنے والی، گردوں اور کان پر اثر انداز ہونے والی ادویہ کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

## تجارتی مرکبات

ENSAMYCIN (FULFORD) ان سامائی سین  
1M.I.V; 10mg 1ml amp Rs. 13.34; 50mg: 1ml amp Rs. 41.68  
SISOPTIN-50 (THEMIS CHEMICALS) سوپ ٹین ۵۰  
50mg: 1ml Rs.32.84, 10mg 1ml Rs.9.13

## SPIRAMYCIN

## اسپائی رامائی سین

افعال و منافع: آلات تنفس کے انفکشن ورم نائزہ Urethritis ورم لثہ، ٹوکسوپلاسموس وغیرہ میں مفید موثر ہے۔  
مقدار و ترکیب: بالغوں کو ۲ گولی دن میں ۲ بار ۱۰ سے ۱۲ سال کے بچوں کو ۱/۲ گولی دن میں ۲ بار۔  
منفی افعال: حساس مریضوں کو اور ایام رضاعت میں مضر ہے۔  
مضر اثرات: متلی قے اسہال جلد پر الرجی کا اثر۔

## تجارتی مرکبات

ROVAMYCIN (RHONI-POULENC) 10 tabs Rs.47.74 رووامائی سین  
ROVAMYCIN FORTE (RHONE-POULENC) رووامائی سین فورٹ  
10 tabs Rs.95.47  
SPIRACIN (ELDER) 10: Rs. 50.00 اسپائی راسین  
SPIRACIN SUSP (ELDER) 60ml: Rs.30.00 اسپائی راسین سرپ



## STREPTOMYCIN

## اسٹرپٹومائی سین

افعال و منافع: ہر قسم کی تپ دق T.B. میں مفید و موثر ہے، ٹی بی کی دوسری دواؤں کے ساتھ استعمال کرنے سے جلد فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جراثیم دق کو ختم کرتی اور اس کی افزائش کو روکتی ہے۔ ایچ انفلو انزا، سرسام دماغی، طاعون Plague اعضاء بول کے انفکشن بروسی لوسس میں مٹراسا نکلیں کے ہمراہ دینے سے مفید رہتی ہے۔ ورم باریطون Peri Tonitis اور ورم غلاف القلب میں پینی سیلین کے ہمراہ دینے سے بہت موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: بالغوں کو اگر ام یومیہ عضلاتی انجکشن ایک یا دو خوراکیوں میں تقسیم کر کے ۴۰ سال سے زائد عمر والوں کو آدھی گرام یا ۳/۴ گرام دی جائے بچوں کو ۲۰ سے ۳۰ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے عضلاتی انجکشن لگائیں۔

منفی اثرات: اسٹرپٹومائی سین سے الرجک مریضوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: جلد پر داغ پڑنا، انجکشن کی جگہ درد ہونا کان میں سننا ہٹ بہرہ پن، ہاتھ پیروں میں جھنجھٹ کبھی گردوں کا ماؤف ہونا۔

## SULPHONAMIDES

## سلفونا مائیڈس

SULFADOXINE

سلفاڈاکسن

SULFAMOXOLE

سلفاموکسول

SULFISOXAZOLE

سلفی سوکسازول

SULPHADIAZINE

سلفاڈایازین

SULPHADIMIDINE

سلفاڈیمیڈین

SULPHAGUANIDINE

سلفا گواناڈین



**SULPHAMERAZINE**

سلفامیرازین

**SULPHAMETHOXAZOLE**

سلفامیتھا کسازول

**SULPHA METHOXINE**

سلفامیتھا کسین

**COTRIMOXAZOLE**

کوٹرا موکسازول

**SULPHINETHOXY**

سلفین تھاکسائی

**PYRIDAZINE**

پائی راڈازین

**SULPHAPROXYLINE**

سلفا پراکسی لین

**SULPHA SOMIDINE**

سلفا سومی ڈین

افعال و منافع: آلات بول کے انفلشن ورم غدہ قدامیہ، نمونیہ، سمکھڑوں میں ورم سعال شدید، ورم لوز تین، ورم الاذن پتہ کی نالی کا ورم ورم مرارہ، جراثیمی پیچش Bascillary Dysentery، ورم مدین چھالے پڑنا، زخم، پھوڑے پھنسی، سیلولائیٹس، روہے، لکڑے Trachoma اسٹریپٹوکوکائی سے پیدا ہونے والے امراض سرسام و بائی سعال مزمن، آلات بول کے مزمن انفلشن میں مفید و موثر ہے مقدار و ترکیب: پہلی خوراک ۳ گرام پھر اگر ام ہر ۴ گھنٹہ بعد دی جائے آلات بول کے انفلشن میں آدھی سے اگر ام ہر ۶ گھنٹہ بعد دی جائے بچوں کو عمر کے مطابق۔

منفی افعال: C/1 سلفونامائیڈ سے الرجک مریضوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: متلی قے، اسہال درد سر، جلد پر داغ پڑنا، جوڑوں میں درد خشکی، بے چینی، خیندہ آنا،

منشآت و اعصاب میں درد زیادہ عرصہ استعمال کرنے پر خون کے سفید ذرات میں کمی ہوتا۔

احتیاط: بچوں اور بوڑھوں میں احتیاط برقی علاج کے دوران پانی زیادہ پلائیں۔



## تجارتی مرکبات

<b>ABURIL</b>	(PARKE DAVIS)	آبرل
Sulphadiazine 410mg, Trimethoprim 90mg, tabs 10, Rs.9.19		
<b>ABURIL SUSP</b>	(PARKE DAVIS)	آبرل سرپ
Sulpha diazine 205mg, Trimethoprim 45mg susp; 50ml Rs.11.12		
<b>MADRIBON</b>	(ROCHE)	میڈریبون
Sulphadiazine 500mg tabs 10: Rs.11.95		
<b>TRIGLOBE</b>	(ASTRA-IDL)	ٹرائی گلوب
Sulphadiazine 410mg, Trimethopri 90mg, tabs 10, Rs. 8.48		
<b>TRIGLOBE SUSP</b>	(ASTRA-IDL)50ml Rs.8.71	ٹرائی گلوب سرپ
<b>ULTROX</b>	(ETHNOR)	الٹراکس
Sulphadiazine 410mg, Trimethoprim 90mg, tabs 10, Rs.7.54		
<b>UROLUCOSIL</b>	(H.CIBA GEIGY)	یورولوکوسل
Sulphamethizole 500mg tabs; 10 tabs Rs. 5.62		

## TRIMETHOPRIM

## ٹرائی می تھاپریم

انفعال و منافع: عام طور سے یہ سلفا میٹھا کسون کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے۔ بالائی وزیری  
آلات کے انفکشن، آلات ہضم اور تناسلی اعضاء کے انفکشن، زچگی کے دوران ہونے والے انفکشن  
تسمم الدم Septicaemia ورم الاذن، ورم غار الالف E.N.T.I. میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۴۰ سے ۸۰ ملی گرام دن میں ۲ بار یومیہ بچوں کو ۴۰ ملی گرام دن میں ۲ بار چھوٹے  
بچوں کو ۲۰ ملی گرام دن میں ۲ بار۔

منفی افعال: C/I جگر کے فعل کی خرابی میں، خون کی بے اعتدالی، گردوں کی خرابی میں دوا سے  
حساس اور الرجک مریضوں میں استعمال نہ کرائیں۔

مضر اثرات: فعل ہضم کی خرابی، جلد پر داغ پڑنا۔

احتیاط: جگر اور گردوں کی خرابی میں، ایام رضاعت میں احتیاط برتیں۔



## تجارتی مرکبات

ANTRIMA	(RHONE POULENC)	10, Rs. 8.98	انٹریما
AUBRIL	(H.CIBAGEIGY)	10: Rs. 9.58	آبریل
BACITRAN DS TABS	(REMEDIES (INDIA)	Rs. 14.10	بے سی ٹران ڈی ایس
BACITRAN SUSP	(REMEDIES (INDIA)	Rs. 10.58	بے سی ٹران سرپ
BACTRIM	(ROCHE)	10x10: Rs. 76.68	بیکٹرم
BACTRIM SUSP	(ROCHE)	100ml: Rs. 17.83	بیکٹرم سرپ
BACTRIM D.S	(ROCHE)	10: Rs. 15.65	بیکٹرم ڈی ایس
BACTRIM I.M. INJ	(ROCHE)	3ml: Rs. 3.91	بیکٹرم انجکشن
BACTRIM I.V. INJ	(ROCHE)	400ml per 5ml inj. 5ml: Rs. 2.14	بیکٹرم وریڈی انجکشن
CENOLPRIM	(CARMINOL)	60ml: Rs. 12.65	سی نول پرم
CIDAL	(DEE PHARMA) tabs 10, Rs. 7.10; susp. 50ml, Rs. 8.00		سی ڈال
CIPLIN	(CIPLA)	10, Rs. 8.45; SUSP: 50ml Rs. 9.78; D.S. : 10: Rs. 15.15	سپ لن
COLIZOLE	(EAST INDIA)	10: Rs. 15.57	کولی زول
COMSAT	(BOEHRINGER)	10: Rs. 15.87	کوم سیٹ
COSULF-DS	(BLUE CROSS)	10: Rs. 15.15	کوسلف ڈی ایس
DICIPRIM	(PREM PHARMA)	50ml bottle: Rs. 10.50	ڈی سی پرم
DUALTACK	(FALMA)	10: Rs. 14.94	ڈال ٹیک
DUALTACK SUSP	(FALMA)	50ml: Rs. 9.00	ڈال ٹیک سرپ
FORTRIM-A	(BDH)	10: Rs. 8.80	فور ٹرم اے
KOMBINA	(DEYS)	10: Rs. 9.27	کمبینا
KOMBINA SUSP	(DEYS)	60ml: Rs. 9.79	کمبینا سرپ
MATRIM SS	(MALLADI)	10x10: Rs. 84.33	ماٹرم ایس ایس
MATRIM DS	(MALLADI)	10x10: Rs. 151.20	ماٹرم ڈی ایس
NEOPRIM SUSP	(STADMED)	50ml: Rs. 11.20	نیو پرم سرپ
ORIPRIM-DS	(CADILA)	10: Rs. 15.35	اور پی پرم ڈی ایس
ORIPRIM PED SUSP	(CADILA)	100ml: Rs. 14.25	اور پی پرم پیڈ سرپ
ORIPRIM I.M. INJ	(CADILA)	3ml: Rs. 5.63	اور پی پرم انجکشن
ORIPRIM I.V. INJ	(CADILA)	5ml: Rs. 2.90	اور پی پرم وریڈی انجکشن



<b>OTRIM</b>	(BIOCHEM) 10:Rs.18.95	اوٹرم
<b>PENETRIN</b>	(LEDERLE) 50ml: Rs.12.30	پنی ٹرن
<b>SEPMAX</b>	(BURROUGHS-WELLCOME) D.S. 10: Rs. 16.21	سپ میکس
<b>SEPTRAN</b>	(BURROUGHS-WELLCOME) 10: Rs. 8.81	سپ ٹران
<b>SEPTRAN PAED SSUSP</b>	(BURROUGHS-WELLCOME) 50ml: Rs. 10.45	سپ ٹران سرپ
<b>SERVOPRIM PEAD TAB/SUSP</b>	(HOECHST) 10: Rs.3.97; susp: 50ml: Rs. 8.37	سرو پرم سرب ٹبلیٹ
<b>STAN</b>	(SOL PHARMA) 10x10: Rs.145.70	سٹان
<b>SUMETROL</b>	(THEMIS CHEMICALS) 10:Rs.6.61	سو میٹرل
<b>SYNASTAT</b>	(ROUSSEL) 10: Rs. 16.03	سائی نس ٹیٹ ٹبلیٹ
<b>SYNASTAT PAED SUSP</b>	(ROUSSEL) 50ml Rs.10.42	سائی نس ٹیٹ سرپ
<b>TABROL</b>	(ARISTO) 10: Rs.8.90	ٹب رال
<b>TPRIM FORTE</b>	(ALKEM) 10: Rs.15.50	ٹپرم فورٹ ٹبلیٹ
<b>TPRIM SUSP</b>	(ALKEM) 5ml: Rs.9.50	ٹپرم سرپ
<b>TRIMEXOL TABS</b>	(P&B LABS) 10ml tabs Rs.9.08	ٹرائی میکسول
<b>TRISULFOSE</b>	(WAR.HINDUSTAN) 10: Rs.8.89; 160mg: 10: Rs.16.03	ٹرائی سلفوس
<b>TRISULFOSE SUSP</b>	(WAR.HINDUSTAN) 50ml:Rs.10.53	ٹرائی سلفوس سرپ
<b>ULTROX</b>	(ETHNOR) 6:Rs.11.96	الٹراکس ٹبلیٹ
<b>ULTROX SUSP</b>	(ETHNOR) 30ml:Rs.7.50	الٹراکس سرپ

## VANCOMYCIN

## ون کومائی سین

افعال و منافع: بہت وسیع الاثر دافع انفکشن دوا ہے۔ خطرناک و مہلک انفکشن ایسے متورم امراض جہاں دوسری دوائیں کارگر نہ ہوں یہ دوا کام کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰۰ ملی گرام ہر ۶ گھنٹہ بعد یا اگر ۱۲ گھنٹہ بعد بہت آہستہ آہستہ گھنٹہ میں چڑھائیں بچوں کو ۱۰ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے ہر ۶ گھنٹہ بعد بہت آہستہ وریڈی لگائیں۔

مضرات: گردوں اور کان کے لئے مضر ہے۔ نیوٹروفیل کی کمی، متلی کھلی، بخار جلد پرداغ اسٹوفیلیا ہو سکتا ہے۔



احتیاط: گردوں کی خرابی میں، بہرہ پن میں، زیادہ معمر لوگوں کو، حمل کی حالت میں احتیاط برتنا چاہیے۔  
 دوران علاج سماعت اور گردوں کے افعال پر نگاہ رکھیں۔  
 دواؤں کا رد عمل: گردوں اور اعصاب کو متاثر کرنے والی ادویہ بیہوشی اور مخدر ادویہ کے ہاتھ استعمال مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

VANCOCIN-CP (ELI-LILLY RANBAXY)

inj. 500mg vial Rs.365.00

ون کوسن

VANCORID CP

(PANACEA) 500mg vial Rs.295.00

ون کورڈ

دافع کینسر ادویہ

**ANTI CANCER DRUG**

**CYCLO PHOSPHAMIDE**

سائیکلو فاسفاما سائیڈ

افعال و منافع: ہاجکن ڈیزیز اور دیگر مہلک رسولیوں میں، لیوکیما، غد کا مہلک ورم جسم میں گائٹھ رسولیاں بننا، لمفوسارکوما، مائی لوما (ہڈی کے گودے میں کینسر کا اثر) تخریف الفاصل، وغیرہ میں مفید ہے۔  
 مقدار و ترکیب: ۵۰ سے ۲۰۰ ملی گرام یومیہ  
 منفی اثرات: مٹانے سے خون آنے، حمل، لیوکوسائیٹ کی کمی، آلات بول کے شدید انفکشن، تھرمائین کی کمی، میں اس کا استعمال مناسب نہیں۔  
 احتیاط: معمر افراد میں زیادہ کمزور مریضوں میں، ذیابیطس کے مریضوں میں خون کے سفید ذرات کی کمی میں احتیاط برتنا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

CYCLOXAN INJ

(BIOCHEM)

سائیکلو سان انجکشن

100mg: Rs.19.45, 200mg: Rs.34.00, 500mg: Rs.77.50



**CYCLOXANTABS** (BIOCHEM) سائیکلوسان ٹبلیٹ

50mg tabs: 5x10: Rs. 110

**ENDOXAN-ASTA** (GERMAN REMEDIES) انڈوکسان ٹبلیٹ

50mg tabs 10: Rs. 34.24

**ENDOXAN-ASTAINJ** (GERMAN REMEDIES) انڈوکسان انجکشن

100mg: vial: Rs. 21.64; 200: Rs. 33.10; 500: Rs. 70.76 1g : Rs. 115.08

## FLUTAMIDE

فلوٹامائیڈ

افعال و منافع: غدہ قدامیہ کے بڑھے ہوئے کینسر Advance Prostatic Cancer میں

مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار یومیہ۔

منفی اثرات: شدید ڈپریشن کی حالت میں رگوں میں خون جھننے کی حالت میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: مردوں میں پستانوں کا بڑھ جانا، پستانوں کا ڈھیلا ہو جانا، دودھ بہنا، متلی قے، اسہال، بھوک کی زیادتی، نیند نہ آنا، تھکاوٹ محسوس ہونا۔

احتیاط: S/P دوران علاج جگر کے فعل پر نگاہ رکھیں، امراض قلب اور استسقاء کے مریضوں میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کا رد عمل: وارفارین کے ساتھ اس استعمال ممنوع ہے۔

## تجارتی مرکبات

**PROSTAMID** (BDH) Flutamide 250mg: tabs 10: Rs 250 پروسٹامیڈ

**DROGENIL** (FULFORD) 250mg tabs : 30: Rs. 2103.80 ڈروجی ٹل

**PLUTAMIDE** (TORRENT) 250mg tabs: 10: Rs. 435.00 پلوٹامائیڈ

## IFOSFAMIDE

آئی فوسفامائیڈ

افعال و منافع: پھیپھڑوں اور خسیوں کے سرطان، نرم ساختوں کا کینسر مہلک رسولیاں ہڈیوں کے

کینسر میں مفید و موثر ہے۔

منفی اثرات: لیوکوسائیٹ و تھرومبین کی کمی میں جگر اور گردوں کی شدید خرابی میں، گردوں کے



آپریشن، حمل اور رضاعت میں اس کا استعمال مضر ہے۔

مضر اثرات: پیشاب میں زہریلا اثر Uraemia ورم مٹانہ، مٹانے سے خون آنا نظام عصی میں خرابی، الجھن گھبراہٹ، ضدی پن، اندمال زخم میں تاخیر درد سر جلد پرداغ، نظام ہضم کی خرابی۔  
احتیاط: گردوں کے افعال پر نگاہ رکھیں۔ پیشاب کے اخراج کا دھیان رکھیں، جسم میں پانی کی کمی بڑھنے کے ورم اور ٹیومر، سیرم البومن میں کمی میں احتیاط برتنا چاہیے۔

## تجارتی مرکب

**HOLOXAN UROMITEXAN** (GERMAN REMEDIES) ہالوکسان یورومی ٹکسان  
Ifosphamide 1g vial & mesna 200mg each in 3 amps combination  
pack: 1 cabi pack: Rs. 379.08

## LOMUSTINE

## لومسٹین

افعال و منافع: دماغی رسولی، ہاجکن ڈیزیز (غدد لمفاویہ طحال، جگر گردوں کا بڑھنا) دماغی رسولی  
Brain Tumor اور دوسری رسولیوں میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: بالغوں اور بچوں کو ۱۳۰ ملی گرام / فی اسکوائر میٹر پاؤی کے حساب سے ۶ ہفتہ میں  
خوراک دی جائے۔

منفی اثرات: دوا سے حساس مریضوں، حمل ایام رضاعت میں نہیں دینا چاہیے۔

احتیاط: ہر ہفتہ خون کی جانچ کراتے رہیں دوا کے استعمال سے ۶ ہفتہ بعد بھی جانچ کراتے رہیں، دوا  
خالی پیٹ نہ کھلائیں۔

## MELPHALAN

## میل فالان

افعال و منافع: مخ الحطام کا ٹیومر، خصیۃ الرحم کا کینسر، چھاتیوں کے کینسر اور دوسری مہلک رسولیوں  
میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲ سے ۴ ملی گرام تا ۱۰ ملی گرام ایک دن ناغہ کر کے ۷ دن تک استعمال کرائی جائے  
زیادہ سے زیادہ ۷ دن۔ ۷ دن کے کورس کے بعد خون کی جانچ کرائی جائے غیر طبعی ہونے پر دوا نہ دی



جائے جب تک نارمل بلڈ نہ ہو جائے۔

منفی افعال: دواسے حساس مریضوں کو، حرام مغز اور مخ العظام کے امراض حمل اور ایام رضاعت، میں استعمال نہ کرائیں۔

مضر اثرات: حیض بند ہونا، جلد پر داغ پڑنا، سینہ میں تنگی، ہیمولائیٹک، ایشیمیا، الرجی، بالوں کا گرنا (سفع) ہو سکتا ہے۔

احتیاط: خون کی جانچ کراتے رہیں۔

دواؤں کا رد عمل: نالی ڈک سک ایسڈ، سائیکلو سپورین کے ساتھ استعمال ممنوع ہے۔

## تجارتی مرکب

ALKERAN

(WELCOME)

ال کران

Melphalan 5mg tabs: 25: Rs.550.00

## MESNA

میسنا

افعال و منافع: پیشاب میں زہریلے اثرات Uraemia جو کہ آئی فوسفامائیڈ Ifosfamide اور سائیکلو فوسفامائیڈ جیسی دواؤں کے اثر سے پیدا ہوتے ہیں اس کو دور کرنے اور اس سے محفوظ رہنے کے لئے مفید ہے۔

مضر اثرات: سردرد جلد پر داغ پڑنا، ہضم میں خرابی۔

## تجارتی مرکبات

MESNA

(GERMAN REMEDIES)

میسنا

inj. 3x2 ml: Rs.82.17

## MISULBAN

می سل بان

افعال و منافع: مزمن لیموکیما (خون کا سفید ہونا) Chronic Myeloid Leukaemia میں اور ریڈیم تھیراپی یا ایسے لیموکیما کے مریض جن کا پہلے علاج نہیں ہوا مفید و موثر ہے۔

منفی اثرات: ریڈیم تھیراپی کے دوران، خون میں نیوٹروفیل اور پلے ٹی لیٹ کی کمی یا کسی اور دوا سے



علاج کے دوران اس کا استعمال نہیں کرانا چاہیے۔

مضر اثرات: تھرامین کی کمی، مخ العظام میں کمی، یورک ایسڈ کی زیادتی، متلی قے اسہال، ہونٹوں کا پھٹنا، ورم لث، مسوڑھوں کا ورم ضعف باہ، مردوں میں چھاتیوں کا بڑھنا، موتیابند، یرقان، ضعف عضلات جلد کی رنگت بدلنا، بالوں کا گرنا، آنتوں اور پھیپھڑوں میں فائبروسس بننا، کمزوری، بے چینی وزن میں کمی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: حمل کے آخری ۳ ماہ میں احتیاط رکھیں دوران علاج خون کی جانچ کراتے رہیں۔

## MUSTIN HCL

### مسٹین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: ہاجکن ڈیزیز، غد دلفادیہ کا بڑھنا، پھیپھڑوں کے کینسر، خصیۃ الرحم اور پستانوں کے کینسر، زیر جلد غشاء مخاطی کے کینسر Mycosis Fungoides میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: اعلیٰ گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے ۳ سے ۴ دن تک ایک خوراک میں ۸ ملی گرام سے زیادہ نہیں دینا چاہیے انجکشن ۵۰۰ ملی لیٹر نارمل سیلائن میں ملا کر چڑھانا چاہیے عضلاتی انجکشن نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: متلی قے، بخار، لیوکوسائیٹ کی کمی بھوک کی کمی اسہال (دست آنا) جلد پر داغ مخ العظام میں خرابی حیض کی خرابیاں ہو سکتی ہے۔

احتیاط: حمل، ایام رضاعت میں لیوکوسائیٹ کی شدید کمی میں خون میں تھرامین کی کمی، انیمیا میں نہیں دینا چاہیے ۶ ہفتہ سے قبل دوسرا کورس نہ دیں۔

## تجارتی مرکب

MUSTINE HCL

(BOOTS)

مسٹین ہائیڈروکلورائیڈ

Mustine hcl 10mg inj 10x10 vials Rs. 5500.10

## THIOTEPA

### تھیوٹپا

افعال و منافع: لیوکیمیا، پالی سائی تھیمیا ویرا، ہاجکن ڈیزیز گلیو کے کینسر، بلڈ کینسر، پستانوں کا کینسر خصیۃ الرحم، رحم، معدہ بائفراس میں ہونے والے کینسر، مہلک رسولیاں Malignant Tumor میں



مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۳ سے ۱۵ ملی گرام دن میں ابار، زیر جلد عضلاتی یا وریدی لگا سکتے ہیں۔

منفی اثرات: دوا سے حساس مریضوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: الرجی مخ العظام Bone Marrow میں خرابی ہاضمہ کی خرابی، جگر اور گردوں کے فعل میں خلل ہو سکتا ہے۔

احتیاط: جگر و گردوں کی خرابی ہڈی کے گودے مخ العظام کی خرابی میں احتیاط برتیں۔

## تجارتی مرکب

**THIOTEPA (LEDERLE)**

تھیوٹپا

Thiotepa 15mg per vial inj vial Rs. 27.75

## VINCRIPTIN

ون کریسٹین

افعال و منافع: شدید لیوکیمیہ، غدولفاوی کا کینسر، دوسری مہلک گلٹیاں اور کینسر کے علاج میں مفید و موثر ہے۔

احتیاط: حالت حمل میں احتیاط برتیں۔

**CYTOCRISTINAQUEOUS**

(CIPLA) سائی ٹو کریسٹین اے کو اس

1ml vial Rs. 45.27

**V.C.R.**

(BIOCHEM) 1amp, Rs. 48.00

وی۔ سی۔ آر

**VINCRIPTINE**

(BIOCHEM) 1mg amp Rs. 48.00

ون کریسٹین

## ACLARUBICIN

اکلار روبی سین

افعال و منافع: شدید لیوکیمیہ، مہلک لمفوما، معدہ پھیپھڑے، پستان اور خصیۃ الرحم Ovary کے کینسر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰ ملی گرام بذریعہ انجکشن دی جائے۔

منفی افعال: قلب کے مریضوں کو اور دوا سے حساس مریضوں کو استعمال نہ کرائیں۔

احتیاط: جگر اور گردوں کے مریضوں کو مخ العظام Bone Marrow کی خرابی میں متعدی امراض



اور معمر لوگوں میں احتیاط برتیں۔

## تجارتی مرکبات

KLASINOMYCIN (KHANDELWAL) 1 vial: Rs. 302.91 کلاسی نو مائی سین

## BLEOMYCIN

## بلو مائی سین

افعال و منافع: سرگردن اور جلد کی مہلک گلٹیاں، ناک کی مہلک رسولیاں پھیپھڑوں، غدود دماغ اور اعصاب کی مہلک اور غیر مہلک رسولیوں میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۳۰ ملی گرام دن میں ۲ بار ضرورت کے مطابق ۱۰ ملی گرام یومیہ سے ۱۵ ملی گرام ہفتہ وار استعمال کر سکتے ہیں۔

منفی افعال: حمل ایام رضاعت، پھیپھڑوں کے امراض میں دینا منع ہے۔

مضر اثرات: غشاء مخاطی اور جلد کا متورم ہونا، پھیپھڑوں میں ریشہ دار ساخت بننا۔

احتیاط: معمر لوگوں میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: سائی ٹوٹا کسین اور پنٹا تھیون کے ساتھ نہ بوتل میں اور نہ سرنج میں ملا کر دینا چاہیے۔

## تجارتی مرکب

BLEOCIN (KHANDELWAL) 15mg inj 1 amp Rs.953.68 بلو سین

## DOXORUBICIN

## ڈاکسوروبی سین

افعال و منافع: غدود کا کینسر Lymphomas لیوکی میا، ہڈیوں اور نرم ساختوں کا کینسر و دیگر مہلک رسولیوں Malignant Tumer میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰۲ سے ۲۰۴ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے ایک خوراک وریدی بہت آہستہ لگائیں ہر ۳ ہفتہ بعد لگائیں۔



منفی افعال: مخ العظام کے انفکشن اور منہ کے زخم کی حالت میں نہیں دینا چاہیے۔  
احتیاط: قلب و جگر کی خرابیوں میں احتیاط لازم ہے۔

### تجارتی مرکبات

**ADRIAMYCIN** (WALTER BUSHNELL) ایڈریامائی سین

inj 10mg: Rs.127.00

**ADRIM** (DABUR) 10mg: Rs.204.50: 50mg: Rs.967.00 ایڈریم

**DOXORUBUCIN** (KHANDELWAL) ڈاکسوروبی سین

10mg: Rs. 240, 50mg: Rs.1000.00

**DOXORUBUCIN MEIJI** (KHANDELWAL) ڈاکسوروبی سین میچی

10mg: Rs.255.00

### MITOMYCIN-C

مٹومی سین

افعال و منافع: غدہ کا کینسر Adeno Carcinoma لمف کینسر، خسیوں کے ٹیومرو دیگر مہلک  
رسولیوں میں مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: ۶ سے ۱۰ ملی گرام وریدی ہفتہ میں ۲ بار، زیادہ سے زیادہ ۶۰ سے ۱۰۰ ملی گرام، یہ  
انجکشن عضلاتی یا زیر جلد نہیں لگانا چاہیے۔

منفی اثرات: جریان خون کار حجان رکھے والوں، مخ العظام کی خرابی میں نہیں دینا چاہیے۔  
احتیاط: لیو کو سائیٹ، تھراپین کی کمی منہ کے زخم میں نہ یں۔ ورید کے باہر لگنے سے ساختیں مردہ  
ہو جاتی ہیں۔

### تجارتی مرکب

**MITOMYCIN-C KYOWA** (BIOCHEM)

مٹومی سین سی کیووا

2mg: Rs. 90.00 10mg : Rs. 340.00



## CHLORAMBUCIL

## کلورم بوسل

افعال و منافع: ہاکنز ڈیزیز، غدہ لمفاویہ کا ورم، شدید لیوکیما، خصیۃ الرحم اور چھاتیوں کے کینسر کی مفید دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: پرچہ کے مطابق۔

مضر اثرات: پیچھڑوں میں فائبرین (ریشہ دار ساخت) بننا، جگر میں خرابی بخار، ورم مثانہ، بچوں میں دورے پڑ سکتے ہیں۔

احتیاط: علاج کے دوران خون کی جانچ کراتے رہیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: فینائل بیوٹازون کے ساتھ دینا مضر ہے۔

## تجارتی مرکب

LEUKERAN

(WELCOME)

لیوکران

2mg: 25tabs: Rs.266.40, 5mg: 25tabs: Rs.499.50

## CYTOSIN

## سائی ٹوسن

افعال و منافع: شدید لیوکیما اور غدہ لمفاویہ کے کینسر کی مفید دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۳ سے ۶ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے وریدی ۲ خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے ۵ سے ۱۰ دن تک۔

احتیاط: حمل، جگر کی خرابی میں احتیاط لازم ہے۔

## تجارتی مرکبات

CYTARABINE KOREA

(SHREE GANESH)

سائی ٹارابن کوریا

100mg/5ml; 5ml amp Rs. 125.00

CYTRABIN

(BIOCHEM)

سائی ٹارابن

100mg: 10x5ml: Rs. 1587.00 500mg amp : Rs. 777.45 1000mg amp: Rs. 1478.25



## ETOPOSIDE

## اٹوپوسائیڈ

افعال و منافع: پھیپھڑوں کا کینسر، غد دلفاوی کی مہلک رسولیوں، شدید لیوکیمیہا خسیوں کی رسولیاں، مٹانے کے کینسر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام / اسکوائر میٹر باڈی کے حساب سے پہلے، تیسرے اور پانچویں دن دی جائے۔

مضر اثرات: حرام مغز Spinal Cord میں خرابی متلی، قے، اسہال، ورم اعصاب، مقامی طور سے درید کا متورم ہونا۔

دواؤں کا رد عمل: انٹی نیوپلاسٹک، ایجنٹ Anti Neoplastic Agent کے ساتھ خراب اثر ہوتا ہے۔

## تجارتی مرکبات

ASIDE	(SHRE GANESH)	اے سائیڈ
100mg per 5ml inj: 5ml amp: Rs. 350.00		
ETOSID	(CIPLA) 5ml inj. 5ml 250.00	اے ٹوسڈ انجکشن
ETOSID CAPS	(CIPLA) 50mG caps: 4: 301.20	اے ٹوسڈ کپسول
LASTET	(KHANDELWAL)	لاس ٹیٹ انجکشن
100mg per 5ml inj; 10x5ml: amp Rs.274.86		
LASTET CAPS	(KHANDELWAL)	لاس ٹیٹ کپسول
caps: 25mg: 1 cap: Rs. 96.39, 50mg: 1 cap: Rs. 189.54, 100mg: 1 cap 375.85		

## FLOROURACIL

## فلوروارسل

افعال و منافع: بڑی آنت، مقعد، چھاتیوں، معدہ، بانقراں جگر، رحم، خسیہ الرحم، اور مٹانے کے کینسر میں مفید ہے۔

مقدار و خوراک: ۱۲ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے وریدی دن میں ۴ بار دن، ۸۰۰ ملی گرام یومیہ سے زیادہ نہ دیں۔



منفی افعال: حمل تغذیہ کی کمی، مخ العظام کاڈپریشن، اور شدید انفکشن میں دینا منع ہے۔  
 مضر اثرات: اسہال، متلی قے گنجا پن، (سفعہ) جلد کا متورم ہونا، لیو کو سائیٹ اور تھرا مین کی کمی۔  
 احتیاط: مریض کو اسپتال میں بھرتی رکھ کر علاج کریں

### تجارتی مرکبات

<b>FLURACIL</b> (BIOCHEM)	فلوراسل انجکشن
250mg: 5x5ml Rs. 53.00; 500mg 5x5ml : Rs. 96.00	
<b>FLURACIL ORAL</b> (BIOCHEM).	فلوراسل کپسول
5, Flurouracil 250mg caps 10: Rs. 53.00	
<b>5-FU INJ</b> (SHREE GANESH)	فائیو فوائنجکشن
500mg per 10ml ; 10ml vial Rs. 52.00	

### FLORAFUR

### فلورافر

افعال و منافع: آلات ہضم پستان میں نئی ساختیں بننا، رسولیاں بننا، سرجری کے بغیر، رسولیوں کو ختم کرنے میں مفید ہے۔ ریڈیم تھیراپی یا دوسری دواؤں کے ساتھ اس کا استعمال مفید ہے۔  
 مقدار و ترکیب: ۸۰۰ سے ۱۲۰۰ ملی گرام روزانہ ۲ سے ۴ خوراکیں میں۔  
 منفی اثرات: حمل، مخ العظام کی خرابی، میں دینا مضر ہے۔  
 احتیاط: لیوکیما، انیمیا، تھرا مین کی کمی، جلد کی رنگت میں تبدیلی، متلی قے میں استعمال نہ کرائیں۔

### تجارتی مرکب

<b>FURATOR</b> (BIOCHEM)	فیورائر
Florafur 200mg: caps : 12: Rs. 75.03	

### MERCAPTO PURIN

### مرکاپ ٹوپورین

افعال و منافع: شدید لیوکیما، مزمن، لیوکیما، میں مفید ہے۔ مقدار و خوراک: ۲.۵ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے روزانہ  
 منفی اثرات: ایام رضاعت میں دینا مضر ہے۔



مضر اثرات: جگر میں خرابی، بخار یا جلد پر داغ، مخ العظام کا ڈپریشن بھوک کی کمی متلی، قے، خون میں پورک ایسڈ کی زیادتی، آنتوں میں زخم ہو سکتے ہیں۔  
احتیاط: خون کی جانچ کراتے رہیں، جگر کے فعل اور پورک ایسڈ پر نگاہ رکھیں، حمل اور گردوں کی خرابی میں منع ہے۔

## تجارتی مرکب

**PURINETHOL** (BURROUGHS-WELLCOME) پوری نی تھال  
50mg tabs 25: Rs. 231.50

## METHOTREXATE

میتھوٹریک سیٹ

افعال و منافع: رحم اور بیرونی رحم کا کینسر، رحم کی مہلک رسولیاں، لفاوی لیوکیما مہلک لیوکیما، پچاتیوں کا کینسر، گردن اور سر کی جلد کی نیچے بننے والا کینسر اور پھیپھڑوں کے کینسر کی مفید دوا ہے۔  
مقدار و ترکیب: رحم کے کینسر میں 15 سے 30 ملی گرام یومیہ 5 دن تک، خوردنی یا عضلاتی انجکشن  
یہ کیا میں 3، 3 ملی گرام / فی میٹر باڈی کے حساب سے خوردنی یا عضلاتی لگائیں۔  
مضنی اثرات: حمل، گردوں اور جگر کی شدید بیماریوں میں خون کی غیر طبعی حالت میں دینا مضر ہے۔  
مضر اثرات: مخ العظام کی خرابی نظام ہضم میں خرابی جگر کی خرابی ہو سکتی ہے۔  
احتیاط: معمر لوگوں میں احتیاط برتیں، دوران علاج خون جگر گردوں پر نگاہ رکھیں

## تجارتی مرکبات

**BIOTREXATE** (BIOCHEM) بایوٹریکسیٹ  
5mg amp: Rs. 20.66 : 50mg vial: Rs. 52.56  
**MTX KOREA** (SHRE GANESH) ایم ٹی ایکس انجکشن  
50mg per 2ml inj; 2ml vial Rs. 76.00  
**MTX TABS KOREA** (SHRE GANESH) ایم ٹی ایکس ٹبلٹ  
2.5mg tabs: 100: Rs. 350.00  
**NEOTREXATE TABS** (BIDDLES AWYER) نیوٹریکسیٹ ٹبلٹ  
2.5mg tabs 10: Rs. 35.89



NEOTREXATE

50mg per 2ml Rs. 47.45

(BIDDLESAYER)

نیوٹریکسٹ انجکشن

## MITOZANTRONE

میٹوزان ٹرون

افعال و منافع: پستان کا کینسر، لمفوما، لیوکیما، مزمن لیوکیما میں مفید ہے۔

منفی افعال: حرام مغز کی خرابیوں اور ایام رضاعت میں استعمال نہ کرائیں۔

مضر اثرات: قلب میں خرابی، سانس میں تکلیف، وریدوں کا متورم ہونا، جلد پر داغ پڑنا۔

احتیاط: ریڈیو تھیراپی سے پہلے انٹراسائیکلین کے استعمال امراض قلب اور حمل میں احتیاط برتنا

چاہیے دوران علاج خون اور قلب پر نگاہ رکھیں۔

## تجارتی مرکب

ONCOTRON

(TDPL)

اون کوٹران

Mitozantrone 2mg/ml 10ml: Rs.395.00

## CARBOPLATIN

کاربوپلاٹین

افعال و منافع: خبیثہ الرحم کے کینسر نرم ساختوں کے کینسر کی بہترین دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۴۰۰ ملی گرام / فی مکعب پاؤی میٹر کے حساب سے وریدی بہت آہستہ ۱۵ سے ۶۰

منٹ میں بوتل کے ساتھ استعمال کرائیں۔ ۴ ہفتہ بعد دوبارہ استعمال کرائیں۔

منفی اثرات: شدید گردوں کی خرابی میں حرام مغز کی کمزوری، حمل اور ایام رضاعت میں مضر ہے۔

مضر اثرات: گردوں اور کان کے فعل میں رکاوٹ سن پن (حذر)

احتیاط: دوران علاج خون کی جانچ گردوں کے افعال کی جانچ کراتے رہنا چاہیے۔

دواؤں کا رد عمل: امینوگلائیکو سائیڈ اور دوسری گردوں کو خراب کرنے والی ادویہ کے ساتھ نہ

دینا چاہیے۔



## تجارتی مرکب

ONCOCARBIN

(TDPL) inj.: 150mg: Rs. 850.00

اون کوکراہین

CISPLATIN

س پلاٹین

افعال و منافع: خسیوں اور خسیۃ الرحم کے ٹیو مر کی مفید دوا ہے۔

منفی افعال: گردوں کی خرابی میں حمل اور ایام رضاعت میں، خلل اعصاب، کان کی خرابی جسم میں پانی کی کمی، اور دواسے حساس مریضوں کو استعمال نہ کرائیں۔

احتیاط: خون کے تناسب گردوں کے افعال جسم میں پانی اور نمکیات کے تناسب کا خیال رکھیں، المونیم کے برتنوں سے پرہیز کیا جائے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: امینو گلائ کی کو سائیڈ، گردوں اور حرام مغز کو متاثر کرنے والی ادویہ کے ساتھ احتیاط رکھیں۔

## تجارتی مرکبات

AQUAPLAT (KHANDELWAL) 10mg: inj: Rs.151.35

ایکوا پلاٹ  
سسپلاٹین

CISPLATIN (BIOCHEM)

10mg: Rs. 110.00, 50mg: vial: Rs.365.00

KEMOPLAT (DABUR)

کیمو پلاٹ

20ml vial Rs. 83.00, 100ml vial Rs. 337.00

ESTRAMUSTINE  
PHOSPHATE

ایسٹرامسٹین  
فاسفیٹ

افعال و منافع: غدہ قدامیہ کے کینسر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۳۶۰ ملی گرام روزانہ ضرورت کے مطابق ۴۲۰ ملی گرام سے ۸۴۰ ملی گرام تک دے سکتے ہیں۔

منفی اثرات: مخ العظام Bone Marrow کی خرابی میں زخم معدہ قلب جگر کے شدید امراض



میں نہیں دینا چاہیے۔

## تجارتی مرکب

ESTRACYT

(MERCK) 140mg: caps: 1: Rs. 22.60 ایسٹراست

## ETHINYL OESTRADIAL

ایٹھنی ٹائل اسٹریڈائل

افعال و منافع: پستانوں اور غدہ قدامیہ کے کینسر کی تکالیف اور ان کی شدت کو کم کرنے کے لئے استعمال ہے۔

مقدار و ترکیب: فوری طور سے ۱ سے ۳ ملی گرام پھر اٹلی گرام روزانہ مرض کو کنٹرول رکھنے کے لئے دینا چاہیے۔

منفی افعال: حمل امراض قلب، امراض دماغی، وریڈوں میں رکاوٹ، ہائی بلڈ پریشر جگر کی خرابی، یرقان حمل، یرقان کی ہسٹری، غیر تشخیصی جریان الرحم حالت حمل میں ایسٹروجن کے ساتھ، شدید کھجلی، اور ہرپیز Herpes کی تکالیف میں اس کا استعمال نقصان دہ ہے۔

## تجارتی مرکب

LYNORAL

(INFAR) 1mg tabs : 10: Rs. 17.20

لائی نورال

## نان ڈرولون فینائل پروپیونیت

## NANDROLONE PHENYL PROPIONATE

افعال و منافع: عورتوں میں پستانوں کے کینسر کی مفید دوا ہے، انیمیا، نظام استحالہ میں خرابی، لوبلڈ پریشر، کمزوری، ہڈیوں کی کمزوری میں مفید ہے۔

مقدار و خوراک: ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام عضلاتی ہفتہ وار لگائیں۔

منفی افعال: حمل، ہائی بلڈ پریشر قلب جگر و گردوں کی خرابی، مردوں کی چھاتیوں کے کینسر، غدہ



ذہابیہ کے کینسر میں استعمال نہیں کرانا چاہیے۔  
 احتیاط: مرگی شقیقہ Migrain ذیابیطیس اور جسم میں پانی جمع ہونے میں احتیاط رکھنا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

<b>DECA-DURABOLIN</b>	(INFAR)	ڈیکاڈورابولین
1ml amp: 25mg: Rs.44.50, 50mg: Rs.79.00, 100mg: Rs. 125.50		
<b>DOCABOLIN</b>	(INFAR)	ڈوکابولین
Nandrolone phenyl propionate 25mg desoxy cortico sterone phenyl propionamide 10mg per ml inj; 1ml Rs.32.50		
<b>DURABOLIN</b>	(INFAR)	ڈورابولین
Nandrolonephenyl propionate 25mg per ml inj; 10mg: 1ml Rs.24.00		
<b>EVABOLIN</b>	(CONCEPT)	ایوالبولین
Nandrolonephenyl propionate 25mg per ml amp; 1 amp Rs.12.96		
<b>GROTHIC</b>	(LYKA)	گروٹھک
Nandrolonephenyl propionate 25mg per ml inj; 1ml Rs.6.95; 5ml Rs.23.08		
<b>METABOL</b>	(JAGSONPAL)	مٹابول
Nandrolonephenyl propionate 25mg per ml inj; 1ml Rs. 17.50		
<b>MYOBOLON</b>	(TROIKAA).	مایوبولین
Nandrolonephenyl decanoate 25mg per ml inj; 1ml amp: Rs.36.80		
<b>NEURABOL INJ</b>	(CADILA)	نوروبال
Nandrolonephenyl propionate 25mg per ml inj; 1ml Rs.15.50		

## POLYESTRADIOL

## پولی اسٹر ایڈیول

افعال و منافع: غدہ قدامیہ کے کینسر میں مفید ہے۔  
 مقدار و ترکیب: ۱۶۰ ملی گرام گہرا عضلاتی انجکشن ہر ۴ ہفتہ بعد لگائیں۔  
 منفی اثرات: دواسے الرجک مریضوں، جگر کی خرابی و ریدوں میں خون چھنے اور انیمیا میں دینا مضر ہے۔  
 احتیاط: مرگی، شقیقہ Migrain گردوں اور قلب کی خرابی میں، ذیابیطس کے مریضوں میں ہائی بلڈ پریشر، دماغ اور پھیپھڑوں کی عروق کی خرابی میں احتیاط برتنا چاہیے۔



## تجارتی مرکب

**ESTRADURIN**

(MERCK)

inj 40mg: 10: Rs.55.41 ; 80mg: 10: Rs.70.35

اسٹراڈیورن

## STIL BOESTROL

## اسٹیل بیسٹرول

افعال و منافع: غدہ قدامیہ کے کینسر میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: ابتدا میں ۵۰۰ ملی گرام وریدی انجکشن روزانہ ۵ سے ۱۰ دن تک بعد کو ۲۵۰ ملی گرام روزانہ ۱۰ سے ۲۰ دن تک مرض پر کنٹرول رکھنے کے لئے ۱۰۰ سے ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار خوردنی کھلائیں۔

منفی افعال: جگر کی خرابی میں استعمال مضر ہے۔  
مضر اثرات: مردوں میں پستانوں کا بڑھنا، نسوانیت پیدا ہونا ہاضمہ کی خرابیاں۔  
احتیاط: ذیابیطس شکر میں، احتیاط برتنا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

**HONVAN**

(GERMAN REMEDIES)

ہون وان ٹبلٹ

100mg tabs 10: Rs.81.54

**HONVAN INJ**

(GERMAN REMEDIES)

ہون وان انجکشن

250mg per 10 amps: Rs. 263.20

## TAMOXI FEN CITRATE

## ٹاموکسی فین سائٹریٹ

افعال و منافع: پستانوں کے کینسر کی مفید دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ سے ۲۰ ملی گرام دن میں ۲ بار خوردنی استعمال کرائی جاتی ہے۔

منفی اثرات: حساس مریضوں کو اور حالت حمل میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: جریان مہلکی Viginal Bleeding گرمی کا احساس رحم میں کھجلی، ہضم کی خرابیاں، نیو مریٹا، تھرامین کی کمی، بصارت میں فرق ہو سکتا ہے۔



احتیاط: طویل علاج کے دوران خون اور جگر کی جانچ کرتے رہنا چاہیے۔  
تجارتی مرکبات

MAMOFEN (KHANDELWAL) 10mg tabs 10: Rs. 29.21  
NOLVADEX (ICL) 10mg: tabs 50: Rs. 851.60  
TAMOXIFEN LYKA (LYKA) 10mg tabs 10: Rs. 29.00  
TAMOXIFEN (BIOCHEM)  
10mg: 10: Rs. 25.00, 20mg: 10: Rs. 47.10  
TAMOFEN (TORRENT) 10mg tabs 10: Rs. 51.90

ہاموفین  
نائلوڈیکس  
ہاموکسی فین  
ہاموکسی فین

ہاموفین

مدافعتی نظام پر اثر انداز ہونے والی ادویہ

IMMUNO SUPPRESSIVE/

STIMULANT AGENT

AZATHIOPRINE

ازاتھیوپرین

افعال و منافع: گردوں کی تبدیلی میں شدید تحجر الفاصل میں جہاں دوسری دوائیں بے اثر ہوں یہ دوا مفید رہتی ہے۔ یہ جسم میں مدافعتی نظام کو تیز کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: فوری طور پر گردوں کی تبدیلی میں ۳ سے ۵ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے پھر روزانہ ۱ سے ۳ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے۔ تحجر الفاصل میں پہلی خوراک ۱ ملی گرام / فی کلو گرام کے حساب سے ایک خوراک ضرورت پڑنے پر آدھی ملی گرام / فی کلو گرام ۳ سے ۶ ہفتہ کے وقفہ سے دی جائے۔

معثر اثرات: حرام مغز مخ العظام کی خرابی فتور ہضم جلد پر داغ پڑنا جگر میں خرابی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: خون کی جانچ کراتے رہیں۔ جگر اور گردوں کی خرابی میں، سورج کی تیز شعاعوں سے اور انفلکشن کی حالت میں احتیاط برتنا چاہیے۔



دواؤں کا رد عمل: الوپری ٹال اور مرخی عضلات Relaxant کے ساتھ دینا مضر ہے  
تجارتی مرکبات

AZORAN  
IMURAN

(SEARLE) tabs: 10: Rs.44.46  
(BURROUGHS-WELLCOME)

25mg 10: Rs.30.57 50mg: 10: Rs.87.86

اے زوران  
ایموران

## CYCLOSPORIN

سائیکلو سپورین

افعال و منافع: عضوی تبدیلی، مخ العظام کی تبدیلی اور سر خباہہ Psoriasis میں مفید و موثر ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۳.۵ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے دن میں ۲ بار بوتل میں ڈال کر  
چھ ماہ یا ۱۲.۵ سے ۱۵ ملی گرام جسمانی وزن کے حساب سے روزانہ ۵ دن تک براہ دہن دے سکتے ہیں۔  
مضر اثرات: ہاتھوں اور چہرے پر گرمی کا احساس، غیر طبعی بالوں کا نکلنا ہاتھ پیر کا خپنا، گردوں کی  
خرابی، جگر کی خرابی، مسوڑھوں کا پھولنا، ہاضمے کی خرابیاں، خون میں یورک ایسڈ کی زیادتی، تھرا مبین کی  
کمی بائی بلڈ پریشر، انیمیا۔  
احتیاط: وہ ویکسین جو زندہ جانوروں سے تیار کی جائے اور مدافعتی نظام کو کمزور کرنے والی ادویہ کے  
ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

PANIMUN

(PANACEA)

پانی مون

100mg per ml inj for infusiion: 50ml vial Rs. 6100.00

ZYMMUNE

(CADILA)

زائی مون

100mg per ml inj. 50ml bottle: Rs. 6170.00



**ANTI FILARIAL**

دافع فائیلیریا

**ANTI HELMENTICS**

دافع دیدان امعاء

**DIETHYL CARBAMAZIN  
CITRATE**ڈائی ایتھائل کاربامازین  
سائٹریٹ

افعال و منافع: فائیلیریا، اسٹوفیلیا، کینچوے Round Worms کے علاج کے لئے مفید دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ابتدا میں اعلیٰ گرام / فی کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے دن میں ۳ بار رفتہ رفتہ مقدار میں اضافہ کر کے ۶ اعلیٰ گرام / کلو گرام کر سکتے ہیں، علاج ۲۱ دن جاری رکھیں

مضر اثرات: درد سر، چکر آنا بے چینی، آنکھوں میں تناؤ، بخار، الرجی، لو بلڈ پریشر متلی قے کی تکلیف ہو سکتی ہے۔

احتیاط: دودھ پلانے کے ایام میں، معمر افراد گردوں کی بیماریوں میں احتیاط برتیں۔

## تجارتی مرکبات

**BANOCIDE (BURROUGHS WELLCOME)** بانوسڈ ٹبلٹ

50mg; 10: Rs. 2.26; 100mg; 10: Rs. 2.95

**BANOCIDE SYRUP (BURROUGHS WELLCOME)** بانوسڈ سرپ

120mg per 5ml 115ml Rs. 13.34

**BANOCIDE PAED SYRUP (BURROUGHS WELLCOME)** بانوسڈ سرپ بچوں کا

50mg per 5ml 60ml Rs. 9.76

**CARBAMYL FORTE TABS (KOPRAN)** کاربامائل فورٹ ٹبلٹ

20x10 Rs. 66.00

**CARBAMYL SYRUP (KOPRAN)** 5ml syrup; 100ml Rs. 11 کاربامائل سرپ**DICARBINGA TABS (INGA)** 10 Rs. 5.50 ڈائی کارب ٹبلٹ**DICARBINGA MITIS (INGA)** 110ml: Rs. 8.95 ڈائی کارب سرپ



**DICARB-50/100/150**

(INGA)

50mg: 10: Rs. 3.25; 100mg: 10: Rs. 4.10; 150mg: 10: Rs. 4.95

**HELMAZAN**

(NOEL) 60ml Rs. 5.65

**HETRAZAN**

(CYANAMID)

50mg, 10: Rs. 1.90; 100mg, 10: Rs. 2.90

**HETRAZAN SYRUP**

(CYANAMID)

120mg per 5ml : 100ml Rs. 10.75

**UNICARBAZAN**

(UNICHEM) 500 Rs. 48.00

**UNICARBAZAN FORTE** (UNICHEM)

250mg, Chlorpheniramine maleate 5mg tabs 8 Rs. 6.90, 100 Rs. 65.00

**BIPHENIUM HYDROXY**

بی فی نیم ہائیڈروکسی

افعال و منافع: ہک ورم کے علاج کے لئے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲ سال سے زائد عمر میں ۵ گرام واحد خوراک ۲ سال سے کم عمر والوں کو ۲.۵ گرام کی ایک خوراک۔

منفی افعال: تے والے مریضوں میں نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: متلی تے، شکم کی تکالیف، اسہال آتا۔

تجارتی مرکب

**ALCOPAR**

الکوپار

**ALBENDAZOL**

ال بندازول

افعال و منافع: کینچوؤں، راؤنڈ ورم، ہک ورم، دھاگے نما کیڑوں Pinworm تھریڈ ورم، وہپ ورم اور شیپ ورم (کدو دانوں) کے لئے مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: راؤنڈ ورم ہک ورم، پن ورم وہپ ورم کے لئے ۴۰۰ ملی گرام کی ایک خوراک تھریڈ ورم کے لئے ۸۰۰ ملی گرام روزانہ ۳ دن تک شیپ ورم کے لئے ۴۰۰ ملی گرام روزانہ ۳ دن تک استعمال کرائیں۔



منفی افعال: حالت حمل میں مضر ہے۔

مضرات: قبض بھوک کی کمی متلی کنزوری، چکر آنا۔

احتیاط: جوان عورتوں کو حیض کے ابتدائی دنوں میں احتیاط برتیں، جگر کے فعل کی جانچ کراتے رہیں۔

## تجارتی مرکبات

<b>ABZ</b>	(INDOCO) 400mg tab: 1: Rs.7.50	اے بی زیڈ ٹبلیٹ
<b>ABZ SUSP</b>	(INDOCO) 200mg per 5ml susp: 10ml Rs.11.50	اے بی زیڈ سرپ
<b>ALBENDOL</b>	(MICRO LABS) 400mg tabs; 1 Rs.9.90	البنڈول ٹبلیٹ
<b>ALBENDOL SUSP</b>	(MICRO LABS)	البنڈول سرپ
	200mg per 10ml susp. 10ml: Rs.11.05	
<b>ALMINTH</b>	(TORRENT)	آل منٹھ
	200mg: 2: Rs.7.40, 400mg: 1: Rs.7.40: susp: Albendazole 200mg per 5ml: 10ml: Rs.13	
<b>ALBEZOLE</b>	(KHANDELWAL)	آل بی زول ٹبلیٹ
	400mg tabs 1 tabs (strip) Rs.7.11	
<b>ALBEZOLE SUSP</b>	(KHANDELWAL)	آل بی زول سرپ
	200mg per 5ml susp; 10ml Rs.10.84	
<b>ALZAD</b>	(TATA PHARMA) 400mg tabs 1, 9.90	آل زاڈ ٹبلیٹ
<b>ALZAD SUSP</b>	(TATA PHARMA)	آل زاڈ سرپ
	200mg, per 5ml susp 10ml, Rs.12.90	
<b>BENDEX</b>	(PROTEC) 400mg, chewable tabs 1, Rs.9.75	بنڈیکس ٹبلیٹ
<b>BENDEX SUSP</b>	(PROTEC)	بنڈیکس سرپ
	200mg per 5ml susp 10ml, Rs.12.00	
<b>BENDOL TABS</b>	(KANPHA) 400mg tabs 4, Rs.30.44	بنڈول ٹبلیٹ
<b>BENDOL SUSP</b>	(KANPHA)	بنڈول سرپ
	200mg, flavoured syrup 10ml Rs.10.43	
<b>NEOMIN</b>	(NEO PHARMA) 400mg tabs: 1 tab: Rs.8.00	نیو من
<b>NOPAR TABS</b>	(MALLADI) 400mg tabs 1, Rs.8.00	نوپار
<b>NOWORM</b>	(ALKEM) 400mg tabs 1, Rs.9.50	نورم ٹبلیٹ
<b>NOWORM SUSP</b>	(ALKEM)	نورم سرپ
	400mg/10ml : liquid 10ml, Rs.11.90	



<b>NUBEND</b>	(KOPRAN) 400mg tabs 10x1: Rs.80.61	نو بند ٹبلٹ
<b>NUBEND SUSP</b>	(KOPRAN) 200mg, per 5ml 10ml Rs.11.50	نو بند سرپ
<b>ODAL</b>	(KLAR SEHEN)	او ڈال
400mg: tabs: 1: Rs.8.18, susp: Albendazole 5ml per susp 200mg: 10ml: Rs.9.74		
<b>OMNITEL</b>	(PHARMED) 400mg: 4: Rs.30.00	او منی ٹل
<b>OMNITEL SUSP</b>	(PHARMED) 10ml: Rs.11.50	او منی ٹل
<b>ULBEN</b>	(MEJDA) 400mg tabs 1, Rs.7.65	ال بن ٹبلٹ
<b>ULBEN SUSP</b>	(MEJDA)	ال بن سرپ
200mg, per 5ml syrup 10ml, Rs.9.95		
<b>WOMIBAN</b>	(BLUE CROSS) 400mg tabs 1, Rs.8.90	دو می بان
<b>ZENTEL</b>	(SMITHKLINE) 400mg tabs 1, Rs.9.35	زن ٹل ٹبلٹ
<b>ZENTEL SUSP</b>	(SMITHKLINE)	زن ٹل سرپ
200mg per 5ml, susp 10ml, Rs.12.35, 50ml: Rs. 53.45		

## LIVAMISOL

## لوامی سول

افعال و منافع: کینچوؤں راؤنڈورم اور ہک ورم کے لئے مفید دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: راؤنڈورم کے لئے بالغوں کو ۱۵۰ ملی گرام کی ایک خوراک بچوں کو ۵۰ ملی گرام کی ایک خوراک ہک ورم کے لئے ۱۵۰ ملی گرام کی ۴ خوراک ہر ۶ گھنٹہ بعد بچوں کو ۹۰ ملی گرام۔

مضر اثرات: متلی، قے، بخار درد شکم ہو سکتا ہے۔

احتیاط: کاربن ٹرائیکلورائیڈ، ٹرائیکلورواکھائی لین، کلوروفارم اور ایقھر کے مرکبات کے ساتھ استعمال نہیں کراتا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

<b>DEWORMIS 50/150</b>	(BIDDLESAWYER)	ڈیوورمس
50mg: 1, Rs.3.10, 150mg: 2: Rs.5.12		
<b>VERMISOL</b>	(KHANDELWAL)	ورمی سال ٹبلٹ سرپ
50mg: 1, Rs.3.50; 150mg: 1, Rs.5.00, syrup; levamisole 50mg per 5ml: 1:ml: Rs.8.00		



# MEBENDAZOL

مے بندازول

انفال و منافع: کینچوؤں (راؤنڈورم) ایک ورم تھریڈورم اور کدو دانوں کی مفید دوا ہے۔  
 مقدار و ترکیب: ۱۰۰ ملی گرام صبح و شام ۳ دن اگر ضرورت ہو تو ۲ ہفتہ بعد دوبارہ دیں، کدو دانوں  
 پورم میں ۲۰۰ ملی گرام صبح و شام ۳ دن بچوں کو بھی یہی خوراک دیں۔  
 منفی انفال: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں اس کا استعمال ضرر رساں ہے۔  
 مضر اثرات: پیٹ کی خرابیاں۔  
 احتیاط: ایام رضاعت میں۔

## تجارتی مرکبات

HELMINTOL (MEDLEY) 100mg tabs 6. Rs. 5.10	ہل من ٹال مبلٹ
HELMINTOL SUSP (MEDLEY) 100mg, per 5ml 30ml, Rs. 8.10	ہل من ٹال سرپ
IDIBEND (IDPL) 6: Rs. 5.15 syrup: 30ml: Rs. 5.78	آئی ڈی بند
MEBAGENTABS (FALMA) 100mg tabs 6, Rs. 6.23	میا جن
MEBAZOLE (TORRENT) 100mg tabs 6, Rs. 3.60	میا زول
MEBEX (CIPLA) 100mg : tabs: 6: Rs. 8.90, 200mg: 5gm granules Rs. 3.98: susp: Medenda zole 100mg per 5ml susp: 30ml : Rs. 11.75	مے بکس
MENDAZOLE (BIDDLESAWYER) 100mg tabs 6, Rs. 4.56	مین ڈازول
PANTELMIN (ETHNOR) 100mg tabs 6, Rs. 9.30 syrup: Mebendazole 100mg per 5ml syrup: 30ml : Rs. 14.60	پن ٹل من
WORMIN (CADILA PHARMA) 100mg tabs 6, Rs. 7.40	ورمن مبلٹ
WORMINSYRUP (CADILA PHARMA) 100mg per 5ml syrup: 30ml: Rs. 8.70	ورمن سرپ
ZUMIN (RAPTAKOS) 100mg tabs 6, Rs. 5.50	زومن



## NICLOSAMIDE

## نکلو سامائیڈ

افعال و منافع: کدو دانوں (شیپ ورم) کی تمام قسموں کی مفید و مجرب دوا ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۶ سال سے زائد عمر والوں کو اگر ام چبا کر پانی سے کھلائیں دوسری خوراک اگر ام  
گھنٹہ بعد یا ۲ گرام ایک ہی خوراک میں دے سکتے ہیں۔ دوا کے ۲ گھنٹہ بعد تیز مسہل میگ سلف وغیرہ  
ضرور دینا چاہیے۔ بچوں کو اگر ام ۲ حصوں میں تقسیم کر کے گھنٹہ کے وقفہ سے دی جائے۔  
مضر اثرات: ہاضمہ کی خرابیاں، درد سر، کبھی کھلی ہو سکتی ہے۔

## تجارتی مرکب

NICLOSAN (BIDDLES AWYER)

نکلو سان

Niclosamide 500mg tabs 4, Rs.22.75

## PIPRAZINE CITRATE

## پیرازین سائٹریٹ

افعال و منافع: کینچوؤں (راؤنڈ ورم) اور تھریڈ ورم دھاگے نما کیڑوں کی مفید ترین دوا ہے۔  
مقدار و خوراک: راؤنڈ ورم کے لئے ۲۰ کلو سے زائد وزن والوں کے لئے شام کو ۳ گرام ڈی جائے  
صبح کو دست آور دوا دی جائے، اگر ضرورت ہو تو ۲-۳ دن بعد دوبارہ دی جائے۔ تھریڈ ورم کے لئے ۲  
سال تک کے بچوں کو ۲۵۰ ملی گرام دن میں ۲ بار سے ۴ سال تک ۲۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار سے ۱۲  
سال تک ۵۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار ۱۲ سال سے زائد عمر والوں کو اگر ام دن میں ۲ بار ۷ دن تک دوا کھلائی  
جائے۔

منفی افعال: جگر و گردوں کی خرابی میں اور مرگی کے مریضوں کو دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: چکر آنا، خدر، عضلات کا پھڑکنا، پتی اچھلنا۔

احتیاط: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں استعمال سے گریز کریں۔

## تجارتی مرکبات

ANTIPAR WITH LAXATIVE (WELLCOME)

انٹی پار سرپ

750mg/ 5ml 30ml Rs. 7.30 115ml: Rs. 18.48



**ANTIPAR WITH LAXATIVE**

(WELLCOME)

انٹی پار سفوف

10g granuls 1 Rs.3.08 \*

**HELMACID WITH SENNA**

(GLAXO)

ہیل ماسڈ

10g: 10g Rs.2.16

**PYRANTAL PAMOAT**

پائی رن ٹل پامیٹ

افعال و منافع: راؤنڈورم تھریڈورم اور ہک ورم کی مفید دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے دن میں ایا تین دن تک۔

۲ سال سے کم عمر والوں کو ۱۰۰ ملی گرام ایک بار ۳ دن تک ۸ سے ۱۲ سال کی عمر میں ۶۰۰ ملی گرام دن میں ۱ بار ۳ دن تک۔

منفی افعال: حالت حمل میں نہ دی جائے۔

مضرات: معدہ کی خرابی نظام عصبی میں خلل، جلد پر داغ پڑنا۔

احتیاط: جگر کے مریضوں کو احتیاط لازم ہے۔

تجارتی مرکبات

**COMBANTRIN**

(PFIZER)

کم بان ٹرین

200mg tabs 2, Rs.4.13, susp: pyrantel (as pamoate) 250mg per ml

susp: 8ml: Rs. 11.79

**EXPENT**

(TATA PHARMA)

ایکس پینٹ

**PYRMOATE TABS**

(FRANCO INDIAN)

پائی رومیٹ

250mg tabs 3, Rs.8.20, susp: 10ml: Rs.11.60

**PYRVINUYM PAMOATE**

پائی ری وی نیم پامیٹ

افعال و منافع: پن ورم، تھریڈورم راؤنڈورم کے لئے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲.۵ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے ایک خوراک دو دن تک زیادہ سے

زیادہ ۱۲.۵ ملی گرام ضرورت پڑنے پر ۳ ہفتہ بعد دوبارہ دیں۔

منفی افعال: جگر اور گردوں کے مریضوں میں مضر ہے۔



## SANTONIN CALOMEL

## سینٹونین کیلومل

افعال و منافع: تھریڈورم، راؤنڈورم کی مفید ترین دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۸ سال تک کے بچوں کو ۳۰ ملی گرام ۸ سے زائد عمر والوں کو ۳۰ سے ۶۰ ملی گرام بالغوں کو ۶۰ سے ۹۰ ملی گرام دوا شام کو کھانے کے ۲ گھنٹہ بعد دینا چاہیے۔ اور صبح کو دستوں کی دوا دینا

چاہیے۔

مضر اثرات: پتی اچھلنا چکر آنا، درد سر، متلی، قے، اسہال آسکتے ہیں۔

احتیاط: اس دوا کے بعد کیسٹر آئل کا مسہل نہیں دینا چاہیے زیادہ مقدار میں مرگی جیسے دورے پڑ سکتے

ہیں۔

## TETRAMISOLE HCL

## ٹٹرامیسول ہائڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: کینچوؤں، راؤنڈورم اور ہک دورم کی مفید دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: راؤنڈورم کے لئے ۲.۵ سے ۵ ملی گرام / فی کلو وزن کے حساب سے ایک خوراک

ہک دورم کے لئے بھی اسی حساب سے دی جائے ۱۲ گھنٹہ بعد دوسری خوراک دی جائے اس کے ساتھ

صفائی کے لئے قیناف تھالین بھی دی جاتی ہے۔

منفی افعال: دوا سے حساس مریضوں کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: متلی، قے، بھوک کی کمی، درد شکم، درد سر چکر آنا، جلد پر داغ پڑنا۔

احتیاط: اس کو کاربن ٹٹراکلورائیڈ، آئل آف چینو پوڈیم، کلورو فارم اور ایتھر کے ساتھ نہیں دینا

چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

JETOMISOL-P

(ETHNOR)

جٹومی سول

Tetramisole 150mg, phenolphthalein 60mg: tabs: 1: Rs.4.37

NILCARIS-A

(BDH)

نیل کارس۔ اے

Tetramisole (as hcl) 150mg: tabs: 2: Rs.8.90

NILCARIS-P

(BDH) 50mg: tabs: 2: Rs.7.10

نیل کارس۔ پی



# دافع فنگس ادویہ ANTIFUGAL AGENT

## AMPHOTERICIN B.

ایمفوٹرائی سین بی

افعال و منافع: یہ ایک زبردست دافع فنگس دوا ہے جو ہر طرح کے فنگس انفکشن میں مفید ہے۔  
مضر اثرات: مقامی طور سے جلن کھجلی اور جلد پر داغ پڑ سکتے ہیں۔

تجارتی مرکبات

FUNGIZONE I.V

(SARABHAI)

فنگی زون وریڈی انفکشن

inj; 50mg vial Rs.200.00

## CLOTRIMAZOL

کلوٹریمازول

افعال و منافع: ہر طرح کے فنگس انفکشن جلد، ناخن کے انفکشن کنڈیڈا انفکشن، کنڈیڈ مہلی انفکشن  
خفہ کا اورم اور انفکشن ٹرائی کو مونا س مہلی انفکشن، لیکوریا جراثیمی میں مفید و موثر ہے۔  
مقدار و ترکیب: لیکوریا میں ۱۰۰ ملی گرام کی ٹکیہ سوتے وقت مہل کے خوب اندر رکھوائیں ۶ دن تک  
یا ۲ ملیاں ۳ دن تک رکھوائیں، کریم متاثرہ مقامات پر لگائیں۔  
مضر اثرات: مقامی طور سے معمولی جلن اور داغ پڑ سکتے ہیں۔  
احتیاط: علاج مکمل شفا یابی تک جاری رکھیں۔

تجارتی مرکبات

CANDID-V GEL (GLENMARK)

کنڈیڈوی جیل

30g with applicator: Rs.25.52

CANESTEN VAGINAL (BAYER) 6 Rs.24.95 کے نسٹین ویجائیل

IMIDIL VAGINAL TABS (LYKA) امیڈل

100mg: 6: Rs.14.16 200mg: 3: Rs.9.46 500mg: 1: Rs.7.10

SURFAZ VAGINAL TABS (FRANCO) 6 Rs. 15.43

TRIBEN VAGINAL TABS (JENBURKT)

vaginal tabs 100mg: 3: Rs.12.50; 500mg: 1: Rs.7.50

سرفاز ویجائیل  
ٹرائی بن ویجائیل



## ECANOZOL

## ایکونازول

افعال و ترکیب: مہبل کے کنڈیڈا انفکشن میں ایگزیمیا جلد کا ورم الرجی میں مفید موثر ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۱۵۰ ملی گرام سوتے وقت مہبل کے جوف میں اندر رکھوائیں کریم متاثرہ حصے پر  
لگائیں ۳ دن تک۔

احتیاط: ٹی بی اور وائرل انفکشن میں آنکھ کان میں، حاملہ اور بچوں کو احتیاط برتیں۔

## تجارتی مرکبات

**COBEDERM.H** (SARABHAI)

Halcinonide 1mg, econazole nit. 10mg; cream. 10g. Rs. 17.90

کوبی ڈرم

**ECANOL** (SARABHAI)

Econazole nit. 1% cream 10g Rs. 15.42. 20g; Rs. 19.58

ایکانول

**ECODAX-G** (JNIQUE)

Beclomethasone diprop. 0.025%, econazole nitrate 1%, gentamicin (as sulph) 0.1%, all w/w; Cream. 10g, Rs. 15.91

ایکوڈیکس

**ECANOL VAGINAL** (SARABHAI)

Econazole nit 150mg; tabs. 3 Rs. 55.18

ایکانول ویجائنل

## FLUCONAZOL

## فلوکانازول

افعال و منافع: جلد زیر جلد، مہبل کنڈیڈا انفکشن لیکوریا میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰۰ ملی گرام پہلے دن پھر ۱۰۰ ملی گرام دن میں ابار کھلائیں مہبل کنڈیڈا انفکشن میں ۱۵۰  
ملی گرام دن میں ابار صرف۔

منفی اثرات: دوا سے حساس مریضوں میں حمل اور ایام رضاعت میں نہ کھلائیں۔

مضر اثرات: متلی، تھک، درد سر، جسم پر داغ پڑنا، درد شکم، نفخ شکم اسہال آنا، جگر کے فعل کو تحریک  
دیونچنا، ری ایکشن ہونا۔

احتیاط: گردوں اور جگر کے فعل کی جانچ کراتے رہیں۔



دواؤں کا رد عمل: فین ٹائین، سائیکلو سپورین، وارفارین، دوسری مائع انجماد خون ادویہ اور ریفا م پی  
مین کے ساتھ اس کا استعمال مناسب نہیں۔

## تجارتی مرکبات

<b>ALFLUCOZ</b>	(ALEMBIC) 150mg: caps: 4: Rs.120.00	الفلوکوز
<b>CANCRIPT</b>	(BDH)	کین کریپٹ
	caps: 50mg 4: Rs.42.75, 100mg: 4: Rs.82.00, 150mg: 4: Rs.120.00,	
<b>FLUZIDE</b>	(CONCEPT)	فلوزائیڈ
	caps: 50mg: 4: Rs.46.00: 100mg: 4: Rs.88.00 : 150mg: 1: Rs.32.00	
<b>FLUZON</b>	(CADILA)	فلوزون مہلیٹ
	100mg: 4: Rs.92.00, 150mg: 2: Rs.66.00	
<b>FLUZON INFUSION</b>	(CADILA)	فلوزون انفیوژن
	200mg per ml inj: 100ml: Rs.80.00	
<b>FORCAN</b>	(CIPLA)	فورکان کپسول
	caps; 50mg: 4: Rs.44.00: 150mg: 1caps Rs.31.75; 200mg: 4: Rs.164	
<b>FORCAN INFUSION</b>	(CIPLA)	فورکان انفیوژن
	infusion: 100ml: Rs.75.00	
<b>MYCOREST</b>	(RECON)	مائی کوریسٹ
	caps: 50mg: 5x4: Rs.194.25, 150mg: 1: Rs.28.40	
<b>SYSCAN</b>	(TORRENT)	سکان کپسول
	caps; 50mg: 4: Rs. 40.90; 100mg: 4 caps Rs.87.60; 150mg: 1:	
	Rs.29.90; 200mg: 4: Rs.163.60	
<b>SYSCAN INFUSION</b>	(TORRENT) 100ml Rs.70.90	سکان انفیوژن
<b>ZOCON</b>	(FDC)	زوکون مہلیٹ
	tabs; 50mg: 4: Rs. 44.45; 150mg: 1tab Rs.31.75; 200mg: 4: Rs.161.80	
<b>ZOCON INFUSION</b>	(FDC) 100mg Rs.58.35	زوکون مہلیٹ



# GRISEOFULVIN

## گرائی سو فل وین

افعال و منافع: جلد، بالوں، ناخن وغیرہ کے فنگس، انفکشن دوا کی مفید دوا ہے۔ لگانے کی دوا ہے  
افادہ نہ ہو تو اس کو ضرور دینا چاہیے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار یا ۱۰۰۰ ملی گرام دن میں ۱ بار بچوں کو ۱۰ ملی گرام / کلو  
گرام وزن کے حساب سے دو خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے دوا خالی پیٹ نہ کھائیں جلد اور بالوں  
کے انفکشن میں ۴ ہفتہ ناخن انگلی یا ایڑی کے انفکشن میں ۶ سے ۱۲ ماہ تک کھلائیں۔ مرض ختم ہونے تک  
علاج جاری رکھیں۔

منفی افعال: مونی لیال انفکشن اور جگر کے مریضوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

مضر اثرات: خشکی، درد سر، فتور، ہضم، پتی اچھلنا (شری) کروشنی سے نفرت۔

دواؤں کا رد عمل: باربی ٹون کے مرکبات، خودنی مانع حمل ادویہ اور شراب کے ساتھ مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

DEROMONORM TABS	(GLAXO)
FUNGAL TABS	(INGA)
125mg: 10, Rs. 10.47; 500mg: 10, Rs. 35.55	
FUNGIVIN	(EUPHORIC)
GRISACTIN FORTE	(CFL) 10: Rs. 22.27
GRISOFIL	(DEE PHARMA) tabs 6: Rs. 3.54
GRISORAL	(MICRO LABS) 10: Rs. 18.10
GRISOVIN-FP	(GLAXO) tabs 10: Rs. 5.89
IDIFULVIN	(IDPL)
125mg: 10: Rs. 6.50 250mg: 10: Rs. 12.43	
WALAVIN-FP	(WALLACE) 10: Rs. 8.80

ڈر مونارم  
فنگل ٹبلٹ

فنگی وین  
گرائی سلفین فورٹ  
گرائی سو فل  
گرائی سورال  
گرائی سو وین ایف پی  
آئی ڈی فل وین

ولادین ایف پی



## HAMYCIN

## ہے مائی سین

افعال و منافع: منہ کے زخم سفید چھالے Thrush جو کہ کنڈیڈا انفکشن کے سبب ہوں ورم مہبل، جلد، بالوں اور ناخنوں کے فنگل انفکشن میں مفید ہے۔

مقدار و خوراک: ۲ لاکھ یونٹ کالوشن متاثرہ مقام پر لگائیں دوا کو منہ میں کافی دیر روکے رکھیں، ویجائٹل ٹبلٹ ۴ لاکھ یونٹ اسے ۲ ٹکیہ ویجائٹا میں خوب اندر کور کھوائیں، مرہم متاثرہ مقام پر دن میں ۲ بار لگائیں۔

منفی اثرات: حالت حمل میں۔

مضر اثرات: کبھی کبھی جلن اور گرمی کا احساس۔

## تجارتی مرکبات

HAMYCIN

(HAL)

Hamycin 200,000u per ml susp. 10ml Rs. 14.86

HAMYCIN OVULES

(HAL)

Hamycin 400,000u, 6 Rs. 15.76

ہے مائی سین لوشن

ہے مائی سین گولی

## KETOCONAZOLE

## کیٹوکانازول

افعال و منافع: جلد کے بالائی حصہ میں ہونے والا ایسٹ yeast انفکشن منہ اور ویجائٹا میں ہونے والا کنڈیڈا انفکشن وغیرہ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار ۵ دن تک

منفی اثرات: دوا سے حساس مریضوں کو حمل اور ایام رضاعت میں ۲ سال سے کم عمر بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: ہضم کی خرابیاں، جلد پر الرجی کے اثرات، درد سر، تھرا مبین کی کمی مردوں میں چھاتیوں کا بڑا ہو جانا اور ورم جگر ہو سکتا ہے۔

احتیاط: جگر کی خرابی میں احتیاط برتیں۔



دواؤں کا رد عمل: مانع افزاز جگر ادویہ، دافع تیزابیت، مانع انجماد خون فین ٹائن، ری قام پی سین اور مائیکلو سپورین کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

<b>FUNAZOLE</b> (KHANDELWAL)	فونازول
200mg tabs 10: Rs.57.90	
<b>FUNGICIDE (TORRENT)</b> 200mg tabs 10: Rs.123.00	فنگی سائیڈ
<b>KETOZOLE TABS (GUFIC)</b> 200mg tas 10: Rs.110.00	کیٹا کونازول
<b>NIZRAL (ETHNOR)</b> 200mg tabs 10: Rs.139.50	نزرال

## MICONAZOL

## مائی کونازول

افعال و منافع: منہ اور آنتوں کے کنڈیڈا انفکشن، داد Ring worm مہلی انفکشن Viginal Candi Diasis اور فنگس انفکشن میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ویجائٹل انفکشن میں ۲۰۰ ملی گرام کی ٹکیہ ویجائٹا میں رکھوائیں کریم متاثرہ مقام پر دن میں ۲ بار ۷ سے ۱۰ دن تک استعمال کرائیں۔

منفی افعال: دوا سے حساس مریضوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: کھجلی جلن، جلد پر داغ، پتی (شرئی) جلد پر خراش ہو سکتی ہے۔

## تجارتی مرکبات

<b>GYNODAKTARIN (ETHNOR)</b> gel 20g Rs.27.10	گائوڈاکٹرین کریم
<b>GYNODAKTARIN OVULE (ETHNOR)</b>	گائوڈاکٹرین ویجائٹل ٹکیہ
200mg ovule 3:Rs.17.04	

## ITRACONAZOLE

## آئی ٹراکونازول

افعال و منافع: یہ ایک زبردست دافع فنگس دوا ہے۔ ہر قسم کے کنڈیڈا انفکشن میں مفید ہے۔

دواؤں کے ساتھ مضر اثرات: سائیکلو سپورین، ٹرفیناڈین، ایس ٹی می زول، ڈیجاکسن، سلفونائی یوریا، وارفین، ریقام پی سین، آئی این ایچ. I.N.H. اور فین ٹائن کے ساتھ دینا مضر ہے۔



## تجارتی مرکبات

ITASPOR  
SPORANOX

(INTAS)  
(ETHNOR)

ای ٹاسپور  
اسپوراناکس

### NYSTATIN

نائی سٹاٹن

افعال و منافع: کنڈی اور موئی لیاں انفکشن میں مفید ہے۔ خصوصاً آنتوں کے موئی لیاں انفکشن کی مفید دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵ لاکھ یونٹ دن میں ۳ بار مقدار ۱۰ لاکھ تک دی جاسکتی ہے۔  
مضر اثرات: زیادہ مقدار میں ہاضمہ کی خرابی دست (اسہال) آسکتے ہیں۔

## تجارتی مرکبات

MYCOSTATIN

(SARABHAI)

مائی کو سٹاٹن

Nystain 500,000u, tabs 10: Rss49.18

دافع جذام ادویہ (انٹی لپروسی)

## ANTILEPROSY DRUGS

### CLOFAZIMINE

کلو فازی مائن

افعال و منافع: یہ جذام (کوڑھ) کی مفید دوا ہے وہ مریض جن پر ڈپ سون بے اثر ہوا، لپروسی یکشن ہو ایسی حالت میں یہ ایک بہترین دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: جذام کے لئے ۵۰ ملی گرام روزانہ یا ۱۰۰ ملی گرام ایک دن کا ناغہ کر کے دی جائے، لپروسی ایکشن میں ۲۰۰ سے ۳۰۰ ملی گرام روزانہ ۳ ماہ سے زیادہ نہ دی جائے۔

منفی اثرات: حمل کے پہلے ۳ ماہ میں مضر ہے۔

مضر اثرات: جلد بال بلغم کی رنگت میں تبدیلی جلد خشک کھلی، ہاضمہ کی خرابی۔



احتیاط: جگر اور گردوں کی خرابی میں درد شکم، اسہال، ایام رضاعت میں۔

## تجارتی مرکبات

**CLOFODAP** (ASTRA IDL) tabs 100: Rs.94.13

**CLOFOZINE** (ASTRA IDL)

caps 50mg : 100: Rs.109.11 100mg: 100: Rs.197.19

**HANSEPRAN** (S G PIMCLS)

caps 50mg: 10: Rs.8.13, 100mg: 10: Rs. 21.12

**LEPROMINE CAPS** (P&B LABS)

caps: 50mg: 10, Rs.9.52; 100mg: 10, 18.10

کلو فوڈاپ  
کلو فوزائن

ہنسران

لپرو مائن

## CLOFAZINE

## کلو فازین

افعال و منافع: جذام ملٹی بے سلری لپری، لپراری ایکشن اور برص سفید داغ میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: جذام، لپری کے لئے ۵۰ ملی گرام روزانہ اخوراک یا ۱۰۰ ملی گرام ایک دن کے وقفہ سے ۳۰۰ ملی گرام مہینہ میں ابار، دوا کھانے کے بعد لینا چاہیے۔ علاج ۶ ماہ جاری رکھیں، لپراری ایکشن میں ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار ۳ ماہ تک برص کے لئے ۱۰۰ ملی گرام روزانہ یا ہفتہ میں ۳ بار، سورج کی تیز شعاعیں داغوں کو پہنچائیں۔

منفی افعال: C/1 حمل کے پہلے ۳ ماہ میں جگر اور گردوں کے امراض میں۔

مضر اثرات: پیشاب کی رنگت میں تبدیلی، جلد کی رنگت بدلتا، معمولی اسہال پیٹ کی خرابی، درد سر، ہو سکتا ہے۔

احتیاط: جگر اور گردوں کے مریضوں میں احتیاط برتیں۔

## DAPSONE

## ڈپ سون

افعال و منافع: ہر طرح کے جذام کی مانی ہوئی دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ابتدا میں ۲۵ ملی گرام ہفتہ میں ۲ بار ہر ماہ ۲۵ ملی گرام کا اضافہ کرتے رہیں۔ ۲۰۰ سے ۳۰۰ ملی گرام ہفتہ میں ۲ بار یا ۱۰۰ ملی گرام روزانہ دیتے رہیں۔



مضر اثرات: انیمیا، لپراری ایکشن۔

احتیاط: مقدار خوراک میں احتیاط برتیں۔

**ANTI MALARIAL**

**دافع ملیریا ادویہ**

**AMODIA QUIN HCL**

اماڈو کوئن ہائڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: شدید ملیریا میں مفید و مستعمل ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے ۵ سال سے کم عمر بچوں کو ۱۵۰ ملی گرام کی ایک خوراک ۵ سے ۱۰ سال کو ۱۵۰ سے ۲۵۰ ملی گرام کی ایک خوراک۔

منفی افعال: دوسری دواؤں کے ساتھ اس کا استعمال ممنوع ہے۔

مضر اثرات: ورم جگر، خون میں سفید ذرات کی کمی، متلی اسہال، کمزوری آنکھ کے طبقہ قرنیہ میں دھندلا پن، بصارت میں فرق، جلد اور ناخن کی رنگت میں تبدیلی۔

احتیاط: خون و جگر اور آنکھوں کا ٹسٹ کراتے رہیں۔

**تجارتی مرکبات**

**BASOQUIN SUSP**

(PARKE-DAVIS)

باسو کوئن

150mg per 5ml susp 30ml: Rs.3.26

**CAMOQUIN (PARKE-DAVIS)**. 2g tabs 10: Rs.3.41

کاما کوئن

**CHLOROQUIN PHOSPHATE** کلورو کوئن فاسفیٹ

افعال و منافع: ہر قسم کی ملیریا کی مشہور زمانہ دوا ہے۔ امیک ورم جگر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ملیریا سے بچاؤ حفظ و مقدم کے لئے ۳۰۰ ملی گرام ہفتہ میں ۱ بار ۴ ہفتہ تک۔

علاج کے لئے پہلی خوراک ۶۰۰ ملی گرام ۶ گھنٹہ بعد ۳۰۰ ملی گرام روزانہ ۳ دن، امیبائی ورم جگر میں

۳۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار دو دن پھر ۱۵۰ ملی گرام دن میں ۲ بار ۳ ہفتہ۔

منفی افعال: ۵ سال سے کم عمر بچوں کو انجکشن نہیں دینا چاہیے۔



مضر اثرات: درد سر، فتور، ہضم، جلد کی رنگت میں تبدیلی و داغ پڑنا، بصارت میں فرق، قریہ میں دھندلا پن، ریٹینا میں خرابی، خون کا غیر طبعی ہونا، الرجی، قلبی صدمہ، Shock  
احتیاط: زیادہ دن استعمال کرانے پر آنکھ کی جانچ کرائیں انیسیا میں، گردوں اور جگر کی خرابی میں، حمل  
ایام رضاعت میں، سرخبادہ Soriasis فساد خون G6PD کی کمی میں احتیاط لازم ہے۔

### تجارتی مرکبات

<b>CENOL QUINE SYRUP</b> (CARMINOL)	سی نول کوئن سرپ
60ml Rs.9.90	
<b>CHLOROMET 500</b> (BDH) 500mg: tabs:10: Rs.15.50	کلورومیٹ
<b>CHLOROMET SYRUP</b> (BDH) 60ml: Rs.10.10	کلورومیٹ سرپ
<b>CLO-KIT</b> (INDOCO) 1: kit:Rs.9.45	کلوکٹ
<b>CLOQUIN</b> (INDOCO) 250mg tabs 10, Rs.9.31	کلو کوئن
<b>EMQUIN</b> (MERCK) 150mg tabs 12, Rs.8.10	ایم کوئن
<b>EMQUIN DS TABS</b> (MERCK) 500mg tabs 5, Rs.8.36	ایم کوئن ڈی ایس
<b>LARIAGO TABS/SUSP/INJ</b> (IPCA) 10: Rs.9.31: susp: chloroquine phos 60ml: Rs.10.17, inj: 5ml: Rs.2.68,	لاریاگو ٹبلٹ۔ سرپ۔ انجکشن
<b>IOQUIN</b>	آئی او کوئن
<b>LA-QUIN</b> (STADMED)	لا کوئن
100mg per 10ml 60ml:Rs.11.86, inj: chloroquine 30ml: Rs.14.58	
<b>MELUBRIN</b> (RANBAXY) 250mg tabs 10, Rs.5.78	میلوبرن
<b>NIVAQUINE-P</b> (RHONE POULENC)	نوا کوئن پی
150mg tabs 10, Rs.9.31	
<b>NIVAQUINE-P INJ</b> (RHONE POULENC)	نوا کوئن پی انجکشن
2ml: 10amps Rs.24.14: 5ml : 10amps Rs.35.20	
<b>NIVAQUINE-P FLAV SUSP</b> (RHONE POULENC)	نوا کوئن سرپ
60ml Rs.10.93	
<b>PREMOQUIN INJ</b> (PREM PHARMA)	پری ما کوئن
30ml vial : Rs. 11.00	
<b>QUINROS TABS/DS TABS</b> (TATA PHARMA)	کوئن روس
<b>RESOCHIN</b> (BAYER) 10 Rs. 9.31	ری سوچن ٹبلٹ



## MEPACRINE

## میپا کرین

افعال و منافع: ملیریا اور گیار ڈیا انفکشن میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ملیریا سے حفاظت کے لئے ۶۰۰ ملی گرام فی ہفتہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے، علاج کے لئے ۹۰۰ ملی گرام پہلے دن دوسرے دن ۶۰۰ ملی گرام تیسرے دن ۳۰۰ ملی گرام ۳ دن تک کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔

منفی افعال: پرانی ماکوئن کے ساتھ اور حمل کی حالت میں مضر ہے۔

مضر اثرات: سردرد، چکر، قے خون میں بگاڑ پتی اچھلنا، جلد متورم جلد پرداغ پڑنا۔

احتیاط: زیادہ مقدار میں دینے سے دماغ و اعصاب متاثر ہوتے ہیں۔

## تجارتی مرکب

MALADIN

(UNIQUE)

میلاڈین

Mepacrine hcl 100mg and 300mg tabs: 100mg: 10 Rs.21.45: 300mg: Rs.62.70

## PRIMAQUINE

## پرانی ماکوئن فاسفیٹ

افعال و منافع: ملیریا خصوصاً P.vivox کے لئے مفید دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: مکمل علاج کے لئے ۵ دن دوا کھلانا چاہیے۔ ۱ سے ۴ سال تک ۲ سے ۵ ملی گرام ۴ سے ۸ سال پہلے ۸ سے ۱۰ ملی گرام ۱۲ سے ۱۵ ملی گرام کلور کوئن کی پوری مقدار کے ساتھ دی جائے۔ ۵ دن دوا کھلانا چاہیے۔

منفی افعال: ہڈی کے گودے (مخ العظام) کی خرابی میں ایک سال سے کم عمر بچوں کو G6PD کی کمی اور حالت حمل میں استعمال نہ کرائیں۔

مضر اثرات: درد شکم، فم معدہ پر بے چینی، خون کی کمی جسم نیلا ہونا خون میں سفید ذرات W.B.C.

کی شدید کمی، ہائی بلڈ پریشر حرکات قلب کا بے ترتیب ہونا۔

احتیاط: کمزور اور نحیف مریضوں خون کے سفید ذرات کی کمی میں احتیاط برتنا چاہیے۔



## تجارتی مرکبات

PMQ INGA

(INGA) 7.5mg tabs, 10 tabs Rs 7.98 پی۔ ایم کیو

PROGUANIL

پروگوانیل

افعال و منافع: ملیریا سے حفاظت اور علاج کے لئے موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۳ سال سے زائد عمر والوں کو ۲۰۰ ملی گرام روزانہ ایک سال سے کم عمر کے بچوں کو ۵۰ ملی گرام ۵ سے ۸ سال کے بچوں کو ۱۰۰ ملی گرام ۹ سے ۱۳ سال والوں کو ۱۵۰ ملی گرام علاج ۶ ہفتہ جاری رکھیں۔

مضر اثرات: معدہ میں خرابی منہ میں زخم قلاع، جلد پر ری ایکشن، بالوں کا گرنا۔  
احتیاط: حمل اور ایام رضاعت، گردوں کے فیل ہونے میں احتیاط رکھیں۔

## تجارتی مرکبات

LAVERAN

(UNIQUE)

لے وی ران

PYRIMETHAMINE

پائی ری میتھامین

افعال و منافع: ملیریا کے علاج اور حفظ ماقدم کے لئے اور ٹوکسو پلازمو سس کی مفید دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ملیریا سے حفاظت کے لئے ۱۰ سال سے زائد عمر والوں کو ۲۵ ملی گرام ہفتہ میں ابار اس سے کم عمر میں ۶.۲۵ ملی گرام ہفتہ میں ابار علاج کے لئے ۲۵ ملی گرام یہ دوا سلفاڈایازین کے ساتھ دی جاتی ہے۔

منفی اثرات: دوا سے حساس مریضوں کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: خیند میں کمی، لیوکوسائٹ خون و تھروامبین کی کمی متلی، درد شکم، اسہال، درد سر، چکر آنا منہ میں خشکی بخار بے چینی، جلد متورم اور رنگت میں تبدیلی۔  
احتیاط: جگر اور گردوں کی خرابی میں احتیاط برتنا چاہیے۔







سال میں ۲۵۰ ملی گرام ۴ سال سے کم عمر میں ۱۲۵ ملی گرام کی صرف اخوراک دی جائے۔  
منفی اثرات: سلفونامائیڈ سے حساس مریضوں کو حمل اور ایام رضاعت میں خراب اثر و نما ہو سکتے ہیں۔  
احتیاط: G6PD فولک ایسڈ کی کمی میں احتیاط رکھیں۔

## تجارتی مرکبات

CROYDOXIN FM	(BIDDLESAWYER) tabs 2: Rs.3.91	کراپوڈاکسین
LARIDOX	(IPCA) tabs: 2: Rs.3.84	لاریڈاکس
MALOCIDE	(TORRENT) tabs 2, Rs.3.85	میلوسڈ
ONIL-2	(KOPRAN) tabs 50x2, Rs.215.50	اونیلی ۲
RIMODAR	(AFD) tabs 2: Rs.3.83	ری موڈار
SULFAMINE	(LA PHARMA) 25mg tabs 2, Rs.4.50	سلفامین

## SULPHAMETHOXY PYRAZINE سلفامیتھاکسی پائی رازین

افعال و منافع: بلیریا سے بچاؤ اور علاج کے لئے مفید دوا ہے۔  
مقدار و ترکیب: علاج کے لئے بالغوں کو ۱ گرام بچوں کو ۲۵ ملی گرام / فی کلو گرام کے حساب سے  
صرف اخوراک حفظ ماتقدم کے لئے ۱ گرام ہفتہ میں ابار بچوں کو عمر کے مطابق۔  
منفی اثرات: سلفونامائیڈ سے حساس، جگر و گردوں کے مریضوں کو خون کی خرابی نو مولود حاملہ اور  
مرضعہ کو دینا منع ہے۔

احتیاط: دوران علاج خون کی جانچ کرتے رہیں۔  
مضر اثرات: جلد پرداغ، ورم خجڑہ، کھجلی، ہاضمہ کی خرابیاں، فساد خون ہو سکتا ہے۔



## ANTIPROTOZOA

## انٹی پروٹوزوا

(اجسام طفیلہ کو روکنے والی ادویہ)

### DEHYDROEMETINE

### ڈی ہائیڈرو ایمین

افعال و منافع: ای می ہا، اور اسکاکی سٹومائی سے پیدا ہونے والے امراض میں مفید ہے ایمبائی پیچش، ایمبائی ورم جگر، دبیلہ جگر، میں مفید کام کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ سے ۲۰ ملی گرام دن میں ۳ بار ۶ سے ۱۰ دن تک ضرورت پر ۱۵ دن تک استعمال کرائیں معمولی حالت میں ۱۰ ملی گرام دن میں ۳ بار۔

منفی افعال: شدید عضوی بیماریوں میں اور حمل میں منع ہے۔

احتیاط: ای می ٹین استعمال کرنے والوں کو ۵ دن سے پہلے نہ دی جائے۔

### ڈائی آیوڈو ہائیڈرو کسائی کیونولین

### DI IODOHYDROXY QUINOLINE

افعال و منافع: ایمبائی پیچش، گیارڈ انفکشن، امی بک کولائی۔ انفکشن ایمبائی تونلج کی مفید دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۶۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار یومیہ ۲۰ دن تک بچوں کو ۳۰ سے ۴۰ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے ۲۰ دن تک دی جائے۔

منفی افعال: شدید عضویاتی خرابیاں، جگر کی خرابی حمل کے ابتدائی ۳ ماہ ایام رضاعت آنکھوں میں تکلیف کی حالت میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: ہاضمے کی خرابیاں، لیوکوسائیٹ کی کمی، پتی (شرٹی) بدن پر چھالے پڑنا، نظام عصبی میں خلل، پیشاب پیہہ آنا، مرگی جیسے دور بے پڑنا، آنکھوں میں درد ہونا۔

احتیاط: حمل، عصبی کمزوری، عصب باصرہ میں خرابی، تھائرائیڈ کی خرابی میں اور مانع بلڈ پریشر دواؤں



کے ساتھ احتیاط برتیں۔

## DILOXANIDE FURATE

## ڈلوکسانائیڈ فیورائیٹ

افعال و منافع: ایبئین سے زیادہ موثر دفاع امیبا دوا ہے لیکن دوسری دواؤں مثلاً میٹریٹائیڈ ازول کے ہمراہ زیادہ موثر ہوتی ہے۔ امیبائی پیچش، درد شکم کے لئے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: بالغوں کو ۵۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار یومیہ ۱۰ دن تک، بچوں کو ۲۵۰ ملی گرام / فی کو گرام وزن کے حساب سے دن میں ۳ بار، کئی خوراکوں میں تقسیم کر کے دینا چاہیے۔  
مضر اثرات: نفخ شکم خلل ہضم۔

## تجارتی مرکب

**FURAMIDE**

(KNOLL)

فیورلائیڈ

Diloxanide furoate 500mg; tabs. 10 Rs.6.49

## FURAZOLIDINE


## فیورازولیڈین

افعال و منافع: یہ ایک وسیع الاثر دفاع بکریا دوا ہے جو آنتوں کے بیشتر طفیلی اجسام کو دفع کرتی ہے۔ جراثیمی پیچش اور اسہال کے لئے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار ۴ سے ۸ دن تک بچوں کو ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار ۴ سے ۸ دن تک۔

مضر اثرات: ہاضمے کی خرابیاں، پیشاب کی رنگت سیاہ

احتیاط: حمل اور ایام رضاعت میں، خون کے سفید ذرات W.B.C کی کمی میں میٹریٹائیڈ ازول کے ساتھ دینا زیادہ بہتر ہے۔





## آئی ڈو کلور ہائیڈروکسائی کیونولین

### iodo chloro hydroxy quinoline

افعال و منافع: امیبائی پچش مزمن یا حاد دونوں حالتوں میں مفید ہے۔ آنتوں میں ورم اسہال گرمائی بچوں کے دست نفع شکم بد ہضمی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵۰ سے ۵۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار کھانے کے بعد ۱۰ دن تک ایک ہفتہ بعد ضرورت ہو تو دوبارہ یہی کورس کھلائیں۔

منفی اثرات: عظم غدہ درقیہ، آیوڈین سے الرجی، جگر اور گردوں کی کمزوری میں نہیں دینا چاہیے۔  
احتیاط: طویل علاج سے، عصب باصرہ کی خرابی میں احتیاط برتیں۔

### METRNIDAZOLE

### میٹری نائی ڈازول

افعال و منافع: امیبائی پچش Amoebic Dysentery آنتوں کے امیبائی امراض، جگر کا امیبائی بڑا اور گیار ڈا انفکشن میں مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱ سے ۳ سال کے بچوں ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار یومیہ ۴ سے ۷ سال کے بچوں کو ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۴ بار ۸ سے ۱۰ سال میں ۴۰۰ ملی گرام ۱۰ سال سے اوپر ۸۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار ۵ دن تک گیار ڈا انفکشن میں یہ علاج ۳ دن جاری رکھا جائے۔

منفی اثرات: خون کی غیر طبعی حالت میں عصبی امراض میں حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں اور ایام رضاعت میں مضر ہے۔

مضر اثرات: ہاضمے کی خرابیاں، زبان میلی، ذائقہ خراب لیو کو سامیٹ کی کمی پتی اچھلنا (شرٹی) جلد پر سرخ دانے نظام عصبی میں خلل، پیشاب گدلا، زیادہ دن استعمال سے مرگی کی طرح کے دورے پڑ سکتے ہیں۔  
احتیاط: دافع بلڈ پریشر ادویہ کے ساتھ اس کی مقدار کم دیں حالت حمل میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کا رد عمل: شراب خوردنی مانع انجماد خون ادویہ، فینوباربیٹون، سیکی ٹی ڈین، فین ٹائن ڈائی



سلفی روم کے ساتھ دینا نقصان دہ ہے۔  
(تجارتی مرکبات کے لئے نظام ہضم کی ادویہ کے تحت میسٹری ناڈازول دیکھئے)

## QUINIDOCHELOR

## کوینوڈوکلور

افعال و منافع: یہ امیبا پروٹوزوا اور اس کے سسٹ کو دور کرتی آنتوں کی خراش بار بار اور درد کے ساتھ اجابت آنے، حاد و مزمن امیبائی پیچش ورم قولوں بچوں کے اسہال، پروٹوزوا، بیکٹریا اور فنگس سے پیدا ہونے والے اسہال میں مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار کھانے کے بعد ۱۰ دن تک ۱۰ دن کے وقفہ سے دوبارہ یہی کورس دے سکتے ہیں۔

منفی افعال: آیوڈین سے حساس مریضوں کو جگر خراب ہونے بصارت کی خرابی غده درقیہ کے افراز کی زیادتی میں اس کا استعمال نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: عصب باصرہ میں درد، بصارت میں فرق، معدہ میں خراش ہو سکتی ہے۔

احتیاط: حمل اور ایام رضاعت میں احتیاط برتنا چاہیے۔

## تجارتی مرکب

ENTERO QUINOL

(EAST INDIA)

انٹروکینال

quinodochlor, 250mg: tabs 20, Rs.8.50

## SECNIDAZOL

## سیکنیڈازول

افعال و منافع: امیبا، گیارڈا، و۔ ٹرائی کو موناس سے پیدا ہونے والے امراض اور جراثیمی و بیکٹریا  
انفلکشن میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: آنٹوں کے امیبائی، گیارڈا، ٹرائی کو موناس اور جراثیمی۔ انفلکشن میں صرف ۲ گرام کی ایک خوراک دی جائے، جگر کے امیبائی ورم اور پھوڑے میں ۵۰۰ گرام دن میں ۱ بار ۵ دن تک دی جائے



امیبائی دہیلۃ الکبد Liver Absces میں ۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار ۵ دن تک یا ۲ گرام روزانہ ۲ سے ۳ دن تک۔

منفی افعال: خون کی غیر طبعی حالت میں نظام عصبی کی خرابیوں میں ثناذازول سے حساس مریضوں میں استعمال نہیں کرانا چاہیے۔

مضر اثرات: ذائقہ اور ہاضمہ میں خلل، متلی، بھوک کی کمی، قے، چکر آنا، کمزوری لیو کوسائیٹ کی کمی، پتی اچھلنا، کھلبلی، چہرے پر سرخی۔

احتیاط: علاج سے قبل اور بعد خون کی جانچ کرائیں، عصبی الجھن بے چینی پریشانی ہو تو دوا بند کر دی۔ شرابی، حاملہ اور مرضعہ کو استعمال نہ کرائیں۔

دواؤں کا رد عمل: وارفارین، ڈائی سلفی رم کے ساتھ دینا مضر ہے۔

### تجارتی مرکبات

**AMID (ELDER)** 500mg tabss 4: Rs.48.00

**SAGENTYL-DS (SYSTOPIC)**

1000mg: tabs: 2: Rs.31.80

**SECNIL (RHONE-POULENC)**

500mg tabs: 4: tabs Rs.35.00

**SECNIL FORTE (RHONE-POULENC)**

1g tabs: 2tabs Rs.35.00

**SECZOL (INTAS)**

500mg tabs; 4 tabs Rs.32.00

**SECZOL DS (INTAS)** 1gm : tabs: 2: Rs.27.80

**TAGERA (UNICHEM)**

500mg: 4: Rs.31.00 1g: 2: Rs.31.00

اسے ٹیڈ  
سے کیٹل ڈی ایس

سیکل

سیکل فورٹ

سیکل زول

سیکل زول ڈی ایس  
ٹیڈ



## دافع ٹی بی ادویہ

### ANTI TUBERCULAR DRUGS

#### CYCLOSERINE

#### سائیکلوسیرین

افعال و منافع: ٹی بی کے وہ مریض جن پر دوسری دوائیں بے اثر ہو جائیں تو یہ دوا کام کرتی ہے ٹی بی کی نمبر (۱) لائن کی دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵۰ ملی گرام ہر ۱۲ گھنٹہ بعد ۲ ہفتہ تک شدید حالت میں ۵۰۰ ملی گرام بھی دی جاسکتی ہے۔ بچوں کو ۱۰ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے دی جائے۔

منفی اثرات: گردوں کی شدید خرابی میں، مرگی، ڈپریشن، بے چینی، گھبراہٹ نفسیاتی عوارض شراب کے عادی افراد میں اس کا استعمال نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: درد سر، چکر، ہاتھ پیر کا پٹنا، دورے پڑنا، نفسیاتی الجھن ڈپریشن، جلد پر داغ پڑنا، انیمیا، اور جگر کے ٹسٹ کا غیر طبعی ہونا۔

احتیاط: الرجی یا عصبی نظام کی خرابی میں دوا بند کر دیں، گردوں کی خرابی میں مقدار خوراک کم کریں، خون جگر اور گردوں کے افعال پر نگاہ رکھیں حمل اور رضاعت کے ایام میں دوا استعمال نہ کرائیں۔

#### تجارتی مرکبات

CYCLOSERINE

(PANACEA)

سائیکلوسیرین

CYCLORINE

(LUPIN)

سائیکلورین

250mg : caps 6: Rs.183.72

#### ETHAMBUTOL

#### ای تھم بیوٹال

افعال و منافع: ہر قسم کی ٹی بی کی مفید دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۵ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے ۲۴ گھنٹہ میں ایک خوراک دینا



چاہیے۔ اگر دوبارہ یہ علاج کرنا پڑے تو مقدار و خوراک ۲۵ ملی گرام / فی کلو گرام دیں دو ماہ بعد مقدار کم کر دیں۔

منفی افعال: دوائے حساس مریضوں کو، عصب باصرہ کی تکلیف میں نہیں دینا چاہیے۔  
مضر اثرات: بصارت کو کمزور کرتی ہے۔

احتیاط: علاج سے قبل آنکھوں کی جانچ کرائیں، گردوں کی خرابی حاملہ و مرضہ کے استعمال میں احتیاط برتنا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

کبو تکس

**COMBUNEX**

(LUPIN)

800mg isoniazid 300mg tabs 10 Rs.25.27

**COMBUTOL**

(LUPIN) 10:Rs.29.16

کبو ٹال

**DEMBUTOL 200/400/800**

(DEYS)

۸۰۰/۴۰۰/۲۰۰ ڈی بو ٹال

200mg: 800mg: 6 Rs.10.18

**ET-400/800**

(WOCKHARDT)

ای ٹی ۴۰۰/۸۰۰

tabs: 400mg: 10: Rs.7.98, 800mg: 10: Rs.15.08

**INABUTOL FORTE** (THEMIS CHEMICALS) 10: Rs.14.79

انابو ٹال

**LYBUTOL** (LYKA) 10: 800mg: 10: Rs.14.26

لائی بو ٹال

**MYAMBUTOL** (LEDERLE)

میم بو ٹال

400mg: 10: Rs.13.00 800mg: 10: Rs.24.00

**MYCOBUTOL** (CADILA)

مائی کو بو ٹال

800mg: 10: Rs.19.55 1g: 10: Rs.24.01

**MYCONEX-800** (CADILA)

مائی کو نیکس ۸۰۰

Ethanbutol 800mg isoniazid 300mg; tabs 10: Rs.19.51

**MYCONEX-600** (CADILA)

مائی کو نیکس ۶۰۰

Ethambutol 600mg isoniazid 300mg; tabs 10: Rs.11.67

**THEMIBUTOL** (THEMIS CHEMICALS)

تھیم بو ٹال

800mg: 10: Rs.25.75; 1g: 10:Rs.31.92

**THEMIBUTOL PLUS** (THEMIS CHEMICALS)

تھیم بو ٹال پلس

Ethambutol hcl 800mg, isoniazid 300mg; tabs: 10: Rs.27.40



## ETHIONAMIDE

### ای تھیوناماائیڈ

افعال و منافع: پھیپھڑوں کی ٹی بی کی مفید ترین دوا ہے جب دوسری دوائیں فیل ہو جائیں یا خراب اثرات رونما ہوں تو اس کو استعمال کرنا چاہیے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰۰ سے ۷۵۰ ملی گرام روزانہ کھانے کے بعد ۲-۳ خوراکیوں میں تقسیم کر کے دوسری دافع ٹی بی کے ساتھ ملا کر دینا چاہیے۔

منفی افعال: دوا سے حساس مریضوں کو حمل اور جگر کی کمزوری میں نہیں دینا چاہیے۔  
مضر اثرات: درم جگر بھوک کی کمی، متلی تے، ذائقہ خراب شدید لو بلڈ پریشر دماغی الجھن، خشکی، دورے، عصبی کمزوری، قوت شامہ میں خلل، بصارت میں فرق دواشیاء نظر آنا، چکر آنا، خدر، ہاتھ پیر کا پینا ضعف باہ، کثرت حیض چہرے پر مہاسے اور بالوں کا گرنا۔  
احتیاط: دوران علاج جگر کے فعل کی جانچ کراتے رہیں۔

### تجارتی مرکبات

ETHIOCID (THEMIS CHEMICALS)

ای تھیوسڈ

Ethionamide 250mg: tabs: 10: Rs.124.60

MYOBID (PANACEA)

مایوبڈ

Ethinomide 250mg: tabs: 10: Rs.135.00

## ISONIAZID (I.N.H)

### آئی سونیاژڈ

افعال و منافع: بالغوں اور بچوں کی ٹی بی کے علاج اور اس سے حفاظت کی مانی ہوئی دوا ہے۔ دوسری دواؤں کے ساتھ زیادہ موثر رہتی ہے۔

مقدار و ترکیب: بچوں کو ۳ سے ۵ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے بالغوں کو ۳۰۰ ملی گرام ایک خوراک میں یا کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔

منفی اثرات: دوا سے حساس مریضوں کو جگر کی شدید بیماریوں میں مضر ہے۔

مضر اثرات: جگر میں خرابی عصب باصرہ میں خرابی، نفسیاتی الجھن خون کا غیر طبعی ہونا۔



احتیاط: شراپیوں اور گردوں کی خرابی میں احتیاط برتنا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

<b>COXRID</b>	(NICHOLAS)	کاکس رڈ
1 tab isoniazid 300mg 1 tab ethambutol 800mg: 1 pack: Rs.4.25		
<b>GOCOX COMP</b>	(IPCA)	گوکاکس کمپونڈ
Isomazid 300mg, Rifampicin 450mg, Vit B6 10mg tabs; 4 tabs		
Rs.23.91		
<b>ERBAZIDE</b>	(MAC)	اربازائیڈ
100mg: 1000 Rs.35.50; 400mg: 10 Rs.3.90		
<b>IPCAZIDE LIQUID</b>	(IPCA)	ایکازائیڈ لکویڈ
Isoniazid IP 100mg, Vit B6 IP 5mg, per 5ml 100ml: Rs.9.61		
<b>IPCACIN KID TABS</b>	(IPCA)	ایپ کاسین کڈ ٹبلٹ
Isoniazid 100mg, Rifampicin 100mg, Vit B6 5mg tabs 10: Rs.14.36		
<b>IPCAZIDE TABS</b>	(IPCA)	ایپ کازائیڈ
Isoniazid 100mg Vit B6 5mg kid tabs 10: Rs.2.51		
<b>ISOKIN TAB</b>	(WARNER) 100: Rs.5.92	آئی سوکن ٹبلٹ
<b>ISOKIN-TF</b>	(WARNER)	آئی سوکن ٹی ایف
Isoniazid 300mg thiacetazone 150mg; tabs 10 Rs.3.85		
<b>ISONEX</b>	(PFIZER) 300mg: 1000: Rs.444.71	آئی سوئیکس
<b>ISORIFAM</b>	(BIOCHEM) 10: Rs.64.00	آئی سورئی فام
<b>R-CINEX</b>	(LUPIN)	آر سی نیکیس
Isoniazid 300mg, Rifampicin 450mg caps: 4: Rs.22.49		
<b>RIFADIN-INH</b>	(TATA PHARMA)	ریفاڈین
Isoniazid 300mg, Rifampicin 450mg tabs; 4: Rs.23.73		
<b>RIFATER</b>	(TATA PHARMA)	ریفاٹر
Isoniazid 80mg, Rifampicin 120mg tabs, Pyrazinamide 250mg tabs; 10: Rs.23.68		
<b>RIFINEX</b>	(KOPRAN)	ریفانیکس
Isoniazid 300mg, Rifampicin 450mg caps; 10: Rs.65.86		
<b>RIMACTAZID</b>	(H.CIBAGEIGY)	ری ماکٹازڈ
Isoniazid 300mg, Rifampicin 450mg tabs; 8: Rs.44.94		



**RIMPINAH**

(LYKA)

Rifampicin 450mg, isoniazid 300mg caps

رم پی تا

**RINIZIDE**

(LUPIN)

Isoniazid 100mg, Rifampicin 150mg, Pyrazinamide 375mg caps, 10  
Rs 33 85

رالی تا لی زائید

**SIOZIDE**

(ALBERT DAVID)

Isoniazid 100mg, vit B6 5mg per 5ml, liq 114ml Rs 9 78

سایو زائید سرپ

**TIBIRIM-INH**

(STANCARE)

Isoniazid 300mg, Rifampicin 450mg tabs, 3 Rs 18 89

نہرم آلی این ایچ

**TRICOX**

(THEMIS CHEMICALS)

Isoniazid 100mg, Rifampicin 225mg, Pyrazinamide 500mg tabs, 10  
Rs 55 34

ٹرائی کوکس

**PARA AMINO SALICYLIC  
ACID (P.A.S.)**پیرا امینو سیلی سیلک ایسڈ  
(پاس)

افعال و منافع: تپ دق (ٹی بی) کے جراثیم کو ختم کرنے اس کے اثرات کو کم کرنے کی مفید و معاون دوا ہے یہ ہمیشہ (I.N.H) آئی سونیاژ کے ساتھ استعمال کرائی جاتی ہے یہ ہر قسم کی ٹی بی میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۱۰ گرام دن میں ۳ بار یا ۶ گولی دن میں ۲ بار کھانے کے بعد۔  
منفی افعال: گردوں کی خرابی، مرگی، بغیر نمک کی غذا کھانے والوں کو دینا مضر ہے۔  
مضر اثرات: متلی تھ، اسہال تھاراکسین کی کمی کے سبب گھٹیکھا Goitre ہو سکتا ہے۔  
دواؤں کے اثرات: پردے نی سڈ، انٹی کو اگولینٹ سیلی سیلیٹ ریغام پی سین کے ساتھ اثرات خراب ہو سکتے ہیں۔

**PYRAZINAMIDE**

پائی رازی نامائیڈ

افعال و منافع: ہر قسم کی ٹی بی کی مفید دوا ہے علاج کی مدت کو مختصر کر دیتی ہے۔  
مقدار و ترکیب: ضعف جگر، نقرسی حجر الفاصل ایام رضاعت میں دینا مناسب نہیں۔  
مضر اثرات: جگر میں خراب اثر پیدا کرتی ہے۔



احتیاط: اس کو دوسری دافع ٹی بی دواؤں کے ساتھ دینا چاہیے۔ حمل ذیابطس میں احتیاط برتیں،  
 اور Liver فنکشن اور، یورک اسڈسٹ کراتے رہنا چاہیے۔  
 دواؤں کا رد عمل: مدارات بول اور سلفی پائی رازون کے ساتھ نقصان دہ ہے۔

## تجارتی مرکبات

<b>LYNAMIDE</b>	(LYKA)	لائی ٹامائیڈ
500mg: 10: Rs.13.39, 750: 10: Rs.20.48		
<b>PIRALDINA</b>	(PHARMED)	پائی رال ڈینا
200mg: 10: Rs.9.90 : 500mg: 10: Rs.17.99: 750mg: 10: Rs.26.76: 1g:		
10: Rs.35.42		
<b>P-ZIDE</b>	(CADILA)	پی زائیڈ
tab 500mg: 10: Rs.18.06 750mg: 10: Rs.32.50 1000mg: 10: Rs.35.42		
<b>PYRAPHASE 500/750</b>	(KOPRAN)	پائی رافیس
500mg: 10: Rs.18.06 750mg: 10: Rs.26.88		
<b>PYZINA</b>	(LUPIN)	پائی زینا
500mg: 10: Rs.21.86 750mg: 10: Rs.34.40		
<b>PZA-CIBA-500/750</b>	(H.CIBAGEIGY)	پی۔زیڈ۔اے
500mg: 10: Rs.23.10, 750mg: 10: Rs.34.40		

## RIFAMPICIN

## ریفام پی سین

افعال و منافع: ٹی بی کے ایسے مریض جن پر ائی سونیا زائیڈ (I.N.H) بے اثر ہو جائے، پھیپھڑوں کی  
 ٹی بی، سرسام دتی جذام اور دق کے اثرات کو ختم کرنے کی بہترین دوا ہے۔  
 مقدار و ترکیب: ۴۵۰ سے ۶۰۰ ملی گرام دن میں ۱ بار کھانے سے ۱ گھنٹہ پہلے یا ۲ گھنٹہ بعد دی  
 جائے بچوں کو ۱۰ سے ۲۰ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے۔  
 منفی افعال: دوا سے حساس مریضوں کو، یرقان، حمل ایام رضاعت وہمی اور نفسیاتی مریضوں کو  
 استعمال نہ کرائیں۔

مضر اثرات: فتور ہضم، جلد پرداغ، بخار، جگر کے مریضوں میں تھرامین ویو کو سائیٹ کی کمی، اسنو



فیلیا، الجھن پریشانی خشکی، درد سر، چکر آنا، حرکات غیر ارادی عضلات کی کمزوری الرجمی ہو سکتی ہے۔  
احتیاط: یرقان، خرابی جگر معمر اور نقص تغذیہ کا شکار افراد میں احتیاط برتیں۔  
دواؤں کا رد عمل: مانع انجماد خون ادویہ، ڈیجی ٹیلز، شکر کی مقدار کم کرنے والی ادویہ، مانع حمل گولیاں،  
ڈائی سلفی رم، فین ٹائن، کارنی سون، سائیکلو سیرین، کوآنی ڈین اور منوم ادویہ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

<b>COXCIDE INH</b>	(DEE PHARMA) 6: Rs.25.50	کا کسائیڈ
<b>FAMCIN</b>	(IDPL)	قام سین
150mg: 4: Rs.7.58, 300mg: 4: Rs.15.07, 450mg: 3: Rs.18.42, 600mg: 3: Rs.24.37.		
<b>FAMCIN H</b>	(IDPL) 10: Rs.39.43	قام سین ایچ
<b>GOCOX</b>	(IPCA) 450mg: 4: Rs.26.16	گو کوکس
<b>GOCOX COMP</b>	(IPCA)	گو کوکس کمپوٹ
Rifampicin 450mg isoniazid 300mg vit B6 10mg tabs 4: Rs.23.91		
<b>ISORIFAM</b>	(BIOCHEM)	آئی سوریفام
Rifampicin 450mg, isoniazid 300mg: caps: 10: Rs.60.80		
<b>ISO-RIPHARMED</b>	(PHARMED)	آئی سوریفامڈ
Rifampicin 450mg isonazid 300mg caps: 4: Rss.25.06		
<b>R-CIN</b>	(LUPIN)	آر سین
caps; 150mg: 4: Rs.9.05; 300mg: 4: Rs.18.50; 450mg: 3: Rs.18.42; 600mg: 3: Rs.27.26		
<b>R-CIN SYRUP</b>	(LUPIN) 200ml Rs.7052	آر سین سیرپ
<b>R-CINEX</b>	(LUPIN)	آر سی نیکس
Rifampicin 450mg isoniazid 300mg; caps 4: Rs.25.04		
<b>R-CINEX Z</b>	(LUPIN)	آر سی نیکس زیڈ
Rifampicin 225mg isoniazid 150mg pyrazinamide 750mg tabs: Box o 10x5x2: Rss.711.00		
<b>RIFA 1-6 ADULT</b>	(CONCEPT)	ریفا ڈالٹ
<b>RIFACOM</b>	(INDOCO)	ریفا کوم
Rifampicin 450mg, isoniazid 300mg tabs: 4: Rs.26.29		



<b>RIFACOM EZ</b>	(INDOCO)	kit: Rs.18.00	ریفاکام ای زیڈ
<b>RIFACOM-Z KIT</b>	(INDOCO)	1 kit: Rs.13.00	ریفاکام زیڈ کٹ
<b>RIFADIN-INH</b>	(TATA PHARMA)		ریفادین
Rifampicin 450mg isoniazid 300mg: tabs 4: Rs.25.52			
<b>RIFAMPILA</b>	(ALBERT DAVID)	4: Rs.15.46	ریفامپلا
<b>RIFAKIN</b>	(WARNER HINDUSTAN)		ریفاکن
Rifampicin 450mg isoniazid 300mg 4: Rs.14.00			
<b>RIFAMYCIN</b>	(BIOCHEM)		ریفامائی سین
Rifampicin 450mg caps: 4: Rs.9.78			
<b>RIFINEX</b>	(KOPRAN)		ریفی نکس
Rifampicin 450mg isoniazid 300mg caps 10x4: Rs.252.00			
<b>RIFINEX PLUS</b>	(KOPRAN)		ریفی نکس پلس
Rifampicin 150mg, isoniazid 100mg: pyrazinamide 500mg tabs: 10x6: Rs.269.27			
<b>RIMACTANE</b>	(H.CIBAGEIGY)	4: Rs.26.85	ریماکٹین
<b>RIMACTANE SYRUP</b>	(H.CIBAGEIGY)	150ml: Rs.67.29	ریماکٹین سرپ
<b>RIMACTAZID</b>	(H.CIBAGEIGY)		ریماکٹازڈ
Rifampicin 450mg isoniazid 300mg; tabs 10x8: Rs.511.20			
<b>RIMACTAZID+Z</b>	(H.CIBAGEIGY)		ریماکٹازڈ - زیڈ
10 composite packs of 3x3 tabs R.331.80			
<b>RIMPAZID-450</b>	(CADILA)		ریمپازڈ ۴۵۰
Rifampicin 450mg isoniazid 300mg tabs 10: Rs.63.53			
<b>RIMPIN</b>	(LYKA)		ریمپن
300mg: 4: Rs.12.08 450mg: 10: Rs.43.98			
<b>RIMPIN SYRUP</b>	(LYKA)		ریمپن سرپ
Rifampicin 100mg per 5ml, 60ml Rs.15.82			
<b>RIMPINAH</b>	(LYKA)		ریمپنا
Rifampicin 450mg isoniazid 300mg; tabs 4: Rs.16.21			
<b>RINIZIDE</b>	(LUPIN)		رینی زائیڈ
Rifampicin 150mg, isoniazid 100mg, pyrazinamide 375mg: caps 10, Rs.38.39			



<b>RIPHARMED</b>	(PHARMED)	ری فارمڈ
300mg: 4: Rs.17.89: 450mg: 4: Rs.26.23		
<b>RIPHARMED SYRUP</b>	(PHARMED) 150ml Rs.51.09	ری فارمڈ سرپ
<b>TIBICIN SUSP</b>	(THEMIS CHEMICALS)	ٹی بی سین سرپ
Rifampicin 100mg per 5ml susp; 60ml Rs.15.20		
<b>TIBIKIT PLUS</b>	(STANCARE) 1kit: Rs.15.28	ٹی بی کیٹ پلس
<b>TIBINEX-450</b>	(THEMIS CHEM)	ٹی بی ٹیکس ۴۵۰
Rifampicin 450mg, isoniazid 300mg; caps 10: Rs.64.08		
<b>TIBIRIM</b>	(RANBAXY)	ٹیریم
300mg; 450mg: 3: Rs.11.70		
<b>TIBIRIM-INH</b>	(RANBAXY)	ٹیریم آئی۔ این۔ ایچ
Rifampicin 450mg INH 300mg 3: Rs.18.78		
<b>TRICOX FORTE</b>	(THEMIS CHEMICALS)	ٹرائی کوکس فورٹ
Rifampicin 225mg, isoniazid 150mg, pyrazinamide 500mg tabs: 10: Rs.55.34		
<b>WOKEX-4</b>	(WOCKHARDT)	ووکیکس ۴
Rifampicin 450mg, isoniazid 300mg 1 tab, pyrazinamide 750mg 2 tabs, ethambutol 800mg 1 tab, vit B6 5mg 1 tab. Blister strip: 10: Rs.143.40		
<b>ZUCOX KIT</b>	(GLAXO) Rs. 13.65	زوکاکس کٹ

## STREPTOMYCIN

## اسٹرپٹومیسین

افعال و منافع: ٹی بی کی مخصوص و مشہور دوا ہے پھیپھڑوں آنتوں غد میں ورم ٹی بی کے اثرات دور کرنے میں مدد دیتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۷۵۰ گرام یا ۱ گرام عضلاتی انجکشن یومیہ لگائیں۔

منفی افعال: دوا سے الرجک مریضوں کو، کان کے ورم، انفکشن میں نہ دیں۔

احتیاط: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ چھوٹے بچوں جگر اور گردوں کی خرابی میں شدید ضرورت پر ہی استعمال کرائیں۔



## تجارتی مرکبات

AMBISTRYN-S (SARABHAI) 1g vial: Rs.8.60 ایم بس ٹرین

COMYCIN SYRUP (GLAXO) کو مینی سین سرپ  
STREPTO-ERBAZIDE (MAC) per vial inj: Rs.5.96 اسٹریپٹو ار بازا ئیڈ

## THIACETAZONE تھیاسیٹازون

افعال و منافع: پھیپھڑوں کی ٹی بی کی لائن نمبر (۲) کی دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ابتدائی خوراک ۵۰ ملی گرام روزانہ خوراک ۱ سے ۲ ہفتہ بعد مقدار میں اضافہ کر کے ۲۰۰ ملی گرام تک کر دینا چاہیے۔

منفی افعال: جگر کی خرابی میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: بھوک کی کمی، متلی، قے، مخ العظام کی خرابی، لیو کو سائیٹ W.B.C کی کمی شدید انیما، جلد پر داغ پڑ سکتے ہیں۔

احتیاط: دوران علاج خون اور جگر کی جانچ کراتے رہیں۔

## تجارتی مرکب

ISOKIN FORTE (WARNER) آئی سوکن

Isoniazid 300mg Thiacetazone 150mg tabs 10 Rs.3.85

## ANTIVIRAL DRUGS

## دافع وائرس ادویہ

## ACYCLOVIR

## اے سائی کلوویر

افعال و منافع: یہ ہرپیز وائرس کی مخصوص دوا ہے۔ سادہ ہرپیز Herpes Simplex جس میں

جلد پر کچھوں کی شکل میں دانے نکلتے ہیں غشاء مخاطی اور جلد کا وائرس انفکشن تناسلی اعضاء کا ہرپیز انفکشن

Herpes Genital تمام جسم پر دانے پھیل جائیں Herpes Zoster کی بہترین دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: تناسلی اعضاء کے انفکشن میں پہلی خوراک ۲۰۰ ملی گرام ہر ۴ گھنٹہ بعد دن میں ۵ بار



دس دن تک دی جائے مرض کی شدت کم ہونے پر ۲۰۰ گرام دن میں ۴ بار ۶ ماہ تک دی جائے۔ شدید  
انفلکشن میں ۸۰۰ ملی گرام دن میں ۴ بار ۷ دن ۲ سال تک کے بچوں کو ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۵ بار ۲ سال  
سے زائد عمر میں ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۵ بار۔

احتیاط: گردوں کی خرابی میں مقدار خوراک کم کر دینی چاہیے حمل میں احتیاط برتیں۔  
دواؤں کا رد عمل: پروینی سڈ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

### تجارتی مرکبات

CYCLOVIR	(CADILA)	ساکلوویر
200mg/tab: 10: Rs.199.00		
CYCLOVIR OINT	(CADILA)	سائی کلوویر مرہم
HERPERAX OINT	(MICRO LABS)	ہرپی ریکس مرہم
3% w/w oint 5g Rs. 50.70		
HERPERAX TABS	(MICRO LABS)	ہرپی ریکس ٹبلٹ
200mg tabs 6 Rs. 108.10		
HERPEX (TIDE)	200mg tabs 10: Rs.210.00	ہرپیکس
ZOVIRAX	(BURROUGHS-WELLCOME)	زوی ریکس ٹبلٹ
inj for infusion 250mg vial Rs.775.14		

### PROTEIN HYDROLYSATE پروٹین ہائیڈرولائی سیٹ

افعال و منافع: وائرل انفلکشن میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲ ملی لٹر عضلاتی انجکشن دن میں ۱ یا ۲ بار شدید حالت میں ہر ۶ گھنٹہ بعد  
لگائیں۔

منفی افعال: شدید الرجک افراد کو اور ٹی بی کے مریضوں کو نہ دی جائے۔

### تجارتی مرکبات

NULIP	(GUFIC) inj: 2ml: Rs.6.50	نولپ
-------	---------------------------	------



## RIBAVIRIN

## رباوائیرین

افعال و منافع: شدید وائرل ورم جگر میں، آلات تنفس کے وائرل انفکشن کے لئے مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۳-۴ بار یومیہ بچوں کو ۱۰ ملی گرام / کلو گرام کے حساب سے  
کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے۔

منفی افعال: دوائے حساس مریضوں کو اور حمل میں دینا مناسب نہیں۔  
احتیاط: خون کی کمی گردوں اور جگر کی خرابی میں احتیاط برتنا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

**VIRAZIDE**

(LUPIN)

ورازائیڈ کپسول

100mg, 4, Rs. 113.37, 200mg, 4, Rs.233.74

**VIRAZIDESYRUP**

(LUPIN)

30ml, Rs.81.47 ورازائیڈ سیرپ

## ZIDO VUDIN

## زائیڈو ووڈین

افعال و منافع: H.I.V. وائرس انفکشن کی روایتی اور تسکین دہ دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۶ بار۔ پھر ۱۵۰ ملی گرام ۴ خوراکیوں میں تقسیم کر کے بچوں  
کو ۱۸۰ ملی گرام / فی مربع میٹر جسم کے حساب سے ۳ ماہ سے کم عمر بچوں کو نہ دی جائے۔

منفی افعال: نیوٹروفیل اور ہیموگلوبین کی کمی میں ایام رضاعت میں استعمال سے احتیاط برتیں۔

مضر اثرات: خون میں نیوٹروفیل اور لیوکوسائٹ کی کمی، جلد پرداغ، درد شکم، بخار، خدر (سن  
پن)، بھوک کی کمی، عضلات میں درد نیند کی کمی۔

احتیاط: دوا کے دوران ہر ۲ ہفتہ بعد خون کی جانچ کراتے رہیں، انیسیا میں مقدار و خوراک کم کریں، جگر  
اور گردوں کے امراض میں معمر اور حاملہ کو احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: دافع درد دوائیں، جگر کے افراز کو روکنے والی دوائیں، پروپینی سڈ،  
میٹھا ذروں کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔



## تجارتی مرکبات

**RETROVIR**

(WELLCOME)

100mg: caps: 10: Rs.535.25

ریٹروویر

**ZIDOVIR**

(CIPLA)

100mg: caps: 10: Rs.185.31

زیڈو ویر

دافع زہر اور تریاتی ادویہ

**DRUGS ANTIPOISONS &**

**ANTIDOTES**

**LEUCOVORIN CALCIUM**

لیوکووورین کیلسیم

افعال و منافع: یہ میتھوٹریکسیٹ اور فولک ایسڈ کو تحلیل ہونے سے رکھتی ہے میگالوبلاستک انیمیا میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۷۵ ملی گرام بذریعہ بوتل چڑھائیں ۱۲ گھنٹہ میں پھر ہر ۶ گھنٹہ بعد ۱۲ ملی گرام عضلاتی لگائیں، انیمیا میں ۱ ملی گرام یومیہ عضلاتی یا خوردنی۔

منفی افعال: پرانی شش انیمیا اور وٹامن B12 کی کمی والے مریضوں کو مضر ہے۔  
مضر اثرات: انجکشن کے بعد بخار ہو سکتا ہے کبھی ری ایکشن بھی ہوتا ہے۔

## تجارتی مرکبات

**FERBON KOREA**

(SHREE GANESH)

3mg 1ml amps: Rs.26.00, 15mg 1ml amps: Rs.100.00

فریون

**LEUCOVORIN CALCIUM**

(BIO CHEM)

3mg per-ml inj. 10 amps: Rs.243.75

لیوکووورن



## نالکسون ہائیڈروکلورائیڈ NALOXONE HCL

**افعال و منافع:** افیون اور اس کے مرکبات کے استعمال سے ہونے والا ڈپریشن، دل بیٹھنا۔ پٹنا زو کین، ڈیکسٹرو پروپاکسی فین وغیرہ سے ہونے والی کمزوری گھبراہٹ میں مفید ہے۔

**مقدار و ترکیب:** بالغوں کے لئے ۵،۴ ملی گرام زیر جلد عضلاتی یا وریدی ہر ۲-۳ منٹ پر ضرورت کے مطابق لگائیں یا بوتل میں ڈال کر بچوں کو ۱۰ ماہ کو ۱۰۰ فی کلو وزن کے حساب سے لگائیں۔

**مضر اثرات:** متلی تے، پسینہ کی زیادتی، وجع القلب، بلڈ پریشر میں اضافہ دورے پڑنا سینہ میں تنگی ہو سکتی ہے۔

**احتیاط:** حمل کی حالت میں، افیون کے عادی افراد میں احتیاط برتیں۔

### تجارتی مرکبات

NARCOTAN

(TROIKAA)

نارکوتان

5x2ml (20mg) amp: Rs.175.00, 5x1ml (40mg) amp: Rs.400.00

### پائی ری ڈین الڈوکسام میتھیوڈائیڈ

## PYRIDINI ALDOXIME, METHIODIDE

**افعال و منافع:** ارگن فاسفورس کے زہریلے اثرات کا تریاق ہے۔

**مقدار و ترکیب:** آکسیجن اور اثر و پین سے دم گھٹنے سانس رکنے کی حالت دور کرنے کے بعد ۱ سے ۲ گرام عضلاتی یا وریدی ۵ فیصدی ۱۰ ملی لیٹر نارمل سیلائن یا واٹر میں ملا کر ۱۵ سے ۳۰ منٹ میں چڑھائیں ضرورت پر دوبارہ دیں۔

**مضر اثرات:** خشکی، چکر آنا، بصارت میں فرق، متلی سینہ میں درد، درد سر، ہوا کی شدید خواہش عضلاتی کمزوری۔

**احتیاط:** جگر کے مریضوں میں احتیاط برتیں۔



## PRALIDOXIME

## پرائیڈاکسائم کلورائیڈ

افعال و منافع: پیراتھیان اور میتھائل پیراتھیان کے زہر کو دور کرنے میں مستعمل ہے۔

مقدار و ترکیب: اگر ام دن میں ۱ بار و ریدی بہت آہستہ لگائیں شدید حالت میں ۱ سے ۲ گرام سوزیم کلورائیڈ سولیوشن میں ۳۰ منٹ میں چڑھائیں۔ بچوں کو ۲۰ سے ۴۰ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے دن میں ۱ بار

منفی اثرات: عضلات کی کمزوری اور نقاہت میں نہ دینا چاہیے۔

مضر اثرات: چکر آنا دو تصادیر دکھائی دینا، خشکی در دسرمہ میں گرمی قے وجع القلب، رگوں میں کھنچاؤ اور پھیل جانا حرکات قلب کا بے ترتیب ہونا، سانس اور بلڈ پریشر میں اضافہ۔  
احتیاط: دوا کے استعمال سے پہلے انٹروپین کا استعمال ضرور کر لینا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

NEOPAM

(TROIKAA)

نیوپام

(PAM) 25mg per ml inj. 20ml amps: Rs.152.00

PAM-A INJ KOREA

(SHREE GANESH)

پام اے انجکشن

500mg per 20ml inj. vial 20ml: Rs.160.00

PAM-A TABS KOREA

(SHREE GANESH)

پام اے ٹبلٹ

500mg tab: 1: Rs.20.00



## معاون تشخیص مرکبات

### DIAGNOSTIC REAGENT

درم جگر بی وائرس ٹسٹ کے لئے HEPATITIS .B. LATEX  
AGGLUTINATION, QUICK TEST ہے

اس سے بی وائرس سے ہونے والے درم جگر کی جانچ بہت جلد اور آسانی سے ہو جاتی ہے تفصیلات کے لئے لٹریچر دیکھئے۔

### تجارتی مرکبات

HEPALEX

(BIOGENICS)

ایپالکس

Hepatitis B Latex Agglutination Quick Test.

### IODAMIDE

### آیوڈاماائیڈ

افعال و منافع: گردوں، پیزو Pelvis اور پیشاب کی نالی کی جانچ Pyelography کے لئے  
درید شکم، خون کی رگوں اور غد و لفاوی کی جانچ میں کام آتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲ سے ۴ ملی لٹر / فی کلوگرام وزن کے حساب سے۔

منفی اثرات: جگر گردوں و قلب کی کمزوری مانی لوما عظم غد در قیہ میں دینا مضر ہے۔

### تجارتی مرکبات

UROMIRO 24% INFUSION

(PHARMED)

یورومیروبوسل

### IOHEXOL

### آیو ہکسال

افعال و منافع: یہ پائی لوگرافی، سسٹی موگرافی، آنتوں کی جانچ، تھرامبوگرافی، ہڈیوں کی جانچ،  
یوروگرافی، پیشاب کی نالیوں کی جانچ، عروق قلبیہ کی جانچ میں مستعمل ہے۔



ترکیب و استعمال، منفی اور مضر اثرات، احتیاط کے لئے دوا کے ساتھ کا پرچہ دیکھئے  
تجارتی مرکب

OMNIPAQUE 140

(NYCOMED)

او مٹی پیک

**IOPANOIC ACID**

آیو پے نو ایک ایسڈ

افعال و منافع: مرارہ (پتہ) Gall Bladder اور اس کی نالیوں کی جانچ کے لئے مستعمل ہے۔  
مقدار و خوراک: ۳ گرام  
منفی افعال: جگر کی کمزوری عظم غدود رقیہ قلب و گردوں کی خرابی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

CISTOBIL TABS

(PHARMED) 6: tabs: Rs. 14.67

سسٹو بل ٹیبلٹ

IOPAC

(DEYS) 6: Rs. 54.00

آیو پیک

**IOPHEN DYLATE**

آیو فین ڈائی لیٹ

افعال و منافع: پائی لو گرائی، وین ٹری کیو لگرائی، بطون قلب کی جانچ ماور رحم میں بچے کی جانچ کے لئے مستعمل ہے۔

مقدار و ترکیب، مضر اثرات و احتیاط کے لئے دیکھئے پرچہ ترکیب استعمال۔

تجارتی مرکب

MYODIL

(GLINDIA)

مایوڈیل

**MEGLUMINE DIATRIZOATE** میگ لومین ڈایاٹرائی زوئیٹ

افعال و منافع: انجیو گرائی (عروق کی جانچ، یورو گرائی (عروق کلیہ کی جانچ) میں مستعمل ہے۔  
مقدار و خوراک، منفی و مضر اثرات و احتیاط کیلئے دیکھیں ساتھ والا پرچہ۔



## تجارتی مرکبات

ANGIOGRAFIN 65%  
UROGRAFIN  
UROVIDEO 76% INJ  
1x20ml: Rs.117.54

(GERMAN REMIDIES)  
(GERMAN REMIDIES)  
(PHARMED)

انجیوگرافین  
یوروگرافین  
یوروویڈیو انجکشن

## میگلو مین آیوڈوپامائیڈ MEGLUMIN IODOPAMIDE

افعال و منافع: پتہ کی پتھری اور پتہ کی نالیوں کی جانچ کے لئے مستعمل ہے۔  
منفی اثرات: دوران خون اور قلب کے فعل کی کمی میں، آیوڈین سے حساس اور غدہ درقیہ کے اضافہ میں جگر اور لردوں کی خرابی میں نہیں دینا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

BILIGRAFIN I.V. FORTE 50% (GERMAN REMEDIES) لی گرافین  
250mg per ml amp 10x20ml Rs.792.45

UROMIRO 24% INFUSION (PHARMED) یورو میرو

## میگلو مین آیوٹھالمیٹ MEGLUMINE IOTHALMATE

افعال و منافع: پیشاب کی نالیوں کی جانچ، دماغی عروق کی جانچ و رید شکم کی جانچ اور طی کے افعال کی جانچ قلبی عروق کی جانچ طحال کی جانچ ران کی و رید کی جانچ میں مستعمل ہے۔  
ترکیب استعمال: منفی، مضر اثرات کے لئے کمپنی کا پرچہ دیکھ کر استعمال کریں۔

## تجارتی مرکب

CONRAY-280 INJ  
inj; 20ml Rs.146.23

(RHONE POULENC)

کون رے انجکشن

## PRO PYLIODONE

## پروپائی لیوڈون

پھیپھڑوں کی بڑی عروق کی جانچ کے لئے مستعمل ہے۔  
(ترکیب استعمال، مضر و منفی اثرات و احتیاط کے لئے پرچہ ترکیب استعمال ملاحظہ فرمائیں)



## تجارتی مرکب

**DIONOSIL**

(GLINDIA)

ڈایونوسل

**SODIUM IOTHALMATE**

سوڈیم آیو تھال میٹ

استعمالات: گردوں کی عروق و رید شکم (اور طی) جوف صدر کی عروق، عروق قلبیہ طحال اور ران کی وریدوں کی جانچ میں مستعمل ہے۔

(مقدار منفی و مضر اثرات کے لئے ساتھ کا پرچہ ترکیب استعمال دیکھئے۔)

## تجارتی مرکب

**CONRAY 420 INJ**

(RHONE POULENC) 20ml:Rs. 180.11 ۴۲۰ روپے

ٹیوبریکیولین پیوریفائیڈ پروٹین ڈرائی ویٹو

**TUBERCULIN PURIFIED PROTIEN DERIVATIVE**

افعال و منافع: یرضی بی کی تشخیص کے لئے یہ انجکشن لگایا جاتا ہے۔

(ترکیب استعمال مقدار منفی و مضر اثرات کے لئے پرچہ ترکیب استعمال دیکھئے)

## تجارتی مرکب

**OLD TUBERCULIN**

(BHAGAT)

اولڈ ٹیوبریکیولین



اندرونی غدد کے افراز کو تحریک دینے والی ادویہ

**ENDOCRINE SYSTEM**

**ANABOLIC DRUGS**

**DE SOXY CORTI COSTERON** ڈی سکسی کارٹی کاسٹیرون

افعال و منافع: معمر افراد میں طاقت اور نئی توانائی پیدا کرنے لو بلڈ پریشر کے مریض، ہڈیوں کی کمزوری، اضمحلال، سنسٹی نقاہت میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ ملی گرام ہفتہ وار شدید حالت میں ۲۰ ملی گرام ہفتہ میں ابار دے سکتے ہیں۔

منفی افعال: حمل، ہائی بلڈ پریشر، قلب و جگر و گردوں کی خرابی میں مردوں کی چھاتیوں کے کینسر غده قدامیہ کے کینسر جسم میں پانی رکھنے میں استعمال نہیں کرانا چاہیے۔

احتیاط: مرگی شقیقہ Migraine ذیابیطیس میں احتیاط برتیں۔

تجارتی مرکب

DOCABOLIN (INI) 10ml per ml inj 1ml Rs.25.00 ڈوکابولین

**ETHYLESTRE NOL**

ایتھائل ایسٹری نال

افعال و منافع: مزمن بیماریوں کے سبب ہونے والی کمزوری، پروٹین کے انجذاب میں کمی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: بالغوں کو ۲ سے ۴ ملی گرام ۱۰ سے ۲۰ کلو وزن کے بچوں کو آدھی ملی گرام دن میں ۱ بار ۲۰ سے ۳۰ کلو کو ۱ ملی گرام ۳۰ کلو سے زائد وزن والوں کو ۵ ملی گرام یومیہ۔

منفی افعال: حمل، غده قدامیہ اور چھاتی کے کینسر، جگر کی شدید خرابی میں دینا منع ہے۔

تجارتی مرکب

ORABOLIN

(INFAR) 2mg:tabs: 10: Rs.19.70

اورابولین



## NANDROLONE

## نان ڈرولون

افعال و منافع: گردوں کی خرابی، زہریلی دواؤں، غذاؤں سے ہونے والا انیمیا اے پلاسٹک انیمیا، پستان کے کینسر طویل بیماریوں کے سبب ہونے والی کمزوری اور انیمیا میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰ سے ۲۰۰ ملی گرام ہفتہ میں ۱ بار

منفی افعال: حمل غدہ قدامیہ اور مردوں کی چھاتیوں کے کینسر میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: جسم میں پانی جمع ہونا، ورم تجج Oedema عورتوں میں مردانہ خصوصیات پیدا ہونا کیلیم میں اضافہ۔

احتیاط: جگر اور گردوں کی خرابی میں، ہائی بلڈ پریشر مرگی شقیقہ، ذیابیطیس کے مریضوں میں احتیاط برتیں دوران علاج پروٹین کی مقدار بڑھائیں۔

## تجارتی مرکبات

DECADURABOLIN	(INFAR) Rs.125.50	ڈیکاڈیورابولین
DECANEURABOL	(CADILA)	ڈیکانوروبال
25mg per ml inj. 1ml amp:	Rs.39.90	
DECA-NEUROPHEN INJ	(SWIFT)	ڈیکانورفین
25mg amp:	Rs.49.99, 50mg amp:	Rs.83.99
METADDEC	(JAGSONPAL)	میٹاڈیک
25mg: 1amp:	Rs.42.50, 50mg: 1amp:	Rs.74.25
MYOBOLIN	(MAX)	مایوبولین
25mg per ml amp:	Rs.36.80	

## نان ڈرولون فینائل پروپائی نیٹ

## NONDROLONE PHENYL PROPIONATE

افعال و منافع: مزمن بیماریوں کے سبب ہونے والی کمزوری، آپریشن جلنے اور حادثات کے سبب ہونے والی نقاہت، نظام استحالہ Metabolism کی خرابیاں ہڈیوں کی کمزوری میں مفید ہے۔



مقدار و ترکیب: ہالغوں کو ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام عضلاتی ہفتہ وار یا ۲ ملی گرام کھانے کے ساتھ ۶ سے ۱۲ سال کے بچوں کو ۵ سے ۱۵ ملی گرام عضلاتی انجکشن ہفتہ وار یا ۲ ملی گرام ہفتہ میں ۲ بار۔  
 منفی افعال: حمل چھاتیوں اور غدہ قدامیہ کے کینسر میں دینا منع ہے۔  
 مضر اثرات: تھج، ورم Oedema عورتوں میں مردانہ خصائل پیدا ہونا، کیلشیم میں اضافہ۔  
 احتیاط: عروق قلبیہ میں تنگی C.C.F. جگر اور گردوں کی خرابی میں ہائی بلڈ پریشر، مرگی، شقیقہ اور ذیابیطس میں احتیاط لازم ہے۔  
 دواؤں کا رد عمل: مانع انجماد خون اور محرک جگر ادویہ کے ساتھ دینا مناسب نہیں۔

### تجارتی مرکبات

DOCABOLIN	(INFAR) 25mg, 1ml amp: Rs.32.50	ڈوکابولین
DURABOLIN	(INFAR) 25mg 1ml :Rs.24.00	ڈیورابولین
EVABOLIN	(CONCEPT) 1amp: Rs.12.98	ایوایبولین
GROTHIC	(LYKA) 1ml:Rs.6.95, 5ml: Rs.23.08	گروٹھک
METABOL	(JAGSONPAL)	مینابول
Nadrolone phenylpropionate 25mg 1ml: Rs.17.50		نادرولون
NEURABOLINJ. (CADILA)		

### آکسی میتھولون OXY METHOLONE

افعال و منافع: اے پلاسٹک انیسیا میں بطور معاون ادویہ مستعمل ہے۔  
 مقدار و ترکیب: ۲ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے علاج ۲ سے ۶ ماہ جاری رکھیں۔  
 منفی افعال: حمل میں، مردوں کی چھاتیوں اور غدہ قدامیہ کے کینسر میں، عورتوں کے مخصوص اعضاء کے کینسر میں جگر و گردوں کی خرابی میں خراب اثر ہوتا ہے۔  
 مضر اثرات: جگر میں ٹیو مر کا خطرہ، یہ قان ورم جگر، عورتوں میں مردانہ خصائل، قبل از وقت بچے کی پیدائش، بندش حیض خون میں شحمی اور کیلیم کے اجزا میں اضافہ۔  
 احتیاط: امراض قلبیہ ذیابیطس ورم غدہ قدامیہ میں احتیاط رکھیں دوران علاج جگر کے فعل کی جانچ



کرائیں۔

دواؤں کا رد عمل: کارنی سون کے مرکبات اور مانع انجماد خون ادویہ۔

## تجارتی مرکب

ADROYD (PARKE DAVIS) 500mg: tabs: 100: Rs.256.50 ایڈروائیڈ

## STANOZOLOL

## اسٹے نوزولول

افعال و منافع: ایک زبردست محرک اور مقوی جسم دوا ہے جسم میں نئی انگ پیدا کرتی ہے۔ پروٹین کی کمی، ہڈیوں میں کمزوری اور اضمحلال، اندمال فریکچر میں تاخیر، عام جسمانی کمزوری، بیماریوں، کے بعد کی نقابت پیشاب کا خون میں سرایت کرنا، اسے پلاسٹک انیمیا، آپریشن کے بعد کی نقابت میں مفید ہے۔ مقدار خوراک: ۲ سے ۴ ملی گرام دن میں ۲ یا ۳ بار کھانے کے ساتھ کھلائیں۔

منفی افعال: غدہ قدامیہ کے کینسر میں مردوں عورتوں کی چھاتیوں کے کینسر میں، حمل، گردوں کی خرابی ورم گردہ، ذیابیطیس میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: جگر میں خرابی، عورتوں میں مردانہ خصوصیات، قبل از وقت بلوغت جلد پر دھبے پڑنا، بد ہضمی، تشنج عضلات، درد سر، عورتوں میں جسم پر بالوں کی زیادتی آواز باریک، جلد چکنی بالوں کا گرنا، مہاسے نکلنا، لڑکیوں میں بطر کا بڑا ہونا جنسی خواہش میں اضافہ، حیض کا بے ترتیب آنا مومے زیر ناف کا قبل از وقت نکلنا، فریسوس، معمر افراد میں غدہ قدامیہ کا بڑا ہونا پیشاب میں رکاوٹ ہو سکتی ہے۔

احتیاط: جگر گردوں اور قلب کے امراض میں حیض کی بے اعتدالی میں پیشاب میں شوگر اور جگر کے ٹسٹ کے نتائج میں، غدہ قدامیہ کے مہلک امراض میں اور بچوں میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کا رد عمل: خوردنی مانع انجماد خون ادویہ کے ساتھ خراب رد عمل ہوتا ہے۔

## تجارتی مرکبات

MENABOL (CFL PHARMA)

Stanozolol 2mg: tabs: 10: Rs.28.00

NEURABOL CAPS (CADILA)

Stanozolol 2mg: caps: 10: Rs.14.60

مینابول

نیورابول



## دافع ذیابیطس ادویہ

### ANTI DIABETIC DRUGS

#### SOLUBLE NEUTRAL انسولین نیوٹرل انسولین INSULINE

یہ انسولین تیل کے غدہ بانقرا سے تیار کی جاتی ہے ۴۰ سے ۸۰ یونٹ / فی ملی لٹر میں ملتی ہے۔  
افعال و منافع: ذیابیطس شکاری، نو عمروں کی ذیابیطس میں مفید ہے، انسولین پر انحصار کرنے والے (IDDM) مریضوں کے لئے نعمت ہے۔

مقدار و ترکیب: بالغوں اور بچوں کو عمر، مرض کی کیفیت کے لحاظ سے متعین کرنا چاہیے یہ زیر جلد اور وریدی لگائی جاتی ہے زیر جلد ۳۰ منٹ میں اثر کرتی ہے اس کا اثر ۶ سے ۸ گھنٹہ تک رہتا ہے وریدی انجکشن صرف ہنگامی حالت میں لگائیں انجکشن کے ساتھ ہی کھانے ناشتہ کا انتظام رکھیں۔  
منفی اثرات: خون میں شکر کی مقدار کم ہونے پر دینا خطرناک ہے۔

مضر اثرات: اچانک خون میں شکر کی مقدار کم ہو جانا، مقام انجکشن پر الرجی ورم جلد پر داغ پڑنا صدمہ کی کیفیت ہونا۔

احتیاط: اگر انسولین تبدیل کر کے لگانا پڑے تو بہت احتیاط سے لگائیں جگہ بدل کر لگائیں حمل کی حالت میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: کارٹی سون کے مرکبات خوردنی مانع حمل ادویہ، غدہ درقیہ کے ہارمون تھیازائیڈ مدربول ادویہ اور زیادہ مقدار میں دینے سے شدید رد عمل ہوتا ہے۔

#### تجارتی مرکبات

HUMAN ACTRAPHANE (TORRENT)  
40iu per ml inj. 10ml Rs.159.18

ہومن اکتراپھین



**HUMAN ACTRAPID** (BOOTS)

40iu per ml inj; 10ml vial Rs.170.00

ہیومن اکتراپڈ

**HUMAN MIXTARD** (BOOTS)

40iu per inj; 10ml vial Rs.170.00

ہیومن مکس ٹارڈ

**HUMAN NORDISULIN** (BOOTS)

40iu per ml inj; 10ml vial : Rs. 159.86

ہیومن نارڈی سولن

**INSULIN** (BOOTS)

40iu: 10ml Rs.33.50 80iu: 10ml: Rs.54.55

ان سولن

**MIXTARD** (BOOTS)

40iu per ml inj 10ml vial Rs.102.96

مکس ٹارڈ

## انسولین زنک سسپنشن INSULIN ZINC SUSPENSION

افعال و منافع: ہر قسم کی ذیابیطس شکاری میں مفید ہے ۸۰/۴۰ یونٹ / ملی لٹر میں ملتی ہے۔  
مقدار و ترکیب: مریض کی ضرورت کے مطابق زیر جلد انجکشن لگانے سے ۲ گھنٹہ میں پورا اثر ہوتا ہے ۲۴ گھنٹہ برقرار رہتا ہے یہ وریڈی نہیں دینا چاہیے۔  
منفی افعال: خون میں شکر کی مقدار کم ہونے پر دینا خطرناک ہے۔  
مضر اثرات: شکر کی مقدار گھٹ جانا، جلد اور آنکھوں پر رری ایکشن ہو سکتا ہے۔  
احتیاط: انسولین کی تبدیلی، انفکشن، حمل جگر و گردوں کی خرابی ذہنی اور دماغی الجھن میں احتیاط لازم ہے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: کارٹی سون کے مرکبات، خوردنی مانع حمل ادویہ، تھائی رائیڈ ہارمون، تھیازائیڈ مدرات بول کے ساتھ دینا خراب اثر کرتا ہے۔

## تجارتی مرکبات

**HUMAN MONOTARD** (BOOTS)

40iu 10ml vial: Rs.176.80, 100iu 10ml: Rs.431.34

ہیومن مونوٹارڈ

**INSULIN ISOPHANE (NPH)** (BOOTS)

40iu per ml inj; 10ml Rs.33.50

انسولین آئی سوفین



انسولین زنک لنٹے

**INSULIN ZINC (LENTE) (BOOTS)**

40iu; 10ml Rs.33.50 80iu; 10ml Rs.54.55

لنٹارڈ

**LENTARD**

(BOOTS)

Highly purified insulin zinc suspension (porcine) 40iu per ml inj;

10ml vial Rs.105.84

کسٹارڈ

**MIXTARD** (BOOTS)

40iu per ml inj 10ml vial Rs.102.96

مونوسولین

**MONOSULIN** (BOOTS)

40iu per ml inj 10ml vial Rs.102.30

مونوٹارڈ ایم سی

**MONOTARD MC** (TORRENT)

40iu per ml inj; 10ml : Rs.138.03

رے پی ڈی کا

**RAPIDICA** (SARBHAI)

40iu per ml inj; 10ml vial Rs.86.98

زنولین

**ZINULIN** (SARABHAI)

40iu per ml inj. 10ml vial: Rs.86.96

آئی سوفین انسولین کرشالین پروٹامین انسولین

**ISOPHANE INSULIN CRYSTALLINE  
PROTAMINE INSULINE**

یہ بھی نیل کے غدہ بانقرا سے تیار کی جاتی ہے ۴۰ یونٹ / ملی لٹر کی طاقت میں آتی ہے۔

افعال و منافع: ہر قسم کی ذیابیطیس شکر کی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: بالغوں اور بچوں کو ضرورت اور مرض کے مطابق مقدار کا تعین کریں۔ زیر جلد

انجکشن لگایا جاتا ہے ۲ گھنٹہ میں پورا اثر ہوتا ہے ۱۸ سے ۲۸ گھنٹہ تک برقرار رہتا ہے وریڈی ہرگز نہیں

لگانا چاہیے۔

منفی افعال: شکر کی مقدار کم ہونے میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: بصارت میں فرق خون میں شکر کی مقدار گھٹ جانا، مقامی الرجی، صدمہ کی کیفیت۔

احتیاط: تبدیلی انسولین میں، انفکشن حمل، جگر گردوں کی خرابی نفسیاتی الجھن میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کا رد عمل: کارٹی سون کے مرکبات، خوردنی مانع حمل ادویہ، تھائی راکسین، تھیازائیڈ، مدرات



بول، مینا بلاکنگ ایجنٹ MAOI کے ساتھ دینا خراب اثر کرتا ہے۔

## تجارتی مرکبات

<b>ACTRAPID</b>	(ORRENT)	10ml Rs.102.18	اکٹراپڈ
<b>ACTRAPID-MC</b>	(ORRENT)		اکٹراپڈ ایم سی
<b>HUMAN INSULATARD</b>	(BOOTS)		ہیومن ان سولے ٹارڈ
10ml vial: Rs.170.00			
<b>ILETIN-R</b>	(LILY RANBAXY)		آئی لے ٹن۔ آر
40iu per ml inj. 10ml vial: Rs.54.64			
<b>ILETIN-N</b>	(LILY RANBAXY)		آئی لے ٹن۔ این
40iu per ml inj. 10ml Rs.54.80			
<b>ILETIN-L</b>	(LILY RANBAXY)		آئی لے ٹن۔ ایل
40iu per ml inj. 10ml vial: Rs.65.08			
<b>INSULATARD</b>	(BOOTS)		ان سولے ٹارڈ
10ml vial: Rs.104.68			
<b>INSULIN PROTAMINE ZINC</b>	(BOOTS)		ان سولن پروٹامن زنک
10ml: Rs.33.50			
<b>RAPIDICA</b>	(SARABHAI)		رے پی ڈی کا
40 iu per ml inj. 10ml vial: Rs.86.98			

خوردنی دافع ذیابیطیس ادویہ

## ORAL ANTI DIABETICS

### CHLORPROPAMIDE

کلور پروپامائیڈ

افعال و منافع: ذیابیطیس شکر میں کوئی پیچیدگی نہ ہو وہ ذیابیطیس جو غذا سے کنٹرول نہ ہو سکے مفید ہے۔ یہ جسم میں انسولین کی مقدار میں اضافہ کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵۰ ملی گرام دن میں ۱ بار ناشتہ کے فوراً بعد ۳ سے ۷ دن بعد نتائج کے لحاظ سے مقدار میں کمی بیشی کی جاسکتی ہے۔ اس کے ساتھ انسولین و دیگر خوردنی ادویہ کی مقدار میں کمی کر دیں۔



منفی اثرات: حمل، آپریشن، الجھن، انفکشن، شدید چوٹ، جگر گردوں اور غدہ درقیہ کی خرابی میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: یرقان، جلد پر داغ پڑنا، تھراپین اور لیو کو سائیٹ کی کمی انیمیا، فتور ہضم ہو سکتا ہے۔

احتیاط: شرابیوں، خون میں شکر کی کمی میں، انسولین کے بعد اور شراب کے ساتھ احتیاط رکھیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: دافع انجماد خون ادویہ MAOI سیلی سائی لیٹ اور بیٹا بلا کر سے اثرات میں اضافہ ہوتا ہے۔

## تجارتی مرکبات

CHLORFORMIN	(CADILA) 10, Rs.3.20	کلور فارمین
COPAMIDE	(DEYS) 250mg tabs 10: Rs.5.25	کوپامائیڈ
DIABINESE	(PFIZER)	ڈیابے نیر
tabs 100mg: 10: Rs.4.79	250mg; 10; Rs.7.60	

## GLIBENCLAMIDE

## گلائی بن کلامائیڈ

افعال و منافع: یہ ایک اہم دافع ذیابٹس دوا ہے۔ یہ بٹاسیل کو تحریک پہونچا کر غدہ بانقرا سے انسولین کے اخراج میں اضافہ کرتی ہے۔

ذیابٹس کی نمبر (۲) کی دوا ہے جو مریض انسولین پر انحصار نہیں کرتے (NIDDM) کے لئے ایک نعمت ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵ء ۲ ملی گرام دن میں ۱ بار ناشتہ کے ساتھ ضرورت کے مطابق مقدار میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: متلی، تے معدہ میں بھاری پن، لیو کو سائیٹ اور تھراپین کی کمی، انیمیا، یرقان شحمی ورم جگر دوا سے ری ایکشن ہو سکتا ہے۔

احتیاط: ضعف و نقاہت میں قلب کے خطرناک مریضوں میں احتیاط برتنا چاہیے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب، بیٹا بلا کر، ہائی گوانائیڈ، کلورم فینی کال، فین فلورامین، MAOI مائی کو نازول، فینا کل بوتازون، سیلی سیلیٹ سلفن پارازون فاسفامائیڈ، ٹراسا نکلین، کارٹی سون کے



مرکبات، مدرات بول، ایسٹروجن فینو تھیازون، تھائراکسین کے ساتھ رد عمل خراب ہوتا ہے۔

## تجارتی مرکبات

<b>BETANASE</b>	(ALIDAC)	بٹانیس
Glibenclamide 5mg tabs 10:	Rs.1.56	
<b>DAONIL</b>	(HOECHST)	ڈائل
Glibenclamide 5mg tabs 10:	Rs.3.90	
<b>EUGLUCON</b>	(BOEHRINGER)	یو گلو کون
Glibenclamide 5mg tabs 10:	Rs.3.90	
<b>GLUCORED</b>	(SUN PHARMA)	گلو کورڈ
Glibenclamide 2.5mg tmetformin 400mg: tabs: 10:	Rs.6.50	
<b>SEMI DAONIL</b>	(HOECHST)	سی ڈائل
Glibenclamide 2.5mg tabs 10:	Rs.2.60	
<b>SEMI EUGLUCON</b>	(BOEHRINGER)	سی یو گلو کون
Glibenclamide 2.5mg tabs 10:	Rs.3.37	

## GLICLAZIDE

## گلائی کلازائیڈ

افعال و منافع: ذیابیطیس شکر کی لائن نمبر ۲ کی دوا ہے انسولین پر انحصار نہ کرنے والوں (NIDDM) کے لئے بہترین دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۶۰ ملی گرام یومیہ دو خوراکوں میں تقسیم کر کے دی جائے ضرورت کے مطابق ۸۰ سے ۳۲۰ ملی گرام تک دی جاسکتی ہے۔

منفی اثرات: کوما اور خون میں تیزابی مادوں KETOSIS میں نوعمر مریضوں میں جگر اور گردوں کی شدید بیماریوں، حمل اور ایام رضاعت میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: خون میں شکر کی مقدار کم ہو جانا، ہضم کی خرابیاں، سردرد، ری ایکشن تھکاوٹ سستی۔

احتیاط: مریضوں کو خون میں شکر کم ہونے سے آگاہ کر دینا چاہیے انسولین کے ساتھ بہت احتیاط سے دیں دواؤں کا رد عمل: شراب، پائی رازول کے مرکبات سیلی سائی لیٹ، فینائل بیوٹازون سلفانو مائیڈ، مانع



انجماد خون بیٹا بلا کر، MAOI، نٹراسا نکلیں، کلوروم فینی کال باربی ٹون کے مرکبات کے ساتھ اثرات خراب ہوتے ہیں۔

## تجارتی مرکبات

**DIABEND** (MICRO LABS)

ڈیابنڈ

Gliclazide 80mg tabs 6 Rs.52.80

**GLIZID** (PANACEA)

گلائیزائیڈ

Gliclazide 80mg tabs 10: Rs.49.00

## GLIPIZIDE

## گلائیزائیڈ

افعال و منافع: ذیابیطیس شکاری کے وہ مریض جو انسولین پر منحصر نہیں ہیں (NIDDM) ان کے لئے ایک بہترین ذوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲.۵ سے ۵ ملی گرام یومیہ کھانے سے ۳۰ منٹ پہلے ضرورت پر ۲.۵ ملی گرام ہر ہفتہ کے حساب سے اضافہ کیا جاسکتا ہے زیادہ سے زیادہ ۲۰ ملی گرام روزانہ ۲-۳ خوراکیوں میں تقسیم کر کے دینا چاہیے، معمر افراد کو مقدار کم دیں۔

منفی اثرات: حمل، بے چینی، ذیابیطیس کو ما، نو عمر مریضوں کو، جگر گردوں اور کلاہ گردہ کے مریضوں کو دینا خطرناک ہے۔

مضر اثرات: متلی اسہال ری ایکشن، چکر آنا، فم معدہ پر درد قبض خشکی سردرد، کی شکایت ہو سکتی ہے۔

دواؤں کا رد عمل: ڈائی کومارول MAOI سلفونامائیڈ فینائل بیوٹازون، کلوروم فینی کال، پروپینی سڈ، سیلی سیلٹ سے دوا کے اثرات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اڈرینالین، کارٹی سون کے مرکبات مانع حمل ادویہ کے ساتھ اثرات کم ہو جاتے ہیں۔

## تجارتی مرکبات

**GLIBETIC** (LA PHARMA)

گلائیزائیڈ بے ٹک

Glipizide 5mg tabs 10: Rs.7.00



**GLIDE** (FRANCO INDIAN)

گلائڈ

Glipizide 5mg tabs 10: Rs.5.80

**GLUCOLIP** (WALLACE)

گلو کولپ

Glipizide 5mg tabs 10: Rs.8.50

**GLUCOTROL** (JENBURKT)

گلو کوٹرول

Glipizide 5mg tabs 20: Rs.17.30

**GLYNASE** (U.S. VITAMIN)

گلائی نیس

Glipizide 5mg tabs 10: Rs.8.69

## GLUCAGON

## گلو کا گون

افعال و منافع: خون میں شکر کی شدید کمی کی حالت میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۰.۵ سے ۱ ملی گرام زیر جلد عضلاتی یا وریدی انجکشن لگائیں۔

منفی اثرات: خون میں گلائی کو جن کی زیادتی میں انسولین اور وارفارین کے ساتھ دینا خطرناک ہے۔

احتیاط: حمل اور ایام رضاعت میں۔

## تجارتی مرکب

**GLUCAGON**

(TORRENT)

گلو کا گون

Glucagon as Hcl 1mg per ml inj. vial Rs.330.00

## METFORMIN

## میٹ فارمین

افعال و منافع: یہ دوا بانقرا س کے فعل میں اضافہ کرتی ہے۔ فربہ افراد کی ذیابیطیس شکر، ایسی ذیابیطیس جو غذا اور جسمانی ورزش سے کنٹرول میں نہ آسکے انسولین پر انحصار (IDDM) کرنے والوں کو بطور معاون دی جاتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵۰ ملی گرام دن میں ۲ بار کھانے کے فوراً بعد مقدار آہستہ آہستہ بڑھائی جاسکتی ہے زیادہ سے زیادہ ۳ گرام دے سکتے ہیں۔

منفی اثرات: ذیابیطیس کو مابین خون میں تیزابی مادے کی زیادتی میں جگر اور گردوں کے شدید امراض میں قلبی عروق کی تنگی میں شریبوں میں اور آکسیجن کی کمی دینا خطرناک ہے۔



مضر اثرات: ہائے کی خرابی۔

احتیاط: دیگر دافع ذیابیطیس دواؤں کے ساتھ حمل میں شدید انفکشن، چوٹ اور آپریشن سے احتیاط لازم ہے۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: شراب مد رات بول مانع انجماد خون ادویہ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

<b>DIAPHAGE</b>	(WALLACE)	ڈیافج
500mg; 10: Rs.6.40	850mg; 10: Rs.10.70	
<b>GLYCIPHAGE</b>	(FRANCO) 0.5g; tabs 10: Rs.6.30	گلائی سی فج
<b>GLYCOMET</b>	(USV) 500mg; tabs 10: Rs.6.25	گلائی کو میٹ
<b>GLUFORMIN</b>	(BOEHRINGER)	گلو فار من
Metformin 500mg; tabs: 10: Rs.6.50		
<b>METMIN</b>	(JENBURKT)	میٹ من
Metformin 500mg; tabs: 10: Rs.6.95		

## PHENFORMIN

## فین فارمین

افعال و خواص: ذیابیطیس کی ابتدائی اور ثانوی حالت میں مفید ہے۔ انسولین کے ساتھ بطور معاون استعمال کرائی جاتی ہے۔ مستقل و عارضی، بالغوں و نوجوانوں کی ذیابیطیس میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵ ملی گرام ۱ سے ۴ مرتبہ روزانہ مریض کی ضرورت کے مطابق ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام روزانہ ناشتہ کے ساتھ دینا چاہیے۔

منفی اثرات: بچوں کی ذیابیطیس میں خون میں تیزابی اثر کوما، انفکشن غانفرانا Gangrene آپریشن کے دوران یا بعد، قلب و جگر و گردوں کی خرابی میں آکسیجن کی کمی میں دینا خطرناک ہے۔

مضر اثرات: فتور، ہضم تیزابیت پیدا ہونا۔

احتیاط: بھوک کے وقت خون میں شکر کی مقدار کم ہونے اور حمل میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کا رد عمل: شراب مانع انجماد خون ادویہ کے ساتھ خراب اثر ہوتا ہے۔



## تجارتی مرکبات

**CHLORFORMIN**

(CADILA)

کلور فارمین

Chlorpropamide 50mg, phenformin hcl 25mg, tabs 10: rs. 2.90

**DBI**

(U S VITAMIN)

ڈی بی آئی

Phenformin hcl 125mg, tabs 10: Rs. 6.96

**DBI-TD**

(U S VITAMIN)

ڈی بی آئی۔ ٹی ڈی

Phenformin hcl 50 mg caps, 15: Rs. 16.80

## TOLBUTAMIDE

ٹالبوٹامائیڈ

افعال و منافع: ذیابیطیس شکری پختہ جو مزمن ہو چکی ہو مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۱ گرام دن میں ۲ بار ۴ سے ۵ دن تک بعد میں ۰.۵ گرام سے ۲ گرام تک مریض کی ضرورت کے مطابق دی جائے دوا کھانے کے بعد کھلائیں۔

منفی افعال: خون میں تیزابیت Ketosis نو عمروں کی ذیابیطیس جگر گردوں اور کلاہ گردہ کے امراض بے چینی، الجھن ذیابیطیس کو مایوس مضر ہے۔

مضر اثرات: ہاضمے کی خرابیاں حساسیت، تھراپین اور لیو کو سامیٹ کی کمی انیسیا۔

دواؤں کا رد عمل: بیٹا بلاکر، پروپنی سڈ بائی گوانائیڈ، کلورم فینی کال فین فلورامین MAOI فناکل بیوٹازون سلی سیلیٹ شراب، سلفن پائی رازین اور ٹراسا نکلمین کے ساتھ دوا کے اثر میں تیزی آتی ہے۔ کارٹی سون کے مرکبات مدرات بول، دست آور ادویہ اسٹروجن کونٹینک ایسڈ فینو تھیازین، تھائی راکسین سے اثر میں کمی ہوتی ہے۔

## تجارتی مرکب

**RASTINON**

(HOECHST)

ریشیٹان

Tolbutamide 0.5g: tabs 10, Rs. 6.50



## کارٹی سون کے مرکبات

### CORTICOSTEROID

#### بیگلو میتھاسون ڈی پروپی نیٹ BECLO METHASONE DIPRO PIONATE

افعال و منافع: یہ ایک دافع ورم کارٹی سون کا مرکب ہے جو بذریعہ ناک بطور نسوار استعمال کیا جاتا ہے۔ پھیپھڑوں کے دمہ، بلغمی دمہ کے پرانے مریضوں کے لئے مفید و موثر ہے۔  
مقدار و ترکیب: بالغوں کو ۱۰۰ مائیکرو گرام یا ۲ بار سو گھنٹہ میں ۲۴ گھنٹوں میں ۲۰ بار تک سو گھنٹہ سکتے ہیں شدید حالتوں میں ۶۰۰ سے ۸۰۰ مائیکرو گرام تک یومیہ دے سکتے ہیں  
منفی افعال: دمہ کے شدید دورے میں دوا سے حساس مریضوں کو استعمال نہیں کرانا چاہیے۔  
احتیاط: کارٹی سون تھیراپی کے ساتھ اس کا دینا خطرناک ہے موت تک ہو سکتی ہے۔  
لہذا کارٹی سون تھیراپی سے قبل اس کو روک دینا چاہیے۔

#### تجارتی مرکبات

BECLATE INHALER (CIPLA) بیک لیٹ ان ہیلر  
50mcg, Rs. 100.86, 200 doses, 100mcg 200metered doses Rs.128.00,  
200mcg. Rs.156.80  
BECLATE ROTACAPS (CIPLA) بیک لیٹ روٹاکیپ  
100mcg 30rotacaps: Rs.24.75 200mcg 30: Rs.36.93

#### BETA METHASONE

#### بٹا میتھاسون

افعال و منافع: شدید دمہ الرجی، نزلاوی بخار تھج المفاصل، خطرناک انفکشن میں انٹی بائیوٹک کے ساتھ، اور لوبلڈ پریشر میں مفید رہتی ہے۔  
مقدار و ترکیب: ابتدا میں ۵۰ ملی گرام سے ۵ ملی گرام تک یومیہ دے سکتے ہیں رفتہ رفتہ کم کرنا



چاہیے۔  
**منفی اثرات:** ٹی بی میں، مقامی انفکشن، زخم معدہ، نفسیاتی عوارض ہڈی نرم ہونے، گردوں کی خرابی  
 ذیابیطیس شکری، گلا کوماہائی بلڈ پریشر، عضلات کی کمزوری، انجماد خون کی صلاحیت میں کمی عروق قلبیہ میں  
 انقباضی کیفیت اور حمل میں دینا خطرہ سے خالی نہیں۔  
**مضر اثرات:** جسم میں پانی اور نمکیات کا رکنا، ہضم، عضلات و اعصاب جلد آنکھ غدود پر برا اثر پڑتا  
 ہے۔ قوت مدافعت کمزوری ہوتی ہے۔  
**احتیاط:** کارٹی سون کے مرکبات کو رفتہ رفتہ بند کرنا چاہیے۔  
**دواؤں کا رد عمل:** سیلی سیلیٹ، فینو باربی ٹون، فین ٹائن خوردنی دافع تیزابیت ادویہ کے ساتھ دینا  
 مناسب نہیں۔

## تجارتی مرکبات

<b>BENICORT INJ</b> (P&B LABS)	بنی کارٹ انجکشن
inj 3x1ml Amp. Rs.16.19	
<b>BENICORT ORAL DROPS</b> (P&B LABS)	بنی کارٹ ڈراپس
15ml Rs.11.23	
<b>BENICORT TABS</b> (P&B LABS) 25X10 Rs.98.46	بنی کارٹ ڈراپس
<b>BETACORTIL</b> (PFIZER) 1mg: 10: Rs.4.72	بٹاکارٹیل
<b>BETNILAN</b> (GLAXO)	بٹنی لان ٹبلٹ
0.5mg: 10: Rs.4.96; 1mg: 10 Rs.5.10	
<b>BETNESOL</b> (GLAXO)	بٹنی سول ٹبلٹ
0.5mg: 10: Rs.4.95, 1mg: 10: Rs.9.57	
<b>BETNESOL INJ</b> (GLAXO)	بٹنی سول انجکشن
4mg per ml inj 6x1ml: Rs.5.61	
<b>BETNESOL ORAL DROPS</b> (GLAXO) 15ml:Rs.10.41	بٹنی سول ڈراپس
<b>CELESTONE</b> (FULFORD)	کیلستون ٹبلٹ
0.5mg: 10's Rs.5.50, 1mg: 10's Rs.10.91	
<b>CELESTONE PEDIATRIC DROPS</b> (FULFORD)	کیلستون ڈراپس
10ml: Rs.10.41	



CELESTONE INJ	(FULFORD) 2ml: Rs. 13.82	کیلٹون انجکشن
CORTIL	(MICRO LABS)	کارٹل
SOLUBET	(LUPIN) 1mg: 10x10: Rs. 61.20	سالوبٹ
SOLUBET INJ	(LUPIN) 4mg per ml inj 3x1ml: Rs. 61.20	سالوبٹ انجکشن
SOLUBET ORAL DROPS	(LUPIN)	سالوبٹ ڈراپس
STEMIN	(SWIFT)	اسٹے من
0.5mg: 15x10: Rs. 99.90, 1mg: 15x10: Rs. 189.90		
STEMIN INJ	(SWIFT) 1ml amp Rs. 6.60	اسٹے من انجکشن
STEMIN ORAL DROPS	(SWIFT) 15ml Rs. 13.98	اسٹے من ڈراپس
SYSTACORT	(SYSTOPIC)	سٹاکارٹ
0.5mg: 10: Rs. 3.90, 1mg: 10: Rs. 7.63		
WALACORT	(WALLACE)	ولے کارٹ
Betamethasone 0.5mg tabs 10: Rs. 4.15		

## CLOBETASONE

## کلو بیٹاسون

افعال و منافع: یہ بیرونی استعمال کے لئے کارٹی سون کا مرکب ہے، معمولی انگیزیا، جلد کا متورم ہونا، ایسے امراض جن میں دوسری دوائیں بے اثر ہو چکی ہوں اس کا استعمال مفید ہے۔  
 مقدار و ترکیب: متاثرہ مقام کو اچھی طرح صاف کر کے دن میں ۳-۴ بار دوا لگائیں۔  
 منفی اثرات: انفکشن کے سبب جلد کا متورم ہونا، ہرپیز، چکن پاکس فنگس کنڈیڈا، بیکٹریا سے ہونے والا انفکشن اور حصصہ Pemphigus میں اور دوا سے حساس مریضوں کو استعمال نہ کرائیں۔  
 احتیاط: انفکشن کی حالت میں مناسب انٹی بائیوٹک کے ساتھ استعمال کرائیں، علاج ۷ دن سے زیادہ جاری نہ رکھیں۔

(تجارتی مرکبات کے لئے بیرونی استعمال کی دوائیں Tropical Preparation دیکھئے)

## DEXAMETHASONE

## ڈیکسامیٹھاسون

افعال و منافع: صدمات، انفکشن، خون میں زہریلے اثرات، شدید، ری ایکشن، الرجی، تھج الفاصل، جلدی بیماریوں، میں مفید و موثر ہے۔



مقدار و ترکیب: ۳ سے ۶ ملی گرام تک ضرورت کے مطابق۔

منفی اثرات: ٹی بی میں، ہرپیز سمپلکس، فنگل انفکشن ذیابیطیس ہڈیوں کی کمزوری نفسیاتی الجھن، گلوکوما، زخم معده ہائی بلڈ پریشر قلب میں تنگی، رگوں میں خون جمنے کا رجحان گردوں کی کمزوری میں دینا مضر ہے۔  
مضر اثرات: بسم میں پانی رکنا، فتور ہضم، عضلات و اعصاب غد و نظام استحالہ Metabolism کی خرابیاں ہو سکتی ہے۔

احتیاط: کارنی سون کے مرکبات کے ساتھ قوت مدافعت پیدا کرنے والے انجکشن (ویکسین سیرم) نہیں دینا چاہیے دوا آہستہ آہستہ بند کریں۔

دواؤں کا رد عمل: ایفیڈرین، فینوباربیٹون، فین ٹائن ریقام پی سین مانع انجماد خون ادویہ کے ساتھ دینا نقصان دہ ہے۔

## تجارتی مرکبات

**DECDAN INJ (MERIND)**

4mg per ml inj 2ml Rs. 10.19

**DECDAN TABS (MERIND)**

0.5mg tabs: 10, Rs. 2.47

**DEXONA INJ. (HEALTH CARE (CADILA)**

4mg per ml inj 2ml: Rs. 9.81

**DEXONA TABS (HEALTH CARE (CADILA)**

0.5mg tabs 10: Rs. 2.37

**DEXONA ORAL DROPS (HEALTH CARE (CADILA)**

10ml Rs. 5.91

**IDIZONE (IDPL)**

tabs: 10: Rs. 2.44, inj. Dexamethasone 4mg per Rs. 9.58

**MYCIDEX INJ (MAC) Rs. 10.40**

**MYCIDEX TAB (MAC) 10: Rs. 3.36**

**STEDEX INJ (SWIFT) 2ml vial: Rs. 9.32**

**WYMESONE (SWIFT) 10: Rs. 2.65**

**WYMESONE INJ (SWIFT) 2ml: Rs. 10.29**

ڈیکاڈان انجکشن

ڈیکاڈان ٹبلیٹ

ڈیکسونا انجکشن

ڈیکسونا ٹبلیٹ

ڈیکسونا ڈراپس

آئی ڈی زون

مائی سی ڈیکس

مائی سی ڈیکس ٹبلیٹ

اسٹی ڈیکس

وائی می سون

وائی می سون انجکشن



## ہائی ڈروکارٹی سون ایسی ٹیٹ

### HYDRO CORTISONE ACETATE

افعال و منافع: تحجر المفاصل (ہڈیوں کا پتھرانا) الرجی، بلغمی جملی کے متورم اور مترشح ہونے میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی گرام ۵ ملی لٹر محلول میں زیر جلد یا جوف صدر میں لگایا جاتا ہے۔ وریڈی یا عضلاتی نہیں لگایا جاتا ہے۔

منفی افعال: نی بی کے اثرات، ہرپیز سمپلکس، فنکشنل انفیکشن ذیابطیس ہڈیوں کا انکسار نفسیاتی الجھن گلوکوما، زخم معدہ و ضعف عضلات ہائی بلڈ پریشر عروق قلبیہ میں تنگی، انجماد خون کار حجاب، ضعف گرد و میں دینا نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: ہڈیوں میں انکسار ہونا، جسم میں پانی نمکیات کا عدم توازن زخم معدہ ہو سکتا ہے۔  
احتیاط: کارٹی سون مرکبات کے ساتھ ایسوانٹی پیدا کرنے والے مرکبات استعمال نہ کرائیں۔

### تجارتی مرکبات

**CORT-S (NEON)**

4mg per ml inj 2ml vial Rs.8.00

**EFCORLIN PELLETS (GLAXO)**

**EFCORLIN INJ (GLAXO)**

**HYDROCORTISONE INJ (ROSSEL)**

5x2ml Rs.41.00

**WYCORT INJ (WYETH)**

5ml: Rs.22.00

کارٹ ایس

ایف کارلن  
ایف کارلن انجکشن  
ہائیڈروکارٹی سون انجکشن

وائی کارٹ انجکشن



## میٹھائل پریڈنی سولون ایسی ٹیٹ

### METHYL PREDNISOLONE ACETATE

افعال و منافع: بلغمی دمہ، شدید الرجی، جلدی امراض، تھجرفاصل، غشاء مخاطی کے ورم میں مفید ہے۔  
 مقدار و ترکیب: دمہ الرجی میں ۸۰ سے ۱۲۰ ملی گرام جلدی امراض میں ۴۰ سے ۱۲۰ ملی گرام بڑے  
 جوڑوں کے درد میں ۱۰ سے ۴۰ ملی گرام چھوٹے جوڑوں کے درد میں ۴ سے ۱۰ ملی گرام۔  
 منفی اثرات: ہرپیز کمپلکس میں، پوٹوں کے ورم نفسیاتی الجھن ٹی بی، زخم معدہ کشنگ سنڈروم،  
 آنٹوں کے آپریشن اور پیچیدگی میں ہڈیوں کے انکسار ضعف گردہ ذیابیطیس ہائی بلڈ پریشر مقامی اور فنکس  
 انفکشن میں نہیں دینا چاہیے۔

### تجارتی مرکبات

DEPO-MEDROL	(MAX)	ڈپو میڈورال
Methylprednisolone acetate 40mg per ml inj. 2ml:	Rs.42.00	
SOLU-MEDROL	(MAX)	سالو میڈورال
500mg: 8ml amp: Rs.440.00, 1g: 16ml amp:	Rs.715.00	
UNIDROL	(UNISEARCH)	یونی ڈرول
40mg per ml inj 2ml vial: Rs.62.00, 1ml vial:	Rs.37.50	

### PREDNISOLONE

### پریڈنی سولون

افعال و منافع: دمہ شدید الرجی، لیوکیما، تھجرفاصل، کولے گن ڈیزیز جلد کا متورم ہونا گردوں کی  
 بیماریاں، ورم قولون، چھالے پڑنا ورم امعاء جلد میں گانٹھیں پڑنا مفاصلی ورم غلاف القلب کمر کی ہڈی میں  
 ورم، ہیملوائی ٹک انیمیا تھراپین کی کمی کے سبب زیر جلد نرف الدم میں مفید ہے۔  
 مقدار و ترکیب: خوراک کا تعین مرض کی کیفیت کے مطابق، مختصر مدت کے لئے ۲۰ سے ۳۰ ملی  
 گرام ابتدائی چند دن تک پھر آہستہ آہستہ ۲۵ سے ۵ ملی گرام کم کرتے رہیں تھجرفاصل کے لئے ۷۵  
 سے ۱۰ ملی گرام یومیہ ۱ سے ۳ ہفتہ تک دی جائے۔  
 منفی اثرات: شدید انفکشن میں اس انفکشن کی خصوصی دوا کے ساتھ دی جائے۔



مضر اثرات: موتیابند، گلوکوما، ہڈیوں کی خرابی، زخم معدہ بچوں میں نشوونما میں کمی۔  
احتیاط: حمل، ذیابیطیس اور مدافعتی انجکشن سے احتیاط رکھیں۔

## تجارتی مرکبات

<b>DELTACORTAL</b>	(PFIZER)	ڈیلٹاکارٹل
5mg: 10: Rs.11.50; 10mg: 10: Rs.21.65		
<b>HOSTACORTIN</b>	(HOECHST)	ہوسٹاکارٹن
Prednisolone 5mg 10: Rs.3.35		
<b>WYSOLONE</b>	(WYETH)	والی سولون
5mg: 10: Rs.4.94 10mg: 10: Rs.14.00 20mg: 6: Rs.16.00		

## TRIAMCINOLONE

## ٹرائم سی نولون

افعال و خواص: دمہ الرجبی، جلدی امراض، تخریف المفاصل (جوڑوں کا پتھرانا) مفاصلی اور ام کلاہ گردہ کی خرابیاں کو لے گن ڈیزیز (نرم ساختوں میں خرابی) میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۳۴ کلوگرام وزن سے زائد وزن والوں کو ۸ سے ۱۶ ملی گرام یومیہ دن میں ابار ایک متعین وقت پر دی جائے ۳۴ کلو وزن سے کم کو ۴ سے ۱۲ گرام یومیہ، اتفاق ہونے پر مقدار کم کر کے ۱ سے ۲ ملی گرام موثر مقدار تک دینا چاہیے۔ انجکشن ۲.۵ سے ۱۵ ملی گرام جوڑوں کے درمیان یا ۲ سے ۳ ملی گرام زیر جلد لگائیں، وریدی نہیں لگانا چاہیے عضلاتی انجکشن ۴۰ سے ۶۰ ملی گرام گہرا کوہے پر لگائیں پولن الیٹھما (الرجبک دمہ) میں ۴۰ سے ۱۰۰ ملی گرام کا ایک ہی انجکشن لگائیں بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔  
احتیاط: فنگل اور وائرل انفکشن میں اس کے ساتھ مخصوص دوا ضرور دینا چاہیے حاملہ اور مرضہ کو

احتیاط، زیادہ دن استعمال نہ کریں

منفی اثرات: زخم معدہ، آنتوں میں خرابی، ہائی بلڈ پریشر، ہڈیوں کی کمزوری، ذیابیطیس میں استعمال نہ کرانیں، مدافعتی انجکشن (ویکسین، سیرم) ساتھ میں نہ دیں۔

مضر اثرات: زخم معدہ آنتوں کی خرابی، ہائی بلڈ پریشر، ہڈیوں میں کمزوری ذیابیطیس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ طویل عرصہ علاج سے کلاہ گردہ کے فعل میں کمی آتی ہے۔



## تجارتی مرکبات

<b>KENACORT</b>	(SARABHAI)	کیناکارٹ ٹبلٹ
Triancinolone 4mg tabs: 10: Rs.15.00		
<b>KENACORT INJ</b>	(SARABHAI)	کیناکارٹ انجکشن
10mg and 40mg 1ml vial Rs.37.21; 10mg. 1ml s.19.17		
<b>LEDERCORT</b>	(LEDERLE) 4mg tabs 10: Rs.14.74	لیڈرکارت
<b>TRICORT-10</b>	(CADILA)	ٹرائی کارٹ ۱۰
10mg per ml inj 1ml amp Rs.11.00		
<b>TRICORT-40</b>	(CADILA)	ٹرائی کارٹ ۴۰
40mg per ml unj 1ml amp: Rs.26.98		

## غده درقیہ و انتی غده درقیہ ادویہ

## THYROID, ANTI THYROID DRUGS

### CARBIMAZOL

### کاربیمازول

افعال و منافع: مرض کھیکھا Goitre، غده درقیہ کے پھول جانے غده درقیہ کے آپریشن کی تیاری کے لئے مستعمل ہے۔

مقدار و ترکیب: بالغوں کو ۱۵ سے ۳۵ ملی گرام روزانہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے بعد کو ۲.۵ سے ۲۵ ملی گرام روزانہ ۱۲ ماہ تک بچوں کو ۵ سے ۱۵ ملی گرام ابتدا میں کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔  
منفی اثرات: ہوائی نالی کی رکاوٹ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: جلد پرداغ پڑنا، متلی، درد سر، جوڑوں میں درد مخ العظام میں کمزوری فتورہضم، حمل میں بچے کو Goitre بن سکتا ہے حلق میں جلن و سوزش۔

احتیاط: منہ میں زخم ہونے پر دوا روک دینا چاہیے، حمل میں استعمال سے گریز کریں۔



## تجارتی مرکبات

**NEO-MERCAZOLE**

(NICHOLAS)

نیو مرکازول

Carbimazole 5mg ; tabs 100, Rs.82.90

**THYROZOLE**

(CADILA)

تھائیروزول

Carbimazole 5mg; tabs 100, Rs.20.60

## IODINE COLLOIDAL

## آیوڈین کولائیڈل

افعال و منافع: سادہ اور زہریلے مرض گھینگھا Goitre میں، اندمال زخم میں، دانتوں اور ساختوں کی مضبوطی میں۔ دودھ کی مقدار کم کرنے، آیوڈین کی کمی، حتمی اور بے وقوفی Cretinism میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۱۰ سے ۳۰ ملی گرام پانی میں ملا کر کھانے کے بعد دن میں ۲ بار پلائیں۔  
منفی افعال: آیوڈین سے الرجی یا ناقابل برداشت ہونے پر استعمال نہیں کرانا چاہیے۔  
مضر اثرات: ذائقہ میں معدنی اثر، تھوک کی زیادتی، ناک آنکھ حلق سے رطوبت کا اخراج اسہال آسکتے ہیں۔

احتیاط: مضر اثرات میں دوا روک دیں۔

## تجارتی مرکب

**COLLOSOL IODINE ORAL**

(DUPHAR)

کلوزول آیوڈین

Iodine 8mg per 5ml liquid 115ml: Rs.11.80

## THYRO GLOBOLIN

## تھائر و گلوبولین

افعال و منافع: تھائی راکسین کی کمی کی حالت میں اس کے بدل کے طور پر دی جاتی ہے جسم میں تھائی راکسین کی کمی، حتمی اور بے وقوفی Cretinism چہرے پر تھج درم میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: ابتدا میں بہت کم مقدار میں دیں رفتہ رفتہ مقدار میں اضافہ کریں مرض پر قابو پانے کے لئے ۳۲.۵ ملی گرام سے ۱۹۵ ملی گرام تک روزانہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے دیں۔  
منفی اثرات: امراض قلب، اڈرینالین کی کمی میں نہیں دینا چاہیے۔



مضر اثرات: درد سر بے چینی پسینہ کی کثرت، گھبراہٹ وجع القلب، آنتوں کی حرکات میں تیزی  
حیض کا بے ترتیب آنا قلب کا فیل ہونا۔

احتیاط: زیادہ مقدار میں غده درقہ کے افراز کی زیادتی میں احتیاط برتنا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

PROLOID

(PARKE DAVIS) tabs 50: Rs.76.60

پرو لائیڈ

**THYROXIN SODIUM**

تھائی رائکسین سوڈیم

افعال و منافع: حتمی و بے وقوفی، چہرے پر درم، مرض گلہڑ Goitre تھائی رائیڈ ایکسٹریکٹ کی کمی،  
غده درقہ کی خرابی یا عدم موجودگی میں مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: ابتدا میں ۵۰ سے ۱۰۰ مائیکرو گرام، رفتہ رفتہ مقدار میں اضافہ کیا جائے مرض پر قابو  
پانے کے بعد مستقل علاج کے لئے ۱۵۰ سے ۳۰۰ مائیکرو گرام یومیہ دے سکتے ہیں۔

منفی افعال: غده درقہ میں زہریلا اثر، ہارٹ ایکٹک، اورائیڈرنیالین کی کمی میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: حرکات قلب کا بے ترتیب ہونا، وجع القلب تشنج عضلات درد سر، رخساروں پر سرخی،  
بے چینی پسینہ کی زیادگی، اسہال وزن میں کمی۔

احتیاط: قلب میں خرابی Myocardial Infarction اور نیالین کی کمی ایام رضاعت میں احتیاط  
برتن۔

دواؤں کا رد عمل: مانع انجماد خون ادویہ، کاربامازی پائسن، فین ٹائسن، انسولین، خوردنی دافع، ذیابیطیس  
ادویہ، پروپرانولول دافع ڈپریشن ادویہ کے ساتھ اس کا اثر خراب ہوتا ہے۔

## تجارتی مرکبات

ELTROXIN  
ROXIN

(ALENBURYS) 0.1mg; tabs 100, Rs.25.00  
(CADILA) 100mcg; tabs 100: Rs.11.05

الٹراکسین  
روکسن



# ورم و تھج دور کرنے والی جراثیم کش مدر بول ادویہ

## ANTI SEPTIC & DIURETICS

### BENZ THIAZIDE

### بنز تھیازائیڈ

افعال و منافع: یہ دوا تنہا یا ہائی بلڈ پریشر کو روکنے والی ادویہ کے ساتھ دی جاتی ہے معمولی اور درمیانی درجہ کے ہائی بلڈ پریشر، ورم تھج قلب میں تنگی جگر میں امتلاء گردوں کا علامیہ Nephrotic Syndrome میں مفید و مجرب ہے۔

مقدار و ترکیب: سو جن Oedema میں ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام یومیہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے ہائی بلڈ پریشر میں ۲۵ ملی گرام دن میں ۲ بار یومیہ۔

منفی افعال: خون میں پوٹاشیم کی زیادتی میں گردوں کے فیل ہونے میں اس کا استعمال مضر ہے۔

مضر اثرات: متلی، اسہال، تھج اعضاء ضعف، جلد پر داغ پڑنا، درد سر، خون غیر طبعی، منہ خشک۔

احتیاط: ضعف جگر و گردہ میں، ذیابیطس، خون میں تیزابی مادے کی زیادتی، نفرس حمل ایام رضاعت میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کا رد عمل: پوٹاشیم کے استعمال کے دوران، پوٹاشیم کے مرکبات لٹھیم ڈیجی ٹیلیس انڈو میتھاسون ہائی بلڈ پریشر کم کرنے والی ادویہ ان کے ساتھ دینا نقصان دہ ہے۔

### BUMETANIDE

### بومی ٹانائیڈ

افعال و منافع: ورم Oedema عروق قلبیہ میں تنگی اور رکاوٹ استقام ذقی، گردوں کی خرابیاں Nephrotic Syndrome ہائی بلڈ پریشر، حاملہ کی سو جن، خون میں زہریلا مادہ شامل ہونے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱ سے ۳ ملی گرام یومیہ زیادہ سے زیادہ ۳۰ ملی گرام، ہائی بلڈ پریشر میں ۰.۵ سے ۱ ملی گرام دن میں ۱ بار بچوں کو ۰.۳ سے ۰.۶ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے دیں۔



منفی اثرات: جگر کا کوما، جسم میں پانی کی شدید قلت، پیشاب بند ہونا، گردوں کی خرابی کے سبب پیشاب بند ہو تو دوا نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: زیادہ دن استعمال سے جسم میں پانی کی قلت پیشاب کی زیادتی عضلات میں درد جلد پر داغ ذیابیطیس کے مریضوں میں بلڈ شوگر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔

احتیاط: زیادہ دن استعمال کے دوران سیرم الکٹرولائٹ کی جانچ کراتے رہیں پیشاب کی ٹالیوں کی رکاوٹ میں حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں احتیاط رکھیں۔

دواؤں کا رد عمل: دافع بلڈ پریشر اور مدد رات بول ادویہ کے ساتھ خراب اثرات پیدا ہوتے ہیں۔

## تجارتی مرکبات

BUMET

(MONTARI)

یومٹ

Bumetanide 1mg : tabs: 10: Rs.4.22

## CHLORTHALIDONE

## کلور تھالی ڈون

افعال و منافع: قلب جگر و گردوں کی خرابی کے سبب ہونے والا ورم، ہائی بلڈ پریشر، حالت حمل کا ورم ٹاکسیمیا میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰۰ سے ۲۰۰ ملی گرام یومیہ مرض پر کنٹرول ہو جانے پر ۱۰۰ ملی گرام ہفتہ میں ۲ یا ۳ بار ورم کی حالت میں ۴۰۰ ملی گرام صبح کو ایک خوراک ہائی بلڈ پریشر میں ۱۰۰ ملی گرام یومیہ زیادہ عرصہ علاج کے لئے ۵۰ ملی گرام ہفتہ میں ۲ یا ۳ بار۔

منفی اثرات: گردوں کے فیل ہونے کی حالت میں دینا خطرناک ہے۔

مضر اثرات: آنتوں و معدہ کی خرابیاں جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی قلبی حرکات کا بے ترتیب ہونا، روشنی سے نفرت جلد پر داغ نقرس خون کا غیر طبعی ہونا بے چینی بصارت میں فرق ضعف باہ۔ لو بلڈ پریشر چکر آنا اور یرقان ہو سکتا ہے۔

احتیاط: حمل، ایام رضاعت، نقرس، ذیابیطیس، جگر گردوں کے فعل میں خرابی، معمر افراد میں، دوا کے ساتھ پوٹاشیم کی اضافی مقدار دینا چاہیے۔



دواؤں کا رد عمل: دافع بلڈ پریشر دوائیں، ڈیجی ٹیلس، لتھیم، انسولین خوردنی دافع ذیابیطیس دوائیں دافع ورم ادویہ (Nsaids) نقصان دہ ہیں۔

## تجارتی مرکبات

**CLOTHALTON**

(S.G. PHARMA)

کلو تھالٹن

15mg tabs 10: Rs.3.45

**HYTHALTON**

(S.G. PHARMA)

ہائی تھالٹن

40mg tabs 10: Rs.25.47

**CATAPRES DIU**

(GERMAN REMEDIES)

کیٹا پریس

0.1mg tabs 10: Rs.7.73

## CLOPAMIDE

## کلوپامائیڈ

افعال و منافع: قلبی عروق میں تنگی (C.C.F) کے سبب ہونے والا ورم، تھج، جگر گردوں کی خرابی معمولی اور درمیانی ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ہائی بلڈ پریشر میں ۵ سے ۲۰ ملی گرام یومیہ ورم میں ۱۰ سے ۵۰ ملی گرام یومیہ صرف صبح کو کھلائیں۔

منفی افعال: جگر اور گردوں کی شدید بیماریاں، شدید ورم گردہ، پوٹاشیم کی کمی، ایڈیسن، ڈیزیز حمل اور ایام رضاعت میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: متلی تے، ہلکا درد سر، منہ خشک اسہال تشنج عضلات بے چینی، الجھن، نامردی، لو بلڈ پریشر خون میں گراوٹ ہیملوگلوبن، زیر جلد زخم آکھوں کے سامنے پٹنے اڑنا۔

احتیاط: ذیابیطیس، نفرس، مدرات بول کا استعمال، گردوں جگر کے فیل ہونے میں اس کا استعمال ممنوع ہے۔ دواؤں کا رد عمل: لتھیم، ڈیجی ٹیلس دافع ورم و درد ادویہ NSAID مرکزی نظام عصبی کو کمزور کرنے والی ادویہ، پروپیل نیسڈ، کلورڈایاز پکاسائیڈ کے ساتھ مضر ہے۔

## تجارتی مرکب

**BRINALDIX**

(SANDOZ)

بری نال ڈکس

Clopamide 20mg tabs: 100: Rs.70.25



## ڈائی پوٹاسیم ہائیڈروجن سائٹریٹ

### DIPOTASSIUM HYDROGEN CITRATE

افعال و منافع: خون میں تیزابیت کا اثر، پیشاب میں جلن، سلفونامائیڈ کے استعمال سے گردوں میں رکاوٹ تے اسہال سے ہونے والی خون میں تیزابیت میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۳ گرام ایک پیالی پانی میں ملا کر دن میں ۳ بار۔

منفی اثرات: زیادہ مقدار میں، ایڈرینال کی کمی میں، گردوں کے فیل ہونے میں، چوٹ ضربہ سقط، سردی نمونیہ کھانسی میں نہیں دینا چاہیے۔

احتیاط: پانی میں حل کر کے استعمال کرائیں، گردہ اور کلاہ گردہ کی خرابی میں، پانی کی شدید کمی میں تشنگی معضلات میں پوٹاسیم کے مرکبات کے ساتھ احتیاط برتیں۔

### تجارتی مرکبات

ALKANIL INGA SYRUP

(INGA)

الکال انگا سرپ

110ml Rs. 12.76

DIPOSOL

(STADMED) 114ml. Rs. 9.78

ڈپوسول

### ڈائی سوڈیم ہائیڈروجن سائٹریٹ

### DI SODIUM HYDROGEN CITRATE

افعال و منافع: بخار کی تیزی، ورم گردہ و مثانہ پیشاب میں رسوب آنا پیشاب میں جلن سخت گرمی میں کام کرنا، سلفونامائیڈ ادویہ کے ساتھ حالت حمل میں خون میں زہریلے مادے کو دور کرنے کے لئے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۴.۸ گرام سے ۲.۸ گرام دن میں ۳ بار پانی ملا کر ۱۲ سال تک کے بچوں کو نصف خوراک ۲ سال کے بچوں کو چوتھائی خوراک۔

منفی اثرات: سوڈیم سے پرہیز والے مریضوں میں ہائی بلڈ پریشر اور قلب کے فیل ہونے میں۔

احتیاط: میتھیٹھن مینڈی لیٹ استعمال کرنے والے مریضوں میں احتیاط برتیں۔



## تجارتی مرکبات

**ALKACITRATE**

(CARMINOL)

الکاسائٹریٹ

100ml: Rs. 12.60

**ALKANIL-PSYRUP**

(INGA) 110ml Rs. 12.76

الکائل

**ALKASOL**

(STADMED) 100ml: Rs. 16.00

الکاسول

**CITAL**

(INDOCO) 100ml Rs. 16.50

سیٹال

**CITRALKA LIQUID**

(PARKEDVIS)

سائیٹرال کا

114ml: Rs. 19.69

**ORICITRAL**

(PHARMA RESEARCH)

اوری سائٹرال

100ml: Rs. 18.00, 450ml: Rs. 55.00

**SALZER**

(PREMPHARMA)

سال زر

100ml: Rs. 20.50

**SIOCITRATE (ALBERT DAVID)** 114ml: Rs. 11.62

سیو سائٹریٹ

## FRUSEMIDE

## فروسی مائیڈ

افعال و منافع: قلب، پھیپھڑوں، گردوں اور دماغ میں پانی جمع ہونے Oedema اور بلڈ پریشر

-، مفید ہے۔ ہاتھ پیروں اور منہ پر ورم میں مفید ہے۔

منفرد اور ترکیب: اوڈیما میں ۲۰ سے ۸۰ ملی گرام دن میں ایک بار ایک دن نانڈ کر کے صرف صبح کو

ہائی بلڈ پریشر میں ۴۰ ملی گرام دن میں ۱ بار بچوں کو ۲ سے ۲۰ ملی گرام فی کلوگرام کے حساب سے۔

منفی اثرات: جگر کی خرابی غشی (Coma) کی حالت لو بلڈ پریشر خون میں پانی نمکیات کی کمی۔ ایڈی

کنڈیز Addison میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: ہضم کی خرابیاں بے چینی جلد پر داغ خون کی غیر طبعی کیفیت کھجلی، سستی کاہلی کیلشیم کی کمی

نفسیاتی الجھن سماعت کی خرابی، ورم با تفراس ہو سکتا ہے۔

احتیاط: جگر اور گردوں کی خرابی میں ذیابیطیس خون میں تیزابیت، ورم غدہ قدامیہ نقرس حمل اور

رضاعت میں۔

دواؤں کا رد عمل: پوناسیم کے مرکبات لیٹھیم کے مرکبات لیٹھیم، ڈیجی ٹیلز امینو گلو کو سائیڈ سفالو



سپورین دافع ورم ادویہ (NSAID) بلڈ پریشر کم کرنے دافع ذیابیطیس اور مرخی عضلات ادویہ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

AMIFRU-40	(ELDER)	10: Rs.10.85	ایمبی فرو
AQUAMIDE	(SUN PHARMA)	10 caps Rs.22.10	ایکو لمانیڈ
DIUOCONTIN-K CONTINUOUS	(MODI-MUNDI PHARMA)	10 tabs Rs.24.75	ڈی کون ٹین
FRUMIL	(GENO)	10: Rs.6.80	فرو مل
FRUSELAC	(LUPIN)	10: Rs.31.22	فرو سی لک
FRUSENEX	(GENO)	40mg. 10 tabs Rs.2.40; 100mg: 10 tabs Rs.6.88	فرو سی ٹیکس
LASILACTONE 50	(HOECHST)	10: Rs.28.89	لا سی لکٹون
LASIRIDE	(HOECHST)	10: Rs.7.12	لا سی رائیڈ
LASIX	(HOECHST)	40mg tabs 10: Rs.3.55	لاسکس ٹیبلٹ
LASIX INJ	(HOECHST)	10mg per ml inj 10x2 ml Rs.24.66	لاسکس انجکشن
SPIROMIDE	(SEARLE)	10: Rs.28.56	سپائی رومانیڈ

## ہائیڈروکلور تھیا زائیڈ

افعال و منافع: یہ دو اگر دوں سے نمکیات اور پانی کے اخراج میں اضافہ کرتی ہے۔ جس سے بلڈ پریشر کم ہو جاتی ہے۔ قلب و گردوں کے سبب ہونے والا اور م Oedema قبل از حیض تناؤ ذیابیطیس سادہ ہائی بلڈ پریشر اور دودھ کو کم کرنے کے لئے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ورم و تیج میں ۲۵ سے ۷۵ ملی گرام یومیہ دو خورا کوں میں پہلی خوراک صبح ناشتہ کے بعد دوسری دوپہر کھانے کے بعد ہائی بلڈ پریشر میں ۲۰ سے ۵۰ ملی گرام دن میں ابار

منفی افعال: جگر کی خرابی کو ما، پیشاب بند گردوں کے فیل ہونے میں استعمال مضر ہے۔

مضر اثرات: پوتا سیم کی کمی، جلد پر داغ پڑنا، روشنی سے نفرت، نقرس خون کا غیر طبعی ہونا۔



احتیاط: ذیابیطیس جگر اور گردوں کی خرابی، نقرس، حمل اور ایام رضاعت میں احتیاط برتیں۔  
دواؤں کے ساتھ رد عمل: بلڈ پریشر کم کرنے والی، ڈیجی ٹیلیس سے اجتناب کریں۔

## تجارتی مرکبات

**BIDURET**

(CROYDON) 10: Rs.12.09

لی ڈورسٹ

**ESIDREX**

(H. CIBAGEIGY)

ایسی ڈریکس

50mg; tabs 10x10: Rs.61.04

## ہائیڈروفلومی تھیازائیڈ **HYDRO FLUMETHIAZIDE**

افعال و منافع: یہ عموماً اسپائرونو لکٹون کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر، جسم میں پانی جمع ہونا، تھج، ورم Oedema، استقاء ذقی عروق قلبیہ میں تنگی گردوں کی سستی میں مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: ہائی بلڈ پریشر میں ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام کھانے کے ساتھ ایک خوراک میں یا کئی خوراکیں میں تقسیم کر کے بچوں کو ۳، ۳ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے دیں۔

منفی اثرات: گردوں کی شدید خرابی، دوا سے حساس مریضوں کو دینا خطرناک ہے۔

مضر اثرات: پوٹاشیم کی کمی، جلد پر داغ پڑنا، روشنی سے نفرت، نقرس خون کا غیر طبعی ہونا الجھن۔

احتیاط: ذیابیطیس، جگر اور گردوں کی خرابی، نقرس، حمل ایام رضاعت میں احتیاط برتیں، دوران علاج پوٹاشیم کی اضافی مقدار دیں۔

دواؤں کا رد عمل: بلڈ پریشر کم کرنے والی ادویہ، لیٹھیم ڈیجی ٹیلیس کے ساتھ نہ دیں۔

## تجارتی مرکبات

**ALDACTIDE**

(SEARLE) 25mg tabs. 10; Rs.14.33

ال ڈکٹائیڈ

**MANNI TAL**

منی ٹال

افعال و منافع: یہ مدرات بول کے ساتھ بطور معاون استعمال کی جاتی ہے۔ گردوں کے فیل ہونے، گردوں کی زہریلے مادوں سے حفاظت تیز دواؤں مثلاً کاربن ٹرائکلورائیڈ وغیرہ کے خراب اثرات دور کرنے کے لئے مفید ہے۔



مقدار و ترکیب: ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام (۲۵۰ سے ۵۰۰ ملی لٹر) ۲۴ گھنٹوں میں وریدی دیا جائے  
زیادہ سے زیادہ ۱۰۰۰ ملی لٹر دے سکتے ہیں۔

منفی افعال: گردوں کے خراب ہونے کے سبب پیشاب کا بند ہونا، پھیپھڑوں میں شدید تنکودمانی  
جریان خون جسم میں پانی کی شدید کمی، نمکیات کے تناسب میں کمی میں دینا مضر۔  
احتیاط: علاج کے دوران جسم میں پانی نمکیات Electrolytes پر دھیان رکھیں۔

## POLY THIAZIDE

## پالی تھیازائیڈ

افعال و منافع: یہ ایک غیر سیمابی مدربول دوا ہے، بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۱ سے ۴ ملی گرام یومیہ، بلڈ پریشر کم کرنے کیلئے ۲ سے ۴ ملی گرام۔  
منفی اثرات: پیشاب بند ہو جانے، تھیازائیڈ سے حساس مریضوں کو دینا خطرناک ہے۔  
مضر اثرات: بھوک کی کمی، بے چینی متلی، تھکاوٹ، ہاتھ پیروں میں تشنج، اسہال قبض، یرقان، چکر آنا  
سن پن، درد سر، جسم کی رنگت چلی، لیوکوسائٹ، تھراپین کی کمی، روشنی سے نفرت جلد پر داغ پڑنا پتی  
اچھلنا، لو بلڈ پریشر، بلڈ شوگر میں کمی، کمزوری، بے چینی۔  
احتیاط: جسم میں پانی اور نمکیات پر نگاہ رکھیں، سیرم ایوڈین کو چیک کرتے رہیں۔  
دواؤں کا رد عمل: شراب، باربیٹون کے مرکبات اور غشیات کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

## SPIRONOLACTONE

## اسپائیرونولکٹون

افعال و منافع: ہائی بلڈ پریشر، قلب کی کمزوری گردے اور جگر کے سبب ہونے والا ورم  
Oedema، عورتوں میں بالوں کی زیادتی میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام کھانے کے ساتھ روزانہ ۱ خوراک میں یا ۲-۳ خوراکیں  
میں تقسیم کر کے۔  
منفی اثرات: پیشاب بند ہو جائے، پوٹاشیم کی زیادتی، گردوں کی شدید خرابی اور عدم کارکردگی دوا  
سے حساسیت کی حالت میں استعمال نہ کرائیں۔



مضر اثرات: مردوں میں پھتانوں کا بڑا ہوتا، ہضم کی خرابیاں، جلد پر داغ خشکی درد سر، الجھن ہو سکتی ہے۔

احتیاط: حمل میں احتیاط رکھیں دوران علاج سیرم پانی نمکیات کی جانچ کراتے رہیں نوجوانوں کو زیادہ استعمال نہ کرائیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: پوتا سیم کے مرکبات، لیٹھیم، ڈیجیٹالس، بلند پریشر کم کرنے والی دوا یہ کے ساتھ اس کا استعمال مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

ALDACTONE	(SEARLE)	ال ڈکٹون
100mg. 10: Rs.58.83		
AQUAMIDE	(SUN PHARMA)	اکوامائیڈ
caps 10x10: Rs.220.00		
FRUSELAC	(LUPIN) 10x10: Rs.300.40	فروسی لیک
LACTONE	(SUN PHARMA)	لک ٹون
25mg. 10x10: Rs.110.00 100mg. 6: Rs.25.20		
LASILACTONE 50	(HOECHST) 10: Rs.28.84	ال سی لکٹون ۵۰
LASILACTONE 100	(HOECHST) 10: Rs.53.94	ال سی لکٹون ۱۰۰
SPIROMIDE	(SEARLE) tabs: 10: Rs.28.27	اسپائرومائیڈ

## TRIAM TERENE

## ٹرائم ٹیرین

افعال و منافع: قلب و جگر و گردوں کی خرابی کمزوری کے سبب ہونے والی سوجن، استقاء Oedeme معمولی اور اوسط درجے کے ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: اوڈیم میں ۱۰۰ سے ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار کھانے کے بعد ہائی بلڈ پریشر میں ۵۰ ملی گرام دن میں ۲ بار۔

منفی افعال: پوتا سیم کی زیادتی، گردوں کی شدید خرابی میں اس کا استعمال مضر ہے۔

مضر اثرات: متلی اسہال، تشنج، کمزوری، جلد پر داغ، درد سر، منہ خشک خون کی غیر طبعی حالت ہونا۔



احتیاط: جگر و گردوں کی عدم کارکردگی میں، ذیابیطس، خون میں تیزابیت نقرس، حمل اور رضاعت کے ایام میں احتیاط برتیں۔  
دواؤں کا رد عمل: پونا شیم کے مرکبات اور مد رات کا استعمال، لیتھیم، ڈیجی ٹالس، انڈومیتھاسین بلڈ پریشر کم کرنے والی ادویہ کے ساتھ اس کا استعمال ضرر رساں ہے۔

## VASOPRESSIN

### واسوپریسین

افعال و منافع: ذیابیطس سادہ، بلڈ پریشر میں فوری اضافہ کے لئے، آپریشن کے دوران ہونے والے صدمات، آنتوں کی سستی نفخ شکم، ہرپیز زائٹر، متعدی پھنسیاں، غذائی نالی کے شدید جریان خون کی لاجواب دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ذیابیطس سادہ میں ۵ سے ۱۰ یونٹ زیر جلد یا عضلاتی دن میں ۲-۳ بار لگائیں۔  
منفی اثرات: مرگی، وجع القلب، ہائی بلڈ پریشر، مفاصلی تکالیف حمل ورم گردہ میں دینا خطرناک ہے۔

### تجارتی مرکب

PETRESIN KOREA

(SHREE GANESH)

پٹری سن کوریا

in 20 iu / ml Rs. 130.00

## XIPAMIDE

### زیپامائیڈ

افعال و منافع: قلب و جگر و گردوں کی خرابی اور وجع المفاصل کے سبب ہونے والا اورم Oedema حمل کے آخری ایام میں ورم و تھج میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰ سے ۴۰ ملی گرام ایک خوراک صرف صبح کو، بلڈ پریشر کم کرنے والی دوا کے ساتھ مقدار کم دی جائے۔

منفی افعال: جسم میں پانی اور نمکیات Electrolyte کی کمی میں، گردوں کی خرابی اور صدمہ Coma کی حالت میں نہیں دینا چاہیے۔

مضمر اثرات: خون میں پونا شیم کی کمی، ہضم کی خرابی اور چکر آنے کی شکایت ہو سکتی ہے۔

احتیاط: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں، نقرس جگر اور گردوں کی خرابی میں ذیابیطس ورم غده قدامیہ اور ایام



رضاعت میں احتیاط رکھیں دوران علاج پوٹاشیم کی مقدار میں اضافہ کر دیں۔  
دواؤں کے ساتھ رد عمل: بلڈ پریشر کم کرنے والی ادویہ، ذیابیطیس، کیتھیم کے ساتھ خراب اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

## تجارتی مرکبات

**XIPAMID**

(GERMAN REMEDIES)

زپامائیڈ

Xipamide 20mg tabs: 10: Rs.23.42

## انٹرا پیروی ٹونیل ڈیالائی سس سلوشن

### INTRA PERITONEAL DIALYSIS SOLUTION

افعال و منافع: گردوں کے فیل ہونے خون میں پوٹاشیم کی زیادتی، زہریا تیز ادویہ کے اثرات کا گردوں کے ذریعہ اخراج کرنا، جسم میں پانی اور نمکیات کا تناسب درست کرنے قلب اور گردوں کے فعل میں رکاوٹ جب کہ مدرات فیل ہو جائیں، گردوں اور جگر کے سبب ہونے والا ورم Oedema اور کوما کی حالت میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: واحد ایکسج سے ۲ لٹر پانی کا اخراج کیا جاسکتا ہے، عموماً ۱۲ سے ۳۰۔ ایکسج مرض کے حساب سے لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔

منفی اثرات: ورم باریطون ناسور مقعد، آنت کا اپریشن شکم کے امراض میں دینا مضر ہے۔  
احتیاط: وریڈی راہ سے یہ سلوشن نہیں دینا چاہیے۔

## تجارتی مرکب

**INTRAPERITONEAL DIALYSIS**

(LACTATE BPC 540 ml)

Mount Mettur 540 ml: Rs.9.00

Krishna Keshav 1000ml: Rs.31.00

انٹرا پیروی ٹونیل ڈیالائی سس



## METHENAMINE MANDELATE میتھی نامین مینڈی لیٹ

افعال و منافع: ورم گردہ، ورم مثانہ، دیگر اعضاء بول کے انفلشن میں مفید و موثر ہے۔ پیشاب کو جراثیمی اثرات سے پاک کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: اگر ام دن میں ۲ بار کھانے کے بعد ۶ سے ۱۲ سال کے بچوں کو ۰.۵ گرام دن میں ۲ بار دی جائے۔

منفی افعال: گردوں کی خرابی میں دینا نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: معدہ آنتوں کے فعل میں خرابی جلد پرداغ پڑنا۔

احتیاط: علاج کے دوران الکلائن (کھاری) دواؤں اور غذاؤں سے پرہیز رکھیں۔

دواؤں کے ساتھ رد عمل: سلفونامائیڈ، اسکاربک ایسڈ اور ایسینیم کلورائیڈ کے ساتھ خراب نتائج نکلتے ہیں۔

MANDELAMINE (PARKEDAVIS)

tabs 0.5g: 40, Rs.35.80 1g: 20, Rs.34.47

مینڈلا مین

## NALIDIXIC ACID

## نالی ڈک سک ایسڈ

افعال و منافع: یہ دوا گرام منفی Gram Negative جراثیم سے پیدا ہونے والے آلات بول کے انفلشن میں اور دستوں میں مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: اگر ام دن میں ۳ بار ۷ دن تک بچوں کو ۶۰ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے کھلائیں۔

منفی افعال: دوروں کی ہسٹری، حساسیت، حمل کے پہلے ۳ ماہ میں اور ۳ ماہ سے کم عمر کے بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: نظام ہضم اور نظام عصبی اور بصارت میں خلل جلد پرداغ خون میں غیر طبعی کیفیت دورے، روشنی سے نفرت ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔



احتیاط: جگر اور گردوں کی خرابی، سانس کی کمزوری میں علاج کے دوران سورج کی تیز شعاعوں سے بچیں۔

دواؤں کا رد عمل: مانع انجماد خون ادویہ، پروبینی سڈ، نائٹروفورن ٹان اور انٹی بیکٹریا کے ساتھ دینا نقصان دہ ہے۔

## تجارتی مرکبات

<b>GRAMONEG</b>	(RANBAXY)	گرامونیک
500mg: tabs 4, Rs. 18.72		
<b>GRAMONEG SUSP</b>	(RANBAXY)	گرامونیک سرپ
300mg, per 5ml susp 30ml, Rs. 18.50; 60ml, Rs. 32.00		
<b>NADIX ACUTAB</b>	(TROIKAA)	ناڈکس اکیوٹیب
300mg: disp. tabs: 6: Rs. 16.50		
<b>NEGADIX</b>	(CFL) 500mg: tabs 10, Rs. 50.75	نگاڈکس
<b>ULIX P</b>	(BLUE CROSS)	یولکس
150mg, dispersible flavoured tabs: 150mg 17.00		
<b>URODIXIC</b>	(DEEPHARMA)	یوروڈیک
500mg, phenazopyridine hcl 50mg: tabs: 6: Rs. 23.10		
<b>UTIDIX</b>	(PHARMASIA)	یوٹی ڈکس ٹبلٹ
500mg: tabs: Rs. 596.20 per box.		
<b>UTIDIX SUSP</b>	(PHARMASIA)	یوٹی ڈکس سرپ
300mg per 5ml susp. 30ml: Rs. 26.87		

## NITROFURANTOIN

## نائٹروفورن ٹان

افعال و منافع: ورم مثانہ، ورم گردہ، حوض گردہ، تناسلی و بولی اعضاء کے انفکشن کی مفید اور موثر دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام روزانہ ۴ مرتبہ کھانے کے ساتھ بچوں کو ۶ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے ۴ خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔  
مفتی اثرات: شدید جس بول گردوں کے فعل کی خرابی ایک ماہ سے کم عمر بچوں کو دینا خطرناک ہے۔



مضر اثرات: جلد پر داغ یا قان اسنو فلیا، جاذب بخار سینہ میں درد سانس میں جھگی، کھانسی عصبی درد ہضم کی خرابیاں خون میں غیر طبعی کیفیت ہو سکتی ہے۔

احتیاط: کھاری دواؤں سے اجتناب کریں۔  
دواؤں کا رد عمل: میکنیشیم ٹرائی سیل کیٹ، پروپینی سڈ سلفن پائی رازین کوئی نولون کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

<b>FURADANTIN</b>	(SMITHKLINE)	فوراڈن ٹین ٹبلٹ
50mg: 10: Rs.4.90; 100mg: 10: Rs. 5.40		
<b>FURADANTIN SUSP</b>	(SMITHKLINE)	فوراڈن ٹین سرپ
25mg, per 5ml : susp 60ml, Rs.7.55		
<b>NEPHROGESIC</b>	(ETHNOR)	نفرو جے سک
50mg tabs; 10: Rs.15.59		

## OIL OF SANDAL WOOD آئل اف صندل وڈ

افعال و منافع: آلات بول کے انفلشن پیشاب کی جلن سوزاک میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۳۰ ملی لٹر سے ۱۰۰ ملی لٹر شکر میں ملا کر کھلائیں اوپر سے دودھ پلائیں۔

## PHENAZO PYRIDINE فینازوپائی ری ڈین

افعال و خواص: اعضاء بول کی اندرونی جھلی (غشاء مخاطی) کے ورم آلات بول کے شدید انفلشن، ورم حوض گردہ ورم مثانہ، ورم غدہ قدامیہ اور نائزہ کے ورم و شدید درد میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۱۰۰ سے ۳۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار کھلائیں۔

منفی افعال: پیشاب بند ہونے، گردوں کی خرابی، حمل ایک ماہ سے کم عمر بچوں اور دوا سے حساس مریضوں میں مہلک ہے۔

مضر اثرات: ہضم کی خرابیاں، الرجک، ری ایکشن، خون میں خرابی، نیولائی ٹک انیمیا، اور لیوکوسائٹ کی کمی ہو سکتی ہے۔



احتیاط: حمل اور ایام رضاعت میں پیچیدوں کی تکلیف میں احتیاط برتیں۔  
 دواؤں کا رد عمل: ممکنہ کم ترائی سلی کیٹ، پروپینسڈ، سلفن پائی رازون کوئی نولون کے ہمراہ دینا  
 نقصان دہ ہے۔

## تجارتی مرکبات

NEPHROGESIC (ETHNOR) tabs 10: Rs. 15.59  
 PYRIDIUM (WARNER)  
 200mg tabs; 10: Rs. 14.50

نفر ہے سک  
 پائی ری ڈیم

## SULPHAMETHIZOLE

## سلفامیتھی زول

افعال و منافع: آلات بول گردہ مثانہ پیشاب کی نالیوں کے انفکشن میں مفید و موثر ہے۔  
 مقدار و ترکیب: ۵۰۰ ملی گرام دن میں ۴ بار  
 مضر اثرات: متلی قے، درد شکم، بھوک کی کمی، ورم بانقراس، ضعف سردرد، چکر آنا بخار، الرجک  
 ری ایکشن روشنی سے نفرت، گردوں کا علامیہ، جان سن علامیہ کا خطرہ۔  
 احتیاط: حمل، ایام رضاعت، گردوں اور جگر کی خرابی میں احتیاط برتیں۔  
 دواؤں کا رد عمل: خودنی مانع انجماد خون ادویہ، فین ٹائن میٹھوٹریکسیٹ کے ساتھ مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

SULPHAMETHIZOLE (WARNER)

500mg tabs 10: Rs. 8.34

UROLUCOSIL

500mg tabs 10: Rs. 5.62

(PARKEDAVIS)

سلفامیتھی زول

یورولوکوسل



## آلات بول کی مسکن درد ادویہ

### URINARY ANTI SPASMODIC

#### ATROPINE SULPHATE اثر و پین سلفیٹ

افعال و منافع: یہ چھوٹے اور نرم عضلات کے تشنج اور درد کو سکون پہونچاتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۰.۲۵ سے ۲ ملی گرام زیر جلد یا عضلاتی انجکشن لگائیں۔

منفی افعال: گلوکوما، میں سخت نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: منہ خشک، کھانے میں دشواری، قبض، جلد خشک، جلد پر داغ دھاریاں، وجع القلب،

خفقان، حرکات قلب بے ترتیب، پتلی کا پھیلنا۔ روشنی سے کراہیت پتلی باہر کو ٹکنا، زیادہ مقدار میں بخار

سینہ میں درد بے چینی پیدا کرتی ہے۔

دواؤں کا رد عمل: کوئی نی ڈین، دافع ذرپیشن دوائیں اور انٹی ہشامین کے ساتھ دینا مضر ہے۔

#### DICYCLOMINE HCL ڈائی سائی کلو مین

افعال و منافع: معدہ آنتوں اور آلات بول کے درد معدہ آنتوں میں تشنج و خراش وجع الفواد،

عسر طمث، وجع الکلیہ، Renal Colic اسہال پیش میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۶ ماہ تک کے بچوں کو ۵ ملی گرام یا ۱۰ بوند ۶ ماہ سے ۲ سال تک ۱۰ سے ۲۰ بوند ۲ سے

زائد ۲۰ سے ۴۰ بوند دن میں ۳ بار قبل از غذا بالغوں کو ۲۰ ملی گرم گولی دن میں ۳ بار انجکشن ۲۰ ملی

گرام عضلاتی ہر ۸ گھنٹہ بعد لگا سکتے ہیں۔

منفی افعال: پیشاب کی رکاوٹ میں، آنتوں کے فعل کی سستی میں ضعف اور جگر کی خرابی میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: منہ خشک کھانے میں دشواری زیادہ مقدار سے آنتوں میں سوزش، آنکھوں کے آگے دھبے۔

احتیاط: گلوکوما، اور حمل میں احتیاط برتنا چاہیے۔

دواؤں کا رد عمل: الکوحل کے مرکبات اور شراب کے ساتھ دینا مضر ہے۔



## تجارتی مرکبات

CLOMIN (CORE) 500mg: tabs 10: Rs.5.80	کلو مین ٹبلیٹ
CLOMIN DROPS (CORE) 10ml: Rs.11.50	کلو مین ڈراپس
COLIMEX TABS (WALLACE) 500mg: tabs:10: Rs.6.20	کولی مکس ٹبلیٹ
CYCLOPAM TABS (INDOCO)	سائیکلوپام ٹبلیٹ
Dicyclomine Hcl 20mg, Paracetamol 500mg: tabs 10: Rs.7.30	
CYCLOPAM INJ (INDOCO) 2ml amp Rs.9.39	سائیکلوپام انجکشن
CYCLOPAM SUSP (INDOCO) 30ml, Rs.6.99	سائیکلوپام سرپ
MEFTAL-SPAS (BLUE CROSS) 10, Rs.12.50	میفل ٹال اسپاس
NEUROSPAS (SWIFT) caps 10, Rs.11.72	نیورواسپاس کپسول
NEUROSPAS FORTE (SWIFT) caps 10, Rs.15.35	نیورواسپاس فورٹ
NEUROSPAS DROPS (SWIFT) 15ml: Rs.14.92	نیورواسپاس ڈراپس
REZIPEN (CONCEPT) 10: Rs.16.50	ریزی پن
ZE-SPAS (KEE PHARMA) 10: Rs.11.50	زی اسپاس

## PANCURONIUM BROMIDE پین کیورونیم برومائید

افعال و منافع: مرارہ اور گردوں کا شدید درد، قنات غذائی میں تشنج و درد عسر طمث میں مفید ہے۔  
 مقدار و ترکیب: ۰.۲ سے ۰.۴ ملی گرام ۳ بار یومیہ ۵ سے ۷ سال کے بچوں کو ۰.۵ ملی گرام ۸ سے ۱۱ سال کو ۰.۵ سے ۱ ملی گرام ۱۱ سے ۱۳ سال ۰.۵ ملی گرام دن میں ۳ بار۔  
 منفی افعال: گلوکوما، معدہ آنتوں میں تسد، جگر کی خرابی، ورم غدہ قدامیہ بندش بول اور الرجک مریضوں کو نہیں دینا چاہیے۔

احتیاط: بلغمی دمہ، حمل، ۳ ماہ یا ۵ کلو وزن سے کم بچوں کو احتیاط لازم ہے۔

## تجارتی مرکبات

BARALGAN (HOECHST) 10: Rs.5.62	بارل گان ٹبلیٹ
BARALGAN INJ (HOECHST) 2ml amp Rs.3.26	بارل گان انجکشن
NEUROSPAS INJ (SWIFT) 2ml amp. Rs.3.73, 5ml amp. Rs.4.95	نیورواسپاس



**FLAVOXATE****فلے ووکسیٹ**

افعال و منافع: پیشاب کا تکلیف سے آنا (عسر البول) بار بار اور جلن سے آنا پیڑو، پردرد، ورم مثانہ ورم غدہ قدامیہ ورم نائزہ مثانے کی نالی میں ورم و تکلیف ہونا آپریشن، کیچھر کے استعمال سے ہونے والے درد ورم میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار

منفی افعال: غذائی نالی اور آلات بول گردے مثانے اور نالیوں میں رکاوٹ کی حالت میں دینا خطرناک ہے۔

احتیاط: گلو کو حاصل کے ابتدائی ۳ ماہ میں اور ۱۲ سال سے کم عمر میں احتیاط رکھیں۔

**تجارتی مرکبات****FLAVOXATE**

(ELDER)

فلے ووکسیٹ

200mg, tabs: 10: Rs.62.45

**URISPAS**

(WALTER BUSHNELL)

یوری اسپاس

200mg, tabs 10 Rs.72.10

**OCTINUM MUCTATE****آکٹی نم مکٹیٹ****AMIDO SULPHONATE****امائی ڈو سلفونیٹ**

افعال و منافع: عضلات میں تشنج، قولنجی درد، Colic pain مرارہ (پتہ) کا درد، وجع الکلیہ Renal Colic حوض کا درد، وضع حمل کی تکالیف میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۶۰۰ سے ۱۲۰۰ ملی گرام ۳۰۳ بار یومیہ انجکشن ۶۰ سے ۱۲۰ ملی گرام عضلاتی ۳ بار دیا جاسکتا ہے۔

منفی افعال: وریڈی انجکشن، گلو کو زیانار مل میلائن میں ملا کر بہت آہستہ لگائیں۔



## تجارتی مرکبات

**NEO-OCTINUM**

(BOEHRINGER-M)

نیو آکٹیئم

dragees, 10: Rs. 15.00

**NEO-OCTINUM DROPS**

(BOEHRINGER-M)

نیو آکٹیئم ڈراپس

80mg per ml 10ml Rs. 15.10

**NEO-OCTINUM INJ**

(BOEHRINGER-M)

نیو آکٹیئم انجکشن

80mg, per ml, 1ml Rs. 3.89

**PITOFENONE HCL**

پیٹوفینی نون ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: پتے اور گردے کا شدید درد، معدہ و آنتوں کا شدید درد اور حیض کے تناؤ اور درد میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: بالغوں کو ۵ سے ۱۰ ملی گرام دن میں ۳ بار ۵ سے ۷ سال کے بچوں کو ۲.۵ ملی گرام ۸ سے ۱۱ سال تک ۲.۵ ملی گرم بالغوں کو ۵ ملی گرام عضلاتی یا وریدی۔

منفی افعال: گلوکوما، معدہ آنتوں میں رکاوٹ جگر کی خرابی، ورم غدہ قدامیہ پیشاب میں رکاوٹ میں دینا سخت نقصان دہ ہے۔

احتیاط: دمہ بلغمی میں، حمل میں ۳ ماہ یا ۵ کلو وزن سے کم بچوں میں سخت احتیاط رکھیں۔

## تجارتی مرکبات

**BARALGAN**

(HOECHST) tabs 10 Rs. 5.62

بیرلگان

**SPASMIZOL-K**

(IDPL) TABS: 10; Rs. 5.13

اسپاس میزول

پی پائی پری ڈی نوای تھا کسی کاربو میتھا کسی بنزوفینون

**P. PIPERIDIONOETHOXY O.CARBO  
METHOXY BENZO PHENONE HCL**

افعال و منافع: وجع الکلیہ (درد گردہ) وجع الرحم، حیض کے درد سے آنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵ ملی گرام یا گولی دن میں ۳ بار۔



احتیاط: دوا سے حساس مریضوں کو گلوکوما، معدہ آنتوں کے تسدد جگر کی خرابی ورم غدہ قدامیہ بندش بول، دمہ بلغمی، حمل اور ۳ ماہ سے کم عمر بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

### تجارتی مرکبات

MAXIGAN  
MAXIGAN INJ

(UNICHEM)

(UNICHEM)

NOVIGAN

(STANGEN) tabs 10: Rs.10.00

TRIGAN

(CADILA) 10: Rs.5.77

TRIGAN INJ

(CADILA)

3ml; Rs.2.40 5ml Rs. 4.72; 30ml: Rs.20.20

میکی گان ٹبلٹ  
میکی گان انجکشن

نووی گان

ٹرائی گان ٹبلٹ  
ٹرائی گان انجکشن

# Relieve



# Abdominal Pain

## SPASMO-PROXYVON



The fastest  
antispasmodic  
that is safe too



جسم میں پانی نمکیات اور غذائی اجزاء کی کمی کو پورا کرنے والے مرکبات

FLUID, ELECTROLYTES & NUTRIENT COMPOUND

## APROTNIN

## اپروٹینین

افعال و منافع: چوٹ لگنا، شدید صدمات، بیہوشی، ورم باریطون ورم بانقراس شدید جریان خون آپریشن کے بعد کی کمزوری وغیرہ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: پہلی خوراک ۵ لاکھ KIU آہستہ وریدی یا بوتل میں ملا کر پھر ہر ۴ گھنٹہ بعد ۱۲ لاکھ K.I.U لگائیں، زچگی، اعضاء نسوانی سے جریان خون کی صورت میں ۱۰ لاکھ K.I.U پہلی خوراک پھر ۲ لاکھ ہر گھنٹہ بعد یہاں تک کہ خون بند ہو جائے۔

منفی افعال: دوا سے حساس مریضوں کو، عروق دمویہ میں تسدد کی حالت میں دینا خطرناک ہے۔  
مضر اثرات: قلبی صدمہ، حرکات قلب بے ترتیب ہونا، شری (پتی اچھلنا) سینہ میں درد جلد پرداغ، جسم کی رنگت بدلنا، سانس میں تنگی متلی، ہاضمے کی خرابیاں، وریدوں میں خون جمنا اور متورم ہونا۔  
احتیاط: دوا استعمال کرنے سے قبل انٹی ہشامین کا استعمال کریں گردوں کی کمزوری میں سخت احتیاط برتیں۔

دواؤں کا رد عمل: ہپارین اور سکسی نائل کولین کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

## تجارتی مرکب

PROTOSOL INJ

(SHREE GANESH)

پروٹوسول

Aprotinin B.P. 500,000 KIU per 50ml vial Rs.115.00

## DEXTRAN

## ڈکسٹران

افعال و منافع: جریان خون کے سبب خون میں کمی اور غلظت، صدماتی کیفیت، چوٹ، آپریشن ایکسیڈنٹ جلنے اور آپریشن کے سبب ہونے والا جریان خون شدید ضعف و نقاہت میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: شدید صدماتی حالت میں پہلی بوتل ۵ منٹ میں دوسری ۳۰ سے ۴۵ منٹ میں



شدید جریان خون میں ۲ بوتل ایک ساتھ چڑھائیں۔ آپریشن سے قبل یا دوران میں بوتل کی رفتار ۱۰ سے ۲۰ بوتل فی منٹ رہنا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

**DEXTRAN 70**

(RALLIS) 540ml bottle Rs.61.86

ڈکسٹران

**LOMODEX**

(RALLIS)

لو موڈیکس

10% I.V. infusion 540ml Rs.150.28

**PREMODEX INJ I.P.** (PREM PHARMA)

پری موڈیکس

10% Premodex inj IP 500ml Rs.37.00

## DEXTROSE

## ڈیکسٹروز

افعال و منافع: جسم میں پانی گلوکوز اور نمکیات کی کمی، گلائی کو جن کا زیادہ اخراج آپریشن سے قبل اور بعد کی کمزوری، اسہال قے، اور پسینہ کی زیادتی غذائیت کی کمی، تیزابیت ضعف و نقاہت کی حالت میں اس کا استعمال ایک نعمت ہے۔

مقدار و ترکیب: ضرورت کے مطابق وریدی لگانا چاہیے۔

منفی افعال: خون کی بوتل کے ساتھ، اعصابی ریشوں کی ٹوٹ پھوٹ سرجری دماغی اور نخاعی جریان خون میں نہیں دینا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

**DEXTROSE INJ 2.5%** (KRISHNA KESHAV) ۲.۵ فیصدی  
500ml Rs.23.00

**DEXTROSE INJECTION 5%**

ڈیکسٹروز بوتل ۵ فیصدی

ALBERT DAVID 540ml Rs.25.00, 1000ml Rs.31.38

DUPHAR 540ml Rs.8.15

KRISHNA KESHAV 500ml Rs.30.00 1000 ml Rs.31.00

STADMED 540ml Rs.20.43

ALEMBIC 540ml

TABLETS INDIA 540ml, 1000ml

PREM PHARMA 500ml Rs.32.00; 1000 ml Rs.42.00



## ڈیکسٹروز الکٹرولائٹ DEXTROSE ELECTROLITE

افعال و منافع: جسم میں پانی و نمکیات کی کمی کو پورا کرتی ہے۔، تھے، اسہال پسینہ کی کثرت آنٹوں کے زخم جلنا، معدہ کے منہ کا بند ہونا، خون میں تیزابیت وغیرہ میں اس کا استعمال مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: مریض کی ضرورت کے مطابق وریڈی استعمال کرائیں۔

منفی اثرات: ذیابیطس سادہ، پوٹاشیم کی زیادتی، گردوں کے شدید امراض، کلاہ گردہ کی خرابی پیرا تھاٹرائیڈ کے افزائش کی کمی میں اس کا استعمال مناسب نہیں۔

### تجارتی مرکبات

DEXTROLYTE-G

(TABLETS INDIA)

ڈیکسٹروز لائٹ

PREMOLYTE-G

(PREMPHARMA)

پریمولائٹ

500ml: Rs.35.00

## ڈیکسٹروز سوڈیم کلورائیڈ DEXTROSE SODIUM CHLORIDE

ڈیکسٹروز سوڈیم کلورائیڈ

افعال و منافع: جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی شدید تھے اسہال معدہ سے رطوبت کا اخراج جسم سے پانی اور خون کے نکل جانے کمزوری ضعف و نقاہت میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: مریض کو ضرورت کے مطابق بذریعہ وریڈی دیا جاتا ہے۔

منفی اثرات: گردوں کی کمزوری، قلب و جگر و گردوں کے امراض اور ضعف کے سبب ہونے والا

درم استقاء Odema میں دینا مضر ہے۔

### تجارتی مرکبات

DEXTROSE 5% & SODIUM CHLORIDE 0.9%

ALBERT DAVID

540 ml Rs.21.00 ; 1000 ml : Rs.31.00

ALEMBIC

540 ml,

ALKEM

540 ml,

DUPHAR

540 ml Rs. 8.35

KRISHNA KESHAV

500 ml Rs.30.10, 1000 ml; Rs.31.00



STADMED  
TABLETS INDIA  
PREM PHARMA

540 ml Rs.20.25  
540 ml, 1000 ml  
500 ml Rs.32.00; 1000 ml Rs.42.00

## FRUCTOSE SODIUM CHLORIDE

فرکٹوز سوڈیم کلورائیڈ

افعال و منافع: چوٹ، حادثات، آپریشن کے بعد کی کمزوری خون میں ذیابیطیس تیزابیت گردوں کی خرابی خون میں یوریا اور نائٹروجن کی زیادتی شراب کے اثرات بد جسم میں پانی و نمکیات کی کمی Dehydration کا لرا، شدید قے و اسہال میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: مریض کی ضرورت کے مطابق

تجارتی مرکبات

FRUCTOSE SODIUM CHLORIDE (DRUGS INDIN) فرکٹوز سوڈیم  
FRUCTODEX (RAPTAKOS) فرکٹوڈیکس

HAEMACCEL

ہیماکسل

افعال و منافع: حادثات ایکسڈنٹ، آپریشن کے سبب کثیر مقدار میں خون کا اخراج ہونا، ورم باریطون، ورم بانقرا اس کے سبب پلازما کا ضیاع، قے اسہال ذیابیطیس کو ما جسم میں نمکیات کی کمی وغیرہ کے لئے بہت بہترین ہے۔

مقدار و ترکیب: دوا کی مقدار اور رفتار کا تعین مریض کی حالت کے مطابق متعین کیا جائے۔

منفی اثرات: قلبی صدمہ، مستقل رہنے والے ہائی بلڈ پریشر میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: حساسیت، جلد کا سرخ ہونا پتی، شرئی لرزہ، کبھی سینے میں درد اور بلڈ پریشر کم ہونا۔

احتیاط: پوری بوتل ایک ہی وقت میں چڑھائیں، بوتل جسمانی حرارت کے برابر گرام ہو بوتل کے ساتھ اسٹور کیا ہوا خون نہیں دینا چاہیے زیادہ مقدار میں نہ دیں، سلوشن صاف ہو۔

دواؤں کا رد عمل: ڈیجی ٹالس کا استعمال اس کے ساتھ ممنوع ہے۔



## تجارتی مرکبات

HAEMACCEL

(HOECHST)

Rs. 137.00

بجے کسل

HERMIN

ہر مین

افعال و منافع: پروٹین کی کمی آپریشن کی کمزوری بے چینی، مختلف امراض لمبی بیماریوں کے سبب ہونے والی پروٹین کی کمی کو پورا کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰۰ سے ۸۰۰ ملی لیٹر ہر ۲۴ گھنٹہ بعد وریڈی ڈرپ کے ذریعہ۔

احتیاط: جگر کے ناکارہ ہو جانے، قلب کے فیل ہونے گردوں کی کمزوری میں احتیاط رکھیں۔

POTASSIUM CHLORIDE & DEXTROSE  
پوٹاشیم کلورائیڈ ڈیکسٹروز

افعال و منافع: قے و اسہال میں جہاں پوٹاشیم کی نمایاں کمی ہو، آپریشن کے بعد اگر ۴۸ گھنٹہ تک وریڈی راہ سے غذائیت پہنچانا مقصود ہو عارضی طور سے جسم کا مفلوج ہونا ڈیجیٹالس کے اثرات بد میں مفید ہے۔

POTASSIUM CHLORIDE

پوٹاشیم کلورائیڈ

افعال و منافع: پوٹاشیم کی کمی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔

مقدار و ترکیب: خوردنی راہ سے، ہنگامی ضرورت پر وریڈی استعمال کی جاتی ہے۔

منفرد اثرات: زیادہ مقدار میں اور غیر ضروری استعمال سے درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔  
دماغی الجھن لو بلڈ پریشر اور E.C.G. غیر طبعی۔

## تجارتی مرکبات

POTASOL

(INDOCO) 100ml bottle Rs. 8.11

POTINOL LIQUID

(CARNIMOL)

100ml Rs. 12.00; 200ml Rs. 21.00

K-GRAD

(WODKARDT) 6: Rs. 6.70

پوٹاسول

پاٹ نال

کے گارڈ



KAY-CIEL (STADMED) 228ml: Rs.23.50 کے سیل  
KEYLYTE (WALLACE) 200ml: Rs. 22.50 کے لائٹ

## RINGER LACTATE SOLUTION رنجر لکٹیٹ سلوشن

افعال و منافع: جلنے، شدید انفکشن، ورم باریطون قے دستوں کے سبب جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی Dehydration میں دینا ضروری ہے۔

مقدار و ترکیب: مریض کی ضرورت کے مطابق وریدی راہ سے ڈرپ لگائیں۔  
افعال منفی: ایڈین ڈیزیز، خون میں کھاری پن کی زیادتی میں اس کا استعمال مناسب نہیں۔

### تجارتی مرکبات

RINGER LACTATE INJ. I.P. (TABLETS INDIA) رنجر لکٹیٹ انجکشن  
540 ml Rs.21.50

## SODIUM BI CARBONATE سوڈیم بائی کاربونیٹ انجکشن INJECTION

افعال و منافع: گردوں کی خرابی کے سبب ہونیوالی خون میں تیزابیت، پچش دستوں ذیابیطیس نقص تغذیہ زہروں کا اثر، سلفونامائیڈ کا استعمال پانی اور نمکیات کی کمی میں اس کا استعمال مفید رہتا ہے۔  
مقدار و ترکیب: مریض کی ضرورت کے مطابق وریدی راہ سے دیا جائے۔  
منفی افعال: جگر کے امراض، صدمات قلب کے فعل میں کمی، میں اس کا استعمال نہیں۔

### تجارتی مرکبات

CARMINOL LIQ. (CARMINOL LABS) کارمی نول لکوڈ  
100ml: Rs.12.95

SODIUM BICARBONATE INJ (PREM PHARMA) سوڈیم بائی کارب انجکشن  
10ml amp. Rs.3.00



## SODIUM LECTATE INJ سوڈیم لکٹیٹ انجکشن

افعال و منافع: خون میں الکلائن پانی اور نمکیات کی کمی کو پورا کرتا ہے۔  
نقص تغذیہ سلفا تھیراپی کے واسطے ہونے والی کمی Dehydration میں اس کا استعمال  
زندگی بخش ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰۰ سے ۱۰۰۰ ملی لیٹر مریض کی ضرورت کے مطابق۔  
منفی افعال: جگر کے امراض صدمات وغیرہ میں استعمال نہ کرائیں۔

### تجارتی مرکبات

SODIUM LACTATE INJ (PREM PHARMA) سوڈیم لکٹیٹ انجکشن  
500ml Rs.33.00, 1000ml Rs.43.00

## SODIUM CHLORIDE سوڈیم کلورائیڈ

افعال و منافع: لو لگنا، بیہوشی، شدید قے اسہال کالرا، خون میں زہریلے اثرات مدرات کے استعمال  
سے ہونے والی نمک اور پانی کی کمی میں اس کا استعمال بہت مفید ہے۔

### تجارتی مرکب

SODIUM CHLORIDE SOLN 0.0% سوڈیم کلورائیڈ سلوشن  
ALBERT DAVID 540ml: Rs.21.00 ; 1000ml: Rs.31.00

خور دنی پانی نمکیات کی کمی دور کرنے والے مرکبات

## ORAL-ELECTROLYTES

افعال و خواص: جسم میں قے دستوں اور بیماریوں کے سبب ہونے والی کمزوری عضلات کی اینٹھن  
میں مفید ہیں۔

PEDITRAL (SEARLE) 29 gm Rs. 8.98  
ELECTRAL (F.D.C.) 35 gm Rs. 10.95

پڈی ٹرال پکٹ  
الکٹرال ملٹی ڈوز



## دافع وجع المفاصل گٹھیا ادویہ

### ANTI RHUMATOID DRUGS

#### D. PENICILLAMINE

#### ڈی پینی سیلامین

افعال و منافع: تخر المفاصل (جوڑوں کا پتھرا جانا) بچوں کی گٹھیا، وجع المفاصل و لسن ڈیزیز معدنیات کے سبب ہونے والا جوڑوں کا درد خون و پیشاب میں خرابی مزمن ورم جگر و مرارہ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: تخر المفاصل میں پہلے ۴ ہفتہ تک ۱۰۰ ملی گرام روزانہ دن میں ۲ بار دوسرے ۴ ہفتوں میں ۲۵ ملی گرام تیسرے ۴ ہفتوں میں ۱۵۰ ملی گرام بچوں کو ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام یومیہ ۲-۴ ہفتہ بعد ۱۵ سے ۲۰ ملی گرام کا اضافہ و لسن ڈیزیز میں ۲۵ ملی گرام سے ۱۰۰۰ ملی گرام یومیہ معدنی زہروں کے اثر میں ۹ گرام سے ۸ گرام روزانہ دینا چاہیے۔

منفی افعال: شدید پی سیلین کے ری ایکشن میں عضلاتی کمزوری گردوں کی خرابی میں نہیں دینا چاہیے۔  
مضر اثرات: ہضم کی خرابی بھوک کی کمی، بخار، ہڈیوں میں درد، ورم غد دلفاویہ الرجبی، قے متلی ابکائی ڈکاریں اور اسہال آنا۔

احتیاط: دوا سے آدھے گھنٹہ پہلے اور بعد کوئی غذا استعمال نہ کریں۔ دوران علاج خون کی جانچ کراتے رہیں۔

دواؤں کا رد عمل: تانبہ فولاد، گولڈ کے مرکبات اور دافع ملیریا ادویہ کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

#### AURANOFFIN

#### اورانو فین

افعال و منافع: وجع المفاصل اور تخر المفاصل میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ابتدا میں ۳ ملی گرام دن میں ۲ بار ۳ سے ۶ ماہ کھلائیں اگر افاقہ کم محسوس ہو تو دن میں ۳ بار دیں۔

منفی اثرات: آنتوں کی خرابی، جلد کا ورم، ہڈیوں کے گودے کی نشوونما میں کمی، خون کی غیر طبعی



حالت، گردوں کے امراض، جگر کے شدید امراض حمل اور ایام رضاعت میں نہیں دینا چاہیے۔  
 مضر اثرات: اسہال متلی، قے، درد شکم آنتوں میں زخم، ورم جلد پر داغ کھجلی، قلاع، (منہ پکنا) گنج  
 صفہ ذائقہ خراب، آنکھ دکھنا گردے کی خرابیاں، پھیپھڑوں میں تکلیف ہو سکتی ہے۔  
 احتیاط: جگر اور گردوں کی خرابی میں دوران علاج خون پیشاب کی جانچ کراتے رہیں حمل کی استعداد  
 والی خواتین کو علاج کے دوران اور ۶ ماہ بعد تک مانع حمل ادویہ استعمال کراتے رہیں۔  
 دواؤں کے ساتھ رد عمل: دافع ملیریا سیرم ویکسین، فینائل بیوٹازون اور آکسی فین بیوٹازون نہیں  
 دینا چاہیے۔

## تجارتی مرکب


GOLDAR (ALIDAC) Auranofin 3mg tabs 10: Rs.114.70 گولڈار

## AURO THIO MALATE SODIUM

اروتھیو می لیٹ سوڈیم

افعال و منافع: تحجر الفاصل، بچوں کی گھٹیا، جسم پر گھٹیا لگانے سے روکتی ہے۔ سونے (Gold) کا مرکب ہے۔

مقدار و ترکیب: مریض کے حالات کے مطابق ہفتہ میں ۱ بار عضلاتی انجکشن لگائیں ۶ ماہ میں ۱ گرام  
 تک دوا دی جاسکتی ہے۔





## مرخی عضلات، پٹھوں کو نرم کرنے والی ادویہ

### MUSCLE RELAXANT

#### ایٹراکیوریم بی سائی لیٹ ATRACURIUM BISYLATE

افعال و منافع: یہ ایک زبردست مرخی اور مسکن عضلات دوا ہے آپریشن کے وقت خصوصاً رحم مادر کے آپریشن شگاف قیصری میں مستعمل ہے۔

مقدار و ترکیب: ۳ء ۶ گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے وریدی بوتل کے ساتھ آہستہ آہستہ دی جاتی ہے۔

احتیاط: ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں عضلات، و اعصاب کے امراض ضعف، قلبی امراض جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی میں احتیاط برتیں۔

#### تجارتی مرکب

TRACRIUM (BURROUGHS WELLCOME)

ٹراکیوریم

10 mg per inj; 5x2ml Rs.333.90

#### BACLOFEN

#### بکلوفین

افعال و منافع: سر کے عضلات کی سختی اور تشنج میں شراٹمین کا درم نخاعی تکالیف کے سبب ہونے والا تشنج، نئی ساختوں، چوٹ، نخاعی دباؤ کے سبب ہونے والی مفلوجی حالت دماغی حادثات سے ہونے والے تشنج میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵ ملی گرام دن میں ۳ بار، مقدار رفتہ رفتہ بڑھائیں زیادہ سے زیادہ ۳۰ سے ۷۵ ملی گرام دی جاسکتی ہے۔ بچوں کو ۵ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے۔

منفی اثرات: دوا سے حساس مریضوں کو اور ایام رضاعت میں استعمال نہ کرائیں۔

مضر اثرات: سانس میں کمزوری، دورے، نشہ طاری ہونا، خشکی حرکات غیر ارادی چکر در در، ری



ایکشن، گھبراہٹ، بکواس کرنا فوری ہضم بستر پر پیشاب نکل جانا۔  
احتیاط: دماغی بیماریوں، مرگی، نفسیاتی الجھن، زخم معدہ، تنگی تنفس جگر اور گردوں کی خرابی، بڑھاپے  
حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں احتیاط رکھیں دوا اچانک بند نہ کریں۔

## تجارتی مرکب

LIORESAL

(HINDUSTAN CIBA GEIGY)

پوری سال

**CARISOPRODOL**

کیری سوپر وڈول

افعال و منافع: تجربہ الفاصل، ہڈیوں اور کمر کے مہروں میں درد شدید نقرس کمر کا درد، عرق النساء  
موج، چوٹ، گردن کا اکثر ناہڈی کی نرم ساختوں کا اور دماغی تناؤ، درد سر، جڑوں کا اکثر نا آپریشن کے بعد  
عسائت کی سختی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۳۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار ۵ سے ۱۰ سال کی عمر میں ۱۷۵ ملی گرام ۲ بار ۵ سال سے  
کم عمر میں دینا جائز نہیں۔

منفی افعال: خون کی خرابی دوا سے حساس الرجک مریضوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: چکر آنا خشکی متلی، فم معدہ پر درد، داغ پڑنا وجع القلب لو بلڈ پریشر، رمی ایکشن ہو سکتا ہے۔  
احتیاط: حمل ایام رضاعت میں احتیاط رکھیں۔

دواؤں کا رد عمل: شراب اور دوسری نظام عصبی کو کمزور کرنے والی ادویہ کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

## تجارتی مرکبات

**CARISOMA (WALLACE) 350mg tabs 10: Rs.28**

**CARISOMA COMPOUND (WALLACE)**

Carisoprodol 175mg, Paracetamol 350mg, Caffeine 32mg tabs 10  
Rs.16.60

**CHLOMEZANON**

کلو می زانون

افعال و منافع: کمر کے عضلات کا درد ناک تشنج ورم عسر الطمث (حیض کے درد) میں مفید ہے۔



مقدار و ترکیب: ۱۰۰ سے ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار  
 مضر اثرات: متلی، متلی، درد سر، چکر آنا، ضعف، نفاہت جلد پر داغ پر داغ برقان شحمی، غلغلہ دماغی ہو سکتا ہے۔  
 احتیاط: حمل، چکر اور گردوں کی خرابی میں۔  
 دواؤں کا رد عمل: MAOI شراب، نظام عصبی کو مفلوج کرنے والی ادویہ۔

## تجارتی مرکبات

<b>MYOSPAS</b>	(WIN MEDICARE)	مایو پاس
100mg tabs: 10	Rs. 25.00	
<b>NEUROPHEN COMPOUND</b>	(SWIFT)	نوروفین کمپونڈ
100mg tabs: 10	Rs. 20.55	
<b>SYSTAFLAM</b>	(SYSTOPIC)	سٹاسٹام
500mg tabs: 10	Rs. 39.80	

## CHLORZOXAZONE

## کلورزوکسازون

افعال و منافع: موج چوٹ وغیرہ کے سبب ہونے والے عضلات کے درد جوڑوں کا درد، عصبی درد،  
 بے چینی درد سر گردن کا اکثر ناپشت کا درد، ریزھ کے مہروں کا اور مودر، پیڑو کے عضلات کے درد میں  
 مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵۰ سے ۵۰۰ ملی گرام ۳-۴ بار یومیہ۔  
 منفی اثرات: دوا سے حساس مریضوں کو، حمل اور جگر کی خرابی میں دینا منع ہے۔  
 مضر اثرات: اگر دوا سے الرجی ہو تو دوا بند کر دینا چاہیے۔  
 دواؤں کا رد عمل: شراب کے ساتھ مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

<b>BRENLAX</b>	(KOPRAN) tabs 10	Rs. 29.10	برین لکس
<b>DUBLACTIN-MR</b>	(TABLETS INDIA) tabs: 6	Rs. 27	ڈبلاکٹین ایم آر
<b>DUODIL</b>	(DUPHAR) 10	Rs. 10.71	ڈیوڈیل



<b>FLAMAR-P</b>	(INDOCO)	قلمی
Chlorzocazone 250mg, paracetamol 300mg. tabs. 10	Rs 22.00	
<b>LOBAKTABS</b>	(GENO) 10	لوپک
	Rs 24.10	
<b>MOBIZOX</b>	(CROSSLANDS) 6	موبی زوکس
	Rs 24.10	
<b>PARAFLAX</b>	(ETHNOR) 10	پیر افلاکس
	Rs 22.95	
<b>PARAFON</b>	(EHTNOR) 20	پیر افون
	Rs 49.00	

## MEPHENSENIN

مے فن سین

افعال و منافع: مقامی مسکن درد مندر اور سرخی عضلات اثر کرتی ہے۔ درد ہورم، موج چوت، غیر درمی و جمع المفاصل تجرب المفاصل چھونے اور بڑے جوڑوں کے درد کو سکون پہنچاتی ہے صرف بیرونی استعمال کے لئے۔

مقدار و ترکیب: مرہم مقام مایوف پر لگا کر مالش کریں یہاں تک کہ دوا جذب ہو جائے۔  
منفی افعال: کئی پھٹی جلد پر کھلے زخموں اور غشائی طی پر نہ لگائیں۔

## تجارتی مرکبات

<b>FLAMAR CREAM</b>	(INDOCO) 20g	Rs 11.90	قلم کریم
<b>KILPANE CREAM</b>	(BIDDLE SAWYER) 28g	Rs 26.85	کل پن کریم
<b>PARBUDOL GEL</b>	(MERCURY) GEL, 20g	Rs 14.60	پار بڈول جیل
<b>RELAXYL</b>	(FRANCO INDIAN) 30g	Rs 15.79	ری لیکسائل کریم

## METHO CARBAMOL

میٹھو کاربامول

افعال و منافع: سر کے عضلات میں شدید تشنج، پرانے درد، عصبی تکلیف ہڈیوں اور جوڑوں کی تکلیف میں مفید و موثر ہے۔

مقدار و خوراک: معمولی تکلیف میں ۵ سے ۱ گرام دن میں ۴ بار شدید تکلیف میں ۵ سے ۱۵ گرام دن میں ۳ بار یومیہ ۲۳ سے ۲۸ گھنٹہ بعد مقدار کم کر دیں، شدید حالت میں وریدی عضلاتی انجکشن ۲ سے ۳ گرام لگائیں نے نے نس میں ۲ سے ۳ گرام وریدی ہر آدمی گھنٹہ پر لگائیں جب تک مریض غور دینی دوا پر نہ آجائے۔



**منفی افعال:** بیہوشی Coma دماغی کمزوری سرگی اور ضعف عضلات میں نہیں دینا چاہیے۔  
**مضر اثرات:** ٹنگلی چکر فتور ہضم بصارت میں فرق، درد سر، چہرہ سرخ، غنودگی بلند پریشتر کم سانس میں آگلی کبھی دورہ بھی آسکتا ہے۔  
**احتیاط:** وریدی انجکشن ۳ ملی لٹر / منٹ سے کم میں نہ لگائیں، حمل ایام رضاعت جگر اور گردوں کی نرابی میں احتیاط رکھیں۔  
**دواؤں کا رد عمل:** شراب و دیگر مرخی و عضلات و اعصاب ادویہ کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

### تجارتی مرکبات

<b>FLEXINOL</b>	(PROTEC) 10	Rs. 14.75	فلکسینول
<b>IBUGESIC-M</b>	(CIPLA)		ایو جے سک
Methocarbamol 750mg, Ibuprofen 400mg tabs: 6 tabs Rs. 17.40			
<b>ROBIFLAM</b>	(KHANDELWAL) 6	Rs. 17.24	روبی فلیم
<b>ROBINAX</b>	(KHANDELWAL) 10ml inj	Rs. 12.29	روبی نیکس انجکشن
<b>ROBINAX TABS</b>	(KHANDELWAL)		روبی نیکس ٹبلٹ
Methocarbamol 0.5g tabs 10: Rs. 14.92			
<b>ROBINAXOL</b>	(KHANDELWAL)		روبی ناکسال
Methocarbamol 350mg, paracetamol 250mg tabs 10: Rs. 13.53			

### ORPHENADRINE CITRATE آر فیناڈرین سائٹریٹ

**افعال و منافع:** مقامی مسکن درد مرخی عضلات دوا ہے، موج چوٹ کھیلوں کی چوٹ تشخ پینہ کا درد، درد سر اور سر کے عضلات میں درد و تشخ میں مفید ہے۔  
**مقدار و ترکیب:** ۲۰ سے ۳۵ ملی گرام دن میں ۲ بار۔  
**منفی افعال:** درم غده قد امیہ، ضعف عضلات اور گلو کو مامیں دینا مضر ہے۔  
**مضر اثرات:** منہ خشک بصارت میں فرق، چکر آنا، غشی غنودگی ضعف، ہضم کی خرابیاں جگر اور گردوں کے امراض میں مضر ہے۔  
**دواؤں کا رد عمل:** مانع افراز جگر ادویہ، شراب اعصاب کو مفلوج کرنے والی ادویہ MAOI دافع



ڈپریشن، پروپاکسی رین، اسٹیرائڈ باربیٹون اور فینائل پروٹازون کے ساتھ معطر ہے۔

## تجارتی مرکبات

ORPHAMOL	(TORRENT) tabs 10: Rs. 7.50	آر فامول
ORPHIPAL	(BIDDLE SAWYER) 10: Rs. 12.90	آر نیپال

## PANCURONIUM BROMIDE پن کیورونیم برومائڈ

افعال و منافع: آپریشن کے لئے بیہوشی کے دوران اور مصنوعی تنفس جاری رکھنے والے مریضوں کے عضلاتی تشنج کو دور کرنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: فوری طور پر ۴۰ سے ۱۰۰ مائیکروگرام / فی کلوگرام وزن کے حساب سے وریدی انجکشن لگایا جائے پھر ۱۰ سے ۲۰ مائیکروگرام دیا جائے۔

منفی اثرات: عام بیہوشی کی حالت میں اور دوا سے حساس مریضوں کو نہ دی جائے۔

احتیاط: ضعف فرہبی، پولیو جسم میں پانی کی کمی Dehydration گردوں کی خرابی، قلب و جگر کے امراض بانی بلند پریش اور حمل میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کا رد عمل: امینو گھائی کو سائیڈ، لیٹھیم انٹی بائیوٹک، میکینیشیم سالٹ، پروکینامائیڈ کوئی فی زین کے ساتھ خراب اثر ہوتا ہے۔

## تجارتی مرکبات

NEOCURON INJ	(NEON) 10x2 ml amp Rs. 166.50	نئو کیورون انجکشن
PANCONIUM	(KHANDELWAL) 2ml amp: Rs. 16.40	پان کونیم
PANURON	(TROIKAA) 5x2ml amp: Rs. 85.80	پان نوران
PAVULON	(INFAR) 1x2ml amp: Rs. 17.00	پاؤلون

## پائی پر کیورونیم برومائڈ PIPER CURONIUM BROMIDE

افعال و منافع: آپریشن کے لئے بیہوشی لانے کے لئے مستعمل ہے۔ سر کے عضلات کو ذمیل کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۰.۰۷ سے ۰.۸۵ ملی گرام / فی کلوگرام وزن کے حساب سے۔



مضر اثرات: سانس میں دشواری، پٹھ پریش میں کمی۔ قحی حرکات ست ہو جاتے ہیں۔

احتیاط: حالت حمل میں ڈاکٹر کی نگرانی میں استعمال کرائی جائے۔

دواؤں کا رد عمل: میکینیشیم سالٹ، کاربیلڈی پام، فین ٹائن اور کارنی سون کے ساتھ خراب اثر کرتی ہے۔

## تجارتی مرکب

ARD'JAN

(THEMIS CHEMICALS)

اردووالن

4mg per 2ml vial I.V. inj 2ml : Rs.62.30

## SUCCINYL CHOLINE CHLORIDE

سکسی ٹائل کو لین کلورائیڈ

افعال و منافع: چھوٹے آپریشن کے لئے اعصاب عضلات کو سن کرنے، غذائی نگلی ڈالنے ہڈیوں کو صحیح کرنے بجلی کی سنگائی، عضلات کو مستقل ڈھیلا رکھنے کے لئے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: مریض کی عمر، وزن اور ضرورت کے مطابق عموماً ۲۰ سے ۱۲۰ ملی گرام عضلاتی انجکشن وریدی ۵۰۰ ملی گرام گلوکوز یا سوڈیم کلورائیڈ میں ملا کر دیا جاتا ہے۔

منفی افعال: پوٹاشیم کی زیادتی، آنکھوں کے آپریشن، تیز بخار میں اس کا استعمال ممنوع ہے۔

مضر اثرات: عضلات میں درد، پیشاب میں ہیموگلوبین کا اخراج، حرارت جسمانی میں اضافہ، ری ایکشن، سینہ میں درد، آنکھوں میں دباؤ، Tension آنکھوں کی حرکات لعاب دہن، رطوبت معدہ میں اضافہ۔

احتیاط: بچوں اور حاملہ سے احتیاط برتنا چاہیے۔

دواؤں کا رد عمل: نیو آسکٹین، انٹی کولی نسرول، کے ساتھ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

MIDARINE

(BURROUGHS WELLCOME)

مڈلین

50mg per ml inj 2ml amps: Rs.9.63



SCOLINE INJ (GLAXO)

50mg/ml 10ml vial Rs 24 65

اسکولین انجکشن

## TIZANIDINE

## ٹائی زانی ڈین

افعال و منافع: یہ دوا سر کے عضلات کو ڈھیلا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آپریشن یا رنجھ کی ہڈی میں ٹراپی کے سبب ہونے والا تشنج، نئی ساختوں کے بننے، ایکسیڈنٹ دماغی اعصاب عضلات کے تشنج میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲ ملی گرام دن میں ۳ بار، ابتداء میں ۶ ملی گرام سے زیادہ نہیں رفتہ رفتہ مقدار خوراک میں اضافہ زیادہ سے زیادہ ۳۶ ملی گرام یومیہ ۳ خوراکیوں میں تقسیم کر کے۔

مضر اثرات: خشکی، الجھن، چکر آنا، منہ خشک، متلی، ہضم کی خرابیاں، بلڈ پریشر میں کمی ضعف نیند کی کمی سینہ میں درد۔

احتیاط: دوا سے الرجک مریضوں میں، جگر و گردوں کی کمزوری میں دوا کے بعد ڈرائیوری کرنا اور مشنری چاٹنا منع ہے۔

دواؤں کا رد عمل: دافع: بلڈ پریشر اور مدربول ادویہ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

SIRDALUID

(SANDOZ) 6 tabs Rs. 40. 00

سرڈالڈ

## TUBOCURARIN CHLORIDE

## ٹیوبوکیورارین

افعال و منافع: زچگی اور ہڈیوں کی درنگی کے لئے بیہوشی طاری کرنے عضلات کو ڈھیلا کرنے میں مستعمل ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۵ سے ۲۵ ملی گرام وریدی بچوں کو ۳ سے ۵ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے۔

منفی افعال: الرجک مریضوں کو، مہلک تیز بخاروں میں، قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔



مضر اثرات: بلڈ پریشر کم ہونا، چہرے پر سرخی، سینہ میں درد ہو سکتا ہے۔  
دواؤں کے ساتھ رد عمل: پروپرانولول، فروسی مائیڈ، منیجیل، آئی سو فلورین ہالوٹھین انٹی ہائیپوٹنک۔

### تجارتی مرکبات

**TUBARINE**

(BURROUGHS WELLCOME)

ٹوبارین

1.5ml amp x 10 : Rs.178.87

**VALETHAMATE BROMIDE** ویلی تھامیٹ برومائیڈ

افعال و منافع: اعصاب و عضلات کے تشنج کو دور کرتی ہے، درد، فم معدہ کا درد زخم معدہ و امعاء  
حنسائی درد و تشنج حیض کے درد میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ سے ۲۰ ملی گرام دن میں ۳ بار

متنی افعال: گھٹو کو ماورم غدہ قدامیہ میں نہیں دینا چاہیے۔

### تجارتی مرکبات

**EPIDOSIN**

(TTK PHARMA)

ایس پی ڈوسن

8mg, per ml: inj: 1ml Rs.7.38

**OSDIL**

(TROIKAA)

آس ڈل


8mg per ml inj. 5x1 ml amps: Rs.36.75

**VALOSIN**

(SIGMA LABS)

ولوسن

8mg per ml inj. 10x1 ml. Rs.46.40





**NEURO****محرک اعصاب و عضلات****MUSCULAR STIMULENTS****NEOSTIGMINE****نیو آسٹگمین**

افعال و منافع: عضلات کی کمزوری و ردستی لاغری میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۵-۳۰ ملی گرام دن میں ۳ بار خوردنی طور سے، وریڈی انٹروپین کے ساتھ ۱ سے ۵ ملی گرام۔

منفی افعال: معدہ و آنتوں اور پیشاب کی نالیوں کے تسدد (رکاوٹ) میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: متلی، تھوک کی زیادتی، اسہال و قوہ لچ ہو سکتا ہے۔

احتیاط: بلغمی دم، قلبی امراض بے چینی مرگی اور پارکنسن کے مرض میں نہیں دینا چاہیے۔

دواؤں کا رد عمل: مرخی عضلات ادویہ سائیکلو سپورین اور ہالوتھین کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

**تجارتی مرکبات****DIASTG INJ****(LIFE)****ڈیاسٹگ**

50x1ml (0.5mg) Rs.87.02; 50x1ml (2.5mg) Rs.198.92; 12x1ml (0.5mg) Rs.20.89; 12x1ml (2.5mg) Rs.47.73

**MYOSTIGMIN INJ****(NEON)****مایوسٹگمین**

0.5mg amp. 10x1ml Rs.39.45; 2.5mg amp 5x5ml Rs.63.00

**PROSTIMINE****(ROCHE)****پراسٹیمین مہلیٹ**

15mg tabs, 10 tabs Rs.36.49

**PROSTIMINE INJ****(ROCHE)****پراسٹیمین انجکشن**

0.5mg, 1ml Rs.1.73; 2.5mg : 1ml Rs.2.72

**TILSTIGMIN****(TABLETS INDIA)****ٹیل اسٹگمین مہلیٹ**

15mg. tabs. 10: Rs.40.45

**TILSTIGMIN INJ****(TABLETS INDIA)****ٹیل اسٹگمین انجکشن**

0.5mg per ml inj. 1ml: Rs.3.98, 5ml: Rs.10.91



## غیر کارٹی سونی دافع ورم و درد ادویہ NO STERIODAL ANTI INFLAMMATORY DRUGS (NSAID)

### ASPIRIN

### اسپیرین

افعال و منافع: دافع بخار، دافع ورم مسکن درد دوا ہے، وجع المفاصل کے درد و ورم کو دور کرتی ہے وجع القلب میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: بالغوں کو ۷۰۰ ملی گرام ہر ۴ گھنٹہ بعد شدید وجع المفاصل میں ۳.۵ سے ۷ گرام کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے ۱۲ سے ۱۶ سال کے بچوں کو ۳۳۰ ملی گرام ۷ سے ۱۲ سال تک ۲۷۰ ملی گرام ۳ سے ۶ سال تک ۱۷۵ ملی گرام ۱ سے ۳ سال تک ۹۰ ملی گرام دینا چاہیے۔

منفی افعال: زخم معده، خون کے رقیق ہونے، جریان خون ایام رضاعت، اسپرین سے حساس مریضوں، انجماد خون کی خرابی میں اور حمل ولادت کے ایام زچہ بچہ کے جریان خون میں دینا خطرناک ہے۔  
مضر اثرات: الرجی، ہاضمہ کی خرابیاں ہو سکتی ہے۔

احتیاط: سینے کے درد، جگر گردوں کی خرابی، بد ہضمی معمر افراد چھوٹے بچوں اور حمل کے آخری ماہ میں احتیاط رکھیں۔

دواؤں کا رد عمل: مانع انجماد خون و دافع ذیابیطیس ادویہ، میتھوٹرائکسٹ کارٹی سون کے مرکبات دافع تیزابیت کے ساتھ خراب اثر کرتی ہے۔

### تجارتی مرکبات

COLSPRIN 100

(RECKITT & COLMAN)

کول اسپرین

100mg: tabs: 14: Rs.2.05

DISPRIN

(RECKITT- COLMAN) 10 tabs : Rs.2.00

ڈسپرین

E-PRIN

(ELDER)

ای پرن

Aspirin 325mg enteric coated tabs 10: Rs.2.46

EQUAGESIC

(WYETH) 10: Rs.6.89

ایکو جے سک



## ڈیکسٹرو پروپاکسی فین DEXTRO PROPOXY PHENE

افعال و منافع: ہر طرح کے جسمانی درد اور واسطہ درجے کے درد میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۶۵ سے ۱۰۰ ملی گرام۔

منفی افعال: حساسیت والے افراد، جگر کی خرابی اور گلوکوما میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: چکر آنا، متلی، قے قبض جلد پر داغ پڑنا۔

احتیاط: جگر گردوں اور پھیپھڑوں کی خرابی میں خلل دماغ چھوٹے بچوں اور حاملہ کو احتیاط لازم ہے۔

دواؤں کا رد عمل: شراب اور مرکزی عصبی کو کمزور کرنے والی ادویہ بنزودایازین بیٹابلاک کرکار بامازی

پائین فین نائن اور وار فین کے ساتھ دینا مضر ہے۔

### تجارتی مرکبات

ANADIX	(CONCEPT) 12: Rs.7.82	انازیکس
BREN-PX	(KOPRAN) 10x10: Rs.124.80	برین پی ایکس
BUTA-PROXYVON	(WOCKHARDT)	یوٹا پروکسیون
caps 8, Rs.12.30		
COMBIGESIC	(UNILOIDS) caps: Price N/A	کمیجے سک
CORBUTYL	(ROUSSEL) 10: Rs.9.36	کاربوٹیل
IBU-PROXYVON	(WOCKHARDT) caps: 6: Rs.8.50	ایبو پروکسیون
PARVON	(JAGSON PAL) caps: 10: Rs.10.75	پارون
PARVON FORTE	(JAGSON PAL) 10: Rs.17.30	پارون فورٹ
PARVON-N	(JAGSON PAL) 10: Rs.5.43	پارون این
PROXYTAB	(WOCKHARDT) 6: Rs.6.83	پراکسی ٹیب
PROXYVON	(WOCKHARDT) caps 8: Rs.9.05	پراکسی وان
SUBDU	(U.S.V.&P) caps: 8: Rs.7.02	سب ڈیو
SUDHINOL	(RANBAXY) tabs: 10: Rs.11.53	سدھینال
SYSTAFLAM	(SYSTOPIC) tabs 10x10: Rs.140.00	سسٹا فلام
WALAGESIC	(WALLACE) caps 10: Rs.11.30	والےجے سک
WYGESIC	(WYETH) caps 6: Rs.7.04	وائیجے سک



## DICLOFENAC SODIUM ڈکلو فینک سوڈیم

افعال و منافع: وجع امفاصل (گٹھیا) تخریج امفاصل، جوڑوں (کا پتھر اجاتا) کمر کے مہروں میں ورم غیر گٹھیاں درد ورم شدید نقرس، چوٹ آپریشن دانت کا درد پیڑو کے ورم درد حیض کی تکالیف میں مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: ۷۰ سے ۵۰ ملی گرام ۲-۳ خوراکیوں میں ۱۰۰ ملی گرام یومیہ دیا جاسکتا ہے بچوں کو ۳، ۵ سے ۵ ملی گرام / فی کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے، شدید درد میں کھانے سے پہلے لینا چاہیے۔

مضر اثرات: درد فم معدہ، ڈکاروں اور تیزابیت کی زیادتی متلی درد سر چکر داغ پڑنا کھلی جسم پر ابھار نمودار ہونا، آلات ہضم سے جریان خون زخم معدہ جگر اور گردوں کے افعال میں خرابی۔

احتیاط: امراض معدہ و امعاء میں معدہ آنتوں کے زخم میں قلب و جگر گردوں کی خرابی ایام حمل رضاعت کم سن بچوں اور معمر افراد میں احتیاط رکھیں۔

دواؤں کا رد عمل: لیٹھیم، ڈیجاکسن کے ساتھ دینا مضر ہے۔

### تجارتی مرکبات

DIC-SR (DEE PHARMA) 100mg S.R. tabs; 10: Rs.13.10	ڈک ایس آر
DIC-FA (DEE PHARMA) 46.5mg tabs: 10: Rs.7.10	ڈک ایف اے
DIC INJ (DEE PHARMA)	ڈک انجکشن
25mg per ml inj. 3ml amp: Rs.3.80	
DIC TOP GEL (DEE PHARMA) 30g tube: Rs.23.80	ڈک ٹاپ جیل
DICLOFAM (MAX) 50mg tabs; 10 Rs.7.06	ڈکلو فام ٹیبلٹ
DICLOFAM INJ (MAX) 25mg per ml inj; 3ml Rs.2.67	ڈکلو فام انجکشن
DICLOFEN INJ (BIOCHEM)	ڈکلو فین انجکشن
25mg/ml, excipients q.s. inj; 3ml Rs.3.05	
DICLOFEN-MR (P&B LABS) 10 tabs Rs.24.67	ڈکلو فین ایم آر
DICLOFENAC SOD. INJ (PREM PHARMA)	ڈکلو فینک
3ml amp: Rs.4.00, 30ml vial : rs.17.50	



<b>DICLOGESIC</b>	(TORRENT)	ڈکلو جے سٹک
Diclofenac sod 50 mg Paracetamol 500mg tabs 10	Rs. 14.90	
<b>DICLOMAX 25/50</b>	(TORRENT)	ڈکلو میکس
25mg 10: Rs. 4.30, 50mg 10: Rs. 7.92		
<b>DICLOMAX GEL</b>	(TIDE (TORRENT) 30g: Rs. 19.90	ڈکلو میکس جیل
<b>DICLOMAX INJ</b>	(TIDE (TORRENT) 3ml amp. Rs. 3.00	ڈکلو میکس انجکشن
<b>DICLOMOL TABS</b>	(WIN MEDIARE)	ڈکلو مول
Diclofenac sod 50mg, paracetamol paracetamol IP 500mg tabs 10	Rs. 13.90	
<b>DICLOMOL INJ</b>	(WIN MEDICARE)	ڈکلو مول
10 ampoules	Rs. 30.60	
<b>DICLOMOL SR TABS</b>	(WIN MEDICARE)	ڈکلو مول ایس آر
100mg tabs 10x10	Rs. 134.70	
<b>DICLONAC</b>	(LUPIN) 50mg tabs 10: 8.57	ڈکلو نیک
<b>DICLOTAL D.T.</b>	(BLUE CROSS)	ڈکلو ٹال ڈی ٹی
100mg caps 10	Rs. 14.00	
<b>DICLOTAL C.R.</b>	(BLUE CROSS)	ڈکلو ٹال سی آر
100mg caps 10	Rs. 14.00	
<b>DICOFEN-50</b>	(KANPHA) 50mg tabs 10, Rs. 7.09	ڈی کو فین ۵۰
<b>DIFEN INJ</b>	(SOL) 3ml inj. 5x3ml. Rs. 13.80	ڈی افین انجکشن
<b>DIFEN GEL</b>	(SOL) 30g Rs. 23.00	ڈی افین جیل
<b>DIFEN SR</b>	(SOL) caps 10x10: Rs. 131.60	ڈی افین ایس آر
<b>DIFISAL</b>	(KOPRAN)	ڈی افی سیل
50mg tabs 10x10	Rs. 73.33	
<b>DIPROMOL</b>	(BDH) 10: Rs. 13.25	ڈی پرو مول
<b>DOFLEX</b>	(JAGSANPAL) 50mg tabs: 10: Rs. 8.50	ڈی افلیکس
<b>DUOFLAM GEL</b>	(SIGMA LABS) 25g tube: Rs. 19.46	ڈیو فلام جیل
<b>DYNAPAR-EC</b>	(TROIKAA)	ڈی ناپار ایس آر
50mg: enteric coated tabs: 10	Rs. 7.10	
<b>DYNAPAR</b>	(TROIKAA)	ڈی ناپار انجکشن
5x3ml amp: Rs. 13.50, 30ml vial: Rs. 17.00		



<b>FENACON</b>	(MODI-MUNDI)	فیناکون ٹبلٹ
100mg c.r. tabs 10	Rs. 15.95	
<b>FENACON GEL</b>	(MODI-MUNDI) 20g tube	فیناکون جیل
<b>FENAPLUS</b>	(MODI-MUNDI) tabs: 10	فیناپلس
<b>FENSAIDE</b>	(NICHOLAS) 50mg, tabs: 10	فین سڈ
<b>FENSAIDE GEL</b>	(NICHOLAS) 30g	فین سڈ جیل
<b>FENSAIDE INJ</b>	(NICHOLAS) 3ml inj. 3ml	فین سڈ انجکشن
<b>FLAMARIN TABS</b>	(FALMA)	فلے مارین ٹبلٹ
50mg tabs, 10	Rs. 6.50	
<b>FRENAC</b>	(WAVE) tabs: 10	فری نیک
<b>INAC 50</b>	(RECON) 50mg e-c tabs: 10	این ایک ۵۰
<b>INAC-TR</b>	(RECON)	این ایک ٹی آر
100mg: timed release caps: 10	Rs. 17.70	
<b>INAC INJ</b>	(RECON) 3ml amp	این ایک انجکشن
<b>INAC GEL</b>	(RECON)	این ایک جیل
<b>JONAC GEL</b>	(GERMAN REMEDIES) 30g	جون ایک جیل
<b>JONAC TABS</b>	(GERMAN REMEDIES)	جون ایک ٹبلٹ
50mg, tabs 10	Rs. 4.30	
<b>JONAC INJ</b>	(GERMAN REMEDIES)	جون ایک انجکشن
3ml inj 1 amp	Rs. 3.00	
<b>HALORAN GEL</b>	(HIND ANTIBIOTICS)	ہالوران جیل
1.16% Gel 20g	Rs. 16.12	
<b>HALORAN-50</b>	(HIND ANTIBIOTICS)	ہالوران ۵۰
50mg tabs 10x10	Rs. 80.70	
<b>MAXREL</b>	(DEYS) 10	میکس ریل
<b>MOBINAK</b>	(CROSLANDS)	موبی نیک
50mg e-c tabs 10	Rs. 9.50	
<b>MOVONAC</b>	(BOEHRINGER-M)	مووونیک
50mg e.c. tabs, 10	Rs. 5.73	
<b>NAC-50</b>	(SYSTOPIC) 50mg e.c tabs 10	نیک ۵۰
<b>NACLO-TR</b>	(NATCO) 100mg caps 10	نیک لو ٹی آر
<b>NACLO INJ</b>	(NATCO) 3ml amp	نیک لو انجکشن



<b>NACPOT</b>	(NATCO)	50mg tabs: 10: Rs. 14.00	نیکپاٹ
<b>OSTEOFLAM</b>	(INDOCO)	50mg tabs: 10: Rs. 5.70	اسٹیفلام
<b>OSTEOFLAM INJ</b>	(INDOCO)	5x3 ml: Rs. 14.85	اسٹیفلام انجکشن
<b>POWER GESIC</b>	(JENBURKT)	tabs: 10: Rs. 26.95	پاور جے سک
<b>RELAXYL TABS</b>	(FRANCO-INDIAN)		ری لکسائل ٹبلٹ
		50mg e-c tabs 10: Rs. 6.96	
<b>SOLUNAC</b>	(SYSTOPIC)		سولونیک
		46 5mg dispersible tabs: 10: Rs. 9.20	
<b>SYSTAFLAM</b>	(SYSTOPIC)	10: Rs. 36.10	سٹاسٹیم
<b>TROMAGESIC</b>	(THEMIS CHEMICALS)		ٹروما جے سک ٹبلٹ
		50mg e.c. tabs; 10: Rs. 3.75	
<b>TROMAGESIC INJ.</b>	(THEMIS CHEMICALS)		ٹروما جے سک انجکشن
		3ml amp: Rs. 2.64	
<b>VOLNI GEL</b>	(GROSLANDS)	30g Price N/A	ولنی جیل
<b>ULTRA-K</b>	(GROSLANDS)		الٹرا کے
		50mg tabs; 10: Rs. 18.65	
<b>VOVERAN</b>	(H. CIBA- GEIGY)		وووی دین ٹبلٹ
		50m tabs 10: Rs. 7.30	
<b>VOVERAN INJ</b>	(H. CIBA- GEIGY)		وووی دین انجکشن
		3ml inj 25's Rs. 70.00	
<b>VOVERAN SR</b>	(H. CIBA- GEIGY)		وووی دین ایس آر
		10x10: Rs. 118.00	
<b>VOVERAN EMULGEL</b>	(H. CIBA- GEIGY)		وووی دین جیل
		50g: Rs. 34.41	
<b>ZODIC-P</b>	(DEE PHARMA)	tabs: 6: Rs. 24.50	زوڈیکی
<b>ZOFEN-K</b>	(GUARDIAN)	50mg: 10: Rs. 19.50	زوفن کے

## FLURBI PROFEN فلوربی پروفن

افعال و منافع: وجع المفاصل، تخر المفاصل، (جوڑوں کا پھرتنا) کمر کے مہروں میں درد اور

دوسرے درجہ کی تکالیف میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۵۰ سے ۲۰۰ ملی گرام ۳-۴ خوراکیوں میں تقسیم کر کے۔



منفی افعال: زخم معده میں مضر ہے۔

مضر اثرات: بد ہضمی متلی، قے، معده آنتوں سے جریان خون اسہال منہ میں زخم پتی اچھلنا شرابی، یرقان شحمی، خون میں تھرا مبین اور سفید ذرات W.B.C کی شدید کمی اسے پلاسٹک انیمیا، گردوں میں خرابی ہو سکتی ہے۔

دواؤں کا رد عمل: فرد سی مائیڈ، مانع انجماد خون ادویہ، ڈی جاکسن، ٹالپو ٹامائیڈ اور دافع تیزابیت کے ساتھ نقصان دہ ہے۔

## تجارتی مرکبات

ARFLUR	(FDC)	آر فلور
50mg: 10: Rs.15.10; 100mg: 10: Rs.29.25		
FLUROFEN	(HOECHST) 100mg tabs 10: Rs.22.50	فلوروفین
FROBEN	(BOOTS) 100mg tabs 10: Rs.29.60	فروبین

## IBUPROFEN

## آئی بوپروفن

افعال و منافع: تجر الفاصل، کمر کے مہروں کا درد دورم، جوڑوں کے درد ورم کندھوں کا درد نرم ساختوں کا ورم، موج چوٹ کا درد، حیض کا درد (عسر طمث) دانتوں کی تکالیف، درد شقیقہ، عصبی اور عضلاتی درد اور بخار کی اکسیر صفت دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۲۰۰ سے ۱۸۰۰ ملی گرام یومیہ کئی خوراکیوں میں تقسیم کر کے بچوں کو ۲۰ ملی گرام / کلو گرام وزن کے حساب سے ۳ خوراکیوں میں تقسیم کر کے دی جائے۔

منفی افعال: دوا سے حساس مریضوں کو زخم معده میں نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: ہضم کی خرابی، درد سر، چکر آنا، اسہال قے متلی، جلد پر داغ معده میں۔ درد و جلن، یرقان، ورم جگر، ہاتھ پیروں اور منہ پر ورم گردوں میں خرابی، ڈپریشن W.B.C کی کمی۔

احتیاط: دمہ جگر اور گردوں کی خرابی میں، جریان خون، امراض قلب، اور حاملہ کو احتیاط برتیں۔

دواؤں کا رد عمل: اسپرین مانع انجماد خون ادویہ کے ساتھ نقصان دہ ہے۔



## تجارتی مرکبات

<b>ACTIMOL-F</b>	(PHARMED)	آئی مول مہلیٹ
Ibuprofen 400mg, paracetamol 400mg tabs: 10: Rs. 13.80		
<b>ACTIMOL-F SUSP</b>	(PHARMED) 50ml:Rs. 10.50	آئی مول سرپ
<b>ARINAC</b>	(BOOTS) 10: Rs. 10.00	آری نیک
<b>ARMIX TABS</b>	(BPL) 10: tabs Rs. 14.98	آر مکس
<b>BESTOPHEN-I</b>	(BIOLOGICAL E) 10: Rs. 8.16	بستوفین
<b>BREN</b>	(KOPRAN)	برین
200mg: 10: Rs. 4.82; 400mg: 10: Rs. 7.58; 600mg: 10: Rs. 11.40		
<b>BREN SUSP</b>	(KOPRAN) 60ml: Rs. 9.00	برین سرپ
<b>BRENFED</b>	(KOPRAN) 10x10 Rs. 110	برین فیڈ
<b>BREN LAX</b>	(KOPRAN) tabs 10x10 Rs. 290.10	برین لیکس
<b>BRUDESIC</b>	(DEYS) 200mg: Rs. 3.79; 400mg: Rs. 6.74	بروڈی سک
<b>BRUFEN</b>	(BOOTS)	بروفن
200mg: 10: Rs. 3.80 ; 400mg: 10: Rs. 6.76 ; 600mg: 10: Rs. 76		
<b>COMBIFLAM TABS</b>	(ROSSEL) 10: Rs. 8.45	کبھی فلم مہلیٹ
<b>CORFLAM</b>	(CORE) 10: Rs. 12.50	کار فلم مہلیٹ
<b>CORFLAM PEAD SUSP</b>	(CORE) Rs. 12.00	کار فلم سرپ
<b>CROCIN-IBU</b>	(DUPHAR) tabs 10: Rs. 7.30	کرو سین ابو
<b>DORFEX</b>	(PFIMEX) tabs: 10: Rs. 10.00	ڈار فیکس
<b>DUOFLAM</b>	(SIGMA LABS) tabs 10: Rs. 12.20	ڈوا فلم
<b>EMBRU</b>	(MALLADI)	امبرو
200mg: 10x10; Rs. 45.00; 400mg: 10x10 Rs. 72.00		
<b>EMFLAM</b>	(MERCK)	ایم فلم مہلیٹ
200mg: 10 Rs. 3.79; 400mg: 10; Rs. 6.74; 600mg: 10: Rs. 9.87		
<b>FEBRAFEM</b>	(ASTRA-IDL) tabs: 10: Rs. 9.72	فہر افیم
<b>FENCETA</b>	(ALKEM) tabs 10: Rs. 11.40	فین سی ٹا
<b>FENLONG-400</b>	(SOL) caps 10x10; Rs. 177.30	فین لانگ
<b>FLAMAREST TABS</b>	(FALMA) tabs 10: Rs. 11.75	فلم آر یسٹ
<b>FLAMFORT</b>	(PHARMASIA) tabs: 10: Rs. 14.11	فلم فورٹ
<b>FLEXON</b>	(ARISTO) tabs 10: Rs. 11.95	فلکسون مہلیٹ



<b>IBODIK SUSP</b>	(PREM PHARMA)	ابو ذک سرپ
60ml bottle Rs.12.30		
<b>IBUACT</b>	(DEE PHARMA) tabs: 10: Rs.9.80	ابو ایکٹ ٹبلیٹ
<b>IBUCLIN</b>	(STANGEN) tabs 10: Rs.8.25	ابو سیلین ٹبلیٹ
<b>IBUCON 200/400 PLUS</b>	(CONCEPT)	ابو کون ٹبلیٹ
200mg: 10: Rs.8.25 ; 400mg: 10: Rs.12.00		
<b>IBUFLAMAR 200/400</b>	(INDOCO)	ابو فلام ٹبلیٹ
200mg: 10: Rs.3.81 ; 400mg : 10: Rs.6.87		
<b>IBUGESIC SUSP</b>	(CIPLA) 50ml: Rs.6.50	ابو جے سک سرپ
<b>IBUGESIC</b>	(CIPLA)	ابو جے سک
200mg: 10: Rs.3.80; 400mg: 10: Rs.6.74; 600mg: 10: Rs.9.44		
<b>IBUGIN</b>	(GLAXO)	ابو جن
200mg: 10: Rs.3.68; 400mg: 10: Rs.6.50		
<b>IBUPLUS</b>	(SYSTOPIC) 10: Rs.12.63	ابو پلس
<b>IBU-PROXYVON</b>	(WOCKHARDT) caps: 6: Rs.7.90	ابو پراکسی وون
<b>IBU-PR</b>	(PHARMASH) caps: 10: Rs.12.75	ابو پی آر
<b>IBURIN</b>	(UNISEARCH)	ابو رین
400mg: 10: Rs.6.69; 600mg: 10: Rs.9.70		
<b>IMOL</b>	(RECON) 10: Rs.12.90	آئی مول ٹبلیٹ
<b>INFLAPEN CAPSULES</b>	(GLAXO ALENBURYS)	ان فلام پن کپسول
caps 10: Rs.8.51		
<b>LEDERFLAM PLUS</b>	(LEDERLE) 10: Rs.8.17	لیڈر فلام پلس ٹبلیٹ
<b>LOBAK</b>	(GENO) tabs 10: Rs.24.10	لو بیک
<b>NEUROPHEN FORTE</b>	(SWIFT)	نوروفین فورٹ
caps 10x10 : Rs.85.40		
<b>NEUROPHEN-P SUSP</b>	(SWIFT) 50ml: Rs.11.75	نوروفین فورٹ
<b>NORSWEL</b>	(HEALTH CARE (CADILA)	نار سویل
10: Rs.6.54		
<b>NOVIGAN</b>	(STANGEN) 10: Rs.10.00	نووی گان
<b>P-FEBRIN</b>	(NEO PHARMA) tabs: 4: Rs.5.00	پی فمبرین ٹبلیٹ
<b>PARBUDOL SUSP</b>	(MERCURY) 50ml: Rs.10.05	پاربیڈول سرپ
<b>PARBUDOL TAB</b>	(MERCURY) 20x6 tabs: Rs.144.74	پاربیڈول ٹبلیٹ



**PROFENTOL SUSP**

(REMEDIES (INDIA) پرو فین ٹول سرپ

60ml: Rs. 10.05

**PROMOL**

(BDH) tabs: 10: Rs. 10.60

**RIBUFEN GEL**

(BOOTS) gel 30g Rs. 21.16

**RUMANIL**

(INGA)

200mg: 10: Rs. 4.95; 400mg: 10: Rs. 7.80; 600mg: 10: Rs. 12.50

**SUBDU**

(U.S. VITAMIN) caps: 8: Rs. 7.02

**TABALON**

(HOECHST) tabs 10: Rs. 6.75

**TRIBUSYNTH**

(ASTRA-IDL) tabs 10: Rs. 8.17

**XTRAGESIC**

(CROSLANS) 6: Rs. 8.50

**ZUPAR**

(GLAXO ALENBURY) caps 10: Rs. 8.34

**INDOMETHASINE**

انڈو میتھاسین

افعال و منافع: زبردست محلل ورم و تشنج و مسکن درد دوا ہے۔

جہاں دوسری دوائیں بے اثر ہوں یہ دوا موثر رہتی ہے، وجع المفاصل (جوڑوں کے درد) تھج المفاصل (جوڑوں کا پتھرتا) جوڑوں میں نئی ساختوں کے پیدا ہونے سے جوڑوں کے اکٹھے ہونے کے مہروں میں درد شدید نقرس عضلات و عظام میں چوٹ و ورم غصاریف میں ورم و درد، کندھوں کا نمجہ ہونا، Frozen Shoulder اور کمر کے درد میں عجیب الفع چیز ہے۔

مقدار و ترکیب: ۷۵ سے ۱۵۰ ملی گرام یومیہ کئی خوراکیوں میں منقسم کر کے دوا غذا کے ساتھ یا فوراً بعد استعمال کرائیں۔

منفی افعال: زخم معدہ کے مریضوں کو اسپرین سے حساس مریضوں کو حمل اور ایام رضاعت میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: فتور ہضم چکر آتا۔

احتیاط: پارکن ویزیز، نفسیاتی عوارض اور بچوں میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کا رد عمل: سیلی سیلیٹ، لیٹھیم، کارٹی سون کے مرکبات، مدرات، پیٹابلاک اور پروپونیل سڈ کے ہمراہ نقصان دہ ہے۔



## تجارتی مرکبات

IDICIN	(IDPL) 25mg caps 10	Rs. 4.70	آئی ڈی سین
INDOCAP	(JAGSONPAL) 25mg caps 10	Rs. 8.10	انڈو کپ
INDOFLAM	(RECON) 25mg caps 10	Rs. 7.96	انڈو فلیم

## ISOPRO PYLAN TIPYRIN آئی سو پرو پائل این ٹی پائی رین

افعال و منافع: وجع المفاصل، تخر المفاصل (مٹھیا، جوڑوں کا پتھر اجاتا) جوڑوں میں نئی ساختوں کے سبب ہونے والا درد، نقرس، موج، غصاریف، غشاء العظام و دیگر عضلات و عظام کے درد میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۱۵۰ سے ۳۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار

## KETO PROFEN

## کیٹو پرو فین

افعال و منافع: مٹھیا، جوڑوں کا پتھر اجاتا، ہڈیوں کے جوڑوں کا جڑ جانا ساخت بننے کے سبب ہونے والا درد کمر کے مہروں میں درد دورم عضلات و عظام و حوض کے درد میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار کھانے کے ساتھ۔  
منفی افعال: زخم معده، امراض قلب جریان خون کے اور دوا سے الرجک مریضوں کو نہ دیں۔  
مضر اثرات: متلی فم معده پر درد جلن، اسہال پیٹ کی خرابیاں تے، چکر آنا درد سر، جلد پر داغ پڑنا، بھوک کی کمی، ورم حج oedoma جسم میں پانی رکنا، معده میں زخم بننا، قات غذائی سے جریان خون، ڈپریشن، بصارت میں فرق وری ایکشن ہو سکتا ہے۔  
دواؤں کا رد عمل: اسپرین اور مانع انجماد خون لودیہ کے ساتھ ہرگز استعمال نہ کریں۔

## تجارتی مرکبات

OSTOFEN	(TORRENT)	اسٹوفین
50mg caps 10	Rs. 8.90	
PROFENID-CR	(RHONE POULENC)	پروفینڈ
100mg controlled release caps 10	Rs. 30.25	



## KETO ROLAC TROMETHAMINE

## کیٹورولیک ٹرو میتھامین

افعال و خواص: اپریشن کے بعد ہونے والا معمولی اور شدید درد، شدید درد گردہ، چوٹ کینسر کے درد میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: خوردنی، ۱۰ ملی گرام دن میں ۳ بار فوری سکون کے لئے ۳۰ ملی گرام عضلاتی دے دیں۔

منفی افعال: حساس مریضوں کو زخم معده کے مریضوں کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: متلی، بد ہضمی، درد نف معده، اسہال قبض، نفخ شکم زخم معده مقعد سے خون آنا قلاع (بے پکنا) خشکی، چکر درد سر، خشکی بے چینی ڈپریشن نیند کی کمی سانس میں تنگی دمہ، پیشاب بار بار آنا، کھجی پتی اچھلتا ذائقہ و بصارت میں فرق ہو سکتا ہے۔

احتیاط: جریان خون کی حالت میں، مانع انجماد خون ادویہ کے ساتھ، گردوں کے امراض سرخ ذرات R.B.C. کی کمی میں پروٹین والی دواؤں اور غذاؤں کے ساتھ احتیاط رکھیں۔

## تجارتی مرکبات

DOLAC	(CADILA)	10mg tabs 10: Rs. 17.70	ڈولاک
KELAC	(INTAS)	10 tabs: Rs. 18.00	کیلاک ٹبلٹ
KENALFIN TABS	(GUFIC)	10mg tabs 10: Rs. 18.10	کینالفن ٹبلٹ
KETANOV	(RANBAXY)	10mg tabs 10: Rs. 19.70	کیتانو ٹبلٹ
KITONIC TABS	(NICHOLAS-PHARMAL)	10mg tabs 10: Rs. 18.00	کیتانک ٹبلٹ
KITOWIN	(DEE PHARMA)	10mg tabs 10: Rs. 18.70	کے ٹوون
NODINE	(PROTEC)	10mg tabs 10: Rs. 17.73	نوڈن
TOROLAC	(LUPIN)	30mg/1ml inj Rs. 18.00	ٹورولیک
TORVIN	(TIDE (TORRENT)	10mg: tabs: 10: Rs. 18.90	ٹارون ٹبلٹ
TRONAL INJ	(BIOLOGICAL E)	30mg/1ml inj Rs. 10	ٹرونال انجکشن
TRONAL TABS	(BIOLOGICAL E)	10mg: 10: Rs. 10	ٹرونال ٹبلٹ
ZOROVON	(SUN PHARMA)	10mg tabs: 10: Rs. 18	زوروون ٹبلٹ



**ZORQVON INJ** (SUN PHARMA)  
30mg per ml inj. 1 amp Rs.9.10

زورون انجکشن

## MEFANAMIC ACID

منفی ٹامک ایسڈ

افعال و منافع: عضلاتی، چوٹ کا درد، دانتوں کی تکالیف، درد سر، ہڈیوں کے جوڑ میں درد، جوڑوں کے پتھر اجانے اور حیض کی تکالیف میں مفید ہے بچوں میں دافع بخار اثر کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار کھانے کے ساتھ یا فوراً بعد بچوں کو سرپ پلائیں ۷ دن سے زیادہ دوا نہ کھلائیں۔

منفی اثرات: معدہ کے زخم و درم میں حمل، گلوکوما گردوں و جگر کے امراض، آنکھوں کے درم میں اس کا استعمال نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: اسہال جلد پر داغ، گردوں کی خرابی خون میں تھرا سین کی کمی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: مزمن شری Urticaria اور دمہ میں پانی کی کمی میں اور بوڑھے افراد میں احتیاط رکھیں۔ دوران علاج خون کی جانچ کراتے رہیں۔

دواؤں کا رد عمل: مانع انجماد خون ادویہ، سلفونائی لوریاہائی ڈن ٹائن کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

## تجارتی مرکبات

<b>DYSMEN</b>	(SIGMA LABS)	ڈس من
250mg, dicyclomine hcl 10mg tabs: 10:	Rs.10.65	
<b>LENAGESIC</b>	(TATA PHARMA)	لے نا جے سک
250mg, acetaminophen 500mg tabs 10:	Rs.8.00	
<b>MEFTAL</b>	(BLUE CROSS) 250mg tabss 10:	میف ٹال
Rs.9.90		
<b>PLACENTIRFX</b>	(ALBERT DAVID) 2ml Rs. 5.99	پلاسٹریکس
<b>PONSTAN KAPSEALS</b>	(PARKEDAVIS)	پان اسٹان کپسول
250mg: 10: Rs.12.40; 500mg: 10: Rs.18.50		
<b>ZE-SPAS</b>	(KEE PHARMA)	زی اسپاس
250mg, with dicyclomine hcl 10mg: tabs: 10:	Rs.11.50	



## ناپروکسن NAP ROXEN

افعال و منافع: وجع المفاصل، تخریب المفاصل (جوڑوں کا درد، پتھرا جانا) جوڑوں میں نئی ساخت بنانا، کمر کے مہروں میں درد و درم شدید نقرس، عضلات و عظام میں نئی ساختوں کے سبب درد و درم اور حیض کے درد میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵۰ سے ۵۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار یومیہ مرض کو کنٹرول میں رکھنے کے لئے ۲۵۰ ملی گرام سوتے وقت درد و حیض اور دیگر دردوں کے لئے ۵۰۰ ملی گرام پہلی خوراک پھر ہر ۸ گھنٹہ بعد ۲۵۰ ملی گرام بچوں کو ۱۰ ملی گرام / ۲ خوراکوں میں تقسیم کے شدید نقرس میں ۷۵۰ ملی گرام پہلی خوراک پھر ہر ۸ گھنٹہ بعد ۲۵۰ ملی گرام دی جائے۔

منفی افعال: زخم معده اور حساسیت کے مریضوں کو اس کا استعمال نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: نفور ہضم، غذائی تالی میں جریان خون، زخم معده قبض معده میں جلن درد شکم، متلی، دور رس، چکر آنا، خستگی، کھجلی جلد پر دافع پڑنا، کان بجنا جسم پر درم Oedema درم گردہ پر کان درم جگر ہو سکتا ہے۔

احتیاط: زخم معده، ہضم کی خرابی، جگر اور گردوں کے امراض استقاء القلب ہائی بلڈ پریشر یوٹھوں، حاملہ یام رضاعت اور مرگی میں احتیاط برتنا چاہیے۔

دواؤں کا رد عمل: پروینی سڈ، دافع تیزابیت سوڈیم ہائی کارب خوردنی مانع انجمد خون لادو یہ فین ٹائن ایسٹھوٹرکٹ سلفونامائیڈ دافع ذیابیطس اور مدبول لادو یہ کے ساتھ ضرر رساں ہے۔

## تجارتی مرکبات

NAPROSYN (SEARLE) 250 mg tabs: 10: Rs.26.58

XENOBID (RALLIS) 275mg tabs 10x10: Rs.316.50

ناپروکسن

زیونڈ

## NIMESULIDE

## نی می سولائیڈ

افعال و منافع: تخریب المفاصل (جوڑوں کا پتھرا جانا) جوڑوں میں درد، کینسر کا درد، آپریشن کے بعد کا درد کھیل ملاقات کی چوٹ مٹا کر کان ملن کا درد کھج عروق معده نولائی کی تکلیف میں مفید ہے۔



مقدار و ترکیب: ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار

منفی افعال: زخم معدہ میں جگر کی خرابیوں حمل اور لیام رضاعت میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: درد سر متلی تے، معدہ میں جلن اسہال جلد پرداغ کھجلی چکر آنا نیند کی زیادتی۔

احتیاط: معمر افراد میں اور گردوں کے فعل کی کمی میں احتیاط رکھیں۔

دواؤں کا رد عمل: وال پورک ایسڈ، ٹالبوٹامائیڈ، فروسی مائیڈ میٹھوٹریکسیٹ، خوردنی مانع انجماد خون

ادویہ کے ساتھ خراب اثرات رونما ہوتے ہیں۔

## تجارتی مرکبات

NIMESEL	(WAVE)	نمی سل
100mg: tabs: 10: Rs.27.00		
NIMIND	(INDOCO) 10tabs: Rs. 22.00	نی مائنڈ
NIMULID	(PANACEA) 100mg: tabs: 10: Rs.29.50	نی سولڈ
REMULIDE	(RECON) 100mg: tabs: 10: Rs.24.00	ری سولڈ

## OXYPHEN BUTAZONE آکسی فین بیوٹازون

افعال و منافع: وجع المفاصل، تھج المفاصل (جوڑوں کا درد پتھر اچانا) ہڈیوں کی جھلی میں ورم و درد نقرس و گردن کے مہروں میں درد و ورم میں مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰۰ سے ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار۔

منفی افعال: ہاتھ پر ورم تھج (Oedema) ہائی بلڈ پریشر، لیسپرین اور دوسری دافع درد دواؤں NSAID سے الرجی میں ضعف قلب، زخم معدہ اور ۱۴ سال سے کم عمر بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: زخم معدہ، جگر کی کمزوری، خون میں تھیلی، جلد پرداغ پڑنا، درد شکم بخار حلق میں خراش پڑنا۔  
احتیاط: جگر اور گردوں کے شدید امراض، دمہ، حمل، اور لیام رضاعت، طویل عرصہ تک دوا کے استعمال سے احتیاط رکھیں۔

دواؤں کا رد عمل: مانع انجماد خون دوائیں، دافع ذیابیطس دوائیں، فین ٹائن سلفونامائیڈ، ڈیہاکسن کارنی سوکے مرکبات اور دوسری دافع درد NSAIDS کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔



## تجارتی مرکبات

ALGIRIL TABS	(P&B LABS) 10 tabs: Rs. 7.80	ال جریل
BUTA PROXYVON	(WOCKHARDT) caps 8: Rs. 8.40	یو ہارکسی وون
BUTADEx	(CADILA) tabs 10: Rs. 4.09	یو ہڈیکس
COMBIGESIC	(UNILODS)	کبی جے سک
JAGRIL	(JAGSONPAL) 10: Rs. 4.05	جاگرل
PHENABID	(IDPL) 100mg tabs 10: Rs. 3.80	فینابڈ
REPARIL	(FDC) 100mg tabs 10: Rs. 2.28	ری پے ریل
REDUCIN	(UNIQUE) tabs : 10: Rs. 4.45	ری ڈیوسن
SIORIL	(ALBERT DAVID) 100mg tabs 10: Rs. 5.40	سیورل
SUGANRIL	(S.G.PHARMA) 100mg tabs 10: Rs. 6.39	سگازیل
SYSTAFLAM	(SYSTOPIC) 10: Rs. 14.10	سٹاسٹیم
TROMALGIN	(LA PHARMA) 10: Rs. 4.71	ٹرومالجن

## PHENYL BUTAZONE

## فینائل بیوٹازون

افعال و منافع: وجع المفاصل، تخرج المفاصل ہڈیوں کی جھلی میں ورم، ریزہ کے مہروں میں درد ورم  
نترن ریزہ کے مہروں کا اکثر جانا کر کے درد میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: ابتدا میں ۲۰۰ سے ۳۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار کھانے کے بعد دودھ سے لینا چاہیے۔  
منفی افعال: زخم معدہ کے مریضوں میں سخت مضر ہے۔  
مضر اثرات: متلی، قے، درد فم معدہ، جلد پر داغ، بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے۔  
احتیاط: قلب و گردوں کے امراض اور ہائی بلڈ پریشر میں احتیاط لازم ہے۔  
دواؤں کا رد عمل: مانع انجماد و خون، دافع ذیابیطیس، فین ٹائن، سلفونامائیڈ، ڈیجاکسن کارٹی سون کے  
ساتھ خراب اثر ہوتا ہے۔

## تجارتی مرکبات

ACTIMOL	(PHARMED) 10: Rs. 6.50	اکٹی مول
ARTHOZOLIN TABS	(REMEDIES INDIA) Rs. 5.91	ارتھوزولین



<b>ESGIPYRIN</b>	(S.G. PHARMA)
3ml 5 amps Rs. 14.56, 5ml 5amps Rs. 19.62	
<b>PARABUTAZONE</b>	(LIFE) 10 tabs: Rs. 3.53
<b>PHENORIN</b>	(JAGSONPAL)
<b>ZOLANDIN</b>	(S.G. PHARMA)
100mg: 10: Rs. 4.46, 200mg: 10: Rs. 8.35	

اکی پارین

پیرایوٹازون

فینورن

زولندین

## PIROXICAM

## پائی را کسی کام

افعال و منافع: شدید وجع المفاصل، تخریب المفاصل، نئی ساختوں کا درد، درد مہروں کے درد، دورم نقرس، اعصاب و عضلات کی دردناک انٹنسنس، تشنج، چوٹ آپریشن حیض کے درد میں مفید و موثر ہے۔  
مقدار و ترکیب: گھٹیا کی درد میں ۲۰ ملی گرام روزانہ، ایک خوراک نقرس حیض اور شدید عضلاتی درد میں ۳۰ ملی گرام ایک خوراک ۲ دن تک پھر ۲۰ ملی گرام روزانہ ۷ سے ۱۴ دن تک انجکشن کی مقدار بھی اسی طرح بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

منفی افعال: حساس مریضوں کو سینہ میں درد دورم و تھج جو دافع درد دواؤں سے پیدا ہوا اور زخم معدہ میں اس کا استعمال خراب اثر کرتا ہے۔

مضر اثرات: فور ہضم ورم تھج، نظام عصبی میں خرابی، ضعف، نفاہت کان بچنے کی شکایت ہو سکتی ہے۔ احتیاط: دم، آپریشن، جگر اور گردوں کے افعال میں خرابی، جریان خون اور انفکشن، ضعف قلب ہائی بلڈ پریشر، حمل رضاعت میں اور ۱۲ سال سے کم عمر بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

دواؤں کا رد عمل: مانع انجماد خون ادویہ، دافع درد دورم NSAID دافع ذیاطیس اور لیجیم کے ساتھ خراب اثر ہوتا ہے۔

## تجارتی مرکبات

<b>BREXIC</b>	(WOCKHARDT)
10mg 6: Rs. 7.32, 20mg 6: Rs. 12.47	
<b>DOLONEX</b>	(PFLIZER)
caps 10mg: 10: Rs. 19.20, 20mg: 20: Rs. 27.56	

بریک سک

ڈولونیکس کپسول



**DOLONEX I.M.** (PFIZER)

Piroxicam 20mg per ml inj, 1ml amp Rs 7 48, 2ml amp Rs 13 95

**INFLAVAN 10/20** (LA PHARMA)

10mg 10 Rs 3 81, 20mg 10 Rs 4 88

**MINICAM GEL** (BLUE CROSS) 30g Rs 21 00

**MINICAM D.T.** (BLUE CROSS) 20mg tabs 10 Rs 23 50

**MODACT-20** (MERIND) 20mg caps 10 Rs 25 33

**MOVON-20** (IPCA) 20mg caps 10 Rs 14 00

**PIRICAM** (ALIDAC)

10mg 10 Rs 5 10 20mg 10 Rs 8 75

**PIROX GEL** (CIPLA) 30g Rs 22 65

**PIROX -10/20 caps** (CIPLA)

10mg 10's Rs 16 25, 20mg 10 Rs 25 20

**PIROX DISTABS** (CIPLA) 20mg tabs 10's Rs 27 60

**PIROX INJ.** (CIPLA)

20mg per ml inj 1ml Rs 5 60 2ml Rs 9 59

## SERRATIO PEPTIDASE

## سراٹیو پیپٹیڈیس

افعال و منافع: آپریشن چوٹ، ایکسڈنٹ کے سبب ہونے والا درد ورم ورم غار الانف کان کا ورم  
مٹانے کے ورم درد پھیپھڑوں میں پھوڑا، بلغم نہ نکلنا، بلغمی و مد و غیرہ میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۳ سے ۱۰ ملی گرام کھانے کے بعد۔

منفی افعال: انجماد خون کی شکایت جگر اور گردوں کی شدید خرابی میں اس کا استعمال مضر ہے۔  
مضر اثرات: ہاضمے کی خرابی، بد ہضمی، بھوک کی کمی قے متلی ہو سکتی ہے۔  
احتیاط: دوا سے حساس مریضوں کو نہ دیں، مانع انجماد خون ادویہ کے ساتھ نہ استعمال کریں۔

## تجارتی مرکبات

**BIDANZEN** (BIDDLES AWYER) 5mg tabs 10 Rs 33 80

**FLANZEN** (SIGMA LABS)

tabs 2 5mg 10 Rs 17 98, 5mg 10 Rs 32 62, 10mg 10 Rs 56 06



KINETO (SYSTOPIC) 5mg tabs 10 Rs 35 80

MAXILASE FORTE (TABETS INDIA)

SERPA (KAMRON)

5mg 10 Rs 32.50, 10mg 10 Rs 58 90

ZEDASE (GUARDIAN (CROSLANDS)

5mg tabs 10 Rs 35 00

کائی نے ٹو

میگزنی لیس فورٹ

سرپا

زی ڈیس

## NUTRITION

## طاقت بخش ادویہ

### GINSENG

### جن سینگ

افعال و منافع: یہ ایک کوریائی بوٹی ہے جو مقوی اعضاء ریسر و شریفہ ہے۔ کمزوری، بے چینی، جسمانی اور دماغی تناؤ، بیماری و دواؤں کے سبب ہونے والی کمزوری دور کرتی ہے۔

مقدار: ۲۵۰ ملی گرام دن میں ۳ بار

### تجارتی مرکبات

BIOVITAL (MICRO LABS) Rs 36 00

GINSEC (DUPHAR)

250mg 10 Rs 42 00, 500mg 6 Rs 42 00

GINTONA (LYKA) 10caps Rs 43 80

GLENGENG TONIC (GLENMARK) 180ml Rs 50 90

GLENGENG-500 (GLENMARK)

Korean ginseng powder 500mg caps 10 Rs 66 52

JENSHENG (BIOLOGICAL E) 250mg 10 Rs 47 50

TRINERGIC (UNICHEM) 10 Rs 45 00

REVITAL (RANBAXY)

10 caps Rs 49 50, 30 Rs 138 75

REVITAL LIQUID (RANBAXY) 100ml Rs 55

WINOFIT GINSENG (WOCKHARDT) 240ml Rs 26 45

WINOFIT GINSENG CAPS (WOCKHARDT)

panax ginseng 75mg & other herbal ingredients caps 30 Rs 58 00

بایو ویٹال

جن سیک

جن ٹونا

گلین سینگ

گلین سینگ کپسول

جن شینگ

ٹرائی نر جیک

ریوٹی لال کیسول

ریوٹی لال سرپ

وینوفٹ سرپ

وینوفٹ سرپ



مستہمی (بھوک بڑھانے والی) ادویہ

## APITITIC STIMULANTS

### CYPRO HEPTADINE

سائپروہپٹاڈین

افعال و منافع: بھوک کی کمی، عام جسمانی کمزوری، آپریشن لمبی بیماریوں کے سبب ہونے والی کمزوری نقابت کو دور کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: بچوں کو ۵ ملی لٹریا گولی بالغوں کو ۱۰ سے ۲۰ ملی لٹریا ۲ گولی دن میں ۲ بار

منفی افعال: گھو کوما، پیشاب رکنے آنتوں میں رکاوٹ اور حساس مریضوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

احتیاط: دوا کے استعمال کے بعد ذرا سیوری کرنا مشنری چلانے سے احتیاط رکھیں۔

### تجارتی مرکبات

APITAMINE LIQUID	(TABLETS INDIA)	اسے پی ٹامین لکوز
200ml Rs.35.00		
CARMIPHOS SYRUP	(CARMINOL)	کارمی فاس سرپ
200ml Rs.23.40		
CIPLACTIN	(CIPLA) 110ml Rs.10.95	سپلاکٹین سرپ
CIPLACTIN TABS	(CIPLA) 4mg tabs 10 Rs.2.77	سپلاکٹین ٹبلٹ
CYDINE	(CFL) 200ml Rs.30.80	سائیڈین
CYP-L	(ALBERT DAVID) 200ml Rs.30.69	سائپ ایل
CYPON SYRUP	(GENO) 200ml Rs.32.00	سائی پون سرپ
CYPROWAL (WALLACE)	175ml Rs.28.90	سائپرو وال
MAGNADYN	(PFIMEX)	میگناڈین
Cyproheptadine hcl 2mg L-lysine monohydrochloride 150mg, per ml		
syrup 120ml Rs.15.00, 200ml Rs.26.00		
MERIZYME DROPS	(MERCURY)s 15ml Rs.15.90	میری زائم ڈراپس



**PERITOL**

(THEMIS CHEMICALS)

4mg tabs 10: Rs.7.50

پیری ٹول ٹبلیٹ

**PRACTIN TABS**

(MERIND) 4mg tabs; 10:Rs.4.77

پراکٹین ٹبلیٹ

**HAEMATINIC****مولد خون و فولاد کے مرکبات**

افعال و منافع: خون کی کمی، فولاد کی کمی، نقص تغذیہ حمل، مرض پلاگرا، خون کا اخراج دودھ پلانے، ہک ورم سگرہنی کے سبب ہونے والی خون کی کمی، میگالوبلاستک، انیمیا ڈائی مارکک انیمیا وغیرہ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: اسال تک ۵ بوند دن میں ۲ بار ۲ سے ۵ کو ۵ سے ۲ ملی لٹر بالغوں کو ۱۵ سے ۳۰ ملی لٹر کمپوسل دن میں ابار گولی صبح و شام کھانے کے بعد انجکشن ۲ ملی لٹر صرف عضلاتی لگائیں۔  
منفی افعال: گردوں میں ورم جگر کے شدید امراض وٹامن بی ۱۲ کی کمی کے سبب ہونے والے انیمیا میں اس کا استعمال معزز ہے۔

احتیاط: گردوں کے فیل ہونے جگر کی خرابی شدید متعدی امراض حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں احتیاط لازم ہے۔ انجکشن گہرا عضلاتی لگائیں وریڈی اگر دینا ہو تو پہلے ٹسٹ کر لیں۔

**تجارتی مرکبات****ANEMIDOX**

(MERCK) caps 30: Rs.23.54

اے نی می ڈاکس

**ASTYFER**

(TABLETS INDIA) tabs 2x15: Rs.57.44

ایسٹ فر ٹبلیٹ

**ASTYFER LIQUID**

(TABLETS INDIA) 200ml:Rs.37

ایسٹ فر لکوڈ

**AUTRIN**

(LEDERLE) 30: Rs.18.19

آٹرن

**BLOSYN**

(GULFIC) 30:Rs.20.76

بلوسائن

**BLOSYN**

(GULFIC) 300ml:Rs.36.20

بلوسائن لکوڈ

**CALPRO ZE CAPS**

(NEON) caps:30:Rs.37.00

کال پروزی

**CAPSOVT (CAP)**

(PHARMED) 10:Rs.8.00

کپ سوٹ

**CENOLPLEX**

(CARMINOL LABS)

سنو پلکس

200ml bottle: Rs.30.00

**CILFER-12F ORAL**

(DUPHAR) 120ml: Rs.9.21

سل فر

**CONVIRON-TR**

(RANBAXY) 10: Rs.15.20

کان وی ران



<b>DEFERON LIQUID</b>	(DEYS) 110ml Rs.11.60	ایفران
<b>DEXORANGE PLUS</b>	(FRANCO-INDIAN)	ایکسورنج
200ml: Rs.38.70		
<b>FACICAP</b>	(KAMRON) 200ml: Rs.29.50	فیس کیپ سرپ
<b>FACICAP CAPS</b>	(KAMRON) caps:10:Rs.9.50	فیس کیپ کپسول
<b>FALBITONE PLUS TONIC</b>	(FALMA)	فال بی ٹون
200ml Rs.32.95		
<b>FALBITONE PLUS CAPS</b>	(FALMA)	فال بی ٹون
300mg: 3x10: Rs.33.00		
<b>FECONTIN-Z</b>	(MODI-MUNDI PHARMA) 10: Rs.13.50	فی کون ٹین زیڈ
<b>FEFOL-Z SPANSULE</b>	(SMITHKLINE) 30: Rs.36.15	فی فول زیڈ
<b>FERINOVA CAPS</b>	(LUPIN) caps 10: Rs.5.00	فیری نووا کپسول
<b>FERINOVA DROPS</b>	(LUPIN) 10ml: Rs.12.00	فیری نووا ڈراپس
<b>FERINOVA SYRUP</b>	(LUPIN) 210ml: Rs.12.00	فیری نووا سرپ
<b>FERRADOL</b>	(PARKEDAVIS) 454g: Rs.27.00	فیراڈول
<b>FERROCIN</b>	(P&B LABS) 110ml Rs.14.29	فیروسین
<b>FERROSTAN LONGULES</b>	(SOL) caps 10x10: Rs.60	فیروشان
<b>FERROUS FUMARATE TABS IP</b>	(J&J DECHANE)	فیرس فیومی ریٹ
500 Rs.25.00		
<b>FERRUM FOL</b>	(KHANDELWAL) 10:Rs.16.94	فیرم فول
<b>FESOFOR-Z SPANSULE</b>	(SMITHKLINE) 30:Rs.29.66	فیسو فور زیڈ
<b>FESOVIT ELIXIR</b>	(SMITHKLINE) 100ml: Rs.13.56	فیسوٹ سرپ
<b>FESOVIT SPANSULE</b>	(SMITHKLINE) 30:Rs.19.13	فیسوٹ کپسول
<b>GLOBAC</b>	(ALIDAC) 60: Rs.50.00	گلوبیک
<b>GLOBAC LIQUID</b>	(ALIDAC) 200ml: Rs.33.40	گلوبیک سرپ
<b>HEAM UP</b>	(CADILA) 200ml: Rs.33.40	ہیم اپ
<b>HEAM UP GEMS</b>	(CADILA) 100: Rs.88.10	ہیم اپ کپسول
<b>HAEMATINGA CAPS</b>	(INGA) 30: Rs.18.50	ہے مے ہنگا کپسول
<b>HAEMATINGA LIQUID</b>	(INGA) 225ml:Rs.29.50	ہے مے ہنگا سرپ
<b>Hb PLUS</b>	(TOTTENT) caps: 10: Rs.5.22	ایچ بی پلس
<b>Hb RICH</b>	(TOTTENT) 200ml: Rs.31.90	ایچ بی ریچ
<b>HEMATRINE</b>	(SANDOZ) caps 30: Rs.30.10	ہیما ٹرین



<b>HEMFER</b>	(ALKEM) 200ml Rs.34.50	ہیمفر
<b>HEMSYNERAL-TD</b>	(U.S.VITAMIN) caps 10: Rs.5.83	ہیم سائی نی رال
<b>HEPASULES</b>	(BIOLOGICAL E) caps 10: Rs.9.40	ہیپاسیول
<b>HEPATOglobin</b>	(RAPTAKOS) 300ml: Rs.45.10	ہیپاٹوگلوبین
<b>HEPP FORTE</b>	(LUPIN) 200ml: Rs.33.40	ہیپ فورٹ
<b>IBEROL</b>	(ABBOTT) 30: Rs.17.20	ای بی رال کپسول
<b>IBEROL-500 LIQUID</b>	(ABBOTT) 150ml: Rs.27.58	ای بی رال لکویڈ
<b>IMFERON</b>	(RALLIS) 10ml vial Rs.12.86	ایم ای رال انجکشن
<b>INCREMIN SYRUP</b>	(CYANAMIDE) 180ml:Rs.22.92	انکریمن
<b>IROSPAN-Z</b>	(PHARMASIA) caps 10: Rs.8.59	آئی رو سپان زیڈ
<b>JECTOFER</b>	(CFL) amp: Rs.12.70	جیکٹوفر
<b>J.P. TONE</b>	(JAGSONPAL) 200ml: Rs.28.20	جے پی ٹون
<b>LIVOGEN CAP</b>	(GLAXO ALLENBURRYS)	لوو جین
<b>LYSIRON</b>	(ETHNOR) 20ml: Rs.17.14	ای لی سورن
<b>NEO-FERRUM INFANTS</b>	(DUPHAR)	نیو فرم
14ml (with dropper) Rs.3.40		
<b>NORI-A</b>	(BURROUGHS WELLCOME) 500: Rs.18.91	نوری اے
<b>NURTIFIL</b>	(WARNER HINDUSTAN) 300ml: Rs.37.30	نورٹیفل
<b>OSIFORT-F</b>	(SYSTOPIC) caps 10: Rs.10.00	اوسی فورٹ
<b>PENTAVITE</b>	(NICHOLAS) 300ml: Rs.25.77	پنٹا ویت
<b>PHOSFOMIN IRON</b>	(SARABHAI) 250ml:Rs.16.35	فاسفومین آئرن
<b>PROBOFEX</b>	(WOCKARDT) 180ml: Rs.18.60	پروبو فیکس
<b>PROBOFEX CAPS</b>	(WOCKARDT)caps:30:Rs.28.50	پروبو فیکس کپسول
<b>PROFERIN</b>	(INDOCO) caps: 30: Rs.20.63	پروفرین
<b>RARICAP</b>	(ETHNOR) 40: Rs.25.00	ری ری کیپ کپسول
<b>R.B.TONE</b>	(MEDLEY) 225ml: Rs.32.55	آر بی ٹون
<b>REDIPLEX</b>	(WARNER HINDUSTAN) 10:Rs.7.99	ریڈی پلکس
<b>REDITONE PLUS</b>	(BLUE CROSS) 10:Rs.9.90	ریڈی ٹون
<b>RUBRAPLEX</b>	(SARABHAI) 240ml Rs.21.40	ریبرا پلکس
<b>SIXAPP</b>	(FRANCO INDIAN) 280ml: Rs.23.64	سکس ایپ
<b>TONIAZOL</b>	(BOEHRINGER) 300ml: Rs.17.92	ٹونیازول
<b>TONOFERON</b>	(EAST INDIA) 450ml Rs.41.94	ٹونوفرین سرپ



**TONOFERON DROPS (EAST INDIA)** 15ml Rs. 9.14 نوٹو فیرون ڈراپس  
**ULTIRON TR (STANCARE)** caps: 10 Rs. 12.50 الٹی ران  
**VITCOFOL IRON CAP (FDC)** caps 30 Rs. 13.11 وٹ کو فول کپسول  
**VITCOFOL SYRUP WITH IRON (FDC)** وٹ کو فول سرپ  
 180ml: Rs. 14.58

## HUMAN ERYTHRO POIETIN

ہیومن رائی تھرو پوائیٹین

افعال و منافع: گردوں کے فیل ہونے کے سبب ہونے والا انیمیا میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰ سے ۵۰ یونٹ / فی کلو گرام کے حساب سے وریدی آہستہ آہستہ ۱ سے ۲ منٹ میں لگائیں۔

احتیاط: تسدد عروق، قلبی بیماریاں، دورے پڑنا، نقرس کی ہشتری حمل اور ایام رضاعت اور بچوں کو احتیاط برتیں۔

### تجارتی مرکب

HEMEX

(HALL) 2ml vial: Rs. 1890.00

ہے میکس

وہ دوائیں جو عام طور سے قے متلی پیدا کرتی ہیں

الوپری نال، انٹی بائیوٹک، برومو کریپٹن، سائی ٹوٹاکسک، ڈی جاکسین،  
 گولڈ کے مرکبات فولاد۔ لووڈوپا، دافع درد ورم ادویہ اسٹروجن، افیم کے  
 مرکبات۔ پینی سیلایمین۔ کوئی نی ڈین سلفا سالازین۔ تھیوفائی لین۔  
 تھیازائیڈ۔



پروٹین، خلاصہ جگر اور غذائیت والے مرکبات

**PROTENS, LIVER EXTRACT**

**AND SUPPLEMENTS**

افعال و منافع: پروٹین کی کمی، خون کی کمی ضعف نقاہت بیماریوں کے بعد کی کمزوری کساح (سوکھا) میں مفید ہیں۔

منفی افعال: ان مریضوں کو جن کے جسم میں فولاد کی مقدار زائد ہو متعدد امراض گردوں میں ورم جگر کے حاد امراض حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں نہیں دینا چاہیے۔

احتیاط: انجکشن کو لہے پر گہرا عضلاتی لگائیں ملٹی ڈوز ہمیشہ عضلاتی لگائیں وریڈی انجکشن سے پہلے ٹسٹ ضروری کر لیں۔

تجارتی مرکبات

AMINOZYME	(STADMED)	200ml	Rs.32.00	امینوزائم سیرپ
AMINOZYME TABS	(STADMED)	10	Rs.6.30	امینوزائم ٹبلٹ
CALPRO SYRUP	(NEON)	200ml	Rs.36.00	کال پرو سیرپ
CENOLPRO POWDER	(CARMINOL)	200gms	Rs.45.00	سینول پرو پوڈر
ECOPROT PLUS	(JENBURK)			ایکوپروت پلس
ENERJAL	(MEJDA)	50gm	Rs.7.50	انرجل
GEFRICH	(MEJDA)	200g	Rs.58.25	جیفرک
GLENTONAS SYRUP	(GLENMARK)	200ml	Rs.19.91	جے لن ٹوناس سیرپ
GRD	(CADILA)	powder 200g	Rs.58.25	جی۔ آر۔ ڈی
HYPROBEX LIQUID	(P&B LABS)	200ml	Rs.34.50	ہائی پرو بیکس سیرپ
LIVOGEN	(ALLENBURYS)	450ml	Rs.49.56	لیووجن
NEOGADINE ELIXIR	(RAPTAKOS)			نیو گوڈین الیکٹر
300ml		Rs.24.90	15-30ml b.i.d before meals	
NEO-HEPATEX	(BIOLOGICAL E)	10ml	Rs.13.05	نیو ہپے ٹیکس انجکشن



<b>NURRISH LIQUID</b>	(SMITHKLINE) 200ml: Rs.30
<b>PROFETON</b>	(MERCURY) 200ml: Rs.29.90
<b>PROLIQ</b>	(PHARMASIA) 200ml: Rs.35.70
<b>PROSOYAL</b>	(FDC) 200g Rs.45.00
<b>PROTINULES</b>	(ALEMBIC) 200g: Rs.59.50
<b>PRONUTRIN</b>	(CFL) 200ml: Rs.24.10
<b>PRONUTRIN CAPS</b>	(CFL) 10: Rs.8.65
<b>PROSUP</b>	(MEDLEY) 200ml: Rs.27.80
<b>PROTOFER</b>	(DEE PHARMA) 200ml: Rs.30.00
<b>PROTOMEAL</b>	(BIOGENICS) 180ml : Rs.27.50
<b>SHARKOFERROL</b>	(ALEMBIC) 450g: Rs.32.16
<b>SOYAL</b>	(FDC) 500g Rs.75.00
<b>SYU</b>	(AFD) 200g: Rs.48.00
<b>VITONEX</b>	(JAGGAT-PHARMA) 125ml: Rs.14.90

نورٹش لکویڈ

پروفٹن ٹن

پرو لک

پرو سویال

پرو ٹینو لیس

پرو نٹو ٹرن سرب

پرو نٹو ٹرن کپسول

پرو سب لکویڈ

پرو ٹو فر

پرو ٹو میل

شارک فیرول

سویال

سیوٹیکس

## VITAMINS

## وٹامن کے مرکبات

### VITAMIN A

### وٹامن اے

افعال و منافع: یہ روغن میں حل ہونے والا وٹامن ہے جسم میں جمع ہو سکتا ہے، وٹامن اے A اور ٹمبی اجزاء کے ہضم و جذب کی کمی سے آنکھوں میں خرابیاں مثلاً رمد چشم، التهاب قرنیہ شب کوری Night Blindness آنکھیں خشک رہنا، Xerophthalmia میں مفید ہے۔ اس کی کمی سے جسم میں انفکشن کے امکانات میں اضافہ ہوتا ہے۔

زیادتی سے، بالوں کا خشک اور گھردرا ہونا، جلد میں خشکی اور سختی جگر بڑا، ای ایس آر E.S.R. سیرم کیلیم، سریم الکلائن اور فاسفیٹ کے لیول میں اضافہ۔

مقدار و ترکیب: ۲۲۵۰ یونٹ یومیہ بالغوں کو حاملہ اور مرضہ کو ۴۰۰۰ یونٹ یومیہ دینا چاہیے۔

متقی افعال: ۲۵۰۰۰ یونٹ یا اس سے زائد حمل کی حالت میں دینے سے بچے میں پیدا انٹی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔



## مرکبات

<b>AQUASOL A CAPS</b>	(U.S. VITAMIN)	ایکواسول کپسول
Vit. A 50,000iu, caps 30: Rs.35.50		
<b>AQUASOL A PARENTRAL</b>	(U.S. VITAMIN)	ایکواسول انجکشن
Vitamin A 50,000 i.u. per ml 2ml Rs.6.82		
<b>AROVIT (ROCHE)</b>	Vit. A 50,000iu tabs: 10: Rs.11.11	اروٹ ٹبلٹ
<b>AROVIT INJ (ROCHE)</b>		اروٹ انجکشن
Vit. A 100,000iu per 2ml Rs.3.00		
<b>AROVIT DROPS (ROCHE)</b>		اروٹ ڈراپس
Vit. A 100,000 u per ml (30drps) 7.5ml: Rs.21.15		

## VITAMIN B. COMPLEX

## وٹامن بی کمپلکس

افعال و منافع: یہ کئی وٹامن کا مرکب ہے جس میں وٹامن بی ۱ بی ۲ بی ۳ بی ۵ بی ۶ اور بی ۱۲ شامل ہوتے ہیں۔ یہ وٹامن ناقص غذائیت کمزور بچوں اور بالغوں کے لئے مفید ہیں جن بچوں کی نشوونما صحیح نہ ہو کمزوری دور کرنے جسم میں طاقت اور توانائی پیدا کرنے کے لئے استعمال کرانا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

<b>ANEUDOX 12 INJ</b>	(P&B LABS)	اے نیوڈوکس انجکشن
3ml inj; 1x3ml Rs.4.90		
<b>ANEUDOX 12 TABS</b>	(P&B LABS)	اے نیوڈوکس ٹبلٹ
10tabs Rs.2.49		
<b>BECELAC</b>	(PFIMEX) 10x10: Rs.155.00	بے سی لیک کپسول
<b>BECOSULESCAPS</b>	(PFIZER) 10: Rs.8.07	بیکاسیول کپسول
<b>BECOSULES SYRUP</b>	(PFIZER) 120ml: Rs.12.90	بیکاسیول سرپ
<b>BENALGIS</b>	(FRANCO-INDIAN)	بینال جس
Vit. B-1 75mg, tabs: 10: Rs.10.20		
<b>BENEURON</b>	(FRANCO-INDIAN)	بی نیورون
250: Rs.37.97		
<b>BEPLEX FORTE</b>	(ANGLOFRENCH) 10: Rs.7.86	بپلکس فورٹ ٹبلٹ



<b>BEPLEX FORTE ELIXIR</b> (ANGLOFRENCH)	پہلکس فورٹ سیرپ
100ml: Rs.21.39	
<b>BEPLEX FORTE INJ</b> (ANGLOFRENCH)	پہلکس فورٹ انجکشن
11ml vial & 1.1 ml amp Rs.20.51	
<b>BERIN INJ</b> (GLAXO)	بیرن انجکشن
Vitamin B1 IP 100mg per ml inj; 10ml: Rs.14.00	
<b>BERIN TABS</b> (GLAXO) 500: Rs.350.00	بیرن ٹبلٹ
<b>BESTOPLEX LIQUID</b> (REMEDIES (INDIA)	بستوپلکس سیرپ
200ml Rs.23.25	
<b>BETAVITE FORTE</b> (NICHOLAS) 10: Rs.10.13	بتاوائٹ
<b>BETHADOXIN-12</b> (BIOLOGICAL E) 220ml: Rs.30.17	بتھاڈاکسن سیرپ
<b>BETHADOXIN-12 INJ</b> (BIOLOGICAL E) 2ml: Rs.4.50	بتھاڈاکسن انجکشن
<b>BETONIN</b> (BOOTS) 200ml: Rs.17.98	بتونین سیرپ
<b>BETONIN CAPS</b> (BOOTS) 10: Rs.11.00	بتونین کپسول
<b>B.G. PROT</b> (MERIND) 200ml Rs.25.10	بی جی پراٹ
<b>HYCIBEX (CAP)</b> (PHARMED) 10: Rs.9.00	ہائی سی بیکس کپسول
<b>HYCIBEX (SYR)</b> (PHARMED) 200ml: Rs.24.00	ہائی سی بیکس سیرپ
<b>KANPLEX FORTE TABS</b> (KANPHA)	کان پلکس فورٹ ٹبلٹ
<b>NEUROBION-INJ-TAB</b> (MERCK)	نیو روبیان انجکشن ٹبلٹ
Rs.4.87: tab 10: 2.50	
<b>KANPLEX FORTE SYRP</b> (KANPHA)	کان پلکس سیرپ
200ml Rs.25.56	
<b>LAVIEST</b> (FRANCO-INDIAN) caps 10: Rs.14.54	لیوسٹ کپسول
<b>BIVINAL FORTE WITH VIT C</b> (ALEMBIC)	بی وی ٹال کپسول
<b>B-LONG</b> (ELDER) tabs: 10: Rs.15.50	بی لاٹنگ
<b>CARMIPLEX SYRUP</b> (CARMINOL) 100ml: Rs.18.00	کاری پلکس
<b>COBADEX FORTE</b> (GLAXO) 10: Rs.9.85	کوباڈیکس
<b>DEYPLEX CAPS</b> (DEYS) 100: Rs.61.58	ڈے پلکس
<b>ELDERVIT CAPS</b> (ELDER) caps: 10: Rs.8.86	ایل ڈروٹ
<b>ELSOMA</b> (ROUSSEL) 300ml: Rs.21.84	ایل سوما
<b>FALPLEX CAPS</b> (FALMA) caps: 10: Rs.9.80	فال پلکس کپسول
<b>FALPLEX SYRUP</b> (FALMA) 60ml: Rs.9.20	فال پلکس سیرپ



NUTROLIN B PED. TABS	(CIPLA) 10: Rs.11.20	خوردن
OLIADÉ BATH OIL	(SWIFT) 100ml: Rs.56.90	ولی ایڈ باتھ آئل
OPTINEURON	(LUPIN) 3ml: Rs.5.12	اپنی خوردن
PALADAC	(PARKEDAVIS) 115ml: Rs.19.80	بے لادیک
PEDIC DROPS	(STADMED) 10ml vial: Rs.9.52	پیدک ڈراپس
PENTAVITE	(NICHOLAS) 300ml: Rs.25.77	پنٹاوائٹ
PHOSFOMIN	(SARABHAI) 250ml: Rs.16.07	فاسفومین
POLYBION	(MERCK) 10: Rs.7.83	پالی بیان ٹیبلٹ
POLYBION INJ	(MERCK) 1amp: Rs.2.31	پالی بیان انجکشن
POLYBION SYRUP	(MERCK) 100ml: Rs.14.13	پالی بیان سرپ
PREMOBION	(PREM PHARMA)	پری موبیان
2ml amp: Rs.5.00; 10ml vial: Rs.15.00		
PYRICONTIN	(MODI MUNDI PHARMA)	پیری کانٹن
REGILAC-B	(PHARMASIA) 10: Rs.17.03	ریگی لک بی
SAN-GA-REE ELIXIR	(P&B LABS)	سانگی رے سرپ
THERAGRAN-M	(SARABHAI) 10: Rs.11.27	تھیراگران ایم
STAMINE INJ	(STADMED) 3ml amp Rs.4.50	اسٹامین انجکشن
STRESS CAPS	(CYANAMID) 30: Rs.28.49	اسٹریس کپس
VBC-12 INJ	(NEON) 10x2ml amp: Rs.33.80	وی بی سی انجکشن
VITAPLEX	(EAST INDIA) 110ml: Rs.6.96	ویٹاپلکس
VITNEURIN	(GLAXO) 2ml amp: Rs.4.15	ویٹ نیورین

## VITAMIN B12

## وٹامن بی ۱۲

افعال و منافع: سبزی خوردوں میں اسکی کمی ہوتی ہے حمل کے لیام میں وٹامن بی ۱۲ اور فولک ایسڈ کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے اس کی کمی سے میگالوبلاستک اینیمیا، دماغی کمزوری، نشوونما میں کمی پیدا ہوتی ہے جانوروں کے گوشت وغیرہ میں اس کی وافر مقدار پائی جاتی ہے۔

## تجارتی مرکبات

ELDERVIT-12	(ELDER) Rs.11.11	ایلڈروٹ
NEUROXIN-12 INJ	(ALIDAC) 10ml vial: Rs.13.79	نیوراکسن
TRINEUROSOL	(MERIND)	ٹرائی نیوروسل ٹیبلٹ



Vit. B1 100mg, B6 5mg B12 50mg: tabs: 12: Rs. 1.79

**TRINEUROSOL DROPS** (MERIND) 15ml: Rs. 3.33

**TRINEUROSOL-H INJ** (MERIND)

5ml vial Rs. 23.51

**VICTOFOL DROPS** (FDC) drops 15ml: Rs. 5.28

**VICTOFOL INJ** (FDC) vial: Rs. 13.76

**VITEXID** (SIGMA LABS) 10: Rs. 16.50

ٹرائیوروسل ڈراپس  
ٹرائیوروسل انجکشن

وٹوفول ڈراپس  
وٹوفول انجکشن  
وائٹیکس

## VITAMIN C

وٹامن سی

افعال و منافع: اسکروی، مسوڑھوں کا پھولنا نزلہ زکام میں مفید ہے۔

### تجارتی مرکبات

**ASCORBIC ACID**

(NEON)

اسکاربک ایسڈ

Ascorbic acid 100mg/ml inj 5x5ml amp Rs. 27.75

**CEBION**

(MERCK) tabs 10: Rs. 13.96

کی بیان ٹبلیٹ

**CEBION DEOPS**

(MERCK) 30ml Rs. 11.66

کی بیان ڈراپس

**CELIN**

(GLAXO) 500mg: 10: Rs. 7.75

کی ٹین

**CITRAVITE**

(PHARMED)

سائٹراوائٹ

450mg chewable tabs: 10: Rs. 14.00

**LIMCEE**

(SARABHAI)

10: Rs. 10.26

لمی

**SORVICIN**

(EAST INDIA)

سروی سین

500mg tabs; 10, Rs. 4.81: Drops vitamin C I.P. 100mg per ml drops

15ml Rs. 6.33

**TILDOXON INJ**

(TABLETS INDIA)

ٹیلڈاکسن انجکشن

Ascorbic acid 100mg per ml inj. 5ml amps. Rs. 32.00

## VITAMIN -D

وٹامن ڈی

افعال و منافع: یہ روغن میں حل پذیر وٹامن ہے، بچوں کے مرض کساح، ہڈیوں کی کمزوری نشوونما کی کمی، ہڈیاں خمیدہ ہونا، گردوں کی خرابی میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔



## تجارتی مرکبات

**CALCIROL** (CADILA)

Vit-D3 60,000 iu granules 1g: sachet, Rs.5.50

**OSTOCALCIUM B-12 SYRUP** (GLAXO)

160ml: Rs.12.06

**OSTOCALCIUM TABS** (GLAXO) 50: Rs.12.06

کیلیس رول

آسٹو کیلشیم

اسٹو کیلشیم ٹبلیٹ

## VITAMIN E

## وٹامن ای

افعال و منافع: یہ بانجھ پن کو دور کرنے والا عنصر Anti Sterility Factor بھی کہلاتا ہے۔ عضلات کی کمزوری و تشنج حوینات منویہ کی نشو و نما میں کمی شحمی اجزاء کے انجذاب میں کمی اور بانجھ پن کو دور کرنے میں مستعمل ہے۔ اس کی کمی سے تولیدی صلاحیت میں کمی عاداتی اسقاط، بندش حیض اور صفر رحم و رات میں پیروں میں اٹھٹھن کی شکایت پیدا ہوتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰ سے ۳۰ ملی گرام یومیہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے مرض کی حالت میں زائد مقدار دینا چاہیے ۱۰۰ سے ۲۰۰ ملی گرام بچوں کو ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام یومیہ

## تجارتی مرکبات

**EVION** (MERCK)

Vit E 100mg, 200mg, 400mg, 600mg ; pearls. Vitamin E deficiency.

100mg: 10: Rs.7.38; 200mg: 10: Rs.12.83; 400mg: 10: Rs.22.85

600mg: 10: Rs.32.43 PEAD DEOPS 50mg: per ml 15ml Rs.16.66

**TOCOFER** (TORRENT)

Vit E 200mg , 400mg peals. 200mg: 10: Rs.12.82; 400mg: 22

**VITEOLIN** (ALLENBURYS)

ای وی یان

ٹوکوفر

وی ٹیولین

# Vitexid\*

Offers the Right Dose of Vitamin E (25 mg)



## کیلیم کے مرکبات

### CALCIUM PREPARATION

افعال و منافع: ہڈیوں کی کمزوری، ہڈیوں کے نرم اور لچک دار ہونے گردوں سے کیلیم کے اخراج اور آنتوں سے انجذاب کی کمی سے پیدا ہونے والے عوارض کو دور کرتے ہیں۔

مقدار و ترکیب: پیکنگ کے ساتھ درج ہدایت کے مطابق۔

منفی افعال: جسم میں کیلیم فاسفیٹ میکنیشیم کی زیادتی میں حمل اور ایام رضاعت اور وزن کی زیادتی میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: گردوں میں خرابی، فاسفیٹ کی زیادتی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: گردوں میں پتھری اور گردوں کی خرابی میں احتیاط رکھنا چاہیے۔

دواؤں کا رد عمل: ڈیجی ٹیلس، تھیازائیڈ والی مدر ادویہ المونیم، میکنیشیم والی دافع تیزابیت، ادویہ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

### تجارتی مرکبات

MACALVIT SYP. INJ. (SANDOZ)

210ml Rs.34.58 inj 15ml Rs.11.30

OSCAL-12 INJ (P&B LABS) 15ml: Rs.14.53

OSCAL-12 TABS (P&B LABS) 10: tabs Rs.4.80

OCIUM (MICRO LABS) 10: Rs.10.00

SANDOCAL-500 (SANDOZ) 20 tabs Rs.34.00

SHELCAL-250 (ELDER) tabs: 20: Rs.31.10

SHELCAL-500 (ELDER) 15: Rs.30.35

SHELCAL SYRUP (ELDER) 150ml: Rs.32.10

SIGMA-CALVIT (SIGMA LABS) 15ml: Rs.25.00

TRICAL-D 250 (SIGMA) 10: Rs.11.65, 150ml: Rs.29.41

TROYCAL (TROIKAA) tabs 30: Rs.28.50

میکال وٹ سرپ۔ انجکشن

اوسکال انجکشن

اوسکال ٹبلٹ

اوسیم

سندوکال

شیل کال ٹبلٹ ۲۵۰

شیل کال ٹبلٹ ۵۰۰

شیل کال سرپ

سگماکیل وٹ

ٹریکال ڈی

ٹرویکال



## VITAMINS & MINERALS حیاتینی اور معدنیاتی مرکبات

افعال و منافع: نقص تغذیہ بیماری آپریشن کے بعد کی کمزوری حمل اور ایام رضاعت چلنے دل و دماغ اور جگر کی کمزوری، کمزور اور سوکھا روگ میں مبتلا بچوں میں اور انٹی بائیوٹک علاج کے دوران اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ عصبی کمزوری تناؤ آنکھوں کا خشک رہنا، جلد اور آلات تنفس کے انفیکشن اینیما بنگر بنی تشخ عضلات میں اس کا استعمال مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ڈراپس سال سے کم عمر بچوں کو ۵ بوندوں میں ۲ بار بڑے بچوں کو ۱۰ بوند سرپ بچوں کو ۵ ملی لیٹر بالٹوں کو ۱۵ ملی لیٹر دن میں ۲ بار، گولی کپسول انجکشن ضرورت کے مطابق۔  
احتیاط: جسم میں پانی کی شدید کمی میں وریڈی راہ سے دینا چاہیے کیلشیم کے اخراج کی حالت میں احتیاط برتیں۔

### تجارتی مرکبات

ABDEC DROPS	(PARKEDAVIS) 15ml Rs. 13.70	ایڈیک ڈراپس
AQUAMIN	(PFIMEX) 200ml: Rs. 28.97	ایکوامن
ASTYMIN FORTE	(TABLET INDIA) 2x10: Rs. 76.00	اسٹامین من
ASTYMIN LIQUID	(TABLET INDIA)	اسٹامین من لکوڈ
	110ml: Rs. 35.27; 200ml: Rs. 49.50	
ASTYMIN C DROPS	(TABLET INDIA)	اسٹامین من ڈراپس
	15ml: Rs. 22.90	
BASITON FORTE	(SARABHAI) 10: Rs. 8.71	بے سوٹون ٹبلٹ
BEETRION	(FRANCO-INDIAN) 10mg: 10: Rs. 6.91	بے ٹریون
CALRON	(EAST INDIA) 280ml Rs. 18.36	کالرون
CARMIPLEX SYRUP	(CARMINOL) 200ml: Rs. 33.60	کارمی پلکس
CENOL FERRUM SYRUP	(CARMINOL)	سی نول فیرم
	200ml: Rs. 23.40	
DI-CALCII-PLEX	(KHANDELWAL)	ڈی کیلسی پلکس
	112ml: Rs. 19.71	
EBEXID	(SIGMA LABS)	ای بکس سڈ
	tabs: 18x10: Rs. 207.00	



<b>PRENATAL CAPS</b>	(CYANAMID) 60: Rs.26.03	پرینیٹل کپسول
<b>SANTEVINI</b>	(SANDOZ) 360ml: Rs.21.75	سائنٹی وائن
<b>SANVITONE</b>	(UNI-SANKYO) 10: Rs.10.55	سان وی ٹون
<b>VIZ CAPS</b>	(KANPHA) 10: Rs.9.00	ویز کپسول
<b>FILIBON</b>	(LEDERLE) 50 caps Rs.43.26	فلیبون
<b>GROMIN</b>	(MEDLEY)	گرومین
170ml: Rs.22.80 Children above 1 year 5ml Adults 10ml both b.i.d after meals.		
<b>KINETONE</b>	(BOOTS) 300ml: Rs.21.14	کائی نی ٹون
<b>MITTAVIN</b>	(BOEHRINGER)	مٹا وین
caps 30: Rs.27.07; 100: Rs.81.26		
<b>MULTIVITE FM CAPS</b>	(GLAXO)	ملٹی وائٹ
<b>NUTRISAN</b>	(SANDOZ) caps: 30: Rs.13.55	نوٹری سان
<b>NUTROSEC</b>	(TABLETS INDIA) 10: Rs.27.27	نوٹرو سک
<b>NUTROSEC LIQUID</b>	(TABLETS INDIA)	نوٹرو سک لکویڈ
110ml: Rs.38.30; 200ml: Rs.23.85		

## AMINO ACID INFUSION امینو ایسڈ بوجھل

افعال و منافع: جلتے چوٹ لگتے، ایکسڈنٹ کینسر، ورم باریطون آنتوں کے آپریشن ہاضمے کی خرابیاں، زخم امعاء، مہلک اور لمبی بیماریوں کے سبب خون میں نائٹروجن کے تناسب کو درست کرنے کی ضروری دور کرنے اور توانائی کے لئے مفید ہے۔

مقدار ترکیب: ۲۰۰ سے ۸۰۰ ملی لیٹر دریدیومیہ لگائیں بچوں کو عمر کے مطابق ابتدا میں ۱۵ سے ۲۰ بوند فی منٹ بعد کو ۳۰ سے ۴۰ بوند فی منٹ کے حساب سے چڑھائیں۔

متقی افعال: قلب، اور جگر کے مآؤف ہونے پر نہیں دینا چاہیے۔

احتیاط: بوجھل تیز چلنے پر خراب علامات نمودار ہوتی ہیں اس کی احتیاط رکھنا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

<b>AMINODRIP</b>	(WOCKHARDT)	امینو ڈرپ
200 ml : Rs.110.00, 500ml : Rs.220		



**ASTYMIN-3****(TABLETS INDIA)**

ایس ٹائی من

200ml: Rs. 184.17

**AMINOCORE-5S (CORE HEALTH CARE LTD)**

اے مینوکور ایس ایس

500ml: Rs. 220.00

**دافع فرہی (موٹاپا) دور کرنے والی ادویہ****ANTI OBESITY****DEX FEN FLORAMINE****ڈیکس فین فلورامین**

افعال و منافع: فرہی دور کرنے میں معاون ہے اس کے ساتھ اگر غذائی احتیاط برتی جائے تو نتائج بہتر ہوتے ہیں۔

مقدار و ترکیب: ۳۰ ملی گرام روزانہ دو خوراکیوں میں تقسیم کر کے صبح و شام ۳ ماہ استعمال کرائیں منفی اثرات، گلوکوما، بھوک کی کمی میں ڈپریشن، نفسیاتی عوارض شراب منشیات کے عادی حمل لیام رضاعت میں اس کا استعمال مضر ہے۔

مضر اثرات: منہ خشک، متلی قبض، اسہال چکر آنا، پیشاب کی زیادتی درد سر ہو سکتا ہے۔

احتیاط: حرکات قلبیہ کی بے ترتیبی میں، جگر اور گردوں کی خرابی میں ہائی بلڈ پریشر میں دوا ایک دم بند کرنے میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کا رد عمل: MAOI ادویہ کن دافع بلڈ پریشر انٹی ڈپریشن اور ٹری سائی کلک کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

**تجارتی مرکب****ASOMERIDE****(SERDIA) 15mg 10: Rs. 108.52**

آکسو میرائیڈ

**GLUCOMANNAN****گلوکومانن**

افعال و منافع: ذیابیطیس شکر میں بطور معاون، خون میں شحمی اجزاء کی زیادتی، فرہی اور قبض میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: اگر ام ایک گلاس پانی میں حل کر کے، ۱۰ منٹ تک کھانے سے قبل استعمال کیا جائے۔



## تجارتی مرکبات

**DIETMANN** (CADILA) ڈائٹ مین  
Glucomannan (fiber gel poly saccharide) 1G per sachet granules. 1G  
sachet 1 packet Rs.8.10

## FENFLURAMINE

## فین فلورامین

افعال و منافع: فرہی موٹاپا بھوک کی زیادتی کو کم کرتی ہے۔

مقدار و ترکیب: فرہی کی نوعیت مریض کی قوت کے مطابق عموماً ۱۲۰ ملی گرام یومیہ کئی خوبیاں کوں  
میں تقسیم کر کے دی جائے۔

مضر اثرات: متلی قے۔

منفی افعال: امراض قلب و جگر اور ہائی بلڈ پریشر میں نہیں دینا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

**FLABOLIN-40** (WOCKHARDT) 40mg; cap 10: Rs.22.50 فلبولین  
**SLIMERAX** (BIDDLESAWYER) 20mg tabs 10: Rs.11.70 سل می ریکس

## SUGAR SUBSTITUTE

## شکر کے متبادل

## SPARTAME SACCHARINE SODIUM

## ایس پارٹیم سکرین سوڈیم

افعال و منافع: ذیابیطیس کے مریضوں کو شکر کی جگہ مٹھاس کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ گولی دودھ یا چائے میں حل کر کے۔

## تجارتی مرکب

**ASPASWEET** (INTAS) ایس پاسویٹ

Aspartame 18mg tabs: 100: Rs.19.50

**ONE-UP** (TORRENT) ون اپ

18mg pallets 100: Rs.32.00



**RALSWEET**

(RALLIS)

رال سویٹ

9mg: tabs: 100: Rs.15.35

**SUGAR FREE TABS**

(CADILA)

شوگر فری ٹیب

18mg tabs: 50: Rs.50; 100: Rs.34.00

**SWEETEX PELLETS**

(KNOLL)

سوئی ٹیکس پی لیت

مصنوعی جنسی ہارمون

**SEX HARMONES****(SYNTHETICS)****ALLY LONESTRENOL**

الائی لونسٹرول

افعال و منافع: محافظ حمل دوا ہے، حمل بچے کی پرورش کے ساتھ کوئی ہارمونی رد عمل پیدا نہیں کرتی، اسقاط مندرہ، عادی اسقاط حمل، قبل از ولادت کاذب درد مشیمہ کے نہ بننے، استخاضہ اور قبل از حیض تناؤ اور درد میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: اسقاط مندرہ میں ۵ ملی گرام دن میں ۳ بار ایک ہفتہ عادی اسقاط میں ۲۰ ملی گرام یومیہ حمل کے پانچویں ماہ تک عدم مشیمہ میں ۱۰ سے ۲۰ ملی گرام روزانہ یہاں تک کہ حمل قرار پا جائے استقرار حمل کے بعد ۱۰ ملی گرام روزانہ ۴ ماہ تک استخاضہ میں ۱۵ ملی گرام یومیہ عسر طمث میں ۱۰ ملی گرام یومیہ ۳ دن قبل حیض دینا چاہیے۔

منفی افعال: پستان یا نسوانی اعضاء کا کنسر جگر کی خرابی غیر تشخیصی مہلی جریان خون۔

مضر اثرات: ہاضمے کی خرابیاں، متلی، تے۔

احتیاط: ذیابیطس مرگی، آدھاسیسی (ثقیقہ) میں احتیاط برتنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

**ANIN**

(SWIFT) 5mg tabs 10: Rs.39.60

اے ن

**FETUGARD**

(BIDDLES AWYER) 5mg tabs 10: Rs.39.75

فیوگارڈ

**FULTERM**

(MICRO LABS) 5mg: Rs.29.05

فل ٹرم



**MAINTANE  
NIDAGEST**

(JAGSONPAL) 5mg tabs 10: Rs.30.10  
(SYSTOPIC) 5mg tabs: 10: Rs.25.25

مین ٹین  
ٹڈاچسٹ

## کور یونک گوناڈوٹروپین

## CHORIONIC GONADO TROPIN

**افعال و منافع:** یہ مردانہ زنانہ تناسلی اعضاء خصوصاً خصبیۃ الرحم اور مردانہ خسیوں کو تقویت اور تحریک پہونچاتی ہے۔ حیض کا زیادہ دن آنا، غیر طبعی حیض آنا، ابتدائی اور ثانوی بندش حیض کارپس لیوٹیم کی عدم کارکردگی، بلوغت میں کمی، بیضہ انش کی عدم پیدائش، جنسی افعال میں کمی، عادی اسقاط خسیوں کا تھیلی میں نہ آنا مردوں میں نسوانی خصوصیات، ورم خصبہ مردوں اور عورتوں میں جنسی سرد مہری میں مفید ہے۔

**مقدار و ترکیب:** ۵۰۰ سے ایک ہزار یونٹ عضلاتی ہفتہ میں ۲ یا ۳ بار لگائیں اسے ۲ ماہ تک استخاضہ میں ۱۵۰۰ سے ۵۰۰۰ یونٹ جب تک خون بند نہ ہو جائے۔ ابتدائی اور ثانوی بندش حیض اور بیضہ انش کی عدم پیدائش میں ۱۰۰۰ یونٹ روزانہ حیض کے ۱۲ اوں ۱۵ اوں اور ۱۶ اوں دن دینا چاہیے۔  
**منفی اثرات:** زیادہ مقدار میں بیضہ انش پر خراب اثر پڑتا ہے۔  
**مضر اثرات:** درد شکم، بخار (الرجک ری ایکشن)۔  
**احتیاط:** سلوشن تیار کرتے ہی لگا دینا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

**CHORIOMON**

(PANACEA)

کور یومن

2000 iu amp. Rs.465.00, 5000 iu amp. Rs.722.00

**CORION 1000 IU**

(WIN MEDICARE)

کور یون

1000 iu; 1 amp Rs.557.75

**GONADOTRAPHIN LH**

(BIOCHEM) Rs.225.00

گوناڈوٹروپین

**GONOTROP-C**

(MODI-MUNDI PHARMA)

گوناڈوٹروپ

1 amp. Rs.557.75



**MAINTANE  
NIDAGEST**

(JAGSONPAL) 5mg tabs 10: Rs.30.10  
(SYSTOPIC) 5mg tabs: 10: Rs.25.25

مین ٹین  
نڈا جیسٹ

کور یونک گوناڈوٹروپین

## CHORIONIC GONADO TROPIN

افعال و منافع: یہ مردانہ زنانہ تناسلی اعضاء خصوصاً خصیۃ الرحم اور مردانہ خسیوں کو تقویت اور تحریک پہونچاتی ہے۔ حیض کا زیادہ دن آنا، غیر طبعی حیض آنا، ابتدائی اور ثانوی بندش حیض کارپس لیوٹیم کی عدم کارکردگی، بلوغت میں کمی، بیضہ انٹی کی عدم پیدائش، جنسی افعال میں کمی، عادی اسقاط خسیوں کا تھیلی میں نہ آنا مردوں میں نسوانی خصوصیات، ورم خصیہ مردوں اور عورتوں میں جنسی سرد مہری میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰۰ سے ایک ہزار یونٹ عضلاتی ہفتہ میں ۲ یا ۳ بار لگائیں اسے ۲ ماہ تک استحاضہ میں ۱۵۰۰ سے ۵۰۰۰ یونٹ جب تک خون بند نہ ہو جائے۔ ابتدائی اور ثانوی بندش حیض اور بیضہ انٹی کی عدم پیدائش میں ۱۰۰۰ یونٹ روزانہ حیض کے ۱۲ اوں ۱۵ اوں اور ۱۶ اوں دن دینا چاہیے۔

منفی اثرات: زیادہ مقدار میں بیضہ انٹی پر خراب اثر پڑتا ہے۔

مضر اثرات: درد شکم، بخار (الرجک ری ایکشن)۔

احتیاط: سلوشن تیار کرتے ہی لگا دینا چاہیے۔

### تجارتی مرکبات

**CHORIOMON**

(PANACEA)

کور یومس

2000 iu amp. Rs.465.00, 5000 iu amp. Rs.722.00

**CORION 1000 IU**

(WIN MEDICARE)

کور یون

1000 iu; 1 amp Rs.557.75

**GONADOTRAPHIN LH**

(BIOCHEM) Rs.225.00

گوناڈوٹروپین

**GONOTROP-C**

(MODI-MUNDI PHARMA)

گوناڈوٹروپ

1 amp. Rs.557.75



<b>PREGNYL</b>	(INFAR) Rs.312.50	پریگنل
<b>PROFASI</b>	(SERUM INSTITUTE) 10,000 iu 1: Rs.545.46	پروفوسائی
<b>PUBERGEN</b>	(UNI-SANKYO)	پیو برگن
5000 iu 1 amp: Rs.280.00		

## BROMOCRIPTINE

## برومو کریپٹن

افعال و منافع: بندش حیض، دودھ بہنا، عورتوں کا عقر (بانجھ پن) دودھ کی پیدائش کو روکنا پارکنسنز ڈیزیز میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵ ملی گرام روزانہ ہمراہ طعام رفتہ رفتہ مقدار بڑھائی جائے۔

مضر اثرات: متلی، تھک، درد سر، قبض چکر آنا، بلڈ پریشر اور خشکی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: استقرار حمل ہوتے ہی دوا بند کر دیں، زخم معدہ میں، ڈرائیوری اور مشنری چلانے سے، ذیابیطیس جگر اور گردوں کی خرابی میں احتیاط برتنا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

<b>BROM-INGA</b>	(INGA) tabs: 10: Rs.70.77	بروم انگا
<b>PRAVIDEL</b>	(SANDOZ)	پراوی ڈیل
<b>PROCTINAL</b>	(BIDDLE SAWYER)	پراکٹی نال
1.25mg: 10: Rs.68.00, 2.5mg: 10: Rs.107.50		
<b>SEROCRYPTIN</b>	(SERUM INSTITUTE)	سیرو کریپٹن
2.5mg tabs: 5: Rs.61.28		

## CLOMIPHENE CITRATE

## کلو می فین سائٹریٹ

افعال و منافع: ہارمون کی خرابی کے سبب ہونے والا بانجھ پن حیض کی خرابیاں دور کرنے بیضہ انٹی و کی پیدائش میں اضافے کے لئے مستعمل ہے۔

مقدار و ترکیب: بانجھ پن میں ۱۵ ملی گرام روزانہ حیض ختم ہونے سے پانچویں دن سے دسویں دن

تک مردوں میں حوینات منویہ کی کمی یا فقدان کے لئے ۲۵ ملی گرام روزانہ ۶ سے ۹ ماہ استعمال کرائیں۔

منفی افعال: غیر طبعی جریان خون، حمل جگر کی خرابی میں نہیں دینا چاہیے۔



مضر اثرات: جسم میں گرمی کی لہریں محسوس ہونا، درد شکم بے چینی آنکھوں کے آگے دھبہ، میہمیں کا پڑا ہونا، ایک ساتھ کئی بچوں کی پیدائش کا امکان۔

احتیاط: دو اثر دوا کرنے سے قبل حمل کی جانچ کرائیں، معالج کی نگرانی میں استعمال کرائیں۔

## تجارتی مرکبات

<b>CLOFERT</b>	(SIGMA LABS)	کلوفرت
25mg: 10: Rs 26.90, 50mg: 5: Rs 26.90		
<b>CLOMITROP</b>	(MODI-MUNDI PHARMA)	کلومی ٹروپ
<b>FERTOMID</b>	(CIPLA)	فرٹومڈ
25mg: 10: Rs.28.85, 50mg: 5, Rs.27.70		
<b>FERTO TAB</b>	(BIDDLESAWYER)	فرٹو ٹیب
25mg: 10: Rs.27.25, 50mg: 10: Rs.52.30		
<b>INDOVUNAL</b>	(BIOGENICS)	انڈو وونال
caps: 25mg: 10: Rs.25.25, 50mg: 10: Rs.50.00		
<b>OMICITE</b>	(TORRENT)	ومی سائیٹ
50mg tabs 10: Rs.50.90		
<b>OVA FAR</b>	(INFAR)	وا فار
50mg: tabs: 5: Rs.31.30		
<b>REJUN</b>	(UNI-SANKYO)	ری جن
tabs: 25mg: 10: Rs.25.27, 50mg: 5: Rs.22.96		
<b>SIPHENE</b>	(SERUM INSTITUTE)	سائی فین
Clomiphene citrate 50mg tabs 5: Rs.28.10		

## DANAZOL

## ڈانازول

افعال و منافع: بانجھ پن رحم کی غشاء مخاطی میں خرابی پستانوں میں رشید دار رسولیاں بننا، استخاضہ، قبل از بلوغت مردوں میں چھاتیوں کے بڑے ہو جانے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: رحم کی خرابی اور بانجھ پن میں ۲۰۰ سے ۴۰۰ ملی گرام یومیہ ۳ سے ۶ ماہ تک چھاتیوں کی رسولی مردوں میں چھاتی کے بڑا ہونے میں ۱۰۰ سے ۴۰۰ ملی گرام روزانہ ۲ سے ۳ ماہ تک استخاضہ میں ۲۰۰ ملی گرام یومیہ ۳ ماہ تک قبل از بلوغت ۱۰۰ سے ۴۰۰ ملی گرام روزانہ مریض کی عمر اور



وزن کے حساب سے۔

منفی افعال: تناسلی اعضاء میں جریان خون، حمل ایام رضاعت قلب و جگر کے ورم خون کی غیر طبعی حالت میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: متلی چکر آنا، جلد پر داغ پشت میں درد، چہرہ سرخ، عضلات میں تشنج محرک و مقوی باہ اثر کرتی ہے۔ جسم میں پانی کا رکنا، وزن میں اضافہ درد سر، یرقان شحمی اور ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔

احتیاط: مردانہ جذبات برا بیختہ ہونے کا دھیان رکھیں، پستانوں کے کینسر جگر گردوں کی خرابی مرگی جسم میں پانی رکھنے یرقان کی ہسٹری میں احتیاط رکھیں۔

دواؤں کا رد عمل: خوردنی مانع حمل ادویہ سائیکلو سپورین دافع انجماد خون اور کاربامائیڈ پائٹن کے ساتھ خراب اثر ہوتا ہے۔

## تجارتی مرکبات

**DANOGEN**

(CIPLA)

ڈانوگن

50mg: 30: Rs.237.60; 100mg: 30: Rs.468.00; 200mg: 30: Rs.759.90

**DANOL**

(KANPHA)

ڈانول

50mg: 3x10: Rs.214.00; 100mg: 3x10: Rs.424.00; 200mg: 3x10: Rs.714.00

**GONABLOK**

(WIN MEDICARE)

گونابلاک

50mg: 30: Rs.202.00; 100mg: 30: Rs.378.00; 200mg: 30: Rs.670.00

## DIENOESTROL

ڈائی نسترول

افعال و منافع: ورم مہیلی، مہیلی کی اندرونی جھلی کا سکڑنا، مہیل کی کھجلی سن یاس کے سبب ہونے والا مہیلی تناؤ کا ورم وغیرہ میں مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: مخصوص آلے میں کریم بھر کر مہیل کے اندرون میں ۱-۲ بار لگائیں۔

احتیاط: مہیلی کینسر اور حمل میں احتیاط رکھیں انفکشن کی حالت میں مناسب علاج ساتھ میں جاری رکھیں۔



## تجارتی مرکبات

ڈائی نسرول

(ETHNOR)

**DIENOSTROL**

Diennoestrol 0.01% cream 50g with applicator Rs.64.80

## ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹیرون جیلی **DIHYDRO TESTO STERONE GEL**

افعال و منافع: تناسلی اعضاء کا نامکمل اور چھوٹا ہونا، حسیوں کا تھیلی میں نہ اترنا، خسیوں کا خراب ہونا نامردی، مردوں میں چھاتیوں کا ابھرنا، جلد کا سخت ہونے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: مردوں میں ۵ سے ۱۰ گرام یومیہ عورتوں میں ۲.۵ ملی گرام یومیہ ایک دن کا ناغہ دے کر استعمال کرائیں۔

منفی افعال: غدہ قدامیہ کا کینسر حمل اور رضاعت میں اور بچوں کو قلب و جگر و گردوں کے امراض میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: ورم غدہ قدامیہ، آلات بول میں انفکشن کا خطرہ خسیہ کی تھیلی پر گانٹھیں چھاتیوں ڈھیلی اور دراز ہونا۔

دواؤں کا رد عمل: تقویت باہ کی دوائیں، انسولین دافع ذیابیطیس ادویہ۔

## تجارتی مرکبات

انڈراکٹم

(CHEMECH)

**ANDRACTIM**

Dihydrotestosterone 2.5g per 100g gel: 100g tube Rs.573.00

## ڈائی ہائیڈرو جیسٹرون **DIHYDRO GESTRONE**

افعال و منافع: قبل از حیض تناؤ و عسر طمت، اسقاط مندرہ، عادت اسقاط مشیمہ کی عدم پیدائش، بانجھ پن، جنسی بے رغبتی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: قبل از حیض تناؤ و درد میں ۵ سے ۱۰ ملی گرام دن میں ۲ بار ماہواری کے ۱۲ ویں دن سے ۲۶ ویں دن تک، عسر طمت میں ۱۵ ویں دن سے ۲۵ ویں دن تک اسقاط مندرہ میں ۳۰ ملی گرام



پہلی خوراک پھر ۵ سے ۱۰ ملی گرام ہر ۸ گھنٹہ بعد، عادی اسقاط میں حمل کا قرار پاتے ہی ۵ ملی گرام روزانہ حمل کے پانچویں ماہ تک۔

منفی افعال: مہل سے خون آنے و ریدوں میں خون جمنے، حمل کا ذب تناکلی اعضاء چھاتیوں کا کینسر، جگر کی خرابی، حمل میں پھنسیاں انیمیا حمل اور ایام رضاعت میں نہیں دیتا چاہیے۔  
مضر اثرات: چکر آنا چھاتیوں میں درد ہونا۔

احتیاط: مرگی، ادھاسیسی دمہ، قلب و جگر کی خرابی نفسیاتی الجھن اور ڈپریشن میں احتیاط برتیں۔

## تجارتی مرکب

**DUPHASTON**

(DUPHAR)

ڈوفاسٹن

Dydrogesterone 5.0mg tabs: 10: Rs.113.20

**ESTRDIOL**

ایسٹراڈیول

افعال و منافع: سن یاس کے سبب ایسٹروجن کی کمی، ہڈیوں کی کمزوری میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵ سے ۱۰۰ ملی گرام یومیہ

منفی افعال: چھاتیوں اور رحم کی اندرونی جھلی میں کینسر رحم سے جریان خون جگر کے فیل ہونے اور ریدوں میں خون جمنے کی ہسٹری میں حمل اور ایام رضاعت میں نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: مقامی خراش، چھاتیوں میں درد، ادھاسیسی کا درد کھلی جلد پر دانے پھنسیاں ری ایکشن ہو سکتا ہے۔

احتیاط: ضعف قلب، ہائی بلڈ پریشر جگر و گردوں کی خرابی، مرگی ادھاسیسی (شقیقہ) رحم اور چھاتیوں کے امراض رحمی رسولی، ذیابیطیس اور چھاتیوں کے کینسر میں احتیاط برتیں۔

## تجارتی مرکب

**ESTRADERM TTS 25,50,100**

(CIBA-GEIGY)

ایسٹراڈرم

0.1mg/day. TTS 25: 2: Rs.89.27, TTS 50: 2: Rs.114.28 TTS 100: 2:

Rs.143.21



## ایسٹریول سکسی نیٹ **ESTRIOL SUCCINATE**

افعال و منافع: سن یاس میں ایسٹروجن کی کمی میں، گرمی کے احساس تناسلی اعضاء میں تبدیلی پیشاب نہ رکنا، سن یاس کی ذیلی علامتوں میں مفید ہے۔ (سن یاس کی علامات کے لیے دیکھیے میڈیکل گائیڈ)  
مقدار و ترکیب: ۸ سے ۱۰ ملی گرام یومیہ پہلے ہفتہ پھر آہستہ آہستہ کم کریں ۲-۴ ملی گرام یومیہ دیں۔  
منفی افعال: حمل رگوں میں خون جمناء، رحمی جریان خون اور لیام رضاعت میں ممنوع ہے۔  
مضر اثرات: متلی، قے، چھاتیوں میں نرمی اور درد پیٹرو میں رطوبت مخاطیہ کی افزائش درد سر۔  
احتیاط: خون میں جھکے Clot بننے کی ہسٹری میں گردوں جگر اور قلب کے فیل ہونے جسم میں پانی کی زیادتی ہائی بلڈ پریشر مرگی ادھاسیسی ورم رحم حمل کھلی ہر پیز اور کارٹی سون کے مرکبات کے ساتھ احتیاط لازم ہے۔

### تجارتی مرکبات

**EVALON**

(INFAR)

ایوالون ٹبلٹ

1mg: 30: tabs : Rs. 40.50, 2mg: 30: Rs. 70.50

**EVALON CREAM** (INFAR)

ایوالون کریم

Estriol 1mg per gm cream: 15g tube with applicator: Rs. 75.00

## اتھینی لوستروڈائل **ETHINYLOESTRODIOL**

افعال و منافع: ایسٹروجن کی کمی سن یاس کی تکالیف ماہواری کی خرابیاں حیض کا درد سے اور بے ترتیب آنا، ابتدائی اور ثانوی بندش حیض چھاتیوں کا سکڑنا، دودھ کی کمی مردوں میں جنسی خواہشات کی زیادتی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ماہواری کی خرابیوں میں ۲۱ گولیوں کا پیکٹ والی / ۱ گولی ماہواری ختم ہونے کے پانچویں دن سے شروع کریں۔ دیگر امراض میں ابتدا میں ۵ ملی گرام اے ۳ بار یومیہ بعد کو ۰.۰۲۵ دینا چاہیے۔  
احتیاط: حمل دماغ قلب و جگر کی خرابی ہائی بلڈ پریشر، یرقان شمی، مہل سے خون آنے کارٹی سون کے مرکبات کے ساتھ احتیاط لازم ہے۔



## تجارتی مرکبات

<b>DUOLUTON-L</b>	(GERMAN REMEDIES)	ڈلوٹن ایل
Ethinyl estrodiol 0.05mg, Levo Norgestrel 0.25mg, tabs 21:	Rs.25.39	
<b>LYNDIAL</b>	(INFAR)	لائن ڈیال
Lynoestrenol 1mg, ethinyl oestradiol 0.05mg: tabs :	22: Rs.14.40	
<b>LYNORAL</b>	(INFAR)	الئی نورال
Ethinyl oestrodial 0.01mg, 0.05mg & 1mg: tabs 0.01mg: 10:	Rs.9.50,	
0.05mg: 10: Rs.11.80, 1mg: 10: Rs.17.70		
<b>MIXOGEN</b>	(INFAR)	مکسو جن
Ethinyl estradiol 4.4mg, methyl testosterone 3.6mg: tabs: 10:	Rs.13.80.	
<b>NOVELON</b>	(INFAR)	نوویلان
Ethinyl estradiol 0.03mg, desogestrel 0.15mg: tabs: 21:	Rs.40.00,	
6x21: Rs.240.00		
<b>ORGALUTIN</b>	(INFAR)	ارگالوٹن
Ethinyl estradiol 0.05mg, lynoestrenol 2.5mg: tabs: 10:	Rs.22.00	
<b>OVRAL-G</b>	(WYETH)	اورال جی
Ethinyl estrodiol 0.5mg, Norgestrel 0.5mg, tabs 20:	Rs.22.00	
<b>OVRAL-L</b>	(WYETH)	اورال ایل
Norgestrel 0.3mg, (equiv to levonorgestrel 0.15mg) ethinyl estrodiol		
0.03mg tabs: 21: Rs.12.29		
<b>OVRAL</b>	(WYETH)	اورال
d-Norgestrel 0.5mg ethinyl estrodiol 0.05mg tabs 21:	Rs.16.56	
<b>PRIMOVLAR-30</b>	(GERMAN REMEDIES)	پرائی موڈلر
Norgestrel 0.5mg, ethinyl estrodiol 0.03mg tabs: 21:	Rs.15.50	

## FOLICLE STIMULATING HORMONE

## فالیکل اسٹی مولیٹنگ ہارمون

افعال و منافع: یہ تین ہارمون کا مرکب ہے میٹن Ovary کے اندر تحریک پیدا کرتا ہے جو بیضہ  
آئنی کی پیداوار میں اضافہ کر کے استقرار حمل میں مدد دیتا ہے۔



مقدار و ترکیب: ۷۵ یونٹ سے ۲۲۵ یونٹ تک مریضہ کے حالات کے مطابق، دیا جائے۔  
منفی افعال: مبیضین وغدہ نخامیہ میں رسولی کے مریض کو دینا خطرناک ہے۔  
مضر اثرات: حساسیت متعدد بیضہ انشی کی پیدائش سے توام بچوں کا اندیشہ، مبیضین کا بڑا ہونا، استقاء، عروق، عروق میں خون جمنہ۔

### تجارتی مرکبات

**GONTROP-M** (MODI-MUNDI PHARMA) گون ٹروپ ایم  
75 iu amp: Rs.445.65, 150 iu amp: Rs.892.00  
**HUMEGON** (INFAR) 1ml amp. with 1ml solvent: Rs.500.00 ہوئے گان  
**PREGNORM 75 I.U** (WIN MEDICARE) پریگ نارم  
1 amp. Rs.300.00

### ہائیڈرو آکسائی پروجسٹرون کیپ رویت

## HYDROXY PROGESTRONE CAPROATE

افعال و منافع: عادت اسقاط، اسقاط مندرہ، جسم ابیض کی خرابی، ابتدائی و ثانوی بندش حیض بانجھ پن میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: عادت اسقاط میں ۲۵۰ سے ۵۰۰ ملی گرام عضلاتی ہفتہ وار اسقاط مندرہ میں ۵۰۰ ملی گرام فوری طور پر عضلاتی پھر ہفتہ میں ۱ بار، جسم ابیض کے سبب ہونے والے عقر میں ۲۵۰ ملی گرام عضلاتی انجکشن لگائیں۔

احتیاط: حالت حمل میں سوائے خطرہ اسقاط کے گردوں کی خرابی جگر میں دبیلہ بننے حمل کی کھجلی اور پھنسی ہر پیزا سٹر میں۔

### تجارتی مرکبات

**ANIN INJ** (SWIFT) اے ن انجکشن  
250mg amp Rs.38.00; 500mg amp Rs.58.00



**HPC DEPOT (BPL)**

250mg: Box of 5x1ml amp. Rs. 125.20; 500mg: Box of 5x2ml  
Rs. 229.40

**MAINTANE INJ (JAGSONPAL)**

250mg: 1ml: Rs. 37.50; 500mg: 2ml: Rs. 60.00

انجلی سی ڈپاٹ

مین ٹین

## LIVON NORGESTRIL

## لون نار جسترل

افعال و منافع: خفیض کی خرابی بار بار حیض آنے اور حمل کی حفاظت کے لئے مفید و مجرب ہے۔  
مقدار و ترکیب: ماہواری ختم ہونے سے ۵ ویں دن سے روزانہ ۱ گولی پیکٹ ختم ہونے کے  
۷ دن کے اندر ماہواری شروع ہو جاتی ہے۔

منفی افعال: چھاتیوں اور رحم کے کینسر میں جگر کی خرابیوں، یرقان، کھلی حالت حمل، ذیابیطس  
بارت ایک نقص تغذیہ جریان مہلی حمل کی کھلی اور ہر چیز کی ہشتری میں دینا مضر ہے۔

مضر اثرات: متلی، تھکاوٹ، اعضاء کی ہشتری، مہل سے خون آنا چکر ضعف، ڈپریشن، بصارت میں فرق،  
چھاتیوں میں نرمی، جنسی خواہش کم اور الرجی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: علاج سے قبل اعضاء نسوانی کی خرابیوں کی جانچ کرائیں۔

## تجارتی مرکبات

**DUOLUTON-L**

(GERMAN REMEDIES)

ڈولوتون ایل

tabs: 21: Rs. 25.39

**OVRAL-L**

(WYETH) 21: Rs. 12.29

لوورال

**TRIQUILAR**

(GERMAN REMEDIES) Rs. 18.60

ٹرائیکولار

## LYNOESTRENOL

## لانی نسٹری ٹال

افعال و منافع: استخاضہ، حیض کا ملتوی کرنا، احساس و سرٹس سرطان الرحم میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: استخاضہ میں ۱۰ ملی گرام پورے ۲۰ دن تک پھر ۵ گرام ۲۵ ویں دن تک استعمال  
کرائیں، التواء حیض کے لئے حیض سے ۳ دن قبل سے ۵ ملی گرام پورے ۲۵ ویں دن تک حیض آنے میں ۵ ملی گرام  
حیض ختم ہونے کے ۵ ویں دن سے ۲۵ ویں دن تک۔



منفی افعال: غیر تشخیص نرف الدم مہیلی، امراض جگر یرقان، کھجلی، ہرپیز میں اس کا استعمال مضر ہے۔  
 مضر اثرات: متلی تے، یرقان سدی، جلد پرداغ درد شقیقہ بندش حیض ہو سکتا ہے۔  
 احتیاط: ایام رضاعت جگر کی غیر طبعی حالت سورج کی تیز شعاعوں سے دوران علاج احتیاط برتیں۔

## تجارتی مرکبات

LYNDIOL IMG	(INFAR)	tabs: 22:Rs. 14.40	لائنڈیال
ORGALUTIN	(INFAR)	tabs: 10:Rs.22.00	ارگالوٹین
ORGAMETRIL	(INFAR)	5mg tabs: 10: Rs.26.30	ارگامٹرل

## MENOTROPHIN

## مینوٹروفین

افعال و منافع: بیضہ انٹی کی عدم افزائش کے سبب عقر، جنسی تحریک کی کمی مہیضین سے حویصلات کی تحریک اور تخریج کے لئے مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: مریض کے حالات کے مطابق مقدار و خوراک کا تعین لٹرچر کے مطابق خوراک دی جائے۔

مضر اثرات: ری ایکشن، مہیض کا بڑا ہونا، شق ہونا، ایک ساتھ کئی بچوں کی پیدائش کا خطرہ۔  
 احتیاط: غد غیر ناقہ کی خرابی، دماغ کی چوٹ یا صدمہ اور حمل میں احتیاط برتنا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

PREGONAL-75	(SERUMINSITUTE)	1amp: Rs.561	پریگونال ۷۵
PREGONAL-150	(SERUMINSITUTE)	1amp: Rs.876.59	پریگونال ۱۵۰
PREGNORM	(WIN MEDICARE)	1mp. Rs.800	پریگونارم

## MESTE ROLONE

## میسٹری لون

افعال و منافع: مردوں میں جنسی رغبت بلوغت کی کمی، مردانہ بانجھ پن ضعف باہ میں مفید ہے۔  
 مقدار و خوراک: ضعف باہ اور جنسی کمزوری میں ابتداء میں ۲۵ ملی گرام دن میں ۳ بار پھر دن میں دو بار یا ۱ بار کئی ماہ تک استعمال کرائیں۔



منفی افعال: غدہ قدامیہ کی رسولی اور کینسر میں نہیں دینا چاہیے۔  
 مضر اثرات: جگر اور شکم کی خرابی و جریان خون کی شکایت ہو سکتی ہے۔  
 احتیاط: صرف مردوں کو استعمال کرائیں۔ غدہ قدامیہ اور جگر میں خرابی ہو تو علاج بند کر دیں۔

### تجارتی مرکبات

**PROVIRONUM** (GERMAN REMEDIES) 30; Rs.279.00 پروویرونم

**NORETHIESTERONE ACETATE** ناراتھھی اسٹرون

افعال و منافع: ابتدائی اور ثانوی بندش حیض، استحضاد عسر طمث، رحم کا سکڑنا حیض کے بے ترتیب آنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: بار بار حیض آنے میں ۵ ملی گرام دن میں ۳ بار ۱۰ دن تک۔

منفی اثرات: حمل یرقان، حمل کی کھلی میں، مرگی، شقیقہ میں مضر ہے۔

مضر اثرات: متلی کی شکایت ہو سکتی ہے۔

### تجارتی مرکبات

**DUBOGEN** (UNICHEM) ڈبوگن ٹبلیٹ

**NORISTREAT** (GERMAN REMEDIES) نارسٹریٹ

2ml: Rs.133.00

**PRIMOLUT-N** (GERMAN REMEDIES) پرائی مولٹ این

5mg tabs: 10: Rs.32.00

**MEDROXY PROGESTERONE** میڈروکسی پروجسٹرون

افعال و منافع: بندش حیض عسر طمث، کارپس لیوٹیم کی خرابی سے ہونے والی حیض کی خرابیوں میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲، ۵، ۱۰ ملی گرام یومیہ ۵ سے ۱۰ دن تک ۲-۳ ماہ استعمال کرائیں۔

منفی افعال: وریڈوں میں ورم و انجماد خون، جگر کی خرابی مہلکی نوزل الدم، اسقاط، حمل کی جانچ میں



استعمال ضرر ہے۔

مضر اثرات: صمبی خرابی، پتی (شری) کھلی جلد پر درخشاں ہے، پسینہ کی کثرت، کلی چھاتوں کا مٹا ہوتا۔  
احتیاط: آنکھوں کی تکلیف میں ذیابیطس سرگی، فقیر تاسلی اعضاء کی مہلک، سولیوں اور ابتدائی ۵۰۰۰۰  
نیمہ دودھ پلانے سے احتیاط رکھیں۔

دواؤں کا رد عمل: مانع انجماد خون مانسولین خوردنی دافع ذیابیطس دویہ۔

## تجارتی مرکبات

<b>DEPO-PROVERA</b>	(MAX)	ذیابیطس
150mg perml 1 vial	Rs. 150.00	
<b>FARLUTAL</b>	(PHARMASIA) 10mg tabs 10	فارلوتال
<b>MEPRATE</b>	(SERUM INSTITUTE)	مپریت
10mg tabs 10	Rs. 33.02	
<b>MODUS 2.5/10</b>	(BIDDLE SAWYER)	مڈس
2.5mg 10	Rs. 13.10 10mg 10	Rs. 33.12
<b>PROVERA</b>	(MAX) 10mg tabs 10	پروورا
	Rs. 55.00	

## NORGESTRIL

## نارجسٹریل

افعال و منافع: رحم اور مصلحات رحم میں عشاء کاذب، کثرت حیض، سرطنت حیض کا ہار بار آتا۔  
مقدار و ترکیب: عشاء کاذب، ۵۰۰ ملی گرام ۶ سے ۱۲ تک کثرت حیض میں ۱ سے ۲ گرام  
۶ سے خون رکھنے پر ۵ سے ۱۰ گرام ۶ سے ۱۲ دیں دن تک سرطنت ہے ترتیب حیض آنے میں ۵ ملی گرام  
روزانہ ماہواری ختم ہونے کے ۵ دیں دن سے ۱۲ دیں دن تک۔

مضی افعال: رحم اور پستانوں کے کینسر میں خون جننے کی حالت میں اس کا استعمال نقصان دہ ہے۔  
مضر اثرات: ہضم کی خرابیاں جسم میں پانی رکنا، مچھور Oedema وزن میں اضافہ، درخشاں پڑنا، بھسن  
پستانوں میں تکلیف، جنسی خواہش کم برکان۔

دواؤں کا رد عمل: باربیٹون، ہائیڈن، ٹائن، نیتال، پیو، جازون، ہرپیام، پی سین، ایسکی، سلیمین، انسولین اور دافع  
ذیابیطس دویہ کے ساتھ رد عمل خراب۔



## تجارتی مرکبات

<b>DUOLUTON-L</b>	(GERMAN REMEDIES) tabs:21: Rs.25.39	ڈیولوٹان
<b>OVRAL-G</b>	(WYETH) tabs 20: Rs.22.00	اورال
<b>PRIMOVLAR-30</b>	(GERMAN REMEDIES)	پرائی موڈلر ۳۰
tabs 21: Rs.14.50		

## OESTRADIOL

## ایسٹراڈائل

افعال و منافع: سن یاس کے سبب ہڈیوں کی خرابی میں مفید ہے۔  
 مقدار و ترکیب: متاثرہ مقام پر جلد صاف کر کے پلاسٹر Patch لگایا جائے ۳-۴ دن بعد بدل دیا جائے بچوں کو اس کا استعمال ممنوع ہے۔  
 منفی افعال: رحم اور چھاتیوں کے کینسر غشاء کاذب، مہلبی نزف الدم، جگر کے ناکارہ ہونے و ریدوں میں خون جمنے کی ہسٹری میں، رگوں میں تھکے Clot بننے حساسیت حمل اور رضاعت میں مضر ہے۔  
 مضر اثرات: پلاسٹر کی جگہ خراش بے چینی، چھاتیوں میں تکلیف شقیقہ پیلا رنگ دکھائی دینا و ریدوں کا متورم ہونا ری ایکشن ہو سکتا ہے۔  
 احتیاط: قلب کاست ہونا، ہائی بلڈ پریشر، جگر گردوں کی خرابی مرگی، شقیقہ پستان میں نئی ساخت ذیابیطس، چھاتیوں کے کینسر کی فمیلی ہسٹری میں احتیاط برتیں۔

## تجارتی مرکبات

<b>ESTRADERMTTS</b>	(CIBA GEIGY) Rs.143.21	ایسٹراڈرم
---------------------	------------------------	-----------

## OESTRADIOL

## ایسٹراڈائل پروپیونیٹ

افعال و منافع: بندش حیض، قلت حیض دودھ کی زیادتی غدہ قدامیہ کا کینسر ورم کی مفید دوا ہے۔  
 مقدار و ترکیب: بندش و قلت حیض میں ۲.۵ سے ۵ ملی گرام عضلاتی انجکشن لگائیں دودھ کی پیدائش روکنے کے لئے ۱۰ ملی گرام عضلاتی ۲-۳ دن لگائیں۔ غدہ قدامیہ کے ورم کینسر میں ۱۰ ملی گرام ایک دن بچ لگائیں۔



منفی افعال و احتیاط: حمل قلبی اور اور دماغی خرابیاں شدید ہائی بلڈ پریشر جگر کی خرابیاں یرقان حمل کا یرقان، غیر تشخیصی نرف مہلی، کارٹی سون کے استعمال کے بعد، رضاعت میں استعمال نقصان دہ ہے اگر خون میں انجماد یا تھکے clot بننے کی شکایت ہو تو دوا بند کر دیں طویل عرصہ تک علاج سے، مرگی اور شقیقہ میں احتیاط برتیں۔

## تجارتی مرکبات

MIXOGEN INJ

(INFAR) 1ml: Rs. 31.50

کموجن

## PROGESTRONE

## پروجسٹرون

افعال و منافع: اسقاط مندرہ، عادی اسقاط، بندش حیض قلت حیض قبل حیض تناؤ درد پستانوں میں گائیں بننے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: اسقاط مندرہ میں ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام شدید حالت میں ۱۰۰ ملی گرام عضلاتی یومیہ بار بار اسقاط میں، حمل کی ابتدا سے ۱۱.۵ ملی گرام ایک دن وقفہ سے ابتدائی ۳ ماہ تک لگائیں، بندش و قلت حیض میں ۲.۵ سے ۵ ملی گرام ایسٹراڈول ۰.۵-۶ مرتبہ ۳ دن کے وقفہ سے بعد میں ۲۵ ملی گرام پروجسٹرون عضلاتی لگائیں ۵ دن تک۔

(منفی و مضر اثرات احتیاط دواؤں کے رد عمل کے لئے دوا کے ساتھ کا پرچہ ترکیب استعمال دیکھئے)

## تجارتی مرکب

UTROGESTAN

(CHEMECH)

یوٹروگیستان

100mg: caps: 10x3 caps: Rs. 532.00

## TESTOSTERONE PROPIONATE

## ٹسٹوسٹرون پروپیونیٹ

افعال و منافع: مردوں میں جنسی خواہش کی کمی نامردی، حوینات منویہ کی کمی مردانہ ہارمون کی کمی کے سبب نامردی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۵ ملی گرام ہفتہ میں ۳ بار ۲ ہفتہ تک لگائیں۔



منفی افعال: غدہ قدامیہ اور پستانوں کے کینسر میں دینا سخت نقصان دہ ہے۔  
 مضر اثرات: جنسی خواہش میں اضافہ، قبل از وقت بلوغت مادہ منویہ میں کرم منی کی کمی، انزال میں منی کا اخراج زیادہ ہو سکتا ہے۔  
 احتیاط: قلب اور گردوں کی خرابی، ہائی بلڈ پریشر قبل از بلوغت استعمال میں احتیاط۔  
 دواؤں کا رد عمل: فولاد دفع تیزابیت اپنی سیلین مانع انجماد خون، دورہ روکنے والی کاربامازی پائین، فین ٹائن، لیتھیم ڈیجاکسن کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔

### تجارتی مرکبات

AQUAVIRON	(NICHOLAS) inj 1ml: Rs.20.85	ایکواوی ران
MIXOGEN INJ	(INFAR) 1ml: Rs.31.50	مکسو جن
SUSTANON "100"	(INFAR) 1ml: Rs.30.00	سٹانن ۱۰۰
SUSTANON "250" IML	(INFAR) Rs.56.50	سٹانن ۲۵۰
SUSTANON 25	(INFAR)	سٹانن ۲۵
25mg per ml inj. 1ml: Rs.10.40		
SUSTANON 50	(INFAR)	سٹانن ۵۰
50mg per ml inj. 1ml: Rs.18.70		
TESTOVIRON INJ	(GERMAN REMEDIES)	ٹسٹو ویرون
TESTANON 25/50	(INFAR) Rs. 10.40/ 18.70	ٹسٹانن
TESTOVIRON DEPOT	(GERMAN REMEDIES)	ٹسٹو ویرون
per ml inj; 100mg 1ml: Rs.39.80; 250mg: 1ml: Rs.71.30		

## SPERMICIDAL DRUGS

## قاتل کرم منی

### NONOXYNOL

### نونو آکسائی نول

افعال و منافع: منع حمل Contraception کے لئے موثر ہے۔  
 مقدار و ترکیب: مباشرت سے قبل ۵ سے ۱۰ منٹ پہلے گولی مہبل میں اندر کور کھوائیں۔  
 مضر اثرات: مقامی خراش جلن۔



# تجارتی مرکب

**TODAY**

(BLISS)

Nonoxynol (9) 5% vaginal pessaries 5: Rs.14.75: 3x5's Rs.41.30

ٹوڈے

نونائل فینوکسی پالی ای تھروکسائی ای تھانول

## NONYL PHENOXY POLY ETHROXYETHANOL

افعال و منافع: تیز مانع حمل دوا ہے جو کرم منی کو فوراً ختم کر دیتی ہے۔  
مقدار و ترکیب: پچکاری بھر کر مباشرت سے قبل مہبل میں داخل کریں ہر مباشرت سے قبل ایک پچکاری لینا ضروری ہے۔

**DELFIN**

(ETHNOR)

ڈیفن کریم

50g with applicator Rs.33.47

آنتوں کے کیڑوں کی ادویہ۔ مقدار، طریقہ استعمال ایک نظر میں

نام دوا	بک ورم	راؤنڈ ورم کچھوے	وہپ ورم	تھریڈ ورم	شیپ ورم کدو دانے
ال بنڈا زول	۳۰۰ ملی گرام ابار	۳۰۰ ملی گرام ابار	۳۰۰ ملی گرام ابار	۳۰۰ ملی گرام ابار	۳۰۰ ملی گرام روزانہ ۳ دن
لی وای سول	۱۵۰ ملی گرام ابار دو دن	۱۵۰ ملی گرام ابار	---	---	---
بی بنڈا زول	۱۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار ۳ دن	۱۰۰ ملی گرام ۲ بار ۳ دن	۱۰۰ ملی گرام ۲ بار ۳ دن	۱۰۰ ملی گرام ابار	۲۰۰ ملی گرام ۲ بار ۳ دن
پائرن ٹس پامیٹ	---	۱ گرام ابار	۱ گرام ابار	۱ گرام ابار	---
چرازین	---	۷۵ ملی گرام / کلو گرام ابار ۳ دن	---	۷۵ ملی گرام / کلو گرام ابار ۷ دن	---
فکلو سامائیڈ	---	---	---	---	۲ گرام (۳ گولی) ۱ بار ۲ گھنٹہ بعد دستوں کی دوا۔



**UTRINE****محرک و مسکن رحم ادویہ****STIMULANT/ SEDATIVES****CARBOPROST TROMETHAMINE** کاربوپروست ٹرومی تھامین

افعال و منافع: یہ عضلاتی یا اندرون رحم استعمال کرائی جاتی ہے رحم میں شدید انقباض پیدا کر کے رحم کی اشیاء کو باہر نکال دیتی ہے۔ ۳ سے ۵ ماہ تک کے حمل کو خارج کرنے، بعد از ولادت جریان خون کو روکنے میں مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: جریان بعد از ولادت ۲۵۰ ملٹروگرام گہرا عضلاتی لگائیں ضرورت ہو تو آدھ گھنٹہ بعد دوبارہ لگائیں حمل ساقط کرنے کے لئے ۲۵۰ ملٹروگرام گہرا عضلاتی انجکشن ضرورت ہو تو ۲-۳ گھنٹہ بعد دوبارہ لگائیں۔ اندرون رحم ۲.۵ ملی گرام ۱۰ ملی لٹر سوڈیم کلورائیڈ میں حل کر کے کیٹھیئر سے لگا میں ضرورت ہو تو دوسرا انجکشن ۳۸ گھنٹہ بعد دیا جاسکتا ہے۔

منفی افعال: حساس مریضوں کو پیڑو کے درم، قلب و جگر و گردوں کے امراض میں دینا مضر ہے۔ احتیاط: ضرورت ہو تو دافع تے واسہال دوائیں دیتے رہیں پیڑو میں زخم سوراخ یا ٹیو مر بننے کا خیال رکھیں یرقان ذیابیطس مرگی میں احتیاط برتیں۔

**تجارتی مرکب****PROSTODIN (ASTRAIDL)**

پراس ٹوڈین

250mg per ml inj 1x1ml amp: Rs.80.13

**DESAMINO OXYTOCIN****ڈس امینو آکسی ٹوسین**

افعال و منافع: درد زہ کو تیز کرنے رحم کے جامد ہونے دودھ میں اضافہ کرنے کے لئے مفید ہے۔ مقدار و ترکیب: ۵۰ یونٹ ہر ۳۰ منٹ بعد رحم کی صفائی کے لئے ۵۰ یونٹ دن میں ۵ بار دودھ میں



اضافہ کے لئے دودھ پلانے سے ۵ منٹ پہلے لگائیں۔

منفی افعال: رحم میں بچے کی غلط پوزیشن، رحم کے زیادہ پھیل جانے چار سے زیادہ ولادت ہونے رحم کا آپریشن پہلے ہو چکا ہو تو مشیمہ نیچے آگیا ہو تو اس کا استعمال خطرناک ہے۔  
مضر اثرات: زیادہ مقدار میں دینے سے شدید انقباض کے نتیجے میں رحم شق ہو سکتا ہے۔

## تجارتی مرکبات

**BUCTOCIN**

(WANDER)

بکوسین

Desamino-oxytocin 50 iu buccal tabs: 8: Rs.77.63

## DINO PROSTONE

## ڈائی نوپروسٹون

افعال و منافع: دردزہ میں اضافہ کے لئے مستعمل ہے جس سے بچے کی پیدائش میں آسانی ہوتی ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۵۰۰ ملی گرام انجکشن عضلاتی یا زیر جلد لگائیں ضرورت ہو تو ہر آدھ گھنٹہ بعد لگائیں۔

منفی افعال: عائدہ کے متورم امراض، جنین کی غیر طبعی پوزیشن میں لگانا خطرناک ہے۔  
مضر اثرات: کبھی متلی، قے، اسہال بچے کی حرکت قلب میں تبدیلی زائد مقدار دینے سے رحمی انقباض شدید۔

احتیاط: قلب و جگر گردوں کی خرابی میں مرگی گلوکوما میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کا رد عمل: پراساگلائڈین انقباض الرحم کی دواؤں کے اثرات کو تیز کرتا ہے اس کے ساتھ اور دافع ورم و درد ادویہ (NSAID) دینا خطرہ سے خالی نہیں۔

## تجارتی مرکبات

**CERVIPRIME**

(ASTRA IDL)

سروی پرائم

Dinoprostone 0.5mg syringe 1: Rs.105.54

**PRIMPROST**

(ASTRA IDL)

پرائم پروسٹ

Dinoprostone (PGE-2) 0.5mg tabs: 4: Rs.76.74



## ETHACRIDINE LACTATE ایٹھا کرائی ڈین لکٹیٹ

افعال و منافع: ۳ ماہ سے زائد حمل کو طبی اور جائز نقطہ نظر سے ساقط کرنے کے لئے مستعمل ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۱۰۰ ملی لیٹر رحم میں بذریعہ انفیوژن دوا داخل کی جائے ۴ گھنٹہ بعد ۵۰ ملی لیٹر اور داخل کر سکتے ہیں۔

### تجارتی مرکبات

<b>ABORTIL</b>	(TROIKAA)	ابارٹل
inj 3x50 ml vial: Rs. 77.00		
<b>FOETABORT</b>	(BIOGENICS)	فوٹ ابارٹ
1mg per ml inj. 3x50ml: Rs. 80.80		
<b>VECREDIL</b>	(JAGSONPAL)	ویس ریڈل
1mg per ml inj. 3x50ml: Rs. 80.80		

## ISOXSUPRINE آئی سوکس سپرین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: مرخی رحم دوا ہے، رحمی ساختوں میں خون کی رسد میں اضافہ کرتی ہے قبل از وقت درد زہ اور اسقاط مندرہ میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: وریدی انفیوژن سے ۰.۳ ملی گرام / فی منٹ عضلاتی ۱۰ ملی گرام ہر ۲ گھنٹہ بعد دینا چاہیے ۶۰ سے ۸۰ ملی گرام یومیہ خوردنی یا عضلاتی دے سکتے ہیں۔  
منفی افعال: رحم سے جریان خون کی حالت میں دینا سخت نقصان دہ ہے۔  
مضر اثرات: سینہ میں درد متلی تے۔ جلد پر داغ، قبل از وقت استعمال سے زچہ کے سینہ میں درم ہو سکتا ہے۔

### تجارتی مرکبات

<b>DUVADILAN</b>	(DUPHAR)	ڈواڈی لان مبلٹ
10mg tabs 50: Rs. 21.28		
<b>DUVADILAN INJ</b>	(DUPHAR)	ڈواڈی لان انجکشن
5ml per ml inj 6x2ml amps Rs. 22.80		



**DUVADILAN RETARD**

(DUPHAR)

زواہی لان کپسول

40mg caps 10: Rs. 23.76

**PERIVALAN**

(TABLETS INDIA)

پیری والان

10mg: tabs: 10: Rs. 12.84

**SUPROX**

(SWIFT) tabs: 10: Rs. 5.86

**SUPROX SR**

(SWIFT) 40mg S.R. tabs: 10: Rs. 27.40

**SUPROX INJ**

(SWIFT)

ہیروکس  
ہیروکس ایس آر  
ہیروکس انجکشن

5mg per ml inj 2ml amp 4.20

میٹھائل ارگو میٹرین میلی ایٹ

**METHYL ERGO METRINE MELEATE**

افعال و منافع: رحم میں فوری انقباض پیدا کرنے درد زہ کے تیسرے درجے کو مختصر کرنے ولادت میں آسانی جریان خون روکنے، بعد از ولادت یا اسقاط خون روکنے رحم اصلی حالت پر نہ آنے خون نفاس کی زیادتی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: براہ دہن ۰.۲۵ ملی گرام دن میں ۳ یا ۴ بار انجکشن ۲ سے ۴ ملی گرام عضلاتی یا، ۲۰۰ ملی گرام وریدی لگائیں ضرورت پر ۲ سے ۴ گھنٹہ بعد دوبارہ لگائیں۔  
منفی افعال: حمل، درد زہ کا پہلا مرحلہ، شدید جگر اور گردوں کی خرابی عروق قلبیہ کے امراض میں استعمال سے گریز کریں۔

احتیاط: بائی بلڈ پریشر، خون میں زہریلے اثرات کی موجودگی میں پیدائش سے قبل نہ لگائیں تو ام بچوں کی موجودگی میں جب تک ایک بچہ تولد نہ ہو جائے۔

**تجارتی مرکبات****ERGACAP CAPS**

(MERCURY)

ارگاکپ

Ergot 214mg caps 20, Rs. 40.00

**HICON**

(SYSTOPIC)

ہائی کون

Methyl ergometrine maleate 0.125mg: tabs: 10: Rs. 30.00

**HICON INJ**

(SYSTOPIC) 1ml amp: Rs. 6.25

ہائی کون انجکشن



IMERGEN INJ	(LIFE) 25x1 ml	Rs.108.24	امرجن
INGAGEN-M	(INGA) 100x1ml	Rs.625.00	انگن ایم انجکشن
INGAGEN-M TABS	(INGA) 0.125mg 10:	Rs.25.00	انگن ایم ٹبلیٹ
LERIN	(TROIKAA) 0.125mg: 10:	Rs.18.10	لیرن ٹبلیٹ
LERIN INJ	(TROIKAA) 02mg per ml inj 5x1ml	Rs.29	لیرن انجکشن
MERGOX INJ	(BPL) 25x1 ml amp.	Rs.160	مرگوکس
METHERGIN TABS	(SANDOZ)		میتھارجن ٹبلیٹ
	.125mg tabs 10:	Rs.37.00	
METHERGIN INJ	(SANDOZ) 1ml: 5amps:	Rs.58	میتھارجن انجکشن
METHYLERGOMETRINE INJ	(P&B LABS)		میتھائل ارگو میٹرین
	.2mg per 1ml, 1ml amp.	Rs.4.15	
SATERGIN	(TABLETS INDIA)		سیٹر جن
STYPTOMET	(DOLPHIN) 200mg tabs 10:	Rs.17.27	اسٹیپٹومیٹ
UTREGIN	(SIGMA LABS) 0.125mg: tabs:10:	Rs.20.00	اٹر جن ٹبلیٹ
UTREGIN INJ	(SIGMA LABS)		اٹر جن انجکشن
	0.2mg/ml inj. 50x1ml amp:	Rs.250.00	

## METHYL ERGONOVINE میتھائل ارگو نوون میلی ایٹ

افعال و منافع: بعد از ولادت جریان خون روکنے شکاف قیصری caesarean section طبی اسقاط حمل، بعد از اسقاط، جریان خون بعد از ولادت رحم کو منقبض کرنے کے لئے مفید و موثر ہے مقدار ترکیب: ۰.۲ ملی گرام زیر جلد عضلاتی وریدی لگا سکتے ہیں۔

مضر اثرات: درد سر، چکر آنا، کان بجناد درد شکم متلی قے، ہائی بلڈ پریشر، سینہ میں درد خفقان سانس میں تنگی اور قلب پر اثر پڑتا ہے۔

احتیاط: دو بچوں کی موجودگی میں جب تک ایک تولد نہ ہو جائے۔ رحم کے راستہ میں رکاوٹ تسمم الدم تقیح الدم جگر گردوں کی خرابی ہائی بلڈ پریشر میں احتیاط رکھیں۔

## تجارتی مرکبات

CHROMERGEN TABS	(LIFE) tabs:10:	Rs.12.69	کرومر جین
METHERONE	(MEJDA) 0.2mg per ml : 50 ams	Rs.300	میتھی رون



## OXYTOCIN

## آکسی ٹوسن

افعال و منافع: رحم کو سیکڑنے (منقبض) کرنے والی دوا ہے۔ درد زہ کو بڑھانے رحم کی سستی اور بے حرکت دور کرنے ولادت کے تیسرے درجے میں لگانے سے بچہ کی ولادت میں آسانی ہوتی ہے بعد از ولادت زائد جریان خون روکنے مردہ یا نامکمل حمل کو خارج کرنے میں مفید و معاون ہے۔

مقدار و ترکیب: درد زہ کو بڑھانے کے لئے ۵ یونٹ یا ۵ ملی لیٹر ۵۰۰ ملی لیٹر سوڈیم کلورائیڈ میں ملا کر چڑھائیں ولادت کے تیسرے درجے ۱ سے ۲ یونٹ عضلاتی لگائیں بعد از ولادت جریان خون روکنے کے لئے ۵ سے ۱۰ یونٹ ۵۰۰ ملی لیٹر بوتل میں ملا کر چڑھائیں۔

منفی افعال: عانہ میں بچے کا سر پھنس جانے، بچہ کی غیر طبعی پوزیشن عانہ کا منہ پورا نہ کھلنے، آپریشن سے بچے کی پیدائش کی ہسٹری میں اس کا استعمال سخت نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: بچے کی قلبی حرکات پر اثر، ری ایکشن، زیادہ مقدار میں دینے سے رحم شق ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔

احتیاط: ماہر دایہ کی نگرانی میں استعمال کرائیں عانہ کا منہ بچے کی پوزیشن ولادت کا صحیح وقت کا تعین کرنے کے بعد لگائیں۔

## تجارتی مرکبات

EVATOCIN INJ	(NEON) 10x1 amp; Rs.63.50	ایواٹوسن
GYNOTOCIN	(SIGMA LABS) 50x1ml Rs.215.00	گائٹوٹوسن
LABORON INJ	(WIN MEDICARE) 5x1ml Rs.11.50	لے بورن انجکشن
PITOCIN	(PARKE DAVIS)	پیٹوسین
Oxytocin 10 u. per ml inj; 1 amps, Rs.9.66		
SYNTOCINON	(SANDOZ)	سن ٹوسی نون
1 iu per ml inj. 2iu 5x1ml Rs.52.00		



## PREPARED ERGOT

## پری پیروڈ ارگٹ

افعال و منافع: بعد از ولادت یا بعد از اسقاط جریان خون روکنے، استحاضہ، سن یا س میں جریان خون رحم کی سستی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۷۰ سے ۵۴۰ ملی گرام دن میں ۳ بار جب تک کہ مکمل افادہ نہ ہو جائے۔  
منفی افعال: حالت حمل ولادت کے پہلے اور دوسرے مرحلے میں شدید تقیح الدم Sepsis میں جگر اور گردوں کے شدید امراض میں حساس مریضوں اور زیادہ مدت تک استعمال نقصان دہ ہے۔  
دواؤں کا رد عمل: اڈرینالین کے ساتھ اس کا استعمال مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

ERGACAP CAPS

(MERCURY)

ارگاکپ

Prepared Ergot 214mg caps: 20: Rs.40.00

ERGOTAB

(JAGSONPAL)

ارگوٹیپ

Ergot preparatata 150mg tabs: 10: Rs.7.00

ERGOTAB FORTE

(JAGSONPAL)

ارگوٹیپ فورٹ

Ergot preparatata 270mg caps: 20: Rs.20.00

## RITRODRINE HCL

## رائی ٹروڈرین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: یہ ایک مرنخی رحم دوا ہے۔ رحم کے عضلات کو ڈھیلا اور سست کرتی ہے قبل از وقت درد زہ، بچہ کی بے چینی درد کاذب کو روکنے کے لئے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۰.۰۵ ملی گرام / فی منٹ وریڈی انفیوژن کی راہ سے یا ۲۵ سے ۳۵ ملی گرام فی منٹ عضلاتی۔ ۳ سے ۸ گھنٹہ تک یہاں تک رحمی انقباض رک جائے۔

منفی افعال: بغیر ولادت جریان خون، دورے پڑنا، رحم میں جنین کی موت ماں کی حرکات قلب بے ترتیب ہونا ہائی بلڈ پریشر، دمہ، بلفمی، ذیابیطس، غدود رقیہ کی خرابی اور کارٹی سون کے استعمال کے دوران نقصان دہ ہے مضر اثرات: زچہ بچہ کی حرکات قلب بے ترتیب، بلڈ پریشر میں تبدیلی، خفقان متلی تے درد سر الجھن سینہ میں درد و جھگی۔



دواؤں کا رد عمل: کارٹی سون کے مرکبات ڈیلازی پاکسائیڈ، میگ سلف، پیسٹی ڈین بیہوشی، اور دافع  
ڈپریشن ادویہ کا استعمال مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

**YUTOPAR** (DUPHAR INTERFERON) یونوپار ٹبلیٹ  
Ritodrine 10mg; tabs: 10: Rs.95.00  
**YUTOPAR INJ** (DUPHAR INTERFERON) یونوپار انجکشن  
Ritodrine 10mg per ml inj. 4 amps: Rs.95.00

## VALETHAMATE

## ویلی تھامیٹ برومائیڈ

افعال و منافع: نرم عضلات کے تشنج کو روکنے بوقت ولادت عائد کامنہ کھولنے کے لئے مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: براہ دہن ۱۰ سے ۲۰ ملی گرام ۳ بار روزانہ انجکشن ۸ سے ۱۶ ملی گرام عضلاتی انجکشن  
اس وقت دیا جائے جب رحم کامنہ ۴ سے ۶ سینٹی میٹر کھلا ہو۔  
منفی افعال: گلوگوما، ورم غدہ قدامیہ میں، اتساع امعاء میں نہیں دینا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

**EPIDOSIN** (TTK PHARMA) اپیڈوسن  
8mg per ml inj 5x1ml: Rs.26.35  
**OSDIL** (TROIKAA) اوسڈل  
8mg per ml inj. 5x1ml amp. Rs.36.75  
**VALOSIN** (SIGMA LABS) ولوسن  
8mg per ml inj. 10x1ml amp. Rs.46.40





## خوردنی مانع حمل ادویہ

### ORAL CONTRACEPTIVES

#### CENTCHROMAN

#### سینٹ کرومان

افعال و منافع: براہ دہن استعمال سے حمل کو روکتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ختم ماہواری سے پہلے دن ۱ گولی چوتھے دن دوسری گولی اس طرح ہفتہ میں دوبار ۳ ماہ تک پھر ہفتہ میں ابار جب تک حمل روکنا چاہیں کھلاتے رہیں منفی افعال: یرقان جگر کی خرابی، مہیضین کی خرابی، پیڑ میں غیر طبعی ساخت بننا، شدید الرجی ٹی بی گردوں کے امراض ایام رضاعت میں ابتداء کی ۶ ماہ تک استعمال نہ کرائیں۔

احتیاط: وقت کی پابندی میں احتیاط رہے۔

#### تجارتی مرکب

CENTRON

(TORRENT)

سین ٹرون

Centchroman 30mg tabs 8: Rs.27.90

#### لائسنسری نول اتھھی نائل ایسٹراڈیول

### LYNOES TRENOL ETHINYL ESTRADIOL

افعال و منافع: براہ دہن استعمال سے حمل قائم ہونے سے روکتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ماہواری ختم ہونے کے پہلے دن سے ۱ گولی روزانہ ۲۲ دن ۶ دن خالی یا دوسرے رنگ کی گولیاں استعمال کریں جو پیکٹ میں ہوتی ہیں۔

منفی اثرات: حمل میں، پستان و تناسل اعضاء کے کینسر رگوں میں خون جھنے امراض جگر یرقان دیا بیٹس ہارٹ ایک نقص تغذیہ و ٹامین کی کمی ابتداء کی ۶ ماہ تک دودھ پلانے والی کو مہیبل جریان خون مرگی شدید الرجی میں نہیں چاہیے۔



مضر اثرات: متلی قے استخاضہ الرجی جلد کی رنگت میں تبدیلی، چکر ضعف و پریش بصرات میں فرق  
ثقیلہ جسم میں درد چھین، وزن میں اضافہ چھاتیوں کا نرم ہونا۔

## OTHER CONTRACEPTIVES دوسری مانع حمل ادویہ

### 1. NORGESTREL ETHINYLES TRADIOL

نارجرٹل اتھی ٹائل ایسٹراڈیل

### 2. LIVONORGESTREL ETHINYL ESTRADIOL

لوونارجرٹل اتھی ٹائل ایسٹراڈائل

(ان کے تجارتی مرکبات جنسی ہارمون کے تحت دیکھئے)

دافع مہبلی انفکشن ادویہ

## DRUGS VIGINAL INFECTION

### CHLORAMPHENICOL SUPPOSITRY کلورم فینی کال سپازیٹری

افعال و منافع: ٹرائی کو مونا س انفکشن ورم مہبل ورم عانہ میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: ایک سپازیٹری روزانہ مہبل کے اندر سونے سے قبل رکھوائیں۔

تجارتی مرکب

KEMICETINE VAGINAL

(MAC)

کیمی شین ویجائٹل

250mg: 3: Rs.9.67; 500mg: 3: Rs.14.33

### CHLORDANTOIN

کلورڈن ٹائسن

افعال و منافع: دافع فنگس مہبل کی جھلی میں کنڈیڈا اور ایسٹ کے اثرات کو دور کرتی ہے۔  
مقدار و خوراک: ۱ فیصدی کریم مہبل میں مخصوص آلے سے دن میں ۲ بار لگائی جائے۔



## تجارتی مرکب

**SPOROSTACIN**

(ETHNOR)

اسپورسٹاکن

cream 50g Rs. 7.22

## CHLOROQUINALDOL

## کلوروکوئی نال ڈول

افعال و منافع: ورم مہبل بیکٹیریل انفکشن ٹرائی کو مونس ورم مہبل کنڈیڈا انفکشن میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۲۰۰ ملی گرام ویجائنا کے اندر سوتے وقت رکھوائیں معمولی حالت میں ۵ سے ۸ دن  
شدید حالت میں ۲ ہفتہ استعمال کرائیں۔

## تجارتی مرکب

**GYNOSAN**

(S G PHARMA)

گائوسان

200mg vaginal tab 25x4 tabs: Rs. 32.08

## CICLOPIROXOLAMINE

## سائیکلوپائیروکسولامین

افعال و منافع: مہبل اور شرمگاہ کے فنگل انفکشن کی مفید ترین دوا ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۵۰ ملی گرام مہبل کے اندر سوتے وقت رکھوائیں ۶ دن ضرورت ہو تو ۱۲ دن۔

## تجارتی مرکب

**BATRAFEN**

(HOECHST)

بٹرافین

Ciclopiroxolamine 10mg cream 15g: Rs. 18.70

## CLOTRIMAZOLE

## کلوٹریمازول

افعال و منافع: کنڈیڈا اور مونی لیاں انفکشن کے سبب ہونے والا لیکوریا، شرمگاہ اور مہبل کا ورم و  
بھجائی ورم شفہ کی کھجائی میں بطور حفظہ مقدم حمل کے آخری ۳ ماہ میں مفید و موثر ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۱۰۰ ملی گرام یا گولی مہبل کے اندر سوتے وقت رکھوائیں ۶ دن تک ضرورت ہو تو  
۳ کورس یا اس کی کریم مخصوص آلے کے ذریعہ استعمال کرائیں۔  
احتیاط: ایام حیض میں دوانہ دیں، شوہر و بیوی دونوں ایک ساتھ دوا استعمال کریں۔



## تجارتی مرکبات

<b>CANDID V6/V3/V1</b>	(GLENMARK)	کنڈیڈوی ٹبلیٹ
100mg: 6: Rs.17.97; 200mg: 3: Rs.16.58; 500mg: 1: Rs.14.19		
<b>CANDID V GEL</b>	(GLENMARK)	کنڈیڈ کریم
30g with applicator 25.52		
<b>CANDINIL-100</b>	(INGA)	کنڈی ٹل
s100mg tabs; 6 tabs Rs.18.10		
<b>CANESTIN VAGINAL</b>	(BAYER)	کے نس ٹین ویجائٹل
0mg vaginal tabs; 6 tabs Rs.26.95		
<b>CANESTIN-3 VAGINAL</b>	(BAYER)	کے نس ٹین ۳ ویجائٹل
200mg vaginal tabs; 3 tabs Rs.24.95		
<b>CANESTIN-1 VAGINAL</b>	(BAYER)	کے نس ٹین ۱ ویجائٹل
500mg vaginal tabs; 1 tabs Rs.21.95		
<b>GYNOSTATUM</b>	(CROSLANDS)	گائوس ٹائٹم
30g with applicator: Rs.32.00		
<b>IMIDIL VAGINAL</b>	(LYKA)	ایڈل ویجائٹل
100mg: 6: Rs.21.80, 200mg: 3: Rs.9.46, 500mg: 1: Rs.6.38		
<b>SINIUM VAGINAL</b>	(DEE PHARMA)	سی نیم
100mg: tabs: 6: Rs.18.72		
<b>STATUM VAGINAL TABS</b>	(FRANCO INDIAN)	اسٹیم ویجائٹل
100mg vaginal tabs 6, Rs.18.00		
<b>SURFAZ VAGINAL TABS</b>	(FRANCO INDIAN)	سرفاز ویجائٹل
100mg vaginal tabs: 6, Rs.15.55		
<b>TRIBEN VAGINAL TABS</b>	(JENBURKT)	ٹرائبن ویجائٹل
100mg: 6: Rs.14.50; 200mg : 3: Rs.12.50: 500mg: 1: Rs.7.50		

## FLUCONAZOLE

## فلو کونازول

افعال و منافع: کنڈیڈ انفکشن مہلک گلٹیوں کے سبب ہونے والے مہیلی انفکشن میں مفید ہے۔  
 مقدار و اثرات: متلی سردرد، جلد پرداغ پڑنا، درد شکم، اسہال، نفخ شکم جلد متورم ری ایکشن،  
 خون کے سرخ ذرات کی کمی۔



احتیاط: گردوں کی خرابی میں، جگر کے افعال پر دھیان رکھیں۔

دواؤں کا رد عمل: فین ٹائن، سائیکلو سپورین وارفارین ری فام پی سین مانع انجماد خون ادویہ کے ساتھ مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

<b>ALFLUCOZ</b>	(ALEMBIC)	الفلوکوز
150mg: caps: 4: Rs.120.00		
<b>FLUZIDE</b>	(CONCEPT)	فلوزائیڈ
50mg: 4: Rs.72.00, 100mg: 4: Rs.124.00, 150mg: 1: Rs.45.00		
<b>FORCAN</b>	(CIPLA) 150mg: caps: 1: Rs.31.75	فورکان
<b>MYCOREST</b>	(RECON)	مائی کوریسٹ
50mg: Rs.194.25, 150mg: 1: Rs.28.40		
<b>SYSCAN</b>	(TORRENT)	سکان کپسول
50mg: 4: Rs.40.90, 100mg: 4: Rs.82.90; 150mg: 1: Rs.29.90; 200mg: 4: Rs.154.50		
<b>SYSCAN INFUSION</b>	(TORRENT)	سکان بوتل
2mg per ml inj. 100ml: Rs.70.90		
<b>ZOCON</b>	(FDC)	زوکون ٹبلیٹ
50mg: 4: Rs.47.95; 150mg: 1: Rs.34.25; 250mg: 4: Rs.174.50		
<b>ZOCON INFUSION</b>	(FDC)	زوکون بوتل
2mg per ml I.V. Infusion 100ml Rs.62.95		

## HAMYCIN

ہے مائی سین

افعال و منافع: مہیلی اور مونیلہ انفکشن و ورم، ٹرائی کو موناس مہیلی انفکشن و ورم و بچائنا کے دیگر جراثیمی انفکشن میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۴ لاکھ سے ۸ لاکھ یونٹ لوشن یا گولی استعمال کرائی جاتی ہے۔

## تجارتی مرکبات

ہے مائی سین لوشن

<b>HAMYCIN</b>	(HAL)
Hamycin 200 00 u per ml susp 10ml Rs.14.85	



**HAMYCIN OVULES** (HAL)  
Hamycin 400,000 ovules 6 Rs. 15.76

ہائی سین گولی

## LIGNOCANE

لگنوکین

افعال و منافع: پیشاب کی نالی و دیگر متعلقات کو سن کرنے کیے تھڑ ڈالنے ورم درد کو تسکین دینے کے لئے استعمال ہے۔

(تجارتی مرکبات ٹیوب جیلی کریم انجکشن کے لئے دیکھئے عنوان سن کرنے والی ادویہ)

## METRINIDAZOL

میٹری نائی ڈازول

افعال و منافع: ٹرائی کو مونس انفکشن کے لئے مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰۰ ملی گرام شدید حالت میں ۳۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار ۷ دن تک بچوں کو ۱۰۰ سے ۲۰۰ ملی گرام عمر کے مطابق انفکشن کی حالت میں شوہر بیوی دونوں کو ایک ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔

منفی افعال: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں خون کی غیر طبعی حالت عصبی امراض و ایام رضاعت میں استعمال نہ کرائیں۔

مضر اثرات: ہضم کی خرابی، زبان و دائقہ خراب لیو کو سائیت کی کمی، پیشاب سیاہ آنا طویل علاج میں دورے کا خطرہ۔

دواؤں کا رد عمل: شراب، خوردنی مانع انجماد خون ادویہ، فینوباربیٹون دواؤں کے بلڈ پریشر کے ساتھ اس کا استعمال مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

**COMPEBA**

(IDPL) 200mg : tabs: 10: Rs.3.82

**FLAGYL**

(RHONEPOULENC)

200mg: 10: Rs.3.94; 400mg: 10: Rs.6.57

**METROGYL**

(UNIQUE)

200mg: 10: Rs.3.93; 400mg: 10: Rs.6.65

**UNIMEZOL**

(UNICHEM)

Metronidazol 200mg: tabs: 10: Rs.3.65

کچی با  
فلے جل

میٹرو جل

یونی میزول



## MICONAZOL NITRATE

مائی کونازول نائٹریٹ

افعال و منافع: شرمگاہ اور مہبل میں اور کنڈیڈ انفکشن کے لئے مفید ہے۔ گرام مثبت G+Positive بیکٹریا سے پیدا ہونے والے امراض میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۲۰۰ ملی گرام یا اگولی مہبل کے اندر رکھوائیں کریم اندر اور باہر ۱۴ دن استعمال کرائیں۔

احتیاط: صرف حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں استعمال کرائیں۔

### تجارتی مرکبات

**GYNODAKTARIN**

(ETHNOR)

گائونڈاکٹرین کریم

20g Rs.28.60; 50g Rs.37.95

**GYNODAKTARIN OVULE**

(ETHNOR)

گائونڈاکٹرین نکلیہ

200mg ovule 3: Rs.17.04; 6: Rs.35.30

**MICOLON**

(ETHNOR)

مائی کولون کریم

0.1% w/w cream 15g: Rs.16.40

**SIGMAZOL CREAM**

(SIGMA LABS)

سگمازول کریم

cream: 5g tube: Rs.7.22; 10g tube: Rs.12.51

**ZOLE**

(GUFIC)

زول لوشن

5g: Rs.4.18; Rs.12.60 Lotion 15ml: Rs.10.82

**ZOLE OVULE**

(GUFIC)

زول نکلیہ

Miconazole 200mg ovule 6 Rs.19.95

**N. BENZOYL SULPHANILAMID**

این بنزو آئل سلفانلامائیڈ

**SULPHACETAMIME**

سلفا سیٹامائیڈ

**SULPHA THIAZOLE**

سلفا تھیا زول

افعال و منافع: مہبل اور رحم کا غیر جراثیمی ورم، مہلی ٹرائی کو مونا س اور کنڈیڈ انفکشن، آپریشن اور ولادت کے بعد جراثیمی انفکشن سے حفاظت کے لئے مفید ہے۔



مقدار و ترکیب: ایک پچکاری مہبل میں دن ۲ بار ۶ دن استعمال کرائیں بعد کو دوالم کر دیں۔  
احتیاط: سلفا گروپ سے حساس مریضوں کو اور گردوں کے امراض میں نہیں دینا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

NEBASULF (PFIZER)	15g : Rs. 9.61	نیاسلف
TRISULFA CREAM (STADMED)	Rs. 13.05	ٹرائی سلفا کریم
TRIPLE SULPHA (ETHNOR)	Cream 20 g Rs. 16.50	ٹریپل سلفا

## NAYASTATIN

## نیاسٹاٹن

افعال و منافع: ایک قابل بھروسہ دافع فنگل انٹی بائیوٹک دوا ہے جو مہبل کے مونی لیال اور کنڈیڈ  
انفلشن کے لئے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱ لاکھ سے ۲ لاکھ یونٹ یا اسے ۲ گولی مہبل کے اندر سوتے وقت ۲ ہفتہ استعمال کرائیں۔

## تجارتی مرکبات

MYCOSTATIN VAGINAL (SARABHAI)	
10, Rs. 24.41	

مائی کو سٹاٹن ویجائنل

## POVIDINE IODINE

## پاوی ڈین

افعال و منافع: کنڈیڈ۔ ٹرائی کو موناں اور غیر جراثیمی ورم مہبل میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: سوتے وقت ۲ مہبل کے اندر ۲ ہفتہ تک رکھوائیں۔

احتیاط: دوا سے آنکھوں کی حفاظت کریں۔

## تجارتی مرکبات

ALPHADINE VAGINAL (NICHOLAS)	
14 pessaries with applicator Rs. 20.25	

الفاڈین ویجائنل

BETADINE VAGINAL (WIN MEDICARE)	10: Rs. 22.29	بٹاڈین ویجائنل
---------------------------------	---------------	----------------

POVIDONE VAGINAL (STAEMED)	14: Rs. 20.00	پاوی ڈین ویجائنل
----------------------------	---------------	------------------

WOKADINE VAGINAL (WOCKHARDT)	14 Rs. 23.48	وکاڈین ویجائنل
------------------------------	--------------	----------------



## SECNIDAZOL

## سیکنی ڈازول

افعال و منافع: ٹرائی کو موناں و جراثیمی مہیلی انفکشن ورم میں مفید ہے۔  
 مقدار و ترکیب: ۲ گرام اخوراک صرف استعمال کرائیں میاں بیوی دونوں استعمال کریں۔  
 احتیاط: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ اور ایام رضاعت میں احتیاط برتیں۔  
 مضر اثرات: دردِ نفمِ معدہ، زبان متورم، بے چینی، دردِ سر، بھوک کی کمی اسہالِ الرجی، جلد پر داغ،  
 لیو کو سائیت کی کمی دورے پڑنا عصبی خلل ہو سکتا ہے۔  
 دواؤں کا رد عمل: وارفارین، شراب، ڈائی سلفی ریم کے ساتھ دینا مضر ہے۔

### تجارتی مرکبات

AMID	(ELDER)	Secidazole 500mg tabs: 4: Rs. 48.00	ایس ڈ
SAGENTYL	(SYSTOPIC)		سے گن ٹائل
SECNIL	(RIIONE-POULENC)		سیک ٹل
SECZOL DS	(INTAS)	Secnidazole 1gm: tabs 2: Rs. 27.80	سیک زول
TAGERA	(UNICHEM)		ٹے گے را

## TERCONAZOL

## ٹرکونال زول

افعال و منافع: مہیل اور شر مگاہ کے کنڈیڈ انفکشن کے لئے مفید ہے۔  
 مقدار و ترکیب: پچکاری کے ذریعہ ۵ ملی لٹر سوتے وقت ۳ دن مہیل کے اندر لگا میں۔  
 مضر اثرات: دردِ سر، حیض کی تکلیف، مقامی سوزش و جلن بخار سردی۔  
 احتیاط: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں دودھ پلانے والی اور حساس مریضوں میں۔

### تجارتی مرکبات

GYNO-TERAZOL VAGINAL CREAM (JHONSON & JHONSON) گائونٹیرازول کریم  
 Rs. 30.25

## TINADAZOL

## ٹناڈازول

افعال و منافع: ۳۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار ۷ دن تک یا ۲ گرام واحد خوراک شوہر بیوی دونوں استعمال کریں۔



احتیاط: حمل کے پہلے ۳ ماہ میں، ایام رضاعت میں خون کی غیر طبعی حالت میں عصبی خرابی اور شراب کے ساتھ احتیاط برتیں۔

## تجارتی مرکبات

<b>COSTINI</b>	(CFL)	Rs. 45	کوشائی نی
<b>TINI-500</b>	(KOPRAN)	10, Rs. 19.60	ٹائی نی ۵۰۰
<b>TINICIDE-V</b>	(BLUE CROSS)	Viginal tabs: 4: Rs. 20.00	ٹائی سائیڈ وی
<b>TINIDAFYL</b>	(JAGSONPAL)	10: Rs. 16.50	ٹائی نی ڈافل
<b>TRIDAZOLE</b>	(FRANCO INDIAN)	500 mg: 4: Rs. 6.19	ٹرائیڈازول
<b>ZIL</b>	(SARABHAI)	4: Rs. 21.33	زل
<b>ZOACIDE-V</b>	(TATA PHARMA)	Vagi tabs: 8: Rs. 30.00	زو آسائیڈ

## NATAMYCIN

## نشامائی سین

افعال و منافع: کنڈیڈ اور ٹرائی کو مونس کے سبب ہونے والا مہلی ورم انفکشن میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۱۰۰ ملی گرام ویجائٹل ٹبلیٹ مہل کے اندر رکھوائیں۔

## تجارتی مرکب

<b>PIMAFUSIN VAGINAL</b>	(ELDER)	پی مافیوسن ویجائٹل ٹبلیٹ
Natamycin 100mg Vaginal tabs. 3 with applicator Rs. 33.50		

## VAGINAL CANDIDIASIS

NOW COVERED UNDER ONE CAP

## CANCAP-150

(Fluconazole 150mg Capsules)



Vaginal  
Candidiasis  
150mg  
Single Dose



# پھیپھڑوں کی عروق کو کشادہ کرنے والی ادویہ

## BRONCHODILATOR

### KETOTIFEN

### کیٹوٹائی فین

افعال و منافع: بلغمی دمہ کا دورہ روکنے، بلغم نکالنے، الرجی، اور رد چشم میں مفید ہے۔  
 مقدار: ۱ سے ۲ ملی لیٹرون میں ۲ بار کھانے کے ساتھ بچوں کو ۱ ملی گرام، ۲ سال سے کم عمر کو نہ دیں۔  
 مضر اثرات: خشکی درد سر، متلی، چکر، منہ خشک وزن میں اضافہ۔  
 احتیاط: حمل ایام رضاعت اور حساس مریضوں کو احتیاط رکھیں۔  
 دواؤں کا رد عمل: مسکنات، منومات، دافع حساسیت شراب اور دافع ذیابیطیس۔

### تجارتی مرکبات

AIRYFEN	(PANACEA)	ایرائی فن ٹیبلٹ سرپ
ASTHAFEN	(TORRENT) 10: Rs. 10.90	ایس تھافین سرپ
KETASMA	(SUN PHARMA) 10: Rs. 13.20	کے ٹاسما
KETOTIF	(KOPRAN) 10: Rs. 11.45	کیٹوٹیف
KETOVENT	(INTAS)	کیٹوونٹ
STAFEN	(UNISEARCH)	ایسٹافن ٹیبلٹ سرپ
TRITOFEN	(FDC)	ٹرائی ٹوفان ٹیبلٹ سرپ
ZEROSMA	(TATA PHARMA)	زیرو ساسما ٹیبلٹ سرپ

### SODIUM CROMO GLYCATE سوڈیم کرومو گلائائی کیٹ

افعال و منافع: دمہ کا دورہ روکنے کے لئے مفید ہے۔  
 مقدار: ۲ ملی گرام دن میں ۴ مرتبہ شدید حالتوں میں زیادہ بار بھی سونگھا سکتے ہیں۔  
 مضر اثرات: حلق اور ناک کی نالی میں خراش، سینہ میں درد، چھینک آنا خون آنا۔  
 احتیاط: حمل اور ایام رضاعت میں زیادہ مقدار میں اور جلدی جلدی استعمال سے احتیاط۔



## تجارتی مرکبات

**CROMAL-S INHALER** (CIPLA) 1 Canister Rs. 156.83  
**FINTAL INHALER** (RALLIS)  
**IFIRAL** (UNIQUE)

کرومال ایس انہیلر  
 فن ٹال  
 ایفیرال

## ADRENALIN

اڈرینالین  
 افعال و منافع: بلغمی دمہ، پتی اچھلنا، الرجی، عروق کو کشادہ کر کے دورہ دور کرنا۔  
 مقدار: ۱ ملی لٹرز زیر جلد یا عضلاتی، وریڈی نہیں لگانا چاہیے۔  
 مضر اثرات: بے چینی درد سر ضعف، خفقان قلب ہائی بلڈ پریشر دماغی جریان خون۔  
 دواؤں کا رد عمل: ٹرائی سائی کلک، دافع ڈپریشن، فیورازولی ڈین انٹی ہشامین لوو تھائی راکسین، بیٹا  
 باکر، گوانی تھیڈین، نائٹریٹ اور الفابلا کر کے ساتھ دینا مضر ہے۔

## ALBUTEROL

آل بیوٹی رول

افعال و منافع: دمہ بلغمی سینہ میں درد پرانی کھانسی، امفازم میں مفید ہے۔  
 مقدار: ۴ ملی گرام دن میں ۳ بار۔  
 مضر اثرات: عضلات کا غنا، خفقان، عروق پھیل جانا، لو بلڈ پریشر، متلی درد سر۔  
 احتیاط: ذیابیطس، جگر کی خرابی حرکات قلب بے ترتیب زخم معدہ غدہ درقیہ پھولنے اور حساس  
 مریضوں کو۔  
 دواؤں کا رد عمل: بکلو میتھاسون، تھیوفائی لین بیٹا بلا کر کے ساتھ دینا مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

**ASMATIDE-BR** (SYSTOPIC) 10: Rs. 10.70  
**RESPIRA SYRUP** (GENO) 100ml: Rs. 16.40

ایس مائٹائیڈ بی آر  
 ریس پائی راسرپ

## EPHIDRINE

ایفیدرین

افعال و منافع: دمہ بلغمی، سینہ کا درد۔ کھانسی بلغم خارج کرنے میں مفید ہے۔



مقدار و ترکیب: ۲۰ سے ۴۰ ملی گرام دن میں ۳ بار۔

مضر اثرات: وجع القلب، متلی، بد ہضمی، درد سر، نیند کی کمی حرکات قلب بے ترتیب۔

احتیاط: امراض قلب و جگر، غده درقیہ کا پھولنا، زخم معدہ حمل ایام رضاعت، عظیم غده قد امیہ میں۔

دواؤں کا رد عمل: سیسی ٹی ڈین، ارائی تھرومائی سین، ساپرو فلاکسا سین، مانع حمل ادویہ کے ساتھ

رد عمل خراب۔

## ISO PRENALINE

## آئی سو پری نالین

افعال و منافع: بلغمی دمہ میں اور پرانی کھانسی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲۰ ملی گرام (آگولی) زبان کے نیچے رکھ کر چوسیں دن میں ۴ بار یا ۴۰۰ سے ۸۰۰

ماکرو گرام ناک و منہ کے ذریعہ پھیپھڑوں میں کھینچیں۔

مضر اثرات: منہ خشک، خفقان، بے چینی۔

احتیاط: ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس، قلبی امراض گھسیکا اور دمہ قلبی میں استعمال نہ کریں۔

## ORCI PRENALINE

## آرسی پری نالین

افعال و منافع: بلغمی دمہ، پرانی کھانسی، گرد و غبار والا دمہ، ہوائی کیسوں کا پھولنا سینہ میں درد، ٹی بی،

پھیپھڑوں کے کینسر میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: بالغوں کو ۱۰ سے ۲۰ ملی گرام دن میں ۴ بار بچوں کو سرپ ۵ ملی لٹرون میں ۳ بار

انجکشن، ۵ سے ۱ ملی لٹر عضلاتی یا زیر جلد۔

مضر اثرات: وجع القلب، بے چینی، کپکپانا، متلی، ہائی بلڈ پریشر خفقان سینہ میں درد۔

احتیاط: امراض قلب، امراض غده درقیہ، قلبی دمہ، ہائی بلڈ پریشر ذیابیطس حمل اور رضاعت میں

احتیاط برتیں۔

## SALBUTAMOL

## سال بیوٹامول

افعال و منافع: قلب کو تحریک کے بغیر پھیپھڑوں کی عروق کو کشادہ کرتی ہے۔ بلغمی دمہ ضیق النفس

کھانسی اور امفائی زما میں بطور معاون مفید ہے۔



مقدار و ترکیب: ۲ سے ۶ سال تک اے ۲ ملی گرام دن میں ۳ بار بڑوں کو ۲ سے ۴ ملی گرام دن میں ۴ بار دینا چاہیے۔ شدید دمہ میں ۱۰۰ سے ۲۰۰ مائیکرو گرام یا اے ۲ کش سو گمکھائیں ہر ۴ گھنٹہ بعد۔  
مضر اثرات: عضلات میں کچکی، وجع القلب خفقان، لو بلڈ پریشر متلی درد سر۔  
احتیاط: امراض قلب، ہائی بلڈ پریشر، عظم درقیہ، ذیابیطس دوا سے حساس مریضوں میں۔  
دواؤں کا رد عمل: بکلو میتھاسون، تھیوفائی لین کے ساتھ دینا مضر ہے۔

## سال میٹرول زینافوئیٹ SALMETROL XINAFOATE

افعال و منافع: دمہ، محنت کے وقت سانس پھولنا دورہ پڑنا، زیادہ دیر تک عروق کو کشادہ رکھنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵ مائیکرو گرام دن میں ۲ بار شدید حالت میں ۱۰۰ مائیکرو گرام سو گمکھائیں ۴ سال سے کم عمر بچوں کو نہ دیں۔

مضر اثرات: ہاتھ پیر کا پنا، وجع القلب، خفقان درد سر، سینہ میں درد ری ایکشن، تشنج عضلات سینہ میں خراش جوڑوں میں درد۔

احتیاط: غدہ درقیہ کے پھولنے، شدید دمہ میں حمل اور رضاعت اور بچوں کو نہ دیں۔

دواؤں کا رد عمل: بیٹا بلا کرادیہ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

## ٹر بوتالین سلفیٹ TERBUTALINE SULPHATE

افعال و منافع: تکلیف دہ کھانسی، پھیپھڑوں کا دمہ سعال مزمن، ہوائی کیسوں کا پھیل جانا پھیپھڑوں کی دیگر تکالیف میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵، ۲ سے ۵ ملی گرام دن میں ۲ یا ۳ بار بچوں کو عمر کے مطابق سو گمکھانے کے لئے ۲ سے ۴ کش دن میں ۳-۴ بار انجکشن ۰.۵ ملی گرام۔

مضر اثرات: عضلات کا کانپنا، وجع القلب خفقان۔

احتیاط: ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، امراض قلب اور دوا سے الرجک مریضوں میں۔

دواؤں کا رد عمل: بیٹا میتھاسون، تھیوفائی لین، بیٹا بلا کر کے ساتھ دینا مناسب نہیں۔



## AMINOPHYLINE

## امینوفائی لین

افعال و منافع: بلغمی دمہ سینہ میں درد تشنج و رم ہوائی کیسوں میں تسلا اور بلغم کی رکاوٹ میں مفید ہے۔  
 مقدار و ترکیب: ۲۰۰ سے ۴۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار کھانے کے بعد۔  
 مضر اثرات: معدہ میں بے چینی متلی تے بھوک نہ لگنا وجع القلب۔  
 احتیاط: قلب و جگر کے امراض میں ہائی بلڈ پریشر میں غدد در قیہ پھولنے، حمل زخم معدہ اور حساس مریضوں میں۔  
 دواؤں کا رد عمل: ابو پری تال، سی می ٹی ڈین، پرو پرائیڈول، ارائی تھرو مائی سین فین ٹائن سگریٹ بیڑی و دیگر نشہ آور ادویہ کے ساتھ دینا مضر ہے۔

## BUDE SONIDE

## بڈی سونا ئیڈ

افعال و منافع: بلغمی دمہ میں دورہ روکنے کے لئے منہ کے ذریعہ پھیپھڑوں میں پہنچائی جاتی ہے۔  
 مقدار و ترکیب: ۱۰۰ سے ۲۰۰ مائکرو گرام ۱ سے ۲ کش دن میں ۲ بار استعمال کریں۔  
 مضر اثرات: آواز بیٹھ جانا، منہ اور حلق میں تکلیف ہو سکتی ہے۔  
 احتیاط: پھیپھڑوں کی ٹی بی، فننگل اور وائرل انفیکشن میں ایام حمل اور حساس مریضوں میں احتیاط رکھیں۔

## DIPRO PHYLINE

## ڈی پرو فائی لین

افعال و منافع: پھیپھڑوں کی تالیوں سے بلغم نکالنے، دمہ کا دورہ روکنے کھانسی سانس پھولنے اور نمونیہ میں بطور معاون مفید ہے۔  
 مقدار و ترکیب: ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار  
 احتیاط: جگر و گردوں کی خرابی، مرگی، ڈپریشن حمل ایام رضاعت گلو کوما اور شرابیوں میں احتیاط برتیں۔

## ETO PHYLINE

## ای ٹو فائی لین

افعال و منافع: بلغمی دمہ۔ شدید دمہ کا دورہ۔ سانس پھولنا۔ بلغمی کھانسی دمہ قلبی اور وجع القلب میں مفید ہے۔



مقدار: ۲۰۰ سے ۳۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار کھانے کے بعد پانی کے ساتھ۔  
مضر اثرات: معدہ میں خراش۔ متلی۔ قے، درد شکم معدہ آنتوں کے جریان خون، نیند کی کمی درد سر،  
بے چینی چکر، خفقان۔ لو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔

احتیاط: شدید قلب و جگر کے امراض، غدہ درقیہ کا پھولنا مرض گھیکھا و حمل میں  
دواؤں کا در عمل: الو پروٹال، سی ی ٹی ڈین، پروپرانولول، ارائی تھرومائی سین فین ٹائن کے ساتھ  
خراب رد عمل ہوتا ہے۔

## THIOPHYLINE

## تھیوفائی لین

افعال و منافع: بلغمی دمہ، پرانی کھانسی، بلغم کارکنا، وائرل انفکشن کی کھانسی امفائی زیمیا۔ پھیپھڑوں کی  
رکاوٹ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰۰ سے ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۲ بار بچوں کو ۱۵ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے  
حساب سے۔

مضر اثرات: متلی۔ قے۔ فم معدہ پر درد، اسہال درد سر، بے چینی، نیند کی کمی خفقان سینہ میں درد چہرہ  
سرخ، لو بلڈ پریشر، سانس میں تنگی جلد پر داغ پڑ سکتے ہیں۔

احتیاط: جگر کا ورم۔ قلب میں تنگی اور درد پھیپھڑوں میں ورم۔ قلب و جگر کے امراض حمل ایام  
رضاعت معمر افراد۔ زخم معدہ اور حساس مریضوں میں احتیاط رکھیں۔

## مندرجہ بالا دواؤں کے تجارتی مرکبات

AEROCORT INHALER (CIPLA) Rs. 115.01

ALUPENT TABS (GERMAN REMEDIES)

Oroprenaline sulph. 10mg: tabs: 10: Rs. 12.50

ASMANIL (INGA)

ASMAPAX DEPOT (NICHOLAS)

ASMATIDE-BR (SYSTOPIC)

ASMOTONE (EAST INDIA)

ایروکارت ان ہیلر  
الوپینٹ ٹیبلیٹ

اسمانیل سرپ  
اسماپاکس ڈیپاٹ  
اسمانائیڈ  
ایسٹون



- ASTHALIN** (CIPLA) استھالین  
Salbutamol 2mg & 4mg tabs 2mg: 10: Rs. 3.47 4mg: 10: Rs. 5.18
- ASTHALIN INHALER** (CIPLA) استھالین ان ہیلر  
Salbutamol sulph 100mg per metered dose; inhaler 200 metered doses.  
Rs. 66.60
- ASTHALIN SYRUP** (CIPLA) استھالین سرپ  
Salbutamol 2mg per 5ml syrup 112ml: Rs. 10.98
- BECLATE INHALER** (CIPLA) بک لیٹ ان ہیلر  
200mg 200 doses: Rs. 156.63
- BRICANYL** (ASTRA-IDL) بری کانل  
**BRICANYL INHALER** (ASTRA-IDL) بری کانل ان ہیلر  
Terbutaline sulph 250mg, permetered dose; inhaler 200 metered doses  
Rs. 75.60
- BRICANYL SYRUP** (ASTRA-IDL) بری کانل سیرپ  
Terbutaline sulph 1.5 mg per 5ml; syrup 100ml: Rs. 10.25
- BRICAREX EXPECTORANT** (ASTRA-IDL) بری کاریکس سرپ  
Terbutaline sulph 1.5mg, guaraphenesin 66.65mg per 5ml 120ml  
Rs. 15.60
- BRICAREX TABLETS** (ASTRA-IDL) بری کاریکس ٹبلٹ  
Terbutaline sulf 2.5mg, guaiaiphenesin 100mg; tabs 10: Rs. 5.07
- BRONCOPHYL PLUS** (CFL) براکوفل  
Salbutamol 2mg, Theophylline 100mg tabs. 10 Rs. 3.95
- BRONCORDIL-PELIXIR** (NEOPHARMA) براکوردیل الگزر  
**BRONCORDIL-S TABS** (NEOPHARMA) براکوردیل ٹیبلٹ  
**BRONKOPLUS** (BIDDLE SAWYER) براکوپلس  
Salbutamol 2mg anhydrous therophylline 200mg; tabs. 10 Rs. 10
- BRONKOPLUS SYRUP** (CROYDON) براکوپلس سرپ  
Salbutamol 2mg, Choline theophylline 100mg/5ml Syrup 100ml  
Rs. 15.07
- BRONKOTAB-EX** (BIDDLE SAWYER) براکوتیب  
Salbutamol 2mg, bromhexine hcl 4mg; tabs: 10: Rs. 2.24.
- BRONTALINE** (S G PHARMA) بران ٹالین



**CADIPHYLATE** (CADILA)

Theophylline ethanoate of piperazine 250mg; Tabs 100: Rs. 29.06

**CADIPHYLATE ELIXIR** (CADILA) 200ml Rs. 26.42

**COLD OFF** (STADMED) 10: Rs. 6.50

**COSYP** (CFL)

**COZY PLUS** (SWIFT)

**CURAMOL** (MAC)

Theophylline 100mg, salbutamol 2mg; tabs: 10: Rs. 4.12

**DASLIN** (SEARLE) 100 ml Rs. 10.86

**DELETUS-A** (NICHOLAS)

Guaiaphenesin 100 mg, Salbutamol 2mg per 10ml liquid 100ml  
Rs. 10.35

**DERIPHYLLIN** (GERMAN REMEDIES)

Etophylline 169.4mg, Theophylline 50.6mg per 2ml ampoules 2ml  
Rs. 2.28

**DERIPHYLLIN SYRUP** (GERMAN REMEDIES)

100ml Rs. 9.76

**DERIPHYLLIN TABS** (GERMAN REMEDIES)

Etophylline 77mg, Theophylline 23mg tabs. 10 Rs. 2.25, 250 Rs. 49.65

**ETO-SALBETOL** (FDC)

Etophylline 200mg, Salbutamol 2mg, Bromhexine hcl 8mg tabs 10  
Rs. 4.80

**GLAXO SALBUTAMOL INHALER** (GLAXO)

Salbutamol 100mg per inhalation; inhaler (200 inhalations) Rs. 49.36

**GRILINCTUS-BM SYRUP** (FRANCO-INDIAN)

Salbutamol (as sulph) 2mg, bromhexine hcl 8mg per 5ml syrup 100ml.  
Rs. 16.10

**GRILINCTUS-BM TABS** (FRANCO-INDIAN)

Salbutamol sulph 2mg, bromhexine hcl 8mg tabs 100: Rs. 31.80

**HYSTALIN** (MEJDA)

**MINAPHILIN** (MEJDA)

**PHENSEDYL** (RHONE-POULENC)

کیدی فائی لیٹ

کیدی فائی لیٹ سرپ

کولڈ آف

کوسیف

کوزی پلس

کیورامول

ڈاس لین سرپ

ڈی لی ٹس

ڈیری فائی لین انجکشن

ڈیری فائی لین سرپ

ڈیری فائی لین ٹبلیٹ

ایٹو سالبی ٹال

گلکسو سالبی ٹامول ان ہیلر

گرائی انکٹس سرپ

گرائی انکٹس ٹبلیٹ

ہسٹالین سرپ

مین فائی لین

فینسی ڈل سرپ



<b>PHYLOBID</b>	(WOCKHARDT)	10 Tabs Rs. 9.50	فانی لو بیڈ
<b>PROTUSSA PLUS</b>	(BOOTS)	100ml Rs. 16.60	پروٹوسا پلس
<b>PULMICORT INHALER</b>	(ASTRA-IDL)		پل می کورٹ ان ہیلر
Budesonide 100mg per metered dose; inhaler 100 metered dose Rs. 144.94			
<b>PULMOREST PLUS SYRUP</b>	(STADMED)		پل مورسٹ سرپ
<b>PULMOREST</b>	(STADMED)		پل مورسٹ ٹبلٹ
Bromhexine hcl 8mg: tabs: 10:Rs.3.50			
<b>RESPREN</b>	(ETHNOR)		ریس پرین
<b>SALBETOL</b>	(FDC)	10; Rs. 3.47	سالمی ٹال
<b>TEDRAL LIQUID</b>	(WARNER HINDUSTAN)	100ml: Rs. 7.43	ٹڈرال لکوڈ
<b>TEDRAL SA</b>	(WARNER HINDUSTAN)		ٹڈرال ایس اے ٹبلٹ
Theophylline 198mg, Ephedrine hcl 48mg, Phenobarbitone 25mg, Sustained action tabs 4: Rs. 4.04			
<b>THEO-ASTHALIN</b>	(CIPLA)		تھیو اسٹھالین ٹبلٹ
<b>THEO-ASTHALIN SYRUP</b>	(CIPLA)	100ml: Rs. 13.86	تھیو اسٹھالین سرپ
<b>THEOMAC</b>	(MAC)		تھیو میک
<b>TUSSIVIL</b>	(LEDERLE)		ٹس ویل
<b>VENT</b>	(KOPRAN)		وینٹ
Salbutamol 2mg, Theophylline anhydrous 100mg tabs; 10x3x10 Rs. 146.78			
<b>VENT FORT</b>	(KOPRAN)		وینٹ فورٹ
<b>VENT LIQUID</b>	(KOPRAN)	100ml: Rs. 17.62	وینٹ لکوڈ
<b>VENTKOF</b>	(KOPRAN)	60ml: Rs. 10.00	وینٹ کوف
<b>VENTORLIN</b>	(GLAXO)		وین ٹورلن ٹبلٹ
Salbutamol (as sulph) 4mg & 8mg controlled release caps 4mg; 10. Rs. 6.27 8mg; 10; Rs. 9.05			
<b>VENTORLIN EXPEC</b>	(GLAXO)		وین ٹورلن سرپ
Salbutamol (as salbutamol sulph) 2mg, guaiaphenesin 100mg per 10ml syrup 120ml; Rs. 11.45			
<b>WINTREL</b>	(PFIMEX)		وین ٹرل
<b>XITMA</b>	(NEON)	10x2ml amps Rs. 29.00	زٹ ما انجکشن



## دافع حساسیت کھانسی زکام کی ادویہ

### ANTI HISTAMINES COUGH COLD REMEDIES

#### CHLORPHENIRAMINE

(۱) کلورم فینی رامین میلی ایٹ

#### MELEATE

افعال و منافع: دافع حساسیت دوا ہے الرجی، کھانسی سردی نزلہ زکام میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵ء۲ سے ۵ ملی گرام دن میں ۴ بار بچوں کو نصف خوراک۔

مضر اثرات: خشکی، چکر، لاتی ہے۔

احتیاط: دوران استعمال ڈرائیوری مشنری چلانے، اور شراب سے پرہیز کریں۔

#### DIPHEN HYDRAMINE

(۲) ڈائی فن ہائڈرامین

افعال و منافع: دافع حساسیت و مانع الرجی اثر رکھتی ہے سردی نزلہ زکام کھانسی ورم غار الانف اور

حساسیتی امراض میں بطور معاون مفید و موثر ہے۔

مقدار: ۱۵ سے ۳۰ ملی گرام دن میں ۳ بار۔

مضر اثرات: خشکی، شکر آنا، دل دھڑکنا۔

احتیاط: دوا سے حساس مریضوں کو دودھ پلانے والی چھوٹے بچوں، گلو کوما مرگی، مشنری چلانے و

ڈرائیوری سے پرہیز کریں۔

دواؤں کا رد عمل: شراب مسکن و منوم ادویہ دافع درد ادویہ کے ساتھ خراب اثر ہوتا ہے۔

#### MEPRAMINE MALEATE

(۳) میپ رامین میلی ایٹ

افعال و منافع: سردی زکام خشک کھانسی، سگریٹ بیڑی کے سبب ہونے والی کھانسی میں مفید ہے۔

مقدار: ۱۶ سے ۳۲ ملی گرام دن میں ۳ بار۔

مضر اثرات: خشکی پیدا کرتی ہے۔



احتیاط: حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں جگر کے امراض شراب، ڈرائیوری اور مشنری چلانے سے احتیاط رکھیں۔

## CODEINE (۴) کوڈین

افعال و منافع: مسکن درد اثر کرتی ہے خشک کھانسی آپریشن کے بعد ہونے والی کھانسی میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۱/۴ گولی سے ۱ گولی دن ۲-۳ بار بچوں کو عمر کے مطابق ۱ سال سے کم عمر بچوں کو نہ دی جائے۔

مضر اثرات: متلی تے، قبض خشکی، گھبراہٹ پیدا کرتی ہے۔

احتیاط: سر کی چوٹ، دماغ میں دباؤ، کثرت شراب نوشی، شدید بلغمی دمہ، ضعف قلب، مرارہ کے آپریشن کے بعد استعمال نہ کرائیں۔

## DEXTRO ME THORPHAN (۵) ڈیکسٹر و میتھارفین

افعال و منافع: خشک و تر کھانسی کو وقتی سکون پہونچاتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۵ ملی گرام دن میں ۳ بار ۶ سال سے کم عمر بچوں کو ۲ سے ۴ ملی گرام۔

مضر اثرات: چکر ہضم کی خرابیاں الجھن، گھبراہٹ پیدا کرتی ہے۔

احتیاط: قلب جگر و گردوں کے امراض، ذیابیطس حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں غدہ درتہ کے پھیل جانے میں احتیاط برتیں۔

## ETHYLMORPHINE (۶) ایتھائل مورفین

افعال و منافع: خشک کھانسی، درمیانی درد شقیقہ دانتوں کے درد، عصبی اور عضلاتی درد میں مفید ہے۔

مقدار: ۱۶ سے ۴۸ ملی گرام یومیہ۔

مضر اثرات: متلی تے، قبض، الجھن، خفقان خشکی بے چینی پیدا کرتی ہے۔

احتیاط: طویل عرصہ تک استعمال سے عادت پڑ جاتی ہے، شدید قبض میں احتیاط برتیں۔

## NOSCAPINE (۷) ناسکاپین

افعال و منافع: نزلہ زکام، کھانسی ناک بہنا، ورم غار الانف میں مفید ہے۔



مقدار و ترکیب: ۵۷ سے ۱۵۷ ملی گرام ۴ سے ۶ گھنٹہ بعد۔

مضر اثرات: متلی، چکر، درد سر، قے، خفقان، پیشاب میں کمی ضعف عضلات ہاتھ پیر کانپنا، الجھن خشکی نیند کی کمی جلد پرداغ پڑنا۔

احتیاط: ہائی بلڈ پریشر، امراض قلب، وجع القلب اور دوا سے الرجک مریضوں میں۔

## (۸) ایمونیم کلورائیڈ AMONIUM CHLORIDE

افعال و منافع: مخرج بلغم اثر کرتی ہے، دوسری دواؤں کے ساتھ استعمال ہوتی ہے حاد و مزمن سعال میں بلغمی کھانسی میں مفید ہے۔

مقدار: ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار بچوں کو عمر کے مطابق۔

## (۹) برومو ہگزین ہائیڈرو کلورائیڈ BROMO HEXINE HCL

افعال و منافع: ہوائی نالیوں میں بلغم رکنا، سعال بلغمی دمہ، ورم غار الانف سینہ کے درد میں مفید ہے مقدار و ترکیب: ۸ سے ۱۶ ملی گرام دن میں ۳ بار ۵ سے ۱۰ سال کے بچوں کو ۴ ملی گرام دن میں ۳ بار ۵ سال سے کم عمر بچوں کو ۴ ملی گرام دن میں ۲ بار۔

منفی افعال: زخم معده، حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں اس کا استعمال نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: متلی، اسہال، بد ہضمی معده میں گرانی۔

دواؤں کا رد عمل: انٹی بائیوٹک ادویہ کو پھیپھڑوں کی نالیوں تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے۔

## (۱۰) کاربو سیسٹین CARBO CYSTEINE

افعال و منافع: سگریٹ نوشوں کی کھانسی، حاد و مزمن سعال، پھیپھڑوں میں دمہ بلغمی کے سبب بلغم رکنا، ٹی بی کی کھانسی، ورم حجرہ ورم شعبۃ الریہ ورم غار الانف نزلہ زکام بہنے انصباب نزلہ میں مفید ہے۔ مقدار و ترکیب: ۵۰ سے ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار سرپ ۵ سے ۱۰ ملی لٹر ۳ بار چھوٹے بچوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: ہضم کی خرابیاں، متلی جلد پرداغ، درد سر۔

احتیاط: زخم معده اور حمل میں احتیاط رکھیں



## (۱۱) ڈائی فینائل پائی رازین DIPHENYL PYRAZINE

افعال و منافع: زبردست دافع حساسیت دوا ہے زکام ناک بہنا، چھینکیں آنے میں پتی اچھلنے، ایگزیریا، کیڑے مکوڑوں کا کٹنا دواؤں غذاؤں سے الرجی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵ ملی گرام دن میں ۲-۳ بار بچوں کو عمر کے مطابق۔

مضر اثرات: خشکی، چکر آنا، منہ خشک رہتا ہے۔

احتیاط: ہائی بلڈ پریشر، قلبی عروق کی تکالیف، حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں، مشنری چلانے ڈرائیوری کرنے سے احتیاط رکھیں۔

دواؤں کا رد عمل: شراب مسکن و منوم ادویہ، منشیات دافع ڈپریشن دواؤں کے ساتھ اس کا استعمال مناسب نہیں۔

## (۱۲) گلیسرائل گواکولیٹ GLYCERYL GUAICOLATE

افعال و منافع: مخرج بلغم ہے۔ بلغمی کھانسی انفلو انزائے بعد نزلہ کھانسی میں مفید ہے

مقدار و ترکیب: بالغوں کو ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار بچوں کو ۲۵ سے ۵۰ ملی گرام

## (۱۳) گوائینے سین GUAIA PHENESIN

افعال و منافع: بلغمی مادے کو ڈھیلا کر کے اس کو خارج کرتی ہے مختلف اشیاء سے ہونے والی بلغمی

کھانسی بلغمی دمہ سعال مزمن ورم شعبۂ الریہ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۰۰ سے ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۲-۳ بار بچوں کو عمر کے مطابق۔

منفی افعال: غدہ درقیہ کا پھولنا، امراض قلب، ذیابیطیس دوا سے حساس مریضوں کو نہیں دینا چاہیے۔

مضر اثرات: ہضم کی خرابیاں، خشکی متلی، تے، ہو سکتی ہے۔

## (۱۴) فینائل پروپانولامین PHENYL PROPANOLAMINE

افعال و منافع: پھیپھڑوں اور آلات تنفس کی رگوں میں پھنسی ہوئی رطوبت کو ڈھیلا کرتی ہے ناک

بند ہونے میں خاص طور سے مفید ہے۔



مقدار و ترکیب: ۱۲ سال سے زائد عمر والوں کو ۲۵ ملی گرام دن میں ۳ بار ۱۲ سال سے کم عمر والوں کو نہ دیں۔

مضر اثرات: منہ خشک، ہلکی خشکی محسوس ہوتی ہے۔

احتیاط: شدید ہائی بلڈ پریشر میں شرائین قلبی کی خرابی میں، ذیابیطیس غدہ درقیہ کے امراض حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں احتیاط برتیں۔

دواؤں کا رد عمل: ہالوتھین کوئی نی ڈین انٹی ڈپریشن کے ساتھ خراب اثر ہوتا ہے۔

## (۱۵) پوٹاسیم گوائے کول سلفیٹ POTASSIUM GUAICOL SULPHATE

افعال و منافع: کھانسی نزلہ زکام سردی میں مفید ہے۔

مقدار: ۱۰۰ سے ۲۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار۔

مضر اثرات: خشکی متلی، پسینہ کی کثرت، قے، آنتوں میں سوزش۔

## (۱۶) سیوڈوایفیڈرین PSEUDOEPHIDRINE HCL

افعال و منافع: بالائی آلات تنفس کے عضلات میں تشنج کو سکون دیتی ہے۔

مقدار و ترکیب: بالغوں کو ۶۰ ملی گرام دن میں ۳ بار بچوں کو عمر کے مطابق۔

مضر اثرات: نظام عصبی میں خلل، بکواس کرنا، جلد پر داغ، ورم غدہ قدامیہ۔

احتیاط: شدید ہائی بلڈ پریشر، امراض قلب، اور ذیابیطیس میں احتیاط رکھیں۔

دواؤں کا رد عمل: فیورازولی ڈین، بھوک کم کرنے والی ادویہ اور انٹی ڈپریشن کے ساتھ استعمال کرائیں۔

## (۱۷) ٹرپین ہائیڈریٹ TREPENE HYDRATE

افعال و منافع: سردی نزلہ زکام کھانسی میں بطور معاون استعمال کی جاتی ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۵ ملی گرام دن میں ۳ بار۔



## (۱۸) ٹرائی پرولی ڈین ہائیڈروکلورائیڈ TRIPROLIDINE HCL

افعال و منافع: الرجی کی علامات، ناک بہنا، بالائی آلات تنفس کی تکلیف ورم غار الانف نزلاوی بخار، ناک بند ہونا سردی نزلہ زکام و ہائی میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۱۲ سال سے زائد عمر میں ۵ء ۲ ملی گرام دن میں ۳ بار ۶ سے ۱۲ سال تک نصف مقدار دیں۔

مضر اثرات: خمار سستی کاہلی، خشکی چکر، متلی درد فم معدہ، بصارت میں فرق پیشاب تکلیف سے اور کم آنا، منہ خشک، لو بلڈ پریشر ضعف عضلات، درد سر ہو سکتا ہے  
دواؤں کا رد عمل: شراب منوم اور مسکن نشلی دافع ڈپریشن ادویہ کے ساتھ استعمال نہ کرائیں۔

### مندرجہ بالا ۱۸ دواؤں کے تجارتی مرکبات

ایول ایکس پکٹورنٹ (HOCHST) Rs. 15.00

ایون سرپ (CARMINOL) 100ml: Rs. 9.00

بناڈرل کف فارمولا (PARKEDAVIS) 114ml: Rs. 27.57

BRICAREX EXPECTORANT (ASTRA-IDL) بری کاریکس سرپ

BRICAREX TABLETS (ASTRA-IDL) بری کاریکس ٹبلٹ

Terbutaline sulph 2.25mg, guaiaiphenesin 100mg tabs 10 Rs. 5.63

BRONKOSYRUP (BIDDLE SAWYER) 100ml: Rs. 15.19 برانکوسرپ

BRONOLAX (ALKEM) 100ml: Rs. 18.00 برونولیکس

BROXYNOL (ETHNOR) 100ml: Rs. 25.35 بروکسائی نول

BRO-ZEDEX 8 (WOCKHARDT) 100ml: Rs. 26.00 بروزی ڈیکس

CHESTON EXPECTORANT (PROTEC) 100ml: Rs. 18.60 چیسٹون

CHLORANTON PLUS TABS (REMEDIES) 10 Rs. 10.36 کلورنٹون

CHLORANTON-S (REMEDIES) 60ml: Rs. 8.43 کلورنٹون ایس

CHLORANTON TABS (REMEDIES) 10: Rs. 4.95 کلورنٹون ٹبلیٹ

CLISTIN EXPECTORANT (ETHNOR) 100ml: Rs. 24.74 کلستین سرپ

CODINOL SYRUP (CARMINOL LABS) 100ml: Rs. 25.20 کوڈی نال



<b>COREX</b>	(PFIZER)		کوریکس
Chlopheniramine maleate 4mg, Codenine phos 10mg, ephedrine hcl 5mg sod citate 150mg, menthol 0.1mg per 5ml syrup 50ml: Rs. 18.45, 100ml: Rs.24.06			
<b>CORICIDINE-F</b>	(FULFORD)	caps 10x10: Rs.142.60	کوری سی ڈین
<b>COSAVIL</b>	(HOECHST)	10 Rs.3.19	کوساویل ٹبلیٹ
<b>COSCOPIN BR</b>	(BIOLOGICAL)	120ml: Rs.15.94	کاس کوپین سرپ
<b>COSOME</b>	(MERCK)	100ml: Rs. 28.07	کوسوم سرپ
<b>DELETUS-A</b>	(NICHOLAS)	100ml: Rs.10.35	ڈی لی ٹس ٹبلیٹ
<b>DILOSYN EXPECTORANT</b>	(GLAXO ALENBURYS)		ڈلوسائن سرپ
120ml:Rs.19.90			
<b>EPHEDREX</b>	(ALEMBIC)	60ml: Rs.17.75	ایفنی ڈریکس سرپ
<b>EPHEDREX-N</b>	(ALEMBIC)	caps:50:Rs.45.00	ایفنی ڈریکس این کپسول
<b>ESKOLD</b>	(SMITHKLINE)	10: Rs. 14.50	اسکالڈ کپسول
<b>ESKOLD EXPECTORANT</b>	(SMITHKLINE)	60ml: Rs. 15.40	اسکالڈ سرپ
<b>LASTUSS-LA</b>	(FDC)	syrup 60ml: Rs.25.20	لاس ٹس سرپ
<b>MEGATUSS P</b>	(BIDDLE SAWYER)	100ml: bottle: Rs.26.85	میگا ٹس سرپ
<b>MITS LINCTUS CODEINAE CO.</b>	(ASTRA-IDL)		مٹس لکٹس
Codeine phosphate IP 15mg, Citric Acid IP 180mg, Syrup Tolu IP 2.0mg per 5ml Syrup. 75ml: Rs. 26.00 300ml: Rs. 80.52			
<b>MUCODYNE</b>	(ELDER)		میو کوڈین کپسول
Carbocisteine 375mg; caps 10: Rs. 30.00			
<b>MUCODYNE SYRUP</b>	(ELDER)		میو کوڈین سرپ
Carbocisteine 250mg per 5ml syrup 100ml: Rs.41.95			
<b>PEDIA-3</b>	(ETHNOR)	60ml Rs. 20.75	پیڈیا سرپ
<b>PHENSEDYL EXP.</b>	(RHONEPOULENC)	120ml Rs.23.43	فینسی ڈل سرپ
<b>PIRITON EXP.</b>	(GLAXO)	115ml; Rs. 13.78	پیریتان سرپ
<b>PROTUSSA PLUS</b>	(BOOTS)		پروٹوسا پلس سرپ
<b>RESPIRA SYRUP</b>	(GENO)	100ml: Rs. 20.90	رس پائریا سرپ
<b>RESPOSYRUP</b>	(BIDDLE SAWYER)		رس پوسرپ
Bromhexine hcl 4mg per 5ml syrup: 100ml bottle : Rs. 13.00			
<b>TIXYLIX</b>	(RHONEPOULENC)	20ml: Rs.14.83	ٹیکسی لکس سرپ



**TOSSEX IMPROVED (SARABHAI)**

ٹوٹیکس امیروڈ

Codeine Phos. 10mg, chlorpheniramine maleate 4mg, menthol 1.5mg, ephedrine hcl 7.5mg, sod. cit. 75mg per 5ml syrup: 100ml Rs. 19.67

**TREXYDIN (RANBAXY) 10: Rs. 50.00**

ٹریکی ڈسٹریکٹ

**VISCODYNE (TATA PHARMA) 100ml: Rs. 21.90**

دس کوڑن سرپ

<b>ZEDEX</b>	<b>(WOCKHARDT)</b>	100ml Rs. 24.50
--------------	--------------------	-----------------

زی ڈیکس سرپ

**ZEET EXPECTORANT (ALEMBIC) 100ml: Rs. 23.00**

### زیٹ سرپ

## محرك اعضائے تنفس

## RESPIRATORY STIMULANT

## DOXAPRAM

ڈوکسایرام

افعال و منافع: بیہوشی کے بعد تنفس کو تحریک پہنچانے نظام عصبی کے ڈپریشن کو دور کرنے پچھپھروں کے امراض مزمنہ اور سستی کو دور کرنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۵۰ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے۔

متنی افعال: مرگی و دیگر دورے پڑنا شدید ہائی بلڈ پریشر ہوائی نالیوں میں رکاوٹ غدہ درقیہ پھولنے  
شدید دمہ کے دورہ میں دینا نقصان دہ ہے۔

مضر اثرات: نظام عصبی میں خلل، بلڈ پریشر میں اضافہ، رفتار تنفس میں اضافہ۔

احتیاط: ہوائی تالیوں کی درستی پر ہی دوا دینا چاہیے جگر اور گردوں کی خرابی تیز رفتار سے بوتل چڑھانے سے احتیاط رکھیں۔

دواؤں کا رد عمل: مرخی عضلات، امینو فائی لین فروسی ہائیڈر تھیوپین ٹون سوڈیم اور دوسرے انکلائن کے ساتھ اس کا استعمال پیچیدگی پیدا کر سکتا ہے۔

## تجارتی مرکبات

**DOXAPRAM (KHANDELWAL)**

ڈاکسایرام

**DOXAPRAM** (KHANDEEWAL)  
Doxapram hcl 20mg, per ml inj 5ml vial: Rs. 32.87; 20ml, Rs. 66.43.



## ETHYL BUTAMIDE

ایتھائل بیٹامائیڈ

## PROPYL BUTAMIDE

پروپائل بیوٹامائیڈ

افعال و منافع: باربیٹون اور کاربن مونو آکسائیڈ کے زہریلے اثرات، نومولود میں آکسیجن کی شدید کمی، سانس رکنا، ڈوبنا، اپریشن کے بعد تنفس میں رکاوٹ، امفائی زیمیا، دم گھٹنا وغیرہ میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۵ء ۱۱۲ ملی گرام دونوں دوائیں ملا کر ویدی عضلاتی یا زیر جلد انجکشن کپسول ۵۰ ملی گرام بوقت ضرورت

## تجارتی مرکبات

RESTIMULEN

(S G PHARMA)

ریسٹی مولین انجکشن

Ethylbutamide 112.5mg, propylbutamide 112.5mg, per 1.5ml inj 5 amp: Rs 31.92

RESTIMULEN PEARLS

(S G PHARMA)

ریسٹی مولین ڈرائس

Ethylbutamide 7.5 propylbutamide 7.5g per 100ml : drops 15ml: Rs.14.77

## NIKETHAMIDE

نکے تھامائیڈ

افعال و منافع: قلب اور پھیپھڑوں کو تحریک پہونچاتا ہے قلب کے فیل ہونے وجع القلب پھیپھڑوں میں خون کی رسد نہ پہونچنا۔ ضعف قلب، صدمہ کی کیفیت میں مفید کام کرتا ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۲ سے ۴ ملی لٹر عضلاتی یا زیر جلد ضرورت پڑنے پر ۱-۲ گھنٹہ بعد لگا سکتے ہیں

## PRETHAEKAMIDE

پری تھی کامائیڈ

افعال و منافع: یہ نشہ کو دور کرنے نظام تنفس میں تحریک پیدا کرتی ہے، باربیٹون کاربن مونو آکسائیڈ کے زہر کو دور کرنے نومولود کے جسم میں آکسیجن کی کمی دم گھٹنا، ڈوبنا، تنفس میں سستی قلب کی کمزوری ضعف تکان میں مفید ہے

مقدار و ترکیب: ۲۲۵ سے ۴۵۰ ملی گرام دن میں کئی بار عضلاتی ویدی یا زیر جلد، کپسول ۱۰۰ ملی گرام دن میں ۳ بار شدید حالت میں ۵۰۰ ملی گرام نومولود کے لئے ۲ بوند دن میں ۳-۴ بار۔



## تجارتی مرکب

**RESTIMULEN**

(S. G. PHARMA)

ریسٹی مولن

Prethecamide 225mg per 1.5ml inj; 5 amps Rs..20.11

سرجری میں کام آنے والی ادویہ

## SURGICAL METERIALS

**CHLOR HEXIDINE GLUCONATE** کلور ہگزائیڈین گلوکونیٹ

افعال و منافع: ایک زبردست جراثیم کش اور انفکشن دور کرنے کے لیے سے محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اپریشن کے اوزار ہاتھ اور مقامی صفائی کے لیے مستعمل ہے۔

مقدار و ترکیب: الٹراپانی میں ۱۰ ملی لیٹر یا فیصدی کالوشن بنا کر استعمال کریں۔

مضر اثرات: جلد پر خراش الرجی ہو سکتی ہے۔

احتیاط: پانی میں حل کر کے استعمال کریں، آنکھ ناک کان کے اندرونی حصہ میں انجکشن انیہا کسی زخم میں نہیں استعمال کرنا چاہیے۔

## تجارتی مرکب

**MICROSHIELD**

مائکرو شیلڈ

**DICHLOROXY LENOL SOLUTION** ڈائی کلوروکسائلین نول سلوشن

افعال و منافع: ایک زبردست انٹی سپٹک دوا ہے، کاربائلک ایسڈ سے ۴ گنا زیادہ طاقتور ہے ہر قسم کے جراثیم فنکس اور پروٹوزوا کو ختم کر دیتی ہے اسپتالوں مکانات مویشی فارم وغیرہ میں بطور دافع انفکشن و جراثیم کش استعمال کی جاتی ہے۔

مقدار و ترکیب: اس کو پانی میں ملا کر استعمال کرنا چاہیے آلات کو ۱۰ منٹ ۵ فیصد سلوشن میں ڈبو کر رنخنا چاہیے زچگی کے لیے ۲.۵ فیصد حلق کے انفکشن کے لیے ۱/۴ فیصد اور عام استعمال کے لیے ۱ فیصد استعمال کرنا چاہیے۔



## تجارتی مرکب

**FAIRGENOLPLAIN** (FDC) Rs. 21.67  
**ITEOL-3** (ASTRA-IDL) 5 lit. Rs. 234.99

فیرجی نال  
ایٹی اول

## POVIDINE IODINE

پاوی ڈین آیوڈین

افعال و منافع: اپریشن سے قبل متعلقہ مقام وزخم کی طہارت و جراثیم سے پاک کرنے کے لئے مفید ہے۔  
 احتیاط: صرف بیرونی استعمال کریں آنکھوں میں نہیں لگنا چاہیے۔

**ALPHADINE SCRUB** (NICHOLAS-PIRAMAL) Rs.38.50 الفاڈین  
**BETADINE-AD** (WIN MEDICARE) 60ml:Rs.38.50 بتاڈین اے ڈی  
**BETADINE SCRUB** (WIN MEDICARE) 500ml:Rs.191.10 بتاڈین اسکرپ  
**BETADINE SOLN** (WIN MEDICARE) 1000ml:Rs.142.78 بتاڈین سلوشن  
**MICRODINE SOLN** (MICRO LABS) 1litre:Rs.175.00 مائکروڈین سلوشن  
**MICROSHIELD PVP-S/PVP-P** (JOHNSON AN JOHNSON) 500ml Rs.272.00 مائکروشیلڈ

**POVIDAX SOLN** (UNIQUE) Povidone iodine 10% w/v, پاوی ڈیکس  
**POVIDINE SOLUTION** (STADMED) پاوی ڈین سلوشن  
 Povidone iodine 5% w/v, 100ml Rs.30.25, 500ml Rs.105.00  
**WOKADINE SCRUB** (WOCKHARDT) ووکاڈین  
 Povidone iodine 7.5% w/v, 500ml Rs. 197.00

ڈریسنگ میں کام آنے والی اشیاء

## DRESSING & APLIANCES

### ADHESIVE TAPE

چپکانے والا ٹیپ

زخم کی ڈریسنگ کو روکنے سہارا دینے کے کام آتا ہے

تجارتی نام

**ADHESIA** (STNCARE) 10cm x 5m Rs.78.20

ایڈیسا



<b>DYNAPLAST</b>	(JOHNSON AND JOHNSON)	ذاتی تاپلاست
10cm x 1m Rs. 68.90		
<b>DERMILITE II</b>	(JOHNSON AND JOHNSON)	ذری لائٹ
2"x10yds Rs. 516.00		
<b>JOHNSON PLAST</b>	(JOHNSON AND JOHNSON)	جان سن پلاست
10cm x 10m. Rs. 330.10		

## CREPE BANDAGE

کریپ بینڈیج

موج، چوٹ، کسر خلع کو سہارا دینے والی اور عصاب و عضلات کو اپنی جگہ قائم رکھتا ہے۔

<b>DYNACREPE</b>	(JOHNSON AND JOHNSON)	ڈیانا کریپ
15cm x 4m Rs. 89.70		

## BENZAL KONIUM CHLORIDE بنزائل کونیم کلورائیڈ ڈرینگ

جو افراد ٹیپ بینڈیج کو برداشت نہ کر سکیں ان کے لئے ابتدائی ڈرینگ کے کام آتی ہے

<b>SURGIDRES</b>	(RANBAXY) 5m Rs. 128.00	سرجی ڈریس
------------------	-------------------------	-----------

## CORN CAP

کارن کیپ

کارن، گنہ، ایڈی یا پیر کے تلے میں سخت گانٹھ پر لگانے سے آرام آجاتا ہے

<b>RIDCORN</b>	Salicylic acid 50% corn caps. 4 Rs. 10.00	ریڈ کارن
----------------	---	----------

## INTERA VENOUS DRIP SET بوتل چڑھانے والا سیٹ

<b>ADIV-1</b>	(ALBERT DAVID)	اے ڈو ۱-۲-۳
Infusion et with vent tube for use with glass bottle with 21 g needle. 1 set Rs. 11.50		

## POLYVINYL POLYMER SPRAY پالی وینائل پالی مر اسپرے

زخموں پر چھڑکنے والی واٹر پروف دوا ہے۔ ڈرینگ کی جگہ استعمال ہوتی ہے

زخم چوٹ، ٹانگوں پر اسپرے کرنے سے زخم جلد مند مل ہو جاتا ہے

انفکشن کی حالت میں استعمال نہ کریں

<b>HEALEX SPRAY</b>	(RALLIS) 100%. Time of 90g, Rs. 83.34	ہیالیکس
---------------------	---------------------------------------	---------





دانتوں میں کام آنے والی ادویہ

## DENTAL PREPARATION

یہ تمام ادویہ دانتوں کی تکالیف مثلاً دانتوں کے درد مسوڑھوں کا ورم خون آنے پانی لگنے دانتوں میں میل جمع ہونے اور دانتوں کی بیماریوں میں مفید ہیں۔

<b>DARDANT</b>	(DABUR)	درد دانت
<b>DENTICIDE MOUTH WASH</b>	(TEEM)	ڈینٹی سائڈ ماؤتھ واش
<b>DENTICURE PAINT</b>	(UNIVERSAL DRUG)	ڈینٹی کیور پیینٹ
<b>DENTAL</b>	(BENGAL CHEMICALS)	ڈین ٹل
<b>DESENT</b>	(INDOCO)	ڈی سینٹ
Strontium chloride 10% w/w cream: 50g: Rs. 12.45		
<b>DETTOLIN</b>	(RECKITT COLMAN) 500ml; Rs. 28.22	ڈی ٹولین
<b>GELORA</b>	(RECKITT & COLMAN) 10g; Rs. 19.75	گیلورا
<b>TOSS TOOTHPASTE</b>	(SWIFT)	ٹاس ٹوٹھ پیسٹ
Strontium chloride 10% w/w cream: 50g: Rs. 17.46		
<b>STERADENT POWDER</b>	(RECKITT & COLMAN)	اسٹراڈینٹ
Sodium perborate 10g bottle: Rs. 15.00		
<b>TEEJAL TEETHING GEL</b>	(RAPTAKOS) 0.1% v/w tube of 10g	ٹی جال
<b>ZINGISOL</b>	(ICPA) 20ml; Rs. 18.00	زین جی سول
<b>ZYTEE TEETHING GEL</b>	(ICPA) 10ml; Rs. 20.50	زائی ٹی جیل





## ناک کے امراض کی دوائیں

### NASAL PREPARATION

ناک کے امراض میں درج ذیل ادویہ یا ان کے مرکبات استعمال کئے جاتے ہیں یہ دافع حساسیت عروق کو کشادہ کر کے مقامی تناؤ بے چینی کو دور کرتی ہیں۔

نزہ زکام ناک بہنے ناک کی غشاء مخاطی کا غیر جراثیمی ورم چھینکیں آنا الرجی درد وغیرہ میں مفید ہیں۔

مقدار و ترکیب: ۲ سے ۳ بوند دونوں سوراخوں میں یا پیکنگ پر درج یدایات کے مطابق۔

مضر اثرات: خراش، متلی، تھکاوٹ، درد سر حلق منہ میں خشکی بے چینی چکر کی شکایت ہو سکتی ہے۔

احتیاط: طویل عرصہ نہ استعمال کریں۔ حمل۔ ۶ سال سے کم عمر بچوں کو ہائی بلڈ پریشر، غدہ درقہ کے پھولنے اور گلوکوما میں استعمال سے احتیاط برتیں۔

### تجارتی مرکبات

**BECLATE NASAL SPRAY (CIPLA)** بیک لیٹ نازل اسپرے

Beclate nasal spray 200 metered doses. Each metered dose supplies.  
Beclomethasone 50mg, 200 metered dose: Rs. 99.32.

**BECLATE AQUANASE (CIPLA)** بیک لیٹ ایکوانیس

Atomising pump 150 metered dose: Rs. 84.80

**BETNESOL-N-SASAL DROPS (GLAXO)** بیٹنی سال نازل ڈراپس

10ml. Rs. 7.46

**DECON NASAL DROPS (CADILA)** 10ml Rs. 12.10 ڈی کان نازل ڈراپس

**DRISTAN SASAL DROPS (GEOFFREY)** ڈریشان نازل ڈراپس

**EFCORLIN NASAL DROPS (GLAXO)** 15ml Rs. 6.38 ایف کارلن

**ENDRINE NASAL DROPS (WYETH)** 10ml Rs. 6.74 انڈرین نازل ڈراپس

**FENOX NASAL DROPS (BOOTS)** 15ml Rs. 15.10 فینوکس نازل ڈراپس

**FINTAL NASAL SPRAY (RALLIS)** 17.5ml Rs. 74.11 فینٹال نازل ڈراپس

**IFIRAL NASAL DROPS (UNIQUE)** ایفیرال نازل ڈراپس

**KARVOL (DUPHAR)** Caps 12 Rs. 9.82; 50 Rs. 35.35 کاروال



KARVOL PLUS INHALENT (DUPHAR) Caps 10	Rs. 13.50	کاروال سوکھانے والا
KEMICETINE ANTIOZENA (MAC) 10ml	Rs. 22.00	کیمی شین اینٹوزینا
MUCORIS-E (FDC) drops: 10ml	Rs. 8	میو کورس
NASIVION (MERCK) 10ml	Rs. 12.43	ناسیوان
NAZALIN (BELL) 10ML	Rs. 13.50	نازالین

## حلق کے امراض کی دوائیں

### OROPHARYNGEAL PREPARATION

حلق اور اس کے متعلقات کے انفکشن (تعدیہ) حلق کی خراش و ورم کھانسی ورم لثہ قلاع منہ کے زخم چھالے، کنڈیڈ اور جراثیمی انفکشن ورم لوزین میں مفید و موثر ہے۔

مقدار و ترکیب: لوزنجز منہ میں رکھ کر چوسیں، تھروٹ پینٹ حلق میں لگائیں، غرغره والی دوا میں گرم پانی میں ڈال کر غرغره کرائیں

مضر اثرات: زبان اور دانتوں کی رنگت میں تبدیلی منہ میں گرمی اور ذائقہ کی خرابی ہو سکتی ہے  
احتیاط: آنکھوں سے محفوظ رکھیں، کولین سیلی سیلیٹ کے ساتھ اس پرین کا استعمال نہ کریں۔

### تجارتی مرکبات

ALPHADINE MOUTHWASH (NICHOLAS)	Rs. 11.39	الفادین ماؤتھ واش
BENYLET LOZENGES (PARKE DAVIS) 20 tubes	Rs. 1.60	بینالیٹ لوزنجز
BENYLIN LOZENGES (PARKE DAVIS)		بینالین لوزنجز
BETADINE MOUTHWASH (WINMEDICARE)		بٹاڈین ماؤتھ واش
100ml:	Rs. 24.30	

CANDID MOUTH PAINT (GLENMARK) 15ml	Rs. 17.03	کنڈیڈ ماؤتھ واش
DESENT (INDOCO) 50ml	Rs. 12.50	ڈیسنٹ
DETTOLIN (RECKITT & COLMAN) 50ml	Rs. 6.30	ڈیٹولین
DEQUADIN LOZENGES (GLAXO ALENBURYS)		ڈیکوڈین لوزنجز
DEQUADIN PAINT (GLAXO ALENBURYS)		ڈیکوڈین پینٹ
FORCAN (CIPLA) 200mg: 4	Rs. 164	فورکان
GELORA (RECKITT & COLMAN) gel 10g	Rs. 19.15	گیلورا



**NIFUGAL B OINT (BIDDLE SAWYER)**

نیفوگل بی آئٹ منٹ

Clotrimazole 1% w/v solution: 15ml bottle: Rs. 16.30

**POVIDONE MOUTHWASH (STADMED)** 60ml Rs. 13.50

**STERADENT (RECKITT & COLMAN)** 100g Rs. 17

**SYSCAN (TORRENT)** Rs. 154.50

**SYSTFORM DENTAL DREAM (SYSTOPIC)** 50g Rs. 13.97

**TANTUM ORAL RINSE (SYSTOPIC)** 50g Rs. 13.97

**TOSS GEL (SWIFT)** 50g: Rs. 21.00

**TOSS K TOOTH PASTE (SWIFT)** 50g: Rs. 22.00

**WOKADINE GARGLE (WOCKHARDT)** 50ml Rs. 13.59

## امراض کان کی دوائیں

## OTIC PRAPARATION

درج ذیل دوائیں بیرونی اور اندرونی کان کا اور م کان بہنا کان کے اندر انفکشن موسمی بیماریاں کان کے اپریشن فنکشن کان میں میل جمناس کان کے درد میں مفید ہیں  
احتیاط: حمل میں اور بچوں کو زیادہ دن استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

### تجارتی مرکبات

**ALFLOX EYE/EAR DROPS (ALKEM)**

الفلکس آئی / ایر ڈراپس

Norfloxacin 3%, benzalkonium drops 5ml Rs. 9.95

**BACTIGEN E/E DROPS (FDC)**

بیکٹی جن ڈراپس

Gentamycin (as sulphate) 0.3% w/v drops. 5ml Rs. 5.67

**BENICORT-N E/E DROPS (P&B LABS)** 5ml vial Rs. 8.51

**BETNESOLE EYE/EAR (GLAXO)** 5ml: Rs. 7.03

**BETNOR EAR (INDOCD)** 5ml Rs. 7.55

**CANDIBIOTIC (GLENMARK)** 5ml Rs. 15.51

**CANDID EAR DROPS (GLENMARK)**

Clotrimazole 1% w/v, lignocaine hcl 2% w/v drops 15ml Rs. 10.90



<b>CHLOROMYCETIN EAR DROPS</b> (PRKE DAVIS)	کلورومائی شین ایر ڈراپس
5ml; Rs.6.69.	
<b>CORGEN EYE/EAR DROPS</b> (SWIFT)	کورگن ڈراپس
3ml Rs. 9.15	
<b>DECDAN-N EYE/EAR DROPS</b> (MERIND)	ڈیکاڈان ڈراپس
3ml Rs.8.40	
<b>DEXONA EYE/EAR</b> (CADILA)	ڈیکسونا ڈراپس
2.5ml: Rs.7.46	
<b>ENTEROMYCETIN OTIC SOLN</b> (DEYS)	انٹرومای شین سلوشن
5ml Rs.8.00	
<b>FLOXIGARD</b> (GUARDIAN (CROSLANDS))	فلوگسی گارڈ
Rs. 12.50	
<b>GARAMYCIN EYE/EAR DROPS</b> (FULFORD)	جیرامائی سین
Gentamycin (as sulphate) 3mg per ml drops 3ml; Rs. 7.08	
<b>G-MYCIN E/E DROPS</b> (BPL)	جی مائی سین
Rs. 7.00	
<b>GENTICYN EYE/EAR</b> (NICHOLAS)	جینٹیسین ڈراپس
5ml Rs. 7.44	
<b>GERFREE E/E DROPS</b> (TATA PHARMA)	جیرفری ڈراپس
5ml Rs.5.17	
<b>GEROCIN BM E/E DROPS</b> (P&B LABS)	جیروسین ڈراپس
Rs. 9.41	
<b>KEMICETINE OTIC SOLN</b> (MAC)	کیمی شین اوٹک سلوشن
6ml Rs.12.50	
<b>LYRAMYCIN EYE/EAR</b> (LYKA)	لائرامائی سین
Rs. 4.90	
<b>MERIGENTA EYE/EAR</b> (MERCURY)	میریجینٹا ڈراپس
3ml Rs. 6.16	
<b>METHAZIL</b> (BELL)	میٹھازل
10ml Rs. 8.00	
<b>NEOSPORIN-H EAR DROPS</b> (BURROUGHS WELLCOME)	نیو سپورین ڈراپس
<b>OTINA EAR DROPS</b> (GLAXO)	اوٹینا ایر ڈراپس
Betamithasone valerate 0.1% w/v, chloramphenicol 5% w/v, lignocaine hcl 2% w/v drops 5ml: Price: N/A	
<b>OTOFLOUR TABS</b> (BELL)	اوٹوفلور ٹبلیٹ
Sodium flouride 20mg tabs tabs 10 Rs. 12.00	
<b>OTOGESIC</b> (ETHNOR)	اوٹو جے سک
Rs.20.77	
<b>PARAXIN EAR DROPS</b> (BOEHRINGER)	پراکسن ڈراپس
5ml Rs. 8.80	
<b>OCUPOL-D EYE/EAR DROPS</b> (ALBERT DAVI)	اوکیوپول ڈراپس
Rs.13.90	
<b>OTEK</b> (FDC)	اوٹک ڈراپس
Rs. 9.34	



# آنکھوں کے امراض میں کام آنے والے مرکبات

## EYE PREPARATION ANTI BACTERIAL

درج ذیل دوائیں آنکھوں کے انفکشن جراثیمی تعدیہ، گہا بخنی، پوٹوں کا اور مرمہ چشم، آنکھوں میں دانے روہے لکرے پانی بہنا سرخی درد و زخم متعدی پھنسیوں میں مفید ہیں۔  
مقدار و ترکیب: دن ۳ بار دونوں آنکھوں میں ڈراپس ڈالیں مرمہ سوتے وقت لگائیں  
احتیاط: اگر ری ایکشن کا اثر ہو تو دوا فوراً بند کر دیں۔

### تجارتی مرکبات

<b>ALBUCID</b> (NICHOLAS)	البوسڈ ڈراپس
Sulphacetamide sodium 10%, 20% 10ml Rs. 10.93	
<b>ALFOX EYE/EAR DROPS</b> (ALKEM) Rs. 9.95	الفاکس ڈراپس
<b>CEBRAN EYE DROPS</b> (BLUE CROSS)	سب ران آئی ڈراپس
Ciprofloxacin 0.3% per 5ml drops: 5ml: Rs.9.80	
<b>C-FLOX EYE DROPS</b> (PREM PHARMA)	سی فلاکس ڈراپس
Ciprofloxacin hcl 0.3% w/v solution: 5ml vial: Rs. 9.25	
<b>CORTOLA-m</b> (EAST INDIA) Rs. 6.88	کارٹولا ایم ڈراپس
<b>DEXOSYN-C</b> (BELL) Rs.8.05	ڈیکوسن سی
<b>ENOX EYE/EAR DROPS</b> (DEYS)	ای نوکس ڈراپس
Norfloxacin 0.3% w/v drops. 5ml vial: Rs.9.50	
<b>ENSAMYCIN</b> (FULFORD)	ان سامائی سین
Sisomycin SO4 4mg per ml drops 3ml Rs. 19.50	
<b>ENTEROMYCETINE EYE DROPS</b> (DEYS)	انٹرومائی سی ٹین ڈراپس
Chloramphenicol 0.5% , phenyl mercuric nitrate 0.002% 5ml Rs.65.50	
<b>FLOXIGARD</b> (GUARDIAN) Rs. 12.50	فلاکسی گارڈ
<b>GARAMYCIN EYE OINTMENT</b> (FULFORD)	جیرامائی سین آئی آنٹ منٹ
Gentamycin (as sulph) 3mg/g oint 3g Rs.1.78	
<b>GENTOMIN-D EYE/EAR DROPS</b> (MEJDA)	جینٹومین ڈی ڈراپس
3ml vial Rs.7.42	



**HERPEX OPHTHALMIC (TORRENT)**

ہرپس افٹھالمک

Acyclovir 3% ointment Tube Rs. 39.00

**LOCULA (EAST INDIA)**

لاکولا

10%: 10ml Rs. 7.17; 20%: 10ml Rs. 10.22; 30%: 10ml Rs. 11.29

**METAMYCIN EYE DROPS (BDH)**

مٹامائی سین

Chloramphenicol 0.5% drops: 5ml : Rs. 6.50

**MICOPTIC (FDC)**

مائیکوپٹک

Miconazole 1% w/v; opticops 30, Rs. 26.30

**NEOSPORIN EYE DROPS (BURROUGHS WELLCOME)**

نیوسپورین ڈراپس

Polymixin B. sulph 5000 units, Neomycin sulphate 1700u, Gramicidin

25 units per ml solution 10ml Rs. 11.91

**NORBACTIN EYE DROPS (RANBAXY)**

نارباکٹین ڈراپس

Norfloxacin 3mk per ml drops 5ml; Rs. 9.95

**PIMAFUCINE EYE DROPS (ELDER)**

پی مافو سین ڈراپس

Natamycin 5% (50mg/ml) drops 3ml Rs. 28.50

**PRIMICIN EYE DROPS (HINDUSTAN ANTIBIOTICS)**

پرائمی سین ڈراپس

Gentamycin (as sulph) 3mg per ml drops 3ml vial Rs. 5.61

**PROFLOX EYE DROPS (FROTEC)**

پروفلاکس ڈراپس

Perfloxacin (as mesylate dihydrate) 0.3% w/v drops 5ml Rs. 9.95

**PYRICORT (FDC)**

پائری کورٹ ڈراپس

Gentamycin (as sulph) 0.3% w/v, dexamethazone 1% w/v eye drops 5ml: Rs. 9.26

**Q-BID EYE/EAR DRIPS (KAMRON)**

کیو بیڈ ڈراپس

Ciprofloxacin 0.3% w/v drips: 5ml vial with dropper : Rs. 11.95

**QUINTOR EYE DROPS (TORRENT)**

کینون ٹور ڈراپس

Quinobact Eye Drops (NICHOLAS) Rs. 12.00

کیونوبیکٹ ڈراپس

SETRIDE EYE DROPS (TATA PHARMA) 10ml: Rs. 7.61

سٹرائڈ ڈراپس

SILVEREX-I (GUARDIAN) Rs. 17.00

سلوریکس ڈراپس

**SOFRAMYCIN OPHTHALMIC OIT (ROUSSEL)**

سوفرامائی سین

**& EYE DROPS**

Soframycin (framycetin slo) 0.5% ointment 5g; Rs. 6.01 ml Rs. 6.43

**SSZ APLICAPS (GUFIC) Rs. 17.25**

ایس ایس زیڈ اپلی کیپ



<b>TOBACIN</b>	(ARISTO)		ٹوباسین
Tobramycin 0.3% drops 3ml; Rs. 2084			
<b>TOBAZON</b>	(BELL)	Rs. 16.40	ٹوبازون
<b>WAXOLVE</b>	(BELL)	10ml Rs. 15.00	وآکسالو

اس کے علاوہ کان کے امراض میں درج شدہ ڈراپس جن پر آئی / ایر لکھا ہو آنکھوں میں مفید ہیں۔

**دافع گلوکوما اور پتلی کو سکیڑنے والی ادویہ**

## **ANTI GLAUCOMA & MIOTIC**

<b>ACETAZOLAMIDE</b>	ایسی ٹازولامیڈ
<b>PILO CARPINE NITRATE</b>	پائلوکارپین نائٹریٹ
<b>BITOXO LOL</b>	بٹاکسولول
<b>TIMOLOL MELEATE</b>	ٹمولول میلی ایٹ

افعال و منافع: حاد و مزمن گلوکوما، آنکھ میں تناؤ اور ثانوی گلوکوما میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: دن میں ۲-۳ بار آنکھ میں ڈالیں۔

منفی اثرات: آنکھ کے شدید ورم، انفکشن، سانس کی تکلیف، ناک بند ہونے میں اس کا استعمال مناسب نہیں

احتیاط: حساسیتی رد چشم، دوا سے حساس مریضوں میں طویل عرصہ اور چھوٹے بچوں میں احتیاط برتیں

### **تجارتی مرکبات**

<b>BI-MIOTIC</b>	(BELL)	Rs. 18.80	بائی مائی اوٹک
<b>CARPO-MIOTIC</b>	(BELL)		کارپو مائیوٹک
Pilocarpine nitrate 0.5%, 1%, 2%, 4% 2% 5ml Rs. 15.90; 4% 10ml Rs. 23.85			



<b>DIAMOX</b>	(LEDERLE)	زلیاموکس
Acetazolamide 250mg tabs 10tabs	Rs.5.11	
<b>GLAUCARE</b> (MEJDA)	Timolol maleate 5ml: Rs.25.10	گلوکیر
<b>GLUCOMOL</b> (TORRENT)	Tomolol Maleate 5ml Rs.22	گلوکومول
<b>IOBET</b> (FDC)	Betaxolol (as hcl) 0.5 5ml Rs.29.45	ایوبٹ
<b>IOTIM</b> (FDC)	Timolol Maleate 5ml Rs.25.95	ایوٹیم
<b>OCUPRES</b> (CADILA)	5ml Rs. 22.29	اوکیوپریس
<b>OPTEZE</b> (GUARDIAN)	5ml vial: Rs. 29.00	آپٹیز
<b>PILOCAR</b> (FDC)		پائلوکار
Pilocarpine nitrate 1%; 2%; 4% drops 1% 5ml	Rs. 12.10, 2% 5ml	
Rs.18.75, 4% 5ml	Rs.30.95	
<b>TIMOLO EYE DROPS</b> (BELL)	Timolol Maleate Rs. 22.54	ٹیملو آئی ڈراپس
<b>TIMOPTAL EYE DROPS</b> (P&B LABS)		ٹی موپ ٹال آئی ڈراپس
Timolol maleate USP	Rs. 28.99	

تیلی کو پھیلانے اور حرکت روکنے والی دوائیں

## MYDRATICS & CYCLOPLEGICS

اس میں درج ذیل ادویہ شامل ہیں

**ATROPIN SULPHATE**

اتروپین سلفیٹ

**CYCLOPENTOLATE**

سائیکلوپین ٹولیٹ

**HOMATROPINE**

ہوماٹروپین

**TROPICAMIDE**

ٹروپی کامائیڈ

**PHENYL EPHRINE**

فینائل الفرین

افعال و منافع: تشخیص کی غرض سے اور موتیابند کے آپریشن کے وقت آنکھ کے گولے کو روکنے اور آپریشن کرنے سے پہلے کو وقتی طور پر سن کرنے کے لئے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔



مقدار و ترکیب: بوقت ضرورت اسے ۲ بوند ڈالیں

احتیاط: زیادہ بوڑھے افراد میں، دور کی نگاہ کی کمزوریوں میں، گلوکوما، سافٹ لینس کی حالت میں اس کا استعمال مضر ہے۔

## تجارتی مرکبات

<b>ATROPINE EYE OINT</b>	(DEYS)	ایٹروپین آئی اےنٹ منٹ
Atropine sulphate 1% w/w 3.5g tube Rs. 1.72		
<b>BELL HOMATROPINE</b>	(BELL) 10ml Rs.5.62	بیل ہوماتروپین
<b>BELL PINO-ATRIN</b>	(BELL)	بیل پینو آٹرین
<b>CYCLOGIC EYE DROPS 1% (MEJDA)</b>	Rs. 18.45	سائیکلو جیک آئی ڈراپس
<b>DROSYN EYE DROPS</b>	(FDC) Rs. 21.90	ڈروسائن آئی ڈراپس
<b>OCCUREST EYE DROPS (GENTAUR)</b>	Rs. 10.50	اکیورسٹ آئی ڈراپس
<b>PUPILETTO FORTE</b>	(BELL) Rs. 5.10	پیوپی لیٹو فورٹ
<b>TROPICO EYE DROPS</b>	(BELL) Rs. 29.10	ٹروپیکو
<b>TROPISYN EYE DROPS 1% (MEJDA)</b>	Rs. 33.16	ٹروپسین سائن

## FLUBI PROFEN

فلوبی پروفین

افعال و منافع: آنکھ کے ورم تناؤ اور درد کو دور کرتی ہے۔ آپریشن کے وقت اور بعد کی تکالیف میں مفید ہے

مضر اثرات: اندمال زخم میں تاخیر جلن، آنکھ میں جریان خون کا خطرہ  
احتیاط: انفکشن کی حالت میں بچوں کو، ورم قرینہ میں احتیاط رکھیں۔

## تجارتی مرکبات

<b>OCUFLURE EYE</b>	(FDC) Rs. 15.30	اوکیو فلور آئی
<b>HYDROXY PROPYL METHYL CELLULOSE</b>		ہائیڈروکسائی پرپائل میتھائل سیلولوز

افعال و منافع: آنکھوں میں خشکی، وٹامن اے کی کمی مزمن رمد چشم، مصنوعی لینس کو روکنے میں



مفید ہے انجکشن، موٹیابند گلوکوما کے اپریشن مصنوعی لینس، طبقہ قرنیہ لگانے میں مستعمل ہے۔

## تجارتی مرکبات

HYPROSOL	(BELL)	10ml Rs. 11.10	ہائپر سول ڈراپس
MOISOL EYE DROPS	(FDC)	5ml: Rs. 9.50	مائی سول آئی ڈراپس
OCULOSE	(MEJDA)	2ml vial: Rs. 56.65	آکیولوز انجکشن
VIZOL	(BELL)	5ml vial Ra. 18.40	وائی زول انجکشن

## IODOXYURIDINE

## ایوڈوکسائی یورائیڈین

افعال و منافع: آنکھ میں ہرپیز (Herpez) کے سبب ہونے والے ورم قرینہ میں مفید ہے  
 مقدار و ترکیب: ۱ بوند ہر گھنٹہ بعد دن میں ہر ۲ گھنٹہ بعد رات میں زیادہ سے زیادہ ۲۱ دن۔  
 احتیاط: مقدار خوراک سے تجلوز نہ کریں، کارٹی سون اور یورک کے ہمراہ نہ دیں

## تجارتی مرکبات

RIDINOX DROPS	(BELL)	10ml; Rs. 10.00	رڈی نوکس ڈراپس
RIDINOX OINT	(BELL)	3g tubes Rs. 5.32	رڈی نوکس اینٹ منٹ

## NAPHAZOLINE NITRATE

## نافازولین نائٹریٹ

افعال و منافع: رمد چشم، سرخی و درد ورم اور مصنوعی لینس نکالنے کے بعد اس کا استعمال مفید ہے  
 مقدار: ۲-۳ بوند دن میں ۳-۴ بار، گلوکوما میں استعمال نہ کریں

## تجارتی مرکب

PROTO-BORIC	(BELL)	10ml Rs. 8.50	پروٹو بورک
-------------	--------	---------------	------------

## PHENYL EPHRINE

## فینائل الفیرین

افعال و منافع: آنکھ کے گولے کو بن اور مفلوج کرنے مصنوعی لینس لگانے میں مستعمل ہے  
 مگدوما۔ بانی بند پریش قلبی امراض میں احتیاط برتیں



## تجارتی مرکبات

**DROSYN EYE DROPS (FDC) 10% 5ml Rs. 21.90** ڈروسائن آئی ڈراپس  
**OCCUREST EYE DROPS (CENTAUR)** ایکوریسٹ آئی ڈراپس  
 10ml vial: Rs.10.50

## SODIUM CHROMOGLYCATE سوڈیم کروموگلائیٹ

افعال و منافع: رمد حساسی، ورم طبقہ قرینہ آنکھ میں درد ورم جلن بے چینی کھلبلی میں مفید ہے  
 احتیاط: شیشی کھولنے کے ۴ ہفتہ بعد استعمال نہ کریں۔

## تجارتی مرکب

**FINTAL EYE DROPS (RALLIS) Rs. 63.52** فن ٹال آئی ڈراپس

## SODIUM HYALURONATE سوڈیم ہائی لورونیٹ

افعال و منافع: موتیا بند، طبقہ قرینہ کا بدلنا، گلوکوما، چوٹ لگنے، آنکھ کے آپریشن میں مستعمل ہے

## تجارتی مرکب

**HEALON (PHARMACIA)** ہیلون  
 Sodium hyaluronate 10mg per vial injection vial Rs. 1550.00 0.4 ml  
 loaded syringe with gauge cannula.

## SODIUM IODINE سوڈیم آیوڈائیڈ مونو بیسک کیلشیم فاسفیٹ

## MONO BASIC CALCIUM PHOSPHATE

افعال و منافع: آنکھ کی پتلی (لینس) کے آگے جھلی پیدا ہونا پتلی بند ہو جانے میں مفید ہے  
 مقدار و ترکیب: اسے ۳ بوند دن میں ۳-۴ بار ۳ سے ۶ ماہ تک بلاناغہ استعمال کریں

## تجارتی مرکب

**CARACSOL EYE DROPS (DEYS)** کریک سول آئی ڈراپس  
 10ml vial: Rs.15.00



# امراض جلد کی بیرونی ادویہ

## SKIN PREPARATION

### ACNE

دافع مہاسے

درج ذیل دوائیں اس میں مفید ہیں

ALUMNIUM CHLORHYDROXIDE

الومینیم کلور و ہائیڈروکسائیڈ

CLINDAMYCIN, ERYTHROMYCIN

کلائنڈامائی سین، ارائی تھرومائی سین

HYDROUS BENZOYL PEROXIDE

ہائیڈروس بنزائل پر آکسائیڈ

METRONIDAZOLE

میٹری نائی ڈازول

SULPHUR

سلفر

TRETINOIN

ٹرائی ٹی نوائسن

TRANS-RETINOIC ACID

ٹرانس ری ٹی نوائک ایسڈ

افعال و منافع: چہرے کے مہاسے، جلد پر مہاسے نکلنا جلد کا ورم اور پھنسی میں مفید ہیں۔  
مقدار ترکیب: سوتے وقت مہاسوں پر لگائیں صبح کو بغیر کاسٹک والے صابن سے دھو ڈالیں۔  
احتیاط: دوا کو آنکھ سے بچائیں، زخم، ہرپیز اور دوسرے انفکشن میں استعمال نہ کریں۔

### تجارتی مرکبات

ACNESOL

(SYSTOPIC)

ایٹنی سول

Erythromycin in hydroalcoholic base 2% soln. 30ml Rs. 35.60

ACNEX

(UNISEARCH) 20ml bottle Rs. 49.96

ایک نیکس



<b>CLINDAC-A</b>	(CROSLANDS)	تلمین ڈیک اے
Clindamycin (as phos.) 1% w/w topical gel 10g: Rs. 35.00		
<b>EUDYNA</b>	(GERMAN REMEDIES)	یوڈائی نا
Tretinoin (trans-retinoic acid-vitA acid) 0.05% cream 20g Rs. 37.60		
<b>MERTOGLYL GEL</b>	(UNIQUE)	میزو جل جیل
Metronidazole 1% w/w gel: 30g: Rs.20.72		
<b>PERNOX GEL</b>	(GFL) 20g Rs. 25.00	پرناکس جل
<b>PERSOL FORTE</b>	(WALLACE)	پرسول فورٹ
Precipitated sulphur. 5% w/w, benzoyl peroxide 10% w/w cream 20g Rs.24.50		
<b>RETINO-A</b>	(ETHNOR) 20g Rs. 44.72	رے نی نو

## ANTIBACTERIAL ASTRINGENT مانع جراثیم مرہم اور لوشن

درج ذیل پینٹ دوائیں جلد کے انفکشن، زخم جلنے کئے چھالے پڑنے پیر وئی کان کے انفکشن واد، کنڈیڈ  
انفکشن جراثیمی انفکشن زخم بستری کار بیکل وغیرہ میں مفید ہیں

### تجارتی مرکبات

<b>ALPHADINE OINT</b>	(NICHOLAS-PIRAMAL)	الفاڈین مرہم
Povidone iodine 5% v/v oint 15g Rs. 11.10; 125g Rs. 47.10		
<b>ALPHADINE POWDER</b>	(NICHOLAS-PIRAMAL) 10g Rs.9.32	الفاڈین پوڈر
<b>ALPHADINE SOLUTION</b>	(NICHOLAS-PIRAMAL)	الفاڈین لوشن
100ml Rs. 25.90		
<b>ANAEBELL CREAM</b>	(BELL) 20gm tube Rs.4.00	انائیل کریم
<b>ARGENEX CREAM</b>	(NEO PHARMA) 25g tube Rs.22	آرجی ایکس کریم
<b>BELLE CREAM</b>	(BELL) 20gm tubes Rs. 7.50	بیلے کریم
<b>BETADINE OINT</b>	(WIN-MEDICRE)	بٹاڈین مرہم
Povidone oindine 5% oint 15g Rs. 16.50; 125g Rs. 58.56; 250g Rs.94.84		
<b>BETADINE POWDER</b>	(WIN-MEDICARE)	بٹاڈین پوڈر
Povidoneiodine 5% powder 10g Rs. 11.10		
<b>DIBACT CREAM</b>	(SIGMA LABS) 250G jar, Rs.115	ڈی بیکٹ کریم



<b>ENSAMYCIN CREAM</b> (FULFORD)	ان سامائی سین کریم
Sisomy sulph 0.1% cream 7.5g Rs. 4.80; 15g Rs 31.63	
<b>ERYACNE</b> (CROSLANDS)	ارائی سین
Erythromycin 4% w/w gel: 20g: tube: Rs. 33.50	
<b>FAIRGENOL</b> (FDC)	فیر جی نال
Dichloroxylenl 1.88%, Terpeneol 2%; fluid 5 lit: Rs. 196.13	
<b>FRAMYCETIN TULLE</b> (TOUSSEL)	فرامائی سین
Framycetin sulphate 1% ; 10 pcs Rs. 76.62	
<b>FUCIBET CREAM</b> (CROSLANDS)	فیوسی بٹ کریم
Fusidic acie 2%, betamethasone (as valerate) 0.1% w/w cream 10g Rs.45.90	
<b>FUCIDIN CREAM</b> (CROSLANDS)	فیوسی ڈین مرہم
Fusidic acid 2% w/w cream 10g: Rs. 44.80	
<b>FUCIDIN OINT</b> (CROSLANDS)	فیوسی ڈین انیٹ منٹ
Sod. fusidate, 2% oint 5g: Rs. 27.18 10g: Rs.44.80	
<b>HEALAN</b> (J & J DECHANE) 110g Rs. 16.00	ہی لین
<b>ITEOL-3</b> (ASTRA-IDL) 5 litres Rs. 173.91	ای ٹی اول
<b>LEDERMYCIN OINT</b> (LEDERLE)	لیدر مائی سین مرہم
Demeclocyclin hcl 0.5% oint 15g Rs.3.29	
<b>MERIGENTA CREAM</b> (MERCURY)	میری جنتا کریم
Gentamicin (as Sulphate) 0.1% w/w 15g Rs. 7.90, 75g: Rs.36.00	
<b>MICRODINE OINT</b> (MICRO LABS)	مائی کرو ڈین
Povidone iodine 5% w/w ointment 20g Rs. 15.80	
<b>NEBASULF OINT</b> (PFIAER) oint 15g: Rs. 15.07	نیمیا سلف مرہم
<b>NEBASULF SPRINKLING POWDER</b> (PFIAER) 10g: Rs. 12.71	نیمیا سلف پوڈر
<b>NEOSPORIN OINT</b> (SURROUGHS WELLCOME) 20g: Rs.18.41:	نیوسپورین مرہم
<b>PIODIN</b> (BIDDLE SAWYER) 120ml: Rs. 23.80	پایو ڈین
<b>SILVEREX CREAM</b> (CROSLANDS) 250g: Rs. 125	سلور ایکس کریم پوڈر
<b>SOFRADEX CREAM</b> (ROUSSEL) 25g, Rs. 26	سوفراڈ ایکس
<b>SOFRAMYCIN SKIN CREAM</b> (ROUSSEL)	سوفرامائی سین سکن
20g: Rs. 12.09 120g: Rs. 48.83	



**TERRAMYCIN SKIN OINT (PFIZER) 15g Rs. 8 07** ٹیرامائی سین اسکن  
**WOKADINE (WOCKHARDT)** ووکاڈین  
**WOKADINE POWDER (WOCHARDRT)** ووکاڈین پوڈر

## MUPIROCIN

موپی روسین

افعال و منافع: یہ ایک زبردست دافع انفکشن دوا ہے، چھالے پڑنا ایگزیم، چوٹ کا زخم کیڑے  
 مکوڑوں کا کٹنا اور جلنے کٹنے کے زخموں میں مفید ہے۔  
 احتیاط: آنکھوں سے بچائیں اگر ری ایکشن ہو تو دوا بند کر دیں، طویل عرصہ تک استعمال نہ کرائیں۔

## تجارتی مرکب

**BACTROBAN (SMITHKLINE) 5g tube, Rs. 58.30** بیکٹروبان

## ANTI FUNGAL

## دافع فنگس بیرونی دوائیں

افعال و منافع: فنگس سے پیدا ہونے والے امراض، کھجلی سر میں جو نہیں پڑنا پھنسی دانے ٹھکنا،  
 داد ایگزیم کنڈید انفکشن مہل کی پھنسیاں و کھجلی مقعد اور شرمگاہ کی کھجلی، الرجی کیڑوں مکوڑوں کے  
 کاٹنے سے ہونے والی سوزش میں مفید ہیں۔

مقدار و ترکیب: متاثرہ مقام کو صاف کر کے دن میں ۲ بار لگائیں۔

منفی افعال: متورم اور کھلے زخم پر، مرہم نہ لگائیں بلکہ خشک پوڈر استعمال کریں۔

احتیاط: ان مرکبات سے آنکھوں کو بچائیں کیہا کی نازول کے مرکبات کو زیادہ عرصہ استعمال نہ کریں  
 ورم جگر کا خطرہ رہتا ہے۔

## تجارتی مرکبات

**ABZORB DUSTING POWDER (CROSLANDS)** ایزارپ پوڈر

Clotrimazole 1% w/w powder 75g Rs.24.30

**BATRAFEN CREAM (HOECHST)** بٹرافین کریم

Ciclopiroxolamine 10mg/ gram 15g tube Rs.25.50



<b>BATRAFEN SOLN</b>	(HOECHST)	بٹرافین لوشن
Ciclopiroxolamine 10mg per ml soln. 20ml bottle		
<b>BENZOCENOL EMULSION</b>	(CARMINOL)	بزو سی نال
	125ml Rs. 18	
<b>BETAMIL</b>	(MERCK)	بٹامل مرہم
	10g: Rs. 17.89	
<b>CANDID</b>	(GLENMARK)	کنڈیڈ مرہم
Clotrimazole 1% w/w cream. 15g: Rs. 14.64		
<b>CANDID LOTION</b>	(GLENMARK)	کنڈیڈ لوشن
Clotrimazole 1% v/v: lotion 15ml: Rs. 15.95		
<b>CANDID POWDER</b>	(GLENMARK)	کنڈیڈ پوڈر
Clotrimazole 1% w/w: powder 30g: Rs. 13.96 100g: Rs. 29.09		
<b>CANDIDERMA</b>	(GLENMARK)	کنڈیڈرما
	15g: Rs. 22.90	
<b>CANDISTAT</b>	(MERCK)	کنڈیڈ سٹیٹ
Miconazole nitrate 2% w/w cream: 15g: Rs. 12.60		
<b>CANESTEN</b>	(BAYER)	کے نس ٹین مرہم
Clonazole 10mg, per gm: cream. 15g: Rs. 21.95		
<b>CLOBEN</b>	(INDOCO)	کلو بین
	15g: Rs. 19	
<b>CLOBEQUAD</b>	(SWIFT)	کلو بی کواڈ
	Tube: Rs. 29.95	
<b>CLOBETAMIL-H</b>	(MERCK)	کلو بیٹامل
	10g: Rs. 21.47	
<b>CLOMYCIN CREAM</b>	(NEO PHARMA)	کلو مائی سین
	10g: Rs. 12.50	
<b>CORTILATE</b>	(MICRO LABS)	کور ٹی لیٹ
<b>CROTORAX</b>	(S G PMCLS)	کرو ٹوریکس
	60g: Rs. 14.43	
<b>CTM CREAM</b>	(BDH)	سی ٹی ایم کریم
Clotrimazole 1% cream: 15g: Rs. 12.08		
<b>CTM LOTION</b>	(BDH)	سی ٹی ایم لوشن
Clotrimazole 1% lotion: 15ml: Rs. 13.23		
<b>DAKTACORT GEL</b>	(ETHNOR)	ڈاکٹاکارٹ جیل
	5mg, Rs. 19.60	
<b>DAKTARIN</b>	(ETHNOR)	ڈاکٹارین
Miconazole nitrate 2% w/w gel 20g: Rs. 26.30		
<b>ELDERM CREAM</b>	(ELDER)	ایلڈرم
	10g: Rs. 13.50	
<b>FLUCREME-NM</b>	(CONCEPT)	فلو کریم
	10g: Rs. 23.90	
<b>FUMIN</b>	(RECON)	فو مین



<b>FUNGITOP GEL</b> (MICRO LABS)	فنگی ٹاپ جیل
Miconazole nitrate 2% w/w topical gel 15g Rs. 18.10	
<b>GENTALENE-C CREAM</b> (CROSLANDS) 10g Rs. 26.50	جنٹالین سی کریم
<b>LOTRIDERM</b> (ZYG PHARMA) 10g, Rs. 15.33	لوٹری ڈرم
<b>MICOGEL</b> (CIPLA)	مائی کو جیل
Miconazole nitrate 2% cream 15g Rs. 12.54	
<b>MICOLON</b> (ETHNOR) 15g, Rs. 16.40	مائی کولون
<b>MILLICORTEN-VIOFORM</b> (H CIBAGEIGY) 15g Rs. 6.22	ملی کارٹن وائیو فارم
<b>MIZOLE CREAM</b> (EUPHORIC)	مائی زول کریم
Miconazole 2% cream Price N/A	
<b>MULTIFUNGIN</b> (BOEHRINGER) 30g Rs. 14.78	ملٹی فن گن کریم
<b>MYCOCID</b> (CHEMOPHARMA)	مائی کو سنڈ
Clotrimazole 1% cream 15g Rs. 7.95	
<b>MYCODERM</b> (FDC) 100g, Rs. 22.40	مائی کو ڈرم پوڈر
<b>MYCOSTATIN OINT</b> (SARABHAI)	مائی کو سٹائن مرہم
Nystatin 100,000u, per g. oint 10g, Rs. 16.60	
<b>NIFUGAL OINT</b> (BIDDLE SAWYER)	نی فزگل
Clotrimazole 1% oint 15g tube Rs. 15.60	
<b>NIZRAL</b> (ETHNOR)	نیزرال ٹبلٹ
Ketaconazole 200mg tabs 10, Rs. 139.50	
<b>OLAMIN</b> (MICRO LABS)	اولامن
<b>PENTADERM CREAM</b> (MERCURY) 5mg Rs. 17.85	پنڈرم
<b>PRAGMATAR</b> (SMITHKLINE) 15g Rs. 17.60	پریگ مٹار
<b>SIGMADERM</b> (SIGMA LABS) 5g tube Rs. 10	سگما ڈرم
<b>SIGMAZOL CREAM</b> (SIGMA LABS) 10g tube Rs. 12.51	سگما زول کریم
<b>SILODERM C CREAM</b> (NEO PHARMA)	سلوڈرم
Clotrimazole 1% w/w cream, 15g tube Rs. 14.90	
<b>SINUM V</b> (DEE PHARMA)	سی نیم وی
Clotrimazole 100mg vaginal tabs: 6 Rs. 18.72	
<b>SINUM CREAM</b> (DEE PHARMA)	سی نیم کریم
Clotrimazole 1% w/w cream: 15g tube Rs. 12.80	



<b>SKINMENT</b> (J & J DECHANE)	80g	Rs. 42.00	اسکن منٹ
<b>SOFRADEX-F</b> (ROUSSEL)	15g tube;	Rs. 16.68	سوفرا ڈیکس
<b>STATUM</b> (CROSLANDS)			اسٹیم کریم
Clotrimazole 1% w/w; oint 20g:	Rs. 26.50		
<b>STATUM DUSTING POWDER</b> (CROSLANDS)			اسٹیم پوڈر
Clotrimazole 1% w/w; powder 30g:	Rs. 12.00	100g: Rs. 17.00	
<b>SURFAZ</b> (FRANCO-INDIAN)			سرفاز لوشن
Clotrimazole 1% w/v, soln 15ml:	Rs. 13.77		
<b>SURFAZ DUSTING POWDER</b> (FRANCO-INDIAN)			سرفاز ڈسٹنگ پوڈر
Powder 30g:	Rs. 12.22		
<b>SURFAZ-SN-CREAM</b> (FRANCO-INDIAN)	7.5g:	Rs. 13.76	سرفاز کریم
<b>TINADERM</b> (FULFORD)			ٹیناڈرم لوشن
Tolnaftate 10mg, per ml : soln 10ml:	Rs. 17.00		
<b>TINADERM CRÉAM</b> (FULFORD)			ٹیناڈرم کریم
Tolnaftate 10mg per g cream 5g :	Rs. 10.00		
<b>TRIBEN CREAM</b> (JENBURKT)			ٹریبن کریم
Clotrimazole 1% w/w cream: 20g:	Rs. 15.95		
<b>TRIBEN DUSTING POWDER</b> (JENBURKT)			ٹریبن پوڈر
Clotrimazole 1% w/w dusting powder: 60g:	Rs. 24.95		
<b>TRIBEN LOTION</b> (JENBURKT)			ٹریبن لوشن
Clotrimazole 1% w/v: lotion: 30ml:	Rs. 32.00		
<b>ZOACIDE-V</b> (TATA PHARMA)	20mg 8:	Rs. 26.50	زوآسائیڈ وی
<b>ZOLE</b> (GUFIC)	15ml:	Rs. 15.80	زول لوشن
<b>ZOLE DUSTING POWDER</b> (GUFIC)	15g:	Rs. 14.10	زول پوڈر
<b>ZOLE-F</b> (GUFIC)	15ml:	Rs. 19.00	زول کریم

In fungal  
infection of  
skin & nail

**FUNGIZOLE**  
(Fluconazole)





## BENZYL BENZOATE

## بنزائل بنزوئیٹ

افعال و منافع: ہر طرح کی کھجلی اور جوئیں کے لئے مفید دوا ہے۔

مقدار و ترکیب: گرم پانی سے نہا کر جسم کو خشک کر کے پورے جسم پر اس کی مالش کریں ۲ دن بعد دوبارہ اسی طرح لگائیں بالوں کی جوؤں کے لئے بالوں میں اچھی طرح شام کو لگا کر سر پر کپڑا باندھ لیں صبح کو دھو ڈالیں۔

احتیاط: دوا گردن سے نیچے لگائیں آنکھوں کو دوا سے بچائیں۔

### تجارتی مرکبات

ASCABIOL (RHONE-POULENC) 125ml Rs. 19.32 اسکے پیال لوشن  
BENZO SCAB (UNILODS) 25g Rs. 2.75 بینزواسکیب مرہم

GAMMA BENZENE HEXA CHLORIDE گاما بنزین ہکسا کلورائیڈ

افعال و منافع: یہ ایک زبردست سریع الاثر دافع پیراسائیٹ دوا ہے جو بیرونی طفیلی کیڑوں، کھجلی کے کیڑوں بالوں میں پیدا ہونے والے طفیلی کیڑوں جوؤں کو ختم کر دیتی ہے۔

مقدار و ترکیب: کھجلی میں نہانے کے بعد پورے جسم پر مالش کی جائے ۲۴ گھنٹہ بعد نہایا جائے جوؤں اور طفیلی کیڑوں کے لئے بالوں میں اچھی طرح دوا لگا کر ۲۴ گھنٹہ بعد نہائیں  
احتیاط: آنکھوں کو دوا سے محفوظ رکھیں

### تجارتی مرکبات

GAB (FUFIC) 40g: Rs. 5.80 اسکے نیس  
SCABEX (INDOCO) 100ml: Rs. 18.00 اسکے نیس  
SCABEX-SCREAM (INDOCO) 20g: Rs. 9.00 اسکے نیس ایس کریم  
SCABINE LOTION/CREAM (STADMED) 15g Rs. 8.50 اسکے بن لوشن کریم  
SCABOMA (GLENMARK) 450ml: Rs. 27.78 اسکے بوما  
SCABOMA CREAM (GLENMARK) 25g, Rs. 6.40 اسکے بوما کریم



## PERMETHRIN

پرمی تھرین

افعال و منافع: کھجلی اور سر کی جوڑوں کے لئے مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: سر سے پیر تک اچھی طرح دوا کی مالش کی جائے ۱۲ گھنٹہ بعد نہانا چاہیے عموماً ایک بار دوا کا استعمال کافی ہوتا ہے۔

### تجارتی مرکبات

PERLICE CREAM RINSE (CROSLANDS) 60g: Rs. 56.60 پرائس کریم  
PERMITE CREAM (CROSLANDS) 30g: Rs. 40.00 پرمیٹ کریم  
SCALTIX (CROSLANDS) 60g bottle: Rs. 56.00 ا۔ کال ٹکس

## ANTI SEBORRHOIC

ایگزیمیا اور بفا کی دوائیں

افعال و منافع: درج ذیل ادویہ، ایگزیمیا، چھاجن، خشک و تراگزیما مقعد اور مہیل کی کھجلی جلد پر سرخ دھبے، الرجی، مہاسے سر میں بھوسی جلد کی مرطوب پھنسیاں داد بالوں کے امراض وغیرہ میں مفید ہیں۔

احتیاط: طویل علاج سے پرہیز، آکھ کنج ران اور متورم مقام پر نہ لگائیں دوران علاج غذا کم کاربوہائیڈریٹ والی استعمال کریں۔

### تجارتی مرکبات

DERMOQUINOL (EAST INDIA) 170g Rs. 25.96 ڈرمو کیو نال  
ELOCON OINT (FULFORD) ایلو کون مرہم  
Mometasone furoate 0.1% w/w oint Price N/A.  
ESKAMEL OINT (SMITHKLINE) 25g Rs. 18.70 اسکامل  
KARPIN LOTION (DEYS) Rs. 16.00 کارپن  
PRAGMATAR OINT (SMITHKLINE) 25g: Rs. 12.00 پراگ مائار مرہم  
SELSUN SUSP (ABBOT) سیلسن سوشن  
Selenium sulphide 2.5% w/v; susp. 60ml Rs. 27.50: 120ml, Rs. 46.22



## ACYCLOVIR

اسانکلوویر

افعال و منافع: یہ دوا جلد کے ایچ ایس وی انفکشن تناسلی اعضاء پوٹوں کے کنارے چہرے اور سینہ پر ہونے والے ہر پیزا انفکشن میں بہت مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: دن میں ۵ بار ۴ گھنٹہ کے وقفہ سے ۵ دن تک لگائیں۔

مضر اثرات: وقتی طور سے چھین کا احساس جلد پر داغ و خشکی ہونا۔

احتیاط: آنکھوں میں یہ دوا نہیں لگانا چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

CYCLOVIR CREAM (CADILA)

سانکلوویر کریم

Acyclovir 5% w/w cream 5g, Rs. 35.00

HERPEX CREAM (TORRENT)

ہر پکس کریم

Acyclovir 5% w/w cream 5g, Rs. 53.55

HERPERAX OINT (MICRO LABS)

ہر پراکس مرہم

Acyclovir 3% w/w oint. 5g, Rs. 50.70

## LACTIC ACID

لیکٹک ایسڈ

## PODOPHYLLINE

پوڈوفائی لین

## SALICYLIC ACID

سلیسیلک ایسڈ

افعال و منافع: یہ دوائیں پیر کے تلوؤں اور دوسرے مقامات پر ہونے والے گٹے (کارن) جلد کی سخت گانٹھ، مزمن داء میں مفید ہیں۔

احتیاط: کھلے زخموں میں استعمال نہ کریں۔

COTARYL (FDC) cream 50g Rs. 24.90

کونارل

DEBORIN SKIN (GLAXO ALLENBURYS) 25g Rs. 16.07

ڈی بورن

KERALIN (EAST INDIA) 10g Rs. 8.46

کیرالین



## ALLANTOIN

الن ٹائن

افعال و منافع: انفکشن کو دور کرنے زخموں کو جلد مندمل کرنے پستانوں کے پھٹنے میں مفید و موثر ہے۔

## تجارتی مرکب

MASSE CREAM (ETHNOR) tube of 20g Rs. 37.75 مہے کریم

## BENZYL NICO TINATE

بنزائل نیکوٹینیٹ

افعال و منافع: گھنچ سحفہ، بالوں کا گرنا، بالوں کے تمام امراض میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: متاثرہ مقام پر دن میں ابار پھر ہفتہ میں ۲-۳ بار

احتیاط: دوا لگانے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کریں ابتدا میں کمزور بال زیادہ گر سکتے ہیں علاج جاری رکھنے پر پورا فائدہ ہوتا ہے۔

## تجارتی مرکب

K-5 HAIR TINCTURE (GERMAN REMEDIES) کے ۵۔ ہینر لوشن  
Benzyl nicotinate 100ml: Rs.67.29

## HEPARIN

ہپارین

افعال و منافع: رگوں میں ر کے خون کو تحلیل کرنے جلد کی سختی اور تناؤ کو دور کرنے خون کا تھکے یا گانٹھ بننے حادثات کھیلوں میں بند چوٹ لگنے سردی کے سبب پیروں اور انگلیوں کے درد میں مفید ہے۔

احتیاط: دوا لگا کر زیادہ زور سے مالش نہ کریں کھلے زخموں پر نہ لگائیں۔

BEPARIN (BIOLOGICAL E) 15g Rs. 6.25

THROMBOPHOB (GERMAN REMEDIES) 20g: Rs. 19.20 ہپارین  
تھرومبوفوب



## MALATHION

میلا تھیان

افعال و منافع: سر کے بالوں زیر ناف بغل اور جسم کے دوسرے اعضاء کی کی جوڑوں وغیرہ کو ختم کرنے میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: متاثرہ مقام پر اچھی طرح لگا کر کم از کم ۲ گھنٹہ بعد صابن یا شیمپو سے دھو ڈالیں عموماً ایک بار لگانا کافی ہوتا ہے ضرورت ہو تو ہفتہ بعد لگائیں

تجارتی مرکب

CYBAN

سائی بان

## MINOXIDIL

مناکسی ڈل

افعال و منافع: یہ دوا بالوں کی جڑوں میں خون کی رسد بڑھا کر بالوں کے غدو میں تحریک پیدا کر کے بالوں کی افزائش میں مدد دینا چاہتی ہے مردانہ ہارمون کی خرابی سے ہونے والے گج میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: متاثرہ مقام کو اچھی طرح صاف کر کے گج کے مقام پر اسپرے کریں ۱۲ گھنٹہ بعد ۱۰ بار لگائیں۔

مضر اثرات: سوزش سرخی اور ری ایکشن ہو سکتا ہے  
احتیاط: ۱۸ سال سے کم عمر والوں کو، حساس افراد کو استعمال نہ کرائیں

تجارتی مرکبات

GROMANE	(ALIDAC)	50ml: Rs. 150.00
HAIREX	(KOPRAN)	60ml: Rs. 201.25
HEBALD	(INTAS)	10ml: Rs. 42.10
MINTOP	(STANGEN)	60ml: Rs. 138.15
MULTIGAIN	(TORRENT)	60ml: Rs. 163.25

گرومین  
ہیریکس  
ہے بالڈ  
مینٹاپ  
ملٹی گین



## MUCOPOLY سکارائیڈ پالی سلفیٹ SACCHARIDE POLY SULFATE

افعال و منافع: موج چوٹ کے سبب خون رگوں میں رک جانا خون کا تھک بن جانا وریڈوں میں خون  
جنے رگیں پھولنے گانٹھوں کو نرم کرنے اور پگھلانے میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: متاثرہ مقام پر دو الگا کر زوردار مالش کریں یا ڈریسنگ کر دیں۔  
احتیاط: آنکھوں اور کھلے زخموں جریان خون کی جگہ پر نہ لگائیں۔

### تجارتی مرکب:

HIRUDOID (CFL) 5g Rs. 15.50, 14g Rs. 32.00

ہیروڈائیڈ

### AMMOIDINE

اموآئی ڈین

افعال و منافع: برص سرخ و سفید داغ کے لئے مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۳۰ کلوگرام وزن کے مریض کو ۱ گولی ۳۰ سے ۵۰ کلو تک ۲ گولی ۵۰ سے ۶۵ کلو  
۳ گولی ۶۰ سے ۸۰ کلو ۴ گولی یومیہ مرہم یا لوشن داغوں پر لگائیں۔  
منفی افعال: یرقان حمل اور چھوٹے بچوں کو نہ دی جائے  
مضر اثرات: متلی، نیند کی کمی، ڈپریشن کھلی چکر در در معمولی تھج ہو سکتا ہے۔  
احتیاط: آنکھوں، ہونٹوں اور تناسلی اعضا پر نہ لگائیں۔

### تجارتی مرکبات

MELANOCYL (FRANCO-INDIAN) 200: Rs. 179.20

میلانوکائل ٹبلٹ

MELANOCYL OINTMENT (FRANCO-INDIAN)

میلانوکائل مرہم

25g Rs. 20.80

MELANOCYL SOLUTION (FRANCO-INDIAN)

میلانوکائل لوشن

25ml: Rs. 23.85



**CALCI POTRIOL****کیلسی پوٹریول**

افعال و منافع: سرخ و سفید داغ پڑنا، برص کے مرض میں مفید ہے۔  
 منفی افعال: حساس مریضوں، حمل رضاعت کے دوران اور بچوں کو استعمال نہ کرائیں۔  
 احتیاط: استعمال کے بعد ہاتھوں کو صاف کریں چہرے پر نہ لگائیں

**تجارتی مرکب**

ڈیواوونیکس **DAIVONEX (CROSLANDS) Calcipotriol 50mg/g: oint 30g**

**METHOXALEN****میٹھا کسالیمن**

افعال و منافع: برص اور سفید داغوں میں مفید ہے۔  
 مقدار و خوراک: 0.7 ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے۔  
 منفی افعال: یرقان میں حمل میں اور چھوٹے بچوں کو نہ دی جائے۔  
 مضر اثرات: متلی، نیند کی کمی، ڈپریشن کھلی، چھالے پڑنا تھج چکر درد سر۔  
 احتیاط: آنکھوں، ہونٹوں پلوں اور تناسل اعضاء پر نہ لگائیں۔

**تجارتی مرکبات****MACSORALEN**

(MAC)

میک سورالین ٹبلٹ

Methoxsalen 10mg tabs; 10:Rs. 8.71

**MACSORALEN LOTION**

(MAC)

میک سورالین لوشن

**PARA AMINO BENZOIC ACID** پیرا امینو بنزوئک ایسڈ

افعال و منافع: برص سفید داغوں کے علاج سورج کی تیز شعاعوں اور گرمی سے حفاظت کے لئے اس کا استعمال مفید ہے۔

**تجارتی مرکبات****MELALITE**

(NICHOLAS)

50g: Rs. 40.82

میلا لائٹ کریم

**PARAMINOL CREAM (FRANCO-INDIAN)**

25g: Rs. 12.80

پیرامینول



**PSORALEN**

سورالین

افعال و منافع: برص سفید داغوں اور سرخ داغوں کے لئے مفید ہے۔  
 مقدار و ترکیب: ۷.۰ ملی گرام / فی کلو گرام وزن کے حساب سے روزانہ۔  
 منفی افعال: روشنی سے حساس مریضوں کو جلد پر چھالے اور غدو جگر کی خرابی میں استعمال نہ کرائیں۔  
 مضر اثرات: سر بھاری، متلی بے چینی، ڈپریشن کی علامات ہو سکتی ہے۔

## تجارتی مرکبات

MANADERM (GEOFFREY) 40 tabs Rs. 28.50 میناڈرم ٹبلیٹ  
 MANADERM OINT (GEOFFREY) میناڈرم مرہم  
 Psoralen 10mg per gram 30g Rs. 29.50

**TRIMETHYL PSORALEN**

ٹرائی میتھائل سورالین

**TRIOX SALEN**

ٹرائی اوکسالیٹ

افعال و منافع: برص، جلد کی رنگت تبدیل ہونے اور سفید داغ میں مفید ہے۔  
 منفی افعال: خون کی خرابی آتشک، و جذام والے سفید داغ اور حمل کی حالت میں استعمال نہ کرائیں۔  
 مضر اثرات: زیادہ مقدار اور تیز دھوپ میں رہنے سے چھالے پڑ سکتے ہیں۔

## تجارتی مرکبات

NEOSORALEN (MAC) نیوسورالین  
 Trimethyl psoralen 5mg tabs 10 tablets Rs. 12.01  
 NEOSORALEN FORTE (MAC) نیوسورالین فورٹ  
 Trimethyl psoralen 25mg dragees 8, Rs. 40.60  
 NEOSORALEN LOTION (MAC) نیوسورالین لوشن  
 Trioxalen 0.2% w/v Rs. 17.60

**BENZYDAMINE HCL**

بنزائی ڈامین ہائیڈروکلورائیڈ

افعال و منافع: چوٹ، موج کسر و خلع کا درد عضلات اعصاب اور رباطات میں درد دور میں مفید ہے



## تجارتی مرکب

**TANTUM CREAM**

(ELDER)

ٹن ٹم کریم

Benzydamine hcl 5% w/w cream 20g: Rs. 26.95

**MENTHOL**

منتھال

**MEPHENSEN**

می فن سین

**METHYL NICOTINATE**

میٹھائل نیکوٹی نیٹ

**METHYL SALICYLATE**

میٹھائل سیلی سیلیٹ

یہ ادویہ مسکن درد، مرخی عضلات اور محرک تاثیر رکھتی ہیں عضلات و مفاصل کے درد موج  
چوٹ، اعصاب کی ختی تشنج میں مفید ہیں۔

احتیاط: زیادہ زور سے مالش یا رگڑنا نہیں چاہیے۔

## تجارتی مرکبات

**ARJET SPRAY** (CADILA) 50ml Rs. 27.79

ارجٹ سپرے

**CAPSIDOL** (CROSLANDS) gel: 30g: Rs. 30.00

کیپ سی ڈول

**ETHNORUB** (ETHNOR) 20g: Rs. 19.50

ای ٹھی نورب

**FLAMAR CREAM** (INDOCO) 20g: Rs. 11.90

فلے مار کریم

**KILPANE CREAM** (BIDDLES AWYER) 30g: Rs. 26.85

کل پن کریم

**MEDICREME** (RALLIS) 30g: Rs. 17.45

میڈی کریم

**MUSLAX CREAM** (BIOLOGICAL E.) 15g: Rs. 12.75

مس لیکس کریم

**MYOLAXIN OINT** (GENO) 30g: Rs. 26.48

مایولاکسن مرہم

**NEUROPHEN CREAM** (SWIFT) 30g: Rs. 23.42

نیوروفین کریم

**RELAXYL** (FRANCO-INDIAN)

ری لکسائل

Mephenesin 10% Methyl nicotinate 1% capsicum oleoresin 0.05%  
oint 30g: Rs. 16.25



## جلد کو ملائم رکھنے اور تسکین دینے والے مرکبات

### SOOTHING AGENT

ذریعہ ذیل مرکبات، گرمی دانوں کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے پتی اچھلنے کھجلی جلد کا متورم ہونا، ایگزیریا کی سوزش و بے چینی میں تسکین پہنچاتے اور جلد کو ملائم رکھتے ہیں۔

#### تجارتی مرکبات

CALAMINE LOTION

کیلا من لوشن

CALADRY LOTION (PARKE DAVIS) 171ml Rs. 29.40

کیلا ڈرل لوشن

CALADRY CREAM (PARKE DAVIS) 14g Rs. 2.92

کیلا ڈرل کریم

GESICAIN OINT (S G PMCLS) 35g Rs. 11.82

گیسی کین مرہم

RASH-FREE (ABBOTT)

ریش فری

Benzalkonium chlor 0.1% zincoxide 8.5% cream 15g Rs. 14.37

SILODERM

(NEO PHARMA) 100g Rs. 67.14

سلوڈرم

### STEROIDS

### اسٹیرائیڈ والے بیرونی مرکبات

BECLOMETHASONE

بیکلو میتھاسون ڈیپروپی نیٹ

DIPROPIONATE

افعال و منافع: ایگزیریا، چھاجن جلد پر سرخ داغ جلد کا متورم ہونا جلد پر پھسیاں فرج و مقعد کی کھجلی میں مفید ہے۔

منفی افعال: آنکھوں میں اور ٹی بی کی وجہ سے ہونے والی جلد کی تکلیف میں استعمال نہ کرائیں۔

#### تجارتی مرکبات

BAYCORT

(BAYER)

10g Rs. 18.00

بے کارٹ

BEC-FORTE CREAM (REMEDIES INDIA) 10g Rs. 14.55

بیک فورٹ کریم

BECLATE

(CIPLA)

15g Rs. 13.26

بیک لیٹ



<b>BECLOTRIM</b>	(BDH)	15g: Rs. 21.90	بیک لوثریم
<b>BECMET</b>	(SWIFT)	15g: 12.56	بیک میٹ
<b>BECMET-N</b>	(SWIFT)	15g: 14.92	بیک میٹ این
<b>BEC-NM CREAM</b>	(REMEDIES)	10g Rs. 17.50	بیک این ایم کریم
<b>BESTOPIC</b>	(SYSTOPIC)	10g: Rs. 19.80	بس ٹوپک
<b>DERMICORT</b>	(RECON)	15g: tube; Price N/A	ڈرمی کورٹ
<b>ECLOSPAN</b>	(TATA PHARMA)	15g: Rs. 27.50	ایک لوسپان
<b>ECODAX-G</b>	(UNIQUE)	10g: Rs. 15.91	ایکوڈیکس
<b>ZIDERM-S</b>	(GLENMARK)	15g: Rs. 19.20	زی ڈرم ایس
<b>ZOVATE</b>	(GLAXO ALENBURYS)		زوویٹ

Beclomethasone dipropionate 0.025% w/w oint 15g: Rs.15.45

## BETAMETHASON DIPRO PIONATE

بٹامیتھاسون ڈیپروپوائیٹ

افعال و منافع: جلد کا ورم چھاجن، ایگزیم میں مفید ہے  
متنی افعال: ٹی بی سے متاثرہ افراد میں وائرل، جراثیمی انفکشن میں اس کا استعمال مناسب نہیں

### تجارتی مرکبات

<b>BETAGEL</b>	(MICROLABS)	15g: Rs. 18.00	بٹا جیل
<b>BETAMIL</b>	(MERCK)	10g: Rs. 17.89	بٹا مل
<b>BETAMIL GM</b>	(MERCK)	10g: Rs. 24.25	بٹا مل جی ایم
<b>BETATOPIC</b>	(SYSTOPIC)	10g: Rs.23.00	بٹا ٹوپک
<b>BETATOPIC CREAM</b>	(SYSTOPIC)	10g: Rs.24.60	بٹا ٹوپک کریم
<b>DIPFORM</b>	(ZYG PHARMA)	10g Rs. 36.90	ڈیپ فارم
<b>DIPGENTA</b>	(ZYG PHARMA)	10g Rs. 29.62	ڈیپ جنتا
<b>DIPLNE</b>	(ZYG PHARMA)	10g: Rs. 28.87	ڈیپ لین
<b>DIPROVATE</b>	(CROSLANDS)	10g: Rs.19.50	ڈیپ روائٹ
<b>DIPROVATE-MF</b>	(CROSLANDS)	10g: Rs.34.00	ڈیپ روائٹ ایم ایف
<b>DIPSALIC LOTION</b>	(ZYG PHARMA)	10ml: Rs.32.65	ڈیپ سالک لوشن
<b>GENTALENE-C CREAM</b>	(CROSLANDS)	10g: Rs.30	جنتالین کریم
<b>GENTOPIC</b>	(SYSTOPIC)	10g:Rs.23.90	جن ٹوپک



## BETAMETHASONE VALERATE بٹامیتھاسون ولیریٹ

افعال و منافع: ایگزیمیا جلد پر سرخ متورم دانے، بیرونی کان کی سوزش و دانے متعدد فرج کی کھجلی میں مفید ہے

منفی اثرات: وائرل، فنگل، ٹی بی، اٹشک کے اثرات میں ۱ سال سے کم عمر بچوں کی متورم جلد میں نہ لگائیں۔

احتیاط: کارٹی سون کے مرکبات جراثیمی انفکشن میں تنہا استعمال نہ کریں جب تک اس مرض کی اصولی دوا ساتھ میں نہ دی جائے۔

### تجارتی مرکبات

BETNOVATE-N (GLAXO) 15g: Rs. 12.05 بنوویٹ این

BETNO VATE SCALP APPLICATION (GLAXO) بنوویٹ اسکالپ لوشن

20ml Rs. 15.44

QUADRIDERMA (ZYG PHARMA) 25g, Rs. 34.15 کوڈرے ڈرم

TOLBET CREAM (CFL) 5g: Rs. 14.90 ٹال بٹ کریم

VALVET CREAM (LUPIN) 25g: Rs. 28.00 ویل بٹ کریم

VALBET SCALP APPLICATION (LUPIN) ویل بٹ اسکالپ لوشن

20ml, Rs. 14.29

## CLOBETASOL PROPIONATE کلوبٹاسول پروپیونیت

افعال و منافع: جلد کے خیلے اور مزمن امراض مثلاً چنبل بار بار ہونے والا ایگزیمیا پھنسیاں جلد پر چھالے سفید داغ پڑنا تکلیف دہ کھجلی میں مفید ہے۔

احتیاط: ۱۲ سال سے کم عمر بچوں حاملہ اور وائرل انفکشن میں استعمال نہ کرائیں انفکشن کی حالت میں خصوصی دوا ساتھ میں چلائیں۔

### تجارتی مرکبات

ADIVATE (CROSLANDS) 10g: tube: Rs. 21.60

CLOBENATE (SWIFT) 15g: Rs. 24.90

اڈی ویت  
کلوبیٹ



<b>CLOBETAMIL (MERC)</b>	10g: Rs. 19.61	کلونی ٹائل
<b>CLOBETAVATE (LUPIN)</b>	10g: Rs. 24.66	کلونی ٹاوٹ
<b>CLOBITOL (CROSLANS)</b>	10g: Rs. 21.05	کلونی ٹائل
<b>CLOSTAGEN CREAM (ELDER)</b>	10g: Rs. 25.95	کلوس ٹاجن کریم
<b>CUTISTATE-G (MEJDA)</b>	10g: Rs. 18.33	کیو ٹس ٹیٹ جی
<b>EXEL (GUFIC)</b>	10 mg Rs. 18.90	ایک سل
<b>LOBATE-CM (NICHOLAS)</b>	15g: Rs. 13.69	لو بیٹ سی ایم
<b>TENOVATE-G (GLAXO)</b>	10g: Rs. 17.14	ٹنو ویٹ جی
<b>TENOVATE-M (GLAXO)</b>		ٹون ویٹ ایم
Clobetasol propionate 0.05% w/w miconazole nitrate 2% cream 10g.		
Rs. 23.86		

**TOPIFORT CREAM (FRANCO-INDIAN)** ٹاپ فورٹ کریم  
10g: Rs. 111.65

**TOPINATE CREAM (SYSTOPIC)** 30g: Rs. 41.00 ٹاپی ٹیٹ کریم

**CLOBETASONE BUTYRATE** کلوبٹاسون بیوٹائی ریٹ

افعال و منافع: ایگزیماء، جلد کا وزم جلد کی پرانی ہٹلی تکالیف میں مفید ہے

منفی افعال: جراثیمی فنگس اور وائرس سے پیدا ہونے والی جلدی بیماریوں اور دوا سے الرجک  
مریضوں میں نہیں دینا چاہیے۔

احتیاط: حمل میں زیادہ عرصہ استعمال سے انفکشن کی حالت میں خصوصی انفکشن کی دوا کے بغیر  
استعمال نہ کریں۔

### تجارتی مرکبات

<b>CLOBEQUAD (SWIFT)</b>	5g: Rs. 17.00, 10g: Rs. 29.95	کلونی کاڈ
<b>EUMOSONE (GLAXO)</b>	10g: Rs. 17.80	یو موسون
<b>EUMOSONE-G (GLAXO)</b>	10g: Rs. 14.87	یو موسون جی
<b>EUMOSONE-M (GLAXO)</b>	10g: Rs. 19.77	یو موسون ایم



۱- ڈیکسامیٹھاسون سوڈیم فاسفیٹ **DEXAMETHASONE**

**SODIUM PHOSPAHTE**

۲- ٹرائی میٹھائل ایسیٹیٹ **TRIMETHYL ACETATE**

افعال و منافع: چھاجن، ایگزیم اور چنبل میں مفید ہیں  
مقدار و ترکیب: دن میں ۲-۳ بار لگائیں دوا لگا کر ڈرینگ کر دیں

تجارتی مرکبات

**MILLICORTENOL (H.CIBAGEIGY) 15g: Rs. 10.40** ملی کارٹی نال

**MILLICORTEN-VIOFORM (H.CIBAGEIGY) 15g: Rs. 6.22** ملی کاشن وایوفارم

**FLUCINOLONE ACETONIDE** فلوئی نولون ایس ٹونائیڈ

افعال و منافع: ایگزیم، مرطوب متورم جلد سینہ اور پشت پر تکلیف دہ دانے (بجی) میں مفید ہے۔  
احتیاط: کارٹی سون کے مرکبات جراثیمی اور فنگس انفکشن کی حالت میں اس مرض کی خصوصی دوا کے  
ہمراہ استعمال کرنا چاہیے۔

تجارتی مرکبات

**CUTI/CUTI-N (EUPHORIC)**

**EFCINOL PLUS CREAM (JENBURKT)**

10g tube: Rs. 21.95

**FLUCORT (LYKA) 15g: Rs. 9.47**

**FLUCORT LOTION (LYKA) 15ml: Rs. 7.95**

**SUPRICORT (GLENMARK) 15g: Rs. 8.40**

**FLUOCORTOLONE**

افعال و منافع: تمام جلدی امراض کیڑے مکوڑوں کا کاشنا، سورج کی گرمی سے ہونے والی تکلیف جلد  
کا درم بے چینی میں مفید ہے



منفی اثرات: ٹی بی آتشک اور وائرس سے پیدا ہونے والے امراض چچک خسرہ چکن پاکس میں اس کا استعمال مضر ہے  
احتیاط: ۴ سال سے کم عمر بچوں حمل کے ابتدائی ۳ ماہ اور انفکشن کی حالت میں انفکشن کی خصوصی دوا کے بغیر اس کا استعمال مناسب نہیں

### تجارتی مرکبات

COLSIPAN (GERMAN REMEDIES) 5g: Rs. 19.42 کول سی پان  
COLSIPAN-N (GERMAN REMEDIES) 15g: Rs.27.61 کول سی پان این  
ULTRAPROCT (GERMAN REMEDIES) 5g:Rs.30.50 الٹرا پراکٹ  
ULTRAPROCT SUPPOSITORIES (GERMAN REMS.) الٹرا پراکٹ سپازیٹری  
5g:Rs.30.76

### FLUCORTOLONE HEXANOATE فلو کورٹولون ہکسانیت

افعال و منافع: ایگزیم، جلد کے امراض وہ تمام امراض جس میں کارٹی سون کے مرکبات مفید رہتے ہیں موثر و مفید ہے۔

مقدار ترکیب: ابتدا میں دن میں ۳ بار آرام آنے پر دن میں ابار۔  
احتیاط: جراثیمی انفکشن میں اس کی خصوصی دوا کے ساتھ دیں، آنکھوں سے بچائیں۔

### تجارتی مرکب

ULTRALAN (GERMAN REMEDIES) 5g: Rs.42.46 الٹرالان

### HYDROCORTISONE ACETATE ہائیڈرو کارٹی سون ایسی ٹیٹ

افعال و منافع: ہر طرح کے ایگزیماترو خشک جلد کا ورم مقعد و فرج کی کھجلی میں مفید و مجرب ہے  
احتیاط: وائرل آتشک اور ٹی بی کے انفکشن میں احتیاط برتیں

### تجارتی مرکبات

CORTO QUINOL (EAST INDIA) 5g: Rs. 5.94

DAKTACORT GEL (ETHNOR) 5g:Rs. 19.60

کانو کونال  
ڈاکٹاکارٹ جیل



**DEROBIN HC**  
**WYCORT**

(GLAXO) 3g: Rs. 2.11  
(WYETH) 5g: Rs. 11.57

ڈی روہن ایچ سی  
وائی کورٹ

## ٹرائم سی نولون ایسی ٹونائیڈ TRIMCINOLONE ACETONIDE

افعال و منافع: جلد کی مختلف تکالیف میں سکون پہنچاتی ہے بطور معان استعمال کی جاتی ہے۔

### تجارتی مرکبات

**KENACOMB** (SARABHAI) 10g: Rs. 20.00  
**KENACORT** (SARABHAI) 10: Rs. 15.00  
**KINALOG-S SKIN** (SARABHAI) 10g: Rs. 18.00  
**LEDERCORT** (LEDERLE) 15g: Rs. 11.30

کیناکومب مرہم  
کیناکورٹ ٹبلٹ  
کینالوگ مرہم  
لیڈرکارت مرہم

## جرثومہ H. Pylori زخم معدہ کاشافی علاج

علاج ۱	اوی پرازول ۲۰ ملی گرام ۲ بار	کلار تھرومامی سین ۵۰۰ ملی گرام ۲ بار	ایسوسی سلین آگرم ۲ بار	مدت علاج ۷ دن	فائدہ ۹۶-۹۹% فیصد
علاج ۲	اوی پرازول ۲۰ ملی گرام ۲ بار	کلار تھرومامی سین ۵۰۰ ملی گرام ۲ بار	میٹری ٹائیڈازول ۴۰۰ ملی گرام ۲ بار	مدت علاج ۷ دن	فائدہ ۹۱-۹۵% فیصد
علاج ۳	اوی پرازول ۲۰ ملی گرام ۲ بار	کلار تھرومامی سین ۲۵۰ ملی گرام ۲ بار	ٹناڈازول ۵۰۰ ملی گرام ۲ بار	مدت ۷ دن	فائدہ ۸۸-۹۳% فیصد
علاج ۴	ریٹینی ڈین ۳۰۰ ملی گرام سوتے وقت	ایسوسی سلین ۵۰۰ ملی گرام ۳ بار	میٹری ٹائیڈازول ۴۰۰ ملی گرام ۳ بار	مدت ۳ دن پھر صرف ۳ دن ریٹینی ڈین ۳۰۰ ملی گرام سوتے وقت	فائدہ ۸۹% فیصد



## ایورویدک کی مرکب دوائیں

### نظام ہضم کی ادویہ

## ALIMENTRY SYSTEM

**ICIDINOL** Banlab Co.

آئی سی ڈی نال

افعال و منافع: معدہ کی جلن، تیزابیت، بد ہضمی، ورم معدہ میں مفید ہے۔  
مقدار و ترکیب: ۲ گولی دن میں ۳-۴ بار کھانے کے ساتھ۔  
قیمت: 1000 گولی 243.00 روپے۔

**ALSAREX** Charak Co

السا ریکس

افعال و منافع: زخم معدہ اور تیزابیت کے لئے مفید ہے۔  
مقدار: ۲ گولی دن میں ۳-۴ بار کھانے کے ساتھ ۴ سے ۶ ماہ استعمال کرائیں۔  
قیمت: 100 گولی 42.00 روپے

**AMAL JEER SYRUP** Dee Pharma

امل جیر سرپ

افعال: مشتمی ہاضم طعام اور بھوک میں اضافہ کرنے والا شربت ہے  
مقدار: ۱ چمچ دن میں ۳ بار۔  
قیمت: 200 ملی لٹر 28.00 روپے

**ANAZYME** Neo Pharma

انازائم

افعال: بد ہضمی، نفخ شکم، بھوک کی کمی، جگر اور بانقرا اس کی کمزوری درد شکم میں مفید ہے۔  
مقدار: ۵ سے ۱۰ ملی لٹر کھانے سے اگنشت پہلے قیمت: 100 ملی لٹر 16.00 روپے



**ARSHONIT Charak**

ارشونٹ

افعال: بواسیر خونی ہو یا بادی میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار ۱۰ دن تک پھر ۱ گولی دن میں ۳ بار ۶ ہفتہ تک۔

قیمت: 100 گولی 25.25 روپے فورٹ والی 100 گولی 28.00 روپے۔

**ARSOL Ban lab**

ارسول

افعال: متورم اور تکلیف دہ بواسیر کے لئے مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ گولی دن میں ۳-۴ بار بچوں کو نصف خوراک۔

قیمت: 200 گولی 34.20 روپے۔

**BIO SAL J.&J Dechane**

بایوسال

افعال: بچوں کے درد شکم، پیٹ پھولنا، نیند نہ آنا معدہ میں۔ تیزابیت اور دستوں میں مفید ہے۔

مقدار: نومولود کو ۱ چمچ ۶ ماہ تک ۱ چمچ ۲ سال کے بچوں کو ۱ سے ۲ چمچ دن میں ۳ بار

قیمت: 100 ملی لٹر 7.50 روپے

**COLI CARMIN Ban lab**

کولی کارمین

افعال: دست، اسہال، پیچش پیٹ پھولنا گیس بننے میں مفید ہے۔

مقدار: ۳ سے ۶ ماہ تک ۲ سے ۴ یونڈ ۳ سال تک ۴ سے ۶ یونڈ ۵ سال تک ۱۰ یونڈ دی جائے۔

قیمت: 30 ملی لٹر ڈراپس 17.50 روپے

**CONSTILAX Gamber**

کانسٹی لیکس

افعال: آنتوں کے افعال کی سستی، بھوک کی کمی میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ سے ۳ گولی سوتے وقت کھلائیں۔ قیمت: 50 گولی 10.00 روپے۔



**DIAREX**

Himalya drug

ڈیاریکس

افعال: دستوں (اسہال) میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ گولی دن میں ۳ بار کھلائیں۔ قیمت: 100 گولی 22.00 روپے

**DIASYN**

J&amp;J.Dechane

ڈایاسین

افعال: امیائی اور پیسلری پیچش، دستوں خصوصاً بچوں میں بہت مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ گولی ہر ۴ گھنٹہ بعد بچوں کو آدھی سے اگولی۔ قیمت: 100 گولی 17.50 روپے۔

**DIGEST**

Synthochem

ڈائی جیسٹ

افعال: بھوک کی کمی، بد ہضمی، نفخ شکم، ہضم کی کمی میں مفید ہے۔

مقدار: بائیس کے لئے ۲ چمچے دن میں ۳ بار کھانے کے بعد بھوک کے لئے ۲ چمچے کھانے سے پہلے۔

قیمت: 110 لٹر 18.75 روپے۔

**DYGEAID**

Themis Pharma ceuticals

ڈائی گید

افعال: بد ہضمی، بھوک کی کمی کو دور کرتی ہے ہضم میں مدد دیتی ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار شربت ۱ سے ۲ چمچے دن میں ۳ بار

**ENTRODARIN**

Ban lab

انٹرو ڈارن

افعال: دست پیچش، پرانی یا وقت (حادیامزمن) میں مفید ہے۔

مقدار: ۳ سے ۴ گولی دن میں ۳ بار بچوں کو ۲ سے ۲ گولی آرام آنے تک استعمال کرائیں۔

قیمت: 1000 گولی 243.50 روپے۔

**F.T.X.**

BDH

ایف۔ٹی۔ایکس

افعال: موناپا (فریبی) جسم میں چھیلے اجزاء کی زیادتی میں مفید ہے۔

ترکیب: پرچے کی ہدایت کے مطابق۔ قیمت: 10 گولی 24.60 روپے۔



## GARLILL Charak

گارل

افعال: نفع، شکم، پیٹ کے درد، اینٹھ مروڑ میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۳ گولی، دن میں ۲ یا ۳ بار کھانے کے بعد بچوں کو نصف مقدار۔

قیمت: 100 گولی 17.00 روپے۔

## GASEX Himalya Drug

گیس، ایکس

افعال: پیٹ پھولنا، گیس کی تکالیف کے لئے مفید ہے۔

مقدار: ۲ سے ۳ گولی کھانے کے بعد چبا کر کھائیں شدید ضرورت پر ہر آدھ گھنٹہ بعد۔

قیمت: 100 گولی 27.00 روپے۔

## GASOFIX Gamber

گیسو فکس

افعال: بد ہضمی، ڈکاریس، ابکائی آنا پیٹ پھولنا اور ریاحی تکالیف میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی پانی سے کھانے کے بعد۔ قیمت: 100 گولی 34.00 روپے۔

## GASTREX Ban lab

گیس ٹریکس

افعال: نفع شکم تیزابیت دور کرنے اور گیس کی تکالیف میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار بچوں کو نصف خوراک۔ قیمت: 1000 گولی 243.05 روپے۔

## GASTROMONE J.&J. Dechane

گیس ٹرو مون

افعال: نفع شکم، بد ہضمی ریاحی تکالیف کے لئے بہترین کام کرتی ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ گولی کھانے سے ۱۵ منٹ قبل یا کھانے کے فوراً بعد بچوں کو عمر کے مطابق۔

قیمت: 80 گولی 11.00 روپے۔

## GASCUT Durveshi Dawakhana P. O. DANG

DISTT. PILIBHIT

گیس کٹ

افعال: قبض، ریاحی درد شکم، پیٹ پھولنا، بد ہضمی اور گیس کی تھیف میں لاجواب ہے۔



مقدار: ۵ گرام یا اچھ پانی کے ساتھ کھانے کے بعد قبض کی حالت میں ایک چھپ سوتے وقت گرم پانی سے کھائیں۔ قیمت: 65 گرام 12.00 روپے

**HEPATOGARD** Themis Pharmaceuticals ہپاٹوگارڈ

افعال: جگر کے ورم انفکشن، تیز اور زہریلی ادویہ و اغذیہ کے استعمال سے جگر کی تکالیف میں مفید ہے۔  
مقدار: ۲ سے ۳ گولی دن میں ۳ بار سرپ ۱ سے ۲ چھپ ۳ بار بچوں کو عمر کے مطابق۔  
قیمت: 10 گولی 5.50 روپے، سرپ 100 ملی لٹر 28.00 روپے، ڈراپس 16.50 روپے۔

**HEPANORM** Themis Pharmaceuticals ہپانارم

افعال: جگر میں چربیلے اور روغنی مادوں کی زیادتی شرابی اور ذیابیطیس کے مریضوں کے امراض جگر میں بے حد مفید ہے۔

مقدار: ۱ گولی دن میں ۲-۳ بار۔ قیمت: 10 گولی 9.00 روپے ہپانارم پلس 10: 9.50 روپے۔

**HERBI TAR** J.&J. Dechane ہربی ٹار

افعال: جگر کی خرابی، جگر کا سکڑنا، انٹی بایونک دواؤں کے سبب جگر کی خرابی میں مفید ہے۔  
مقدار: پہلے ہفتہ ۲-۳ گولی کھانے سے پہلے دن میں ۲ بار دوسرے ہفتہ ۱ گولی بچوں کو نصف مقدار۔  
قیمت: 10 گولی 16.00 روپے، سرپ 100 ملی لٹر 10.00 روپے۔

**HERBOLAX** Himalya Drugs ہربو لیکس

افعال: قبض، اور آنتوں کے فعل کی سستی و خرابی میں مفید ہے۔  
مقدار: ۱ سے ۲ کپسول سوتے وقت۔ گولی ۱ سے ۳ شام کے کھانے سے قبل۔

**INFEE** Zandu ان فی

افعال: بد ہضمی اور قبض دور کرنے کے لئے مستعمل ہے۔  
مقدار: بچوں کو ۵ سے ۱۰ ابوند دن میں ۲ بار پانی کے ساتھ، بڑوں کو آدھ سے ایک چھپ پانی کے



ساتھ ۳ بار۔ قیمت: 100 ملی لٹر 19.50 روپے۔

**KYNO TOMINE** J.&J.Dechane **کائی نوٹومین**

افعال: یرقان بلغمی Catarrhal Jaundice کی کارگردہ ہے۔

مقدار: اگولی دن میں ۳ بار بچوں کو نصف خوراک سرپ ۱ سے ۲ چمچے ۲-۳ بار۔

قیمت: 100 گولی 17.00 سرپ 100 ملی لٹر 10.00 روپے۔

**LAXATE** Synthochem **لکزیٹ**

افعال: قبض دور کرنے کے لئے مفید ہیں۔

مقدار: ۱ سے ۲ کپسول پانی کے ساتھ سوتے وقت لکزیٹ فورٹ اکپسول اگر دست روکنا

چاہیں تو گرم پانی پلائیں۔ قیمت: 100 کپسول 90.00 روپے۔

**LIVMEGH SYRUP** Dee Pharma **لومیگھ سرپ**

افعال: ورم جگر، بھوک کی کمی، اور جگر کی سستی میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار قیمت: 100 گولی 19.00 روپے۔

**LIVEX** Ban lab **لویکس**

افعال: جگر کی مزمن خرابیاں، ضعف جگر، شراب کے سبب ہونے والی جگر کی خرابیوں میں مفید ہے۔

مقدار: اکپسول دن میں ۳ بار، چھوٹے بچوں کو ذرا پس ۵ سے ۱۰ ابوند۔

سرپ: ۱ سے دو چمچے دن میں ۳ بار

قیمت: 100 کپسول 15.90 روپے ذرا پس 14.45 سرپ 21.00 روپے۔

**LIVOMYN** Charak **لوومائن**

افعال: بھوک کی کمی، نقص تغذیہ نشوونما میں کمی، جگر کی خرابی میں مفید ہے۔

مقدار: سرپ ۲ سے ۳ چمچے یا ۲ یا ۳ گولی دن میں ۳ بار بچوں کو سرپ ۱ چمچے یا گولی یا ۵ سے ۱۰



بوند ڈرائپس پائیں۔ قیمت: 100 گولی 18.75 روپے۔ 100 ملی لیٹر 12.75 روپے۔

**LIVO SYN** Syntho chem **لوو سائن**

افعال: جگر کا بڑا ہونا، جگر کا سکڑ جانا، عادی قبض کی مفید دوا ہے۔

مقدار: دو کپسول دن میں ۳ بار، سرپ ۱۰ ملی لیٹر دن میں ۳ بار بچوں کو نصف مقدار دیں۔

قیمت: 100 کپسول 90.00 سرپ 110 ملی لیٹر 18.75 روپے۔

**LIVOTRIT** Zandu **لوو ٹرٹ**

افعال: متعدی ورم جگر عظم جگر، جگر کی خرابی، بھوک کی کمی میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار سرپ اچھہ دن میں ۳ بار۔

قیمت: 100 گولی 20.60 روپے 100 ملی لیٹر 19.60 روپے۔

**LIV 52** Himalya Drugs **اوفٹی ٹو**

افعال: مختلف اسباب سے ہونے والے ورم جگر میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۲ بار، بچوں کو ۵ سے ۲۰ بوند دن میں ۳ بار سرپ بچوں کو ۵ ملی لیٹر بڑوں کو

۵، ۷ ملی لیٹر دن میں ۲ بار بچوں کو عمر کے مطابق قیمت: 100 گولی 25.45 روپے سرپ 37.85

**PIPTARD** Vital care **پپٹارڈ**

افعال: تیزابیت، زخم معدہ، زخم امعاء، ڈکاریس آنا، ابکائی وغیرہ میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۳ کپسول روزانہ دودھ کے ہمراہ یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق۔

**PILEX** Himalya Drugs Co **پائی لیکس**

افعال: بواسیر خونی اور بادی میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ سے ۳ بار کھانے کے بعد ایک ہفتہ پھر ۲ گولی دن میں ۲ بار ۱ ماہ تک۔

قیمت: 100 گولی 25.60 روپے مرہم 19.05 روپے۔



**PILZANO** Gamber **پل زانو**

افعال: نئی یا پرانی دونوں طرح کی بوا سیر میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۲ بار کھانے کے بعد - قیمت: 100 گولی 31.00 روپے

**POLYMIX** Synthochem **پولی مکس**

افعال: چپش اور دست (اسہال) کی مفید دوا ہے۔

مقدار: شدید حالتوں میں ۲ کپسول دن میں ۳ بار معمولی حالت میں ۱ کپسول دن میں ۳ بار

قیمت: 100 کپسول 90.00

**REGULAX** Charak **ریگولیکس**

افعال: وقتی یا عادی قبض میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ گولی سوتے وقت پانی کے ساتھ کھلائیں -

قیمت: 100 گولی 22.00 روپے۔

**SAL PHAS** J.&J. Dechane **سال فاس**

افعال: بھوک نہی کمی، نفخ شکم (پیٹ پھولنا) اور بد ہضمی کی علامتوں میں مفید ہے۔

مقدار: بھوک کی کمی میں ۱ سے ۲ گولی کھانے سے قبل ہضم کی خرابیوں میں ۱ سے ۲ گولی کھانے

کے بعد بچوں کو نصف مقدار۔ قیمت: 100 گولی 17.50 روپے

**SAVOURYN** Ban lab **ساوورائن**

افعال: بچوں کو قولنج آنتوں کے ورم بد ہضمی، تے، اور تیزابیت میں مفید ہے۔

مقدار: عمر کے مطابق ۰.۲۵ چمچے سے ۱ چمچے اچھے دودھ میں ڈال کر پکائیں پھر چھان کر بوتل سے

پائیں ہر بار تازہ بنائیں۔ قیمت: 100 گرام 39.50 روپے



**SILIMIT**

Alarsan

سلی مٹ

افعال: موٹاپا، جسم میں زیادہ چربی جمع ہونے کو روکتی ہے۔

مقدار: اکپسول ۳ بار ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق۔

**SOOKTYN**

Alarsan

سوکٹائن

افعال: پیٹ پھولنا، بد ہضمی سے بھوک کی کمی، اور قبض میں مفید ہے۔

مقدار: بچوں کو آدھ گولی دودھ، پانی یا پھلوں کے رس کے ساتھ دن میں ۳ بار۔

قیمت: ۱۰۰ گولی 36.90

**SPOLAX**

J.&amp;J. Dechane

اسپولیکس

افعال: عادی قبض کے لئے مفید دوا ہے۔

مقدار: ۱ سے ۳ چمچ تازہ پانی سے سوتے وقت بغیر چبائے کھانا چاہیے۔ ۷۵ گرام 15.50

**ULTRA LIV SYRUP**

Jenburkt

الٹرا لوسرپ

افعال: بھوک کی کمی، کمزوری، جگر کی خرابی، دواؤں اور شراب سے ہونے والی جگر کی خرابی پر قان

میں مفید ہے۔

مقدار: بچوں کو آدھ سے اچھے دن میں ۲ بار بڑوں کو ۲ چمچ۔ قیمت: ۱۰۰ ملی لٹر 19.95

**ZANDUZYME**

Zandu

زینڈوزائم

افعال: بد ہضمی، نفخ شکم، ہضم کی خرابیاں، بھوک کی کمی میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی کھانے کے بعد قیمت ۳۰ گولی 15.00



**BLOOD****امراض دمویہ کی دوائیں****ANCARE** Vital Care

ان کیر

افعال: بواسیر خونی، جس میں خون کثرت سے نکلتا ہو مفید ہے۔  
 مقدار: ۱ سے ۳ کپسول پانی کے ساتھ دن بھر میں۔

**AYAPON** Alarsan

ایاپان

افعال: استخاضہ، رحم سے بار بار خون آنے ہر طرح کے جریان خون میں مفید ہے۔  
 مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار جب تک خون بند نہ ہو پھر ۲ گولی دن میں ۲ بار ۳ ماہ تک۔  
 قیمت: ۱۰۰ گولی 30.00

**CHINIUMCO**

J.&amp;J. Dechane

چنی مکو

افعال: رحمی جریان خون بواسیر، نکسیر، منہ حلق اور آنتوں سے جریان خون کی مفید دوا ہے۔  
 مقدار: بچوں کو ۱/۲ سے ۱ گولی بڑوں کو ۱ سے ۲ گولی دن میں ۳ بار۔ قیمت: ۱۰۰ گولی 17.50

**STYPLON**

Himalya Drug

اسٹپلان

افعال: ہر طرح کے جریان خون کو روکنے کے لئے مفید ہے۔  
 مقدار: ۲ سے ۳ گولی دن میں ۳ بار جب تک خون نہ رکے۔ خون رکنے پر ۱ سے ۲ گولی دوبار  
 ۱ ماہ تک۔ قیمت: ۱۰۰ گولی 35.85

**VITALIP**

Vital Care

وٹالپ

افعال: خون میں چربی کے اجزاء کی زیادتی، لحمی اجزاء کی خون میں کثرت شرائین کی سختی، خون کے سرخ  
 ذرات کی خرابی میں مفید ہے۔  
 مقدار: ۱ سے ۳ کپسول ایک دن میں کھلائیں۔



**SAPERA** Charak **سپیرا**

افعال: ہائی بلڈ پریشر کے لئے مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار پھر ۱۰۰ گولی ۳۱.۰۰ فورٹ گولی ۱۰۰: ۴۵.۰۰

**SERPINA** Hemalya Drug **سرپائی نا**

افعال: گردوں اور قلب کے خرابی سے ہونے والا ہائی بلڈ پریشر بچوں کا پیشاب نکل جاتا، بے چینی، اینجن گھبراہٹ، ہسٹریا، نیند نہ آنے میں مفید ہے۔

مقدار: معمولی بلڈ پریشر میں آدھی گولی شدید ہائی بلڈ پریشر میں ۲ گولی دن میں ۳ بار دورے پڑنے سے ۲ گولی دن میں ۳ بار سکون کے لئے آدھی سے ۱ گولی سوتے وقت۔

## عصبی امراض

## CENTRAL NERVOUS SYSTEM

**ALLERIN** Ban lab **ے لیرین**

افعال: دافع الرجی دوا ہے پتی اچھلنا، کھجلی، ددوڑے (چکتے) پڑنے میں مفید ہے۔

مقدار: بڑوں کو ۲ گولی دن میں ۳ بار بچوں کو ۱ گولی، قیمت: ۱۰۰ گولی ۲۹.۰۵

**BILOVAS** German Remedies **بلوواس ٹبلیٹ**

افعال: دماغی افعال میں کمی کی علامات مثلاً چکر آنا، کان بجنا، درد سر، حافظہ کی کمی، الجھن گھبراہٹ ہونا۔

مقدار: اسے ۳ گولی روزانہ چبا کر پانی کے ساتھ کھائیں قیمت: ۱۰ گولی ۶۵.۰۰

**BRAVOBOL** Ban lab **براووبول**

افعال: دماغ کو سکون پہنچانے، الجھن گھبراہٹ، بڑھاپے کی غیر طبعی حرکات میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ کپسول سوتے وقت دودھ کے ساتھ بچوں کو ایک کپسول قیمت: ۳۰ کپسول ۳۴.۰۰



**BRENTO**

Zandu

برین ٹو

افعال: حافظے کی کمزوری، دماغی نشوونما کی کمی میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ گولی دن میں ۳ بار بچوں کو ۱ گولی دن میں ۳ بار سرپ ۱ سے ۳ تہجے بچوں کو  
 اچھ ۳ بار دیر قیمت: ۵۰ گولی 16.00 سرپ ۱۰۰ ملی لٹر 19.60 - ۲ ملی لٹر 32.60

**CEPHA GRANE**

Charak

سیفا گرین

افعال: ناک کے گڑھے کا ورم، آدھاسر کا درد، تناؤ کے سبب درد سر میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار کھلائیں اور ۲ بوندوں نیتھوں میں ہر ۲ گھنٹہ بعد ۷ دن تک ڈالیں ادھا  
 سی میں سورج نکلنے سے آدھ گھنٹہ پہلے ۲ گولی کھلائیں ۱۰۰ گولی 42.00 ڈراپس 11.25

**DERMAFEX**

Ban lab

ڈرما فیکس

افعال: الرجی، جلد پر پھنسیاں مہاسے داغ پڑنا کھجلی ددورے (چکلتے) پڑنے میں مفید ہے۔

مقدار: آپسول دن میں ۳ بار دودھ کے ساتھ کھلائیں۔

مضر اثرات: جگر اور گردوں کے امراض و انفکشن میں اس کا استعمال مضر ہے۔

قیمت: ۱۰۰ آپسول 151.00

**FEUVRIL**

Ban lab

فیوورل

افعال: بخار، نزلہ زکام سردی کے لئے مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار بچوں کو ۱ گولی دن میں ۳ بار۔

مضر اثرات: گردوں اور جگر کی خرابی یا انفکشن کے سبب ہونے والے بخاروں میں دینا مضر ہے۔

قیمت: ۱۰۰۰ گولی 288.65

**HIBRIL**

Vital Care

ہائبرل

افعال: دماغی تناؤ، بے چینی، دماغ ماؤف ہوتا۔ حافظہ کی کمزوری میں مفید ہے۔



مقدار: ایک کپسول دن میں ۲ بار

**H.P 200**

Zandu

ایچ پی ۲۰۰

افعال: ہر طرح کے پارکن سنز (Parkinsonism) کی علامات میں جو دواؤں کے سبب نہ ہوں مفید ہے۔

مقدار: ۵.۷ گرام ۱۰۰ ملی لیٹر پانی میں حل کر کے فوراً پلا دیں۔ دودھ میں نہیں دینا چاہیے۔

قیمت: ۳۵۰ گرام 60.00

**MENTAT**

Himalaya Drug

مین ٹیٹ

افعال: دماغی کمزوری، حافظہ کی کمی، رات میں بستر پر پیشاب نکل جانا۔

مقدار: ۲ گولی یا ۲ چمچ سرپ دن میں ۲ بار بچوں کو ایک چمچ سرپ یا گولی دن میں ۲ بار

قیمت: ۵۰ گولی 24.00 سرپ 29.00

**NEO**

Charak

نیو

افعال: مرگی، ہلکی اور شدید جھٹکے دار مرگی دورہ پڑنے اور ارادی حرکات میں خلل کی حالت میں اور جریان منی، سرعت انزال غدہ قدامیہ کا ورم، بچوں کے بستر پر پیشاب کرنے میں مفید ہے۔

مقدار: بچوں کو گولی دن میں ۳ بار، بڑوں کو ۲ گولی دن میں ۳ بار، قیمت: ۱۰۰ گولی 28.00

**NE VOSS**

J.&J. Dechane

نیو واس

افعال: بے چینی تناؤ، گھبراہٹ اور پریشانی دور کرنے دماغ کو تسکین دینے کے لئے مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ گولی ہر ۳-۴ گھنٹہ بعد دودھ کے ساتھ بچوں کو نصف مقدار۔ ۱۰۰ گولی 17.50

**REMORIN**

J.&J. Dechane

ری مورن انجکشن

افعال: درد کمر، جوڑوں کا پتھر اچانا، عرق النساء، عصبی دردوں میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ ملی لیٹر عضلاتی ۲۴ گھنٹہ میں ایک بار لگائیں ۱۰ انجکشن 20.00



**SILEDIN**

Alarsin

سائی لی ڈین

افعال: نیند میں خلل، نیند نہ آنا، بے چینی تناؤ، عصبی کمزوری، ڈپریشن گھبراہٹ میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ گولی دن میں ۲-۳ بار قیمت: ۵۰ گولی 19.95

**VITAFIX**

Gamber

وٹا فیکس

افعال: قوت باہ کی کمی، جلق، حساسیت غیر ارادی انتشار عضو خاص میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی صبح خالی پیٹ ۲ گولی سوتے وقت۔ قیمت: ۱۰۰ گولی 39.00

**VITESSON**

J.&amp;J. Dechan

وائی ٹی شن

افعال: نفسیاتی بیماریاں، عصبی تناؤ بے چینی و گھبراہٹ میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ گولی دن میں ۳ بار بچوں کو عمر کے مطابق ۱۰۰ گولی 17.50

**VOMITAB**

Charak

وامی ٹیب

افعال: متلی، تے ابکائی، حاملہ کی تے، صبح اٹھکر ہونے والی متلی تے میں مفید ہے۔

مقدار: دو چمچے سرپ یا ۲ گولی بچوں کو نصف مقدار۔ ۵۰۰ ملی لٹر 11.25

جراثیم کش انٹی بائیوٹک ادویہ

**CHEMOTHERAPEUTIC****ALARSKIN**

Alarsin

الارس کن

افعال: چہرے کے مہاسے، جلد کا متورم ہونا، ایگزیم پتی اچھلنے، پسینہ کی زیادتی میں مفید ہے۔

مقدار: خوراک، اور قیمت پرچے کے مطابق۔



**CHIRAKIN****Zandu**

چراکین

افعال: ملیریا اور دوسرے موسمی بخاروں میں مفید ہے۔

مقدار: علاج کے لئے ۲ گولی دن میں تین بار گرم پانی سے ۳ سے ۷ دن بچوں کو نصف خوراک حفظ  
 قدم کے لئے ۱ گولی دن میں ۲ بار ۷ دن تک

منفی اثرات: حالت حمل میں دنیامنع ہے۔ قیمت: ۲۰۰ گولی 159.00

**HEMO PLEX****J.&J. Dechane**

ہیموپلکس

افعال: جلنے پھوڑے بھنسی، زخم وغیرہ میں مفید ہے۔

مقدار: باغوں کو ۲ سے ۲ گولی، دن میں ۳ بار بچوں کو نصف مقدار قیمت: ۵۰ گولی 7.50

**HERBO SULPH****J&J Dechane**

ہربوسلف

افعال: پر نے ایگزیم، اور جلد کے زخموں کے لئے بہت مفید ہے۔

مقدار: بڑوں کو ۲ سے ۲ گولی دن میں ۳ بار، گولی باریک پیس کر ۵ گنے ویسلین میں ملا کر زخموں پر

لگائیں۔ قیمت: ۱۰۰ گولی 7.50

**SULPHONAX****Gamber**

سلفونکس

افعال: مہاسے جلد پر داغ چھالے پڑنا، جلنا اور الرجی میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ گولی پانی کے ساتھ دن میں ۳ بار کھانے کے بعد ۲۰ سے ۳۰ دن تک

قیمت: ۱۰۰ گولی 34.00

**UREXYNOL****Ban lab**

یورکسائی نول

افعال: مزمن ورم گردہ، پیشاب میں رسوب crystal آتا۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار بچوں کو ۱ گولی پیشاب کی نالی کے انفلکشن میں ۲ گولی دن میں ۳ بار

قیمت: ۱۰۰۰ گولی 319.00



## غدد کی خرابی میں کام آنے والی ادویہ

### ENDOCRINE SYSTEM

**DIA BECON**

Himalya Drug

ڈایابی کون

افعال: خون کی شوگر کو نرم کرتی ہے اور ذیابیطیس کی خرابیوں کو دور کرتی ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ گولی دن میں ۲ بار قیمت: ۶۰ گولی 40.50

**GLUSET**

Vital care

گلو سیٹ

افعال: ذیابیطیس شکاری میں مفید ہے۔

**J. K. 22**

Charak

جے۔ کے ۲۲

افعال: بالغوں اور بوڑھے افراد کی ذیابیطیس میں ذیابیطیس کے آغاز میں بہت مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۲ بار قیمت: ۵۰ گولی 22.00

**MERSINA**

J&J. Dechane

مر سینا

افعال: ذیابیطیس کی ہر حالت میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ سے ۴ گولی دن میں ۳ بار کھانے سے آدھ گھنٹہ پہلے۔ ابتدا میں زیادہ مقدار دیں۔

قیمت: ۱۰۰ گولی 13.00

**TRIBANG SHILA**

Zandu

تر بنگ شیلہ

افعال: ذیابیطیس شکاری اور اس کے عوارضات میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ سے ۴ گولی دن میں ۲ بار کھانے سے پہلے۔ ۸۰ گولی 63.50



# امراض گردہ و مثانہ

## EXCRETORY SYSTEM

### ALURETIC

Allarsan

الورے ٹک

افعال: معمولی اور درمیانی درجے کا ورم، گردوں کی کمزوری، ورم گردہ قلب و پھیپھڑوں کے امتلاء میں مفید ہے۔

مقدار: اسے ۲ گولی دن میں ۳ بار۔ شام کے وقت نہ دیں۔ قیمت: ۵۰ گولی 5.70

### BANGSHEEL

Alarsan

بنگ شیل

افعال: آلات بول گردے مثانے کے دیرینہ مزمین انفکشن کے لئے مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۲ بار، ۲ سے ۳ ہفتہ کھلائیں۔ قیمت: ۵۰ گولی 27.00

### CALCUROSIN

Ban lab

کیل کیوروسن

افعال: پیشاب کی نالی میں پتھری، سنگ گردہ و مثانہ کو خارج کرنے میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۳ کپسول دن میں ۳ بار بچوں کو عمر کے مطابق۔

قیمت: ۱۰ کپسول 15.95 سرپ ۱۱۰ ملی لٹر 19.75

### CALCURY

Charak

کیل کیوری

افعال: گردے و مثانے کی پتھری خارج کرنے میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار ۷۵ گولی 28.00

### CYSTONE

Himalya Drug

سسٹون

افعال: پیشاب میں رسوب (کرسٹل) خارج ہونے پر پیشاب کی جلن انفکشن گردہ و مثانہ میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۲ بار جب تک پتھری خارج نہ ہو یا پیشاب صاف نہ ہو جائے۔ ۶۰ گولی 26.25



**KAYBEE**

Gamber

کے بی

افعال: گردے و مثانے کی پتھری، گردوں میں رکاوٹ میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: ۲ گولی پانی کے ساتھ کھانے کے بعد دن میں ۳ بار۔ قیمت ۱۰۰ گولی 34.00

**K-4**

Tablet

کے فور

افعال: غدہ قدامیہ کے ورم، ورم نازہ گردے کے پتھری نکالنے کے لئے مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار پانی یا دودھ سے۔ ۷۵ گولی 30.20

**ORUCLYN**

Charak

اور وکلائن

افعال: پیشاب میں جلن پیشاب میں خون آنا، غیر جراثیمی ورم نازہ میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار بچوں کو اگولی۔ ۷۵ گولی 28.00

**TURAI Co**

J&amp;J Dechane

ٹورائی کو

افعال: پیشاب کا تکلیف سے اور کم آنے میں فائدہ پہنچاتی ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ گولی دن میں ۳ بار پانی زیادہ مقدار میں دیں۔ قیمت: ۱۰۰ گولی 17.50

عضلات و عظام کے امراض

**MUSCULOSKELETAL SYSTEM****ARTHROM**

Vital Care

آر تھروم

افعال: جوڑوں کے درد، وجع المفاصل، جوڑوں کا پتھرا جانا، ہڈیوں کا ورم اور جڑ جانے میں مفید ہے۔

مقدار: ایکسپول دن میں ۲ بار۔



## CHESOL OIL J&J Dechane چسول آئل

افعال: جوڑوں کے درد پبلی کے درد، نمونیہ اور کھانسی میں اس تیل کی مالش کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ قیمت: ۴۰ ملی لٹر 10.00

## R. COMPOUND Alarsin ارگمپونڈ

افعال: جوڑوں کے درد، گٹھیا، موج، چوٹ ورم خون جھنے کے لئے مفید ہے۔  
مقدار: ۲ گولی، دن میں ۳ بار سے ۳ ہفتہ قیمت: ۵۰ گولی 27.45

## REMITONE Gamber ریمی ٹون

افعال: گٹھیا، جوڑوں کا پتھرا جانا، ہڈیوں کا جڑ جانا اور نئی ساخت کے بننے میں مفید ہے۔  
مقدار: ۱ گولی دن میں ۳ بار پانی سے کھانے کے بعد۔ ۱۰۰ گولی 55.00

## RHUMASYL Zandu ریوماسائل

افعال: جوڑوں کے درد، جوڑوں کا اکٹھا ہو جانا، کندھوں کا درد گردن اکڑ جانا، مہروں کا ورم موج چوٹ میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ سے ۳ ملی لٹر روغن یا آدھ انچ ٹیوب کا مرہم لے کر متاثرہ مقام پر مالش کی جائے۔  
قیمت: روغن ۳۰ ملی لٹر 26.80 مرہم ۲۵ گرام 17.00

## RHUMAYOG/RHUMAYOG with Gold Zandu ریوما یوگ / ریوما یوگ گولڈ

افعال: گٹھیا، جوڑوں کا پتھرا جانا، ریڑھ کے مہروں کا ورم، کندھوں کا درد، عرق انساء، عضلات کی پٹھن درد موج میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ گولی دن میں ۲ بار ۱۵ دن تک۔  
قیمت: ریوما یوگ ۷۵ گولی 39.50 گولڈ والی ۴ گولی 17.50



**R.PYRINE**

Ban lab

ارپائی رین

افعال: گھٹیا، جوڑوں کا پتھرا جانا، ہڈیوں کا اور م درد کندھوں کا درد، عرق النساء، موج میں مفید ہے۔  
 مقدار: پرانے دردوں میں ۲ گولی دن میں ۴ بار گرم دودھ کے ساتھ ۴ سے ۶ ماہ۔ شدید حالت  
 میں ۲ سے ۴ گولی دن میں ۳ بار۔  
 قیمت: ۱۰۰ گولی 41.80

**RUMALAYA**

Himalaya Drug

رومالیہ

افعال: مختلف اسباب سے ہونے والے ہڈیوں کے درد میں مفید ہے۔  
 مقدار: ۲ گولی دن میں ۲ بار، کریم دن میں ۲ بار لگائیں۔ ۱۰۰ گولی 22.00 کریم 19.60

**RYMANYL**

Charak

رائی مائل

افعال: گھٹیا، جوڑوں کا پتھرا جانا، نرم ہڈیوں کا اور م، نقرس کمر درد عرق النساء میں مفید ہے۔  
 مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار بچوں کو ۱ گولی۔ قیمت: ۵۰ گولی 33.75

**SUPER GESIC CREAM**

Themis

سپر جے سک کریم

افعال: نئے اور پرانے درد، کے لئے بہترین کام کرتی ہے ۳۰ گرام 26.00

**VEDNIL**

Synthochem

ویدنل

افعال: گھٹیا، جوڑوں کا پتھرا جانا اور نقرس کے لئے مفید چیز ہے۔  
 مقدار: ۱۰۰ کپسول دن میں ۳ بار۔ ۱۰۰ کپسول 90.00



# غذائیت و طاقت والے مرکبات

## NUTRITION

**ALPITONE**

Zandu

ال پی ٹون

افعال: بھوک کی کمی، الجھن، عام جسمانی کمزوری میں مفید ہے۔  
مقدار: ایک بڑا چمچ دن میں ۲ بار کھانے سے پہلے بچوں کو ایک چمچ چائے والا دن میں ۲ بار۔  
قیمت: ۳۵۰ ملی لٹر 37.00

**B. & M. PILLS**

Gamber

بی اینڈ ایم پلز

افعال: حافظہ کی کمی، بھول جانا، عام جسمانی کمزوری کے لئے مفید ہے۔  
مقدار: ۱ صبح ایک شام گرم دودھ میں شہد یا مکھن ڈال کر اس سے استعمال کریں۔ ۱۰۰ گولی 59.00

**BONNISAN**

Himalya Drug

بوننی سان

افعال: بچوں کی بھوک کی کمی، اور ہضم کی خرابی کے لئے مستعمل ہے۔  
مقدار: ۳ ماہ تک کے بچوں کو آدھ چمچ، اسل تک اچھے زیادہ عمر والوں کو دو چمچ ۳ بار۔  
قیمت: ۱۲۰ ملی لٹر 18.80

**CEVIT**

Synthochem

سی وٹ

افعال: وٹامن سی کی کمی، اسکروٹی، مسوڑھوں کا پھولنا، ضعف میں بطور معاون مستعمل ہے۔  
مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار۔ قیمت: ۱۰۰ گولی 50.00

**ELPHA**

Gamber

الفا

افعال: عام جسمانی کمزوری اور ضعف باہ کے لئے مفید ہے۔  
مقدار: ۲ گولی دن میں ۲ بار کھانے کے بعد۔ قیمت: ۱۰۰ گولی 27.00



## FATOF Malladi فاٹوف

افعال: جسم میں چربی کے اجزاء کی زیادتی، موٹاپا اور پیٹ کا بڑا ہونا، جسم کو متوازن بنانے میں مستعمل ہے۔  
مقدار: ۲ کپسول دن میں ۳ بار کھانے سے آدھ گھنٹہ پہلے ۳ ماہ تک قیمت: ۱۰۰ کپسول 239.21

## FEROLIV Ban lab فیرولو

افعال: خون کی کمی، نقص تغذیہ عام جسمانی کمزوری جگر کی سیستی کے لئے بہترین ہے۔  
مقدار: ۲ کپسول روزانہ، ۱۰ دن تک دودھ کے ساتھ بعد کو کپسول روزانہ۔ ۱۰۰ کپسول 151.90

## FORTEG Alarsan فورٹیک

افعال: نقاہت کمزوری الجھن، نفسیاتی یا عضوی نامردی کے لئے مفید ہے۔  
مقدار: ۲ گولی صبح و شام ۶ ماہ تک کھلائیں۔ قیمت: ۱۰۰ گولی 46.95

## GERI FORT Himalya Drug جیری فورٹ

افعال: عام جسمانی صحت کو بحال کرنے میں مدد اور معاون ہے۔  
مقدار: ۱ گولی یا اچھے سرپ دن میں ۲ بار قیمت: ۱۰۰ گولی 34.00 سرپ ۲۰۰ ملی لٹر 30.90

## LIPAN Ban lab لیپان

افعال: فریبی (موٹاپے) کو کم کرنے میں متوازن جسم بنانے کے لئے مفید ہے۔  
مقدار: ۲ کپسول روزانہ یا جیسا ڈاکٹر مشورہ دے۔ قیمت: ۱۰۰ کپسول 151.90

## MANOLL MALT Charak مے نول مالت

افعال: عام جسمانی کمزوری، خون کی کمی نقص تغذیہ و نقاہت کو دور کرتا ہے۔  
مقدار: ۲ چمچے یا دو گولی دودھ کے ساتھ دن میں ۲ بار قیمت: ۱۰۰ گولی 31.00 مالت 45.00



**OBENYL**

Charak

ادبی نائل

افعال: موٹاپا (فرہبی) کسی بھی طرح کی ہو مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۲ بار ۳ ماہ تک غذائی پرہیز اور ورزش کے ساتھ دوا خالی پیٹ نہ کھائیں۔

قیمت: ۵۰ گولی 22.50

**OJUS**

Charak

او جس

افعال: بھوک کی کمی، ہضم کی خرابی کو دور کر کے جسم میں طاقت پہنچاتی ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ چمچے (بڑے) ۱۵-۳۰ ملی لٹریا ۲ گولی دن میں ۲ بار۔

قیمت: ۱۰۰ گولی 28.00 ۱۰۰ ملی لٹر 26.75

**PO TENZA**

Gamber

پوٹینزا

افعال: سرعت انزال، نفسیاتی نامردی، ضعف باہ میں مفید ہے۔

مقدار: وقتی فائدے کے لئے ۳ گولی دودھ کے ہمراہ مباشرت سے قبل، مستقل طور سے ۲ گولی دودھ

کے ہمراہ کھانے کے بعد۔ قیمت: ۱۰۰ گولی 34.00

**POWER PILLS**

Gamber

پاور پیلز

افعال: ضعف باہ، نفسیاتی نامردی کے لئے مستعمل ہے۔

مقدار: ۲ گولی ۱ سے ۲ گھنٹہ قبل مباشرت، دودھ کے ہمراہ قیمت: ۱۰ گولی 30.00

**ROYAL ALFA**

Gamber

راکل الفا

افعال: ضعف باہ، خواہش نفسانی کمی میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دودھ کے ہمراہ کھانے کے بعد دن میں ۲ بار قیمت: ۱۰ گولی 39.00

**SUPER TINE**

Synthochem

سپر ٹین سرپ

افعال: عام جسمانی کمزوری، نامردی، بڑھاپے کی کمزوری میں مفید ہے۔



مقدار: ۲ بڑے چمچے، دن میں ۳ بار قیمت: ۲۰۰ ملی لٹر 28.75

**VIGORIT CAP**

Dee Pharma

وگورٹ کپسول

افعال: طاقت اور چستی کے لئے جسم میں نیا خون نیا جوش والو لہ پیدا کرتی ہے۔

قیمت: ۵۰ کپسول 325.00

**VIGOROLL**

Charak

وگورول

افعال: عام جسمانی کمزوری نقاہت ضعف کو دور کرتی ہے۔

مقدار: اچھے یا ۲ گولی دن میں ۲ بار۔ قیمت: ۱۰۰ گولی 49.00 جیلی ۵۰۰ گرام 75.00

**HONY MOON GOLD PILL**

ہنی مون گولڈ پیلز

*Dr. Abdul Jabbar* Durveshi Dawakhana 262 001

مقدار: ۲ گولی مباشرت سے قبل دودھ کے ساتھ قیمت: ۱۲ گولی 60.00

**VITON - 99**

Ban lab

وائی ٹون

افعال: غذائیت کی کمی، خون کی کمی، قوت باہ کی کمی کو دور کرتی ہے۔

مقدار: ۲ چمچے دن میں ۳ بار بچوں کو اچھے دودھ کے ساتھ شربت ۲۲۰ ملی لٹر 41.80

تولید و تناسل میں کام آنے والی ادویہ

**REPRODUCTIVE MEDICIN**

**ADDY ZOA**

Charak

ایڈائی زوا

افعال: کرم منی کا کم ہونا، بانجھ پن، نامردی میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۲ بار جب تک فائدہ حاصل نہ ہو جائے ۱۰۰ گولی 42.00



**ALOEES COMPOUND**

Alarsan

الوز کمپوٹڈ

افعال: حیض کی خرابیاں، زنانہ بانجھ پن، بندش حیض، حیض تکلیف سے آنے میں مفید ہے۔  
 مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار حیض آنے سے ۵ دن قبل شروع کریں جب تک حیض نہ آئے گولی  
 کھلائیں۔ ۵۰ گولی 16.40

**BANOVIT**

Ban lab

بے نووٹ

افعال: سرعت انزال، قوت باہ کی کمی، جریان، خواہش کی کمی اور بستر پر پیشاب کرنے میں مفید ہے۔  
 مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار دودھ کے ساتھ ۱۰۰۰ گولی 258.65

**B.H.PILLS/SHILAJEET PILL**

Gamber

بی ایچ پلز / شلا جیت پلز

افعال: عام جسمانی کمزوری، نامردی، خواہش نفسانی کی کمی میں فائدہ پہنچاتی ہے۔  
 مقدار: ۲ گولی دودھ کے ہمراہ دن میں ۳ بار کھانے کے بعد ۱۰۰ گولی 27.00

**BRAHAMDINE**

J&amp;I Dechane

برہمڈین

افعال: کثرت حیض، سیلان الرحم (لیکوریا)، حیض کی خرابی میں مفید ہے۔  
 افعال: ۲ گولی صبح ۲ گولی شام۔ ۱۰۰ گولی 17.00

**CEA TANGLE TENTS**

Synthohem

سی ٹینگل ٹینٹ

افعال: بغیر درد کے عانہ (پیڑو) کے منہ کو کھولنے والی بتی ہے۔  
 ترکیب: استعمال، ایک بتی فم رحم کے اندر رکھوائیں۔ ۱۰ بتی 95.20

**FEMIFORTE**

Charak

فیمی فورٹ

افعال: سیلان الرحم (لیکوریا) کے لئے مفید ہے۔  
 مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار پانی کے ساتھ۔ ۷۵ گولی 47.75



**FETEX PASTE**

Gamber

فی ٹیکس

افعال: بندش حیض، درد حیض اور اسقاط حمل کے لئے مستعمل ہے۔

مقدار: ۵ ملی لٹر فی ہفتہ کے حمل کے حساب سے پیسٹ کو مخصوص پچکاری سے رحم میں داخل کریں۔

**GESTONE**

Zandu

گیسٹون

افعال: حالت حمل میں خون کی کمی غذائیت کی کمی مشیمہ نہ بننا عاداتی اسقاط میں ہے۔

مقدار: ۲ چمچے دن میں ۳ بار دودھ کے ساتھ۔ ۲۰۰ گرام 84.00

**GYNEC-20**

Synthocam

گائی نیک

افعال: حیض کا بے ترتیب اور بار بار آنا کثرت حیض وغیرہ میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ چمچے دن میں ۳ بار ۱۰ ملی لٹر 18.75

**HIMCOLIN**

Himalya Drug

ہم کولین

افعال: قوت باہ میں کمی سرعت انزال اور جنسی کمزوری میں مفید ہے۔

مقدار و ترکیب: عضو مخصوص پر تھوڑا سا سرہم لے کر مالش کریں۔ ۱۰ گرام 19.70

**JERIAT**

Vital Care

جی ری آٹ

افعال: عام جسمانی کمزوری، نشوونما کی کمی، سستی کا بلی کے لئے مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ کپسول دن میں ۲ بار دودھ کے ساتھ۔

**LA VIRIL CAP**

Jenuburkt

لاورل کپسول

افعال: نامردی، مردوں اور عورتوں میں جنسی بے رغبتی، جنسی الجھن گھبراہٹ، اور سرعت

انزال میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ سے ۴ کپسول روزانہ صبح و شام پھر ۲ کپسول صرف سوتے وقت ۱۰ کپسول 51.95



**LA-FORT CAP** Jenuburkt لا فورٹ کپسول

افعال: روزمرہ کی طاقت باہر تندرستی کی بحالی کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں۔ ۱۰ کپسول 51.50

**LEPTADEN** Alarsan لیپٹاڈین

افعال: دودھ کی کمی دور کرنے میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار۔ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد شروع کر دیں ۱۰۰ گولی 26.85

**LICOGEN** Gamber لکوجن

افعال: لیکوریا، کثرت حیض اور حیض کی دیگر خرابیوں میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دودھ کے ساتھ دن میں ۲ بار کھانے کے بعد۔ ۱۰۰ گولی 39.00

**LUCUGYL** Ban lab لیو کو جل

افعال: کثرت حیض، حیض کا بے ترتیب اور بار بار آنا۔

مقدار: ۱ کپسول دن میں ۳ بار دودھ کے ساتھ ۳ سے ۶ ہفتے۔ ۱۰۰ گولی 167.10

**LUCOSYNTH-O-** syntho chem لیو کو سنتھ

افعال: سیان الرحم (لیکوریا) ورم العانہ، ورم مہبل میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ کپسول دن میں ۳ بار دودھ کے ہمراہ۔ ۶۰ کپسول 100.00

**LUCO SYNTH-V** Synthochem لیو کو سنتھ وی

افعال: پیڑو کے ورم، ورم مہبل، اور لیکوریا میں اندرونی استعمال کی نکلیاں ہیں۔

مقدار: ایک نکیہ روزانہ صبح اور سوتے وقت مہبل کے خوب اندر رکھوائیں۔ ۱۴ دن۔

قیمت: ۵۰ نکلیاں 85.00



**LUKOL**

Himalya Drug

لیوکول

افعال: لیوکوریا (سیان الرحم) کے لئے مفید ہے۔

مقدار: ۲ سے ۳ گولی دن میں ۲ بار ۱۰۰ گولی 25.00

**LUNAREX**

Charak

لیوناریکس

افعال: حیض بند ہونے حیض کے کمی سے آنے میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۲ بار حیض آنے سے ایک ہفتہ قبل شروع کریں حیض آنے پر بند کر دیں۔

قیمت: ۱۰۰ گولی 33.75

**MAMTONE**

Charak

مام ٹون

افعال: دودھ بڑھانے والا، جزل ٹانک ہے۔ مرضعہ (دودھ پلانے والی) کے لئے بہت مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ کپسول دن میں ۳ بار ۱۰۰ کپسول 159.47

**MENORIL**

Ban lab

مینورل

افعال: حیض کا بے ترتیب آنا، ابتدائی بندش حیض میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ کپسول دن میں ۳ بار۔ ۱۰۰ کپسول 30.40

**M-2 TONE**

Charak

ایم ٹون

افعال: جنسی بلوغت کی کمی، حیض کی خرابیاں، بار بار حیض آنا، حیض کی زیادتی میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ بڑے چمچے ۱۵ سے ۳۰ ملی لٹر دن میں ۳ بار ۳ ماہ تک ۲۰۰ ملی لٹر 32.00

**MYRKAP**

Zandu

مائریکپ

افعال: ولادت کے بعد جریان خون سن یا س سے قبل جریان خون، آلات منع حمل کے سبب ہونے

والے جریان خون میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ کپسول دن میں ۳ بار ۳۰ کپسول 36.00



**OAKAY PILLS**

Gambers

او کے پل

افعال: بندش حیض، حیض کے درد سے آنے (عسر الطمث) میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار پانی کے ساتھ کھانے کے بعد ۵ سے ۱۰ دن تک ۱۰۰ گولی 27.00

**OVARIN**

Ban lab

اووارین

افعال: حیض کا تکلیف سے آنا، حیض کم آنے میں مفید ہے۔

مقدار: ایکسول دن میں ۳ بار دودھ یا پانی کے ساتھ ۴ ہفتہ ۱۰۰ گولی 174.70

**OVOUTOLINE**

Zandu

اووٹولین

افعال: کثرت حیض، حیض کا تکلیف سے اور بار بار آنا، ورم رحم وغیرہ میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ گولی دن میں ۳ بار روزانہ سرپا سے ۲ تہچے،

قیمت: ۵۰ گولی 32.50 سرپ ۱۰۰ ملی لٹر 20.60

**PEP CAP**

Prem Pharma

پیپ کیپ

افعال: مردانہ بانجھ پن جنسی رغبت میں کمی، نامردی، سرعت انزال میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ کپسول روزانہ، ۱۰ کپسول 4.50

**POSEX**

Charak

پوسیکس

افعال: مختلف اسباب سے ہونے والے جریان خون کے لئے فائدہ مند ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار یا مرض کے مطابق۔ ۱۰۰ گولی 31.00

**RE PEL**

Vita Care

رے پل

افعال: سیان الرحم (لیکوریا) حیض کا تکلیف سے آنا پست کے درد میں مفید ہے۔

مقدار: ایک کپسول دن میں ۲ بار



**SATAVAREX**

Zandu

ستاوریکس

افعال: دودھ کی پیدائش میں اضافہ کرتی ہے حالت حمل میں بچے کو طاقت دیتی ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ چمچے دن میں ۲ بار دودھ کے ساتھ۔ ۲۰۰ گرام 30.80

**SENSA HERB**

Vicico lab

سین ساہرب

افعال: جنسی خواہش کی کمی سرعت انزال، عضو کے انتشار میں کمی الجھن پریشانی میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۲ بار ۱۰ دن پھر اگولی دن میں ۲ بار ۱۵ دن تک ۲۰ گولی 35.30

**SENSA SPUR**

Vilco lab

سنسا سپر

افعال: حویات منویہ کی مقدار میں کمی اور جنسی خواہش کی کمی کو دور کرتی ہے۔

مقدار: ۱ کپسول دن میں ۲ بار ۳۰ دن تک ۳۰ کپسول 121.80

**SENZINE**

J&amp;J Dechane

سین زائن

افعال: ضعف کے سبب ہونے والی نامردی میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ گولی دن میں ۳ بار ۱۰۰ گولی 17.50

**SEXTON**

Synthochem

سیکس ٹون

افعال: ضعف باہ، عضوی نامردی، جوش و انتشار کی کمی میں فائدہ مند ہے۔

مقدار: ۱ کپسول دن میں ۳ بار دودھ کے ساتھ فوری فائدہ کے لئے ۲ کپسول صبح سے قبل۔

قیمت: ۶۰ کپسول 90.00

**SPEMEN**

Himalya Drug

اے من

افعال: کرم منی کم ہونا، ورم غدہ قدامیہ میں غدہ قدامیہ کے بڑا ہو جانے میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار ۳ سے ۶ ماہ تک



**SPEMEN FORT**Himalya Drug **اپسے من فورٹ**

افعال: سرعت انزال، جریان اور جلق کی خرابیوں کو دور کرتی ہیں۔

مقدار: ۱ سے ۲ گولی روزانہ ۴ ہفتہ کھلائیں۔ ۱۰۰ گولی 34.00

**SOVERGEN**

Gamber

ساورن

افعال: لیکوریا (سیلان الرحم) کمزوری اور اعصابی الجھن میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۲ بار کھانے سے پہلے ۱۰۰ گولی 39.00

**TEN TEX FORT**

Himalya Drugs

**ٹن ٹیکس فورٹ**

افعال: مردانہ کمزوری ضعف باہ کے لئے مفید ہے۔

مقدار: دو گولی دن میں ۲ بار دودھ کے ساتھ چبا کر کھائیں ۳ سے ۴ ہفتہ تک۔ ۱۰۰ گولی 13.00

**VIGOREX**

Zandu

وگوریکس

افعال: نامردی، ضعف باہ، تکان، عام جسمانی کمزوری میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ گولی دن میں ۲ بار دودھ سے۔ ۱۵ کپسول 43.00

**VIROGEN-G**

Gambers

وروجن۔ جی

افعال: جنسی قوت کی کمی پرانی نامردی کے کیسوں میں اچھا کام کرتی ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ گولی شہد یا مکھن کے ساتھ کھانے کے بعد۔ ۲۰ گولی 70.00

**VIBRANT**

Vital Care

وائی برنٹ

افعال: جنسی خواہش کی کمی، سرعت انزال نامردی، بے رغبتی میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ کپسول دن میں ۲ بار دودھ کے ساتھ کھلائیں۔



**VYSEX**

Ban labs

وائی سیکس

افعال: ضعف باہ، جریان منی کے لئے مفید ہے۔

مقدار: ۱ گولی صبح ایک گولی سوتے وقت دودھ کے ساتھ ۳ ماہ تک ۱۰۰ گولی 250.65

## آلات تنفس کے امراض

## RESPIRATORY DISEASES

**ALLERKHAND**

Sitaram

الر کھنڈ

افعال: دمہ سے بچاؤ اور علاج کے لئے، کھانسی نزلہ آلات تنفس کے انفلشن میں مفید ہے۔  
مقدار: ۱ سے ۲ چمچے شہد یا دودھ کے ہمراہ۔

**ASMAGARD**

Malladi

ایسما گارڈ

افعال: بلغمی دمہ، پرانی کھانسی، سینہ میں درد، الرجی، اسٹوفیلیا، میں مفید ہے۔  
مقدار: ۱ کپسول دن میں ۳ بار روزانہ کھانے سے پہلے ۶ دن تک بچوں کو ۲ بار ۱۰۰ کپسول 239.21

**BRIFRIL**

Vital Care

بریف ریل

افعال: بلغمی دمہ، حاد و مزمن سعال، کھانسی ورم حلق میں مفید ہے۔  
مقدار: ۱ سے ۳ کپسول گرم پانی سے۔

**CORAZAN**

Zandu

کور ازان

افعال: نزلہ زکام ناک اور ہوائی نالیوں میں رکاوٹ، بخار، درد چھٹکیں آنے میں مفید ہے۔  
مقدار: ۱ سے ۲ کپسول دن میں ۲ بار ۱۶۰ کپسول 164.00



**CURX SYP**

Ban lab

کیوریکس

افعال: کھانسی، الرجک کف، تکلیف دہ کھانسی میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ چمچے دن میں ۳ بار سرپ ۱۰ ملی لٹر، 22.80

**GLYSAN SYP**

Dee Pharma

گلائی سان سرپ

افعال: یونانی دواؤں سے تیار کردہ کھانسی کا شربت نزلہ زکام کھانسی میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ چمچے دن میں ۳ بار ۱۰۰ ملی لٹر 25.00

**DANGINE**

J&amp;J Dechane

ڈین جین

افعال: کالی کھانسی اور دوسری تکلیف دہ کھانسی میں فائدہ کرتی ہے۔

مقدار: ۲ گولی دن میں ۳ بار بچوں کو آدھی گولی ہر ۴ گھنٹہ بعد شہد کے ساتھ ۱۰۰ گولی 17.50

**DEKOF CYN**

Allarsan

ڈی کوف سائن

افعال: کھانسی، دمہ، اسٹونفیلیا، نزلہ زکام میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ گولی یا ۲ چمچے پانی یا شہد کے ساتھ دن میں ۳ بار۔ ۱۰۰ گولی 32.75 ۱۰۰ ملی لٹر 15.65

**DESMA**

J&amp;J Dechane

ڈے سما

افعال: پرانی کھانسی اور دے کے لئے بہترین کام کرتی ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ گولی دن میں ۳۔ ۴ بار بچوں کو آدھی گولی۔ ۱۰۰ گولی 17.50

**DETONSY**

Charak

ڈی ٹون سی

افعال: نئے، پرانے ورم لوز تین اور تالو کے ورم میں مفید ہے۔

مقدار ۲ گولی دن میں ۳ بار ۷ دن تک۔ ۱۰۰ گولی 42.00



**DRILL EXPEC**

Banlab

**ڈرل سرپ**

افعال: حاد و مزمن سعال (بلغمی کھانسی) دمہ بلغمی کے لئے مفید ہے۔

مقدار: اچھے دن میں ۳ بار بچوں کو آدھا چمچہ ۱۰ ملی لیٹر 20.50

**IOBIN**

J&amp;J Dechane

**آیو بین**

افعال: نزلہ زکام کھانسی الرجی میں فائدہ پہنچاتی ہے۔

مقدار: آٹھ دن میں ۳ بار بچوں کو آدھی گولی۔ ۱۰۰ گولی 17.70

**KASKOL**

Concept

**کاس کول**

افعال: بالائی آلات تنفس کے انفیکشن، نئی و پرانی کھانسی میں مفید ہے۔

مقدار: بڑوں کو ۵ سے ۱۰ ملی لیٹر دن میں ۳ بار بچوں کو عمر کے مطابق ۱۰۰ ملی لیٹر 18.00

**KOFLET**

Himalya Drug

**کف لیٹ**

افعال: کھانسی، نزلہ زکام میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ چمچے دن میں ۲ بار ۱۰۰ ملی لیٹر 19.30

**KOFLIN**

J&amp;J Dechane

**کوف لین**

افعال: دمہ اور بلغمی کھانسی میں بہترین کام کرتی ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ گولی دن میں ۳ بار بچوں کو عمر کے مطابق ۱۰۰ گولی 17.50

**KOFOL**

Charak

**کوفول**

افعال: ورم حلق، ورم قصبۃ الریہ، ورم لوزتین میں فائدہ مند ہے۔

مقدار: ۱-۲ گولی منہ میں رکھ کر چوسیں دن میں ۵ سے ۶ بار ۱۰۰ گولی 22.50



**MEDI TAB**

J&amp;J Dechane

میڈی ٹیب

افعال: پرانی کھانسی (سعال مزمن) دمہ بلغمی میں مفید ہے۔

۲۰ گولی 4.00

مقدار: ۱ سے ۲ گولی دودھ یا شہد کے ساتھ دن میں ۲-۳ بار

**SEPTILIN**

Himalya Drug

سپٹیلن

افعال: ورم حلق، ناک کے گڑھے کا ورم، ورم لوز تین، آلات تنفس کے انفکشن میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ چمچ یا گولی دن میں ۲ بار بچوں کو نصف مقدار۔ ۱۰۰ گولی 33.85 ۱۰۰ ملی لیٹر 25.03

**SPASMA**

Charak

اسپازما

افعال: دمہ بلغمی پھپھڑوں میں ورم اور پرانی کھانسی میں مفید ہے۔

مقدار: ۲ سے ۳ چمچ دن میں ۳ بار بچوں کو اچھے ۲۰۰ ملی لیٹر 28.00

**WHOOPEX**

Synthochem

وہو پیکس

افعال: سعال مزمن، کالی کھانسی، اور خشک کھانسی میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ کپسول دن میں ۲ بار ۴ کپسول 8.00

**ZEFS**

Zandu

زیف

افعال: سردی زکام حلق کے ورم کھانسی سعال، کالی کھانسی وغیرہ میں مفید ہے۔

مقدار: ۱ سے ۲ چمچ دن میں ۳ بار بچوں کو آدھی خوراک ۱۰۰ ملی لیٹر 19.50

**ZENIF SYP**

Neo Pharma

زے نف سرپ

افعال: کھانسی، الرجک کف، سگریٹ بیڑی والوں کی کھانسی اور بلغمی دمہ میں بہت مفید ہے۔

مقدار: ۵ سے ۱۰ ملی لیٹر بچوں کو نصف مقدار دیں۔ ۱۰۰ ملی لیٹر 18.00



## مراہم لوشن جلدی بیماریاں

### TOPICAL PREPARATION

**ALARSKIN**

Alarsan

الارسکن

افعال: مہاسے چہرے پر داغ پڑنا، فٹکس انفکشن میں مفید ہے۔

**BACTIMO**

Vital Care

بکٹی مو

افعال: جلد کا ورم، ایگزیم، کھجلی جراثیمی اور فٹکس، انفکشن میں مفید ہے۔  
مقدار: ایک کپسول دن میں ۲ بار کھلائیں۔

**CLAREX**

Concept

کلاریکس

افعال: چہرے کے مہاسے پھنسیاں دور کرنے جلد کو تقویت پہنچانے کے لئے مفید ہے۔  
مقدار: دن میں ۲-۳ بار صاف کر کے لگائیں۔ ۲۵۰ گرام ٹیوب 38.00

**CUTFAR OINT**

Ban lab

کٹ فار مرہم

افعال: زخم، کٹ جانے چھالے پڑنے کے لئے بہترین کام کرتا ہے۔  
ترکیب: گرم پانی سے دھو کر زخم پر لگائیں۔ دن میں ۲ بار ۱۵ گرام ٹیوب 15.60

**DENTOSOL**

Synthochem

ڈین ٹوسول

افعال: منہ آنا (قلاع) مسوڑھوں کا ورم تالو کے ورم میں مفید ہے۔  
ترکیب: متاثرہ مقام پر روئی کی پھریری سے لگائیں۔ ۶۰ بوٹل پانی میں ڈال کر غرہ کریں۔  
قیمت: ۵ ملی لٹر 7.10



**DERMAFEX**

Ban lab

ڈرما فیکس

افعال: ایگزیم، چھاجن، چھوت دار پھنسیوں کے لئے اکسیر ہے  
 ترکیب: دن میں ابار متاثرہ مقام پر اچھی طرح لگائیں۔ ٹوب 22.00

**GUMTONE**

Charak

گم ٹون

افعال: مسوڑھوں میں ورم خون پیپ آنا اور پائیوریا میں مفید ہے۔  
 ترکیب: انگلی یا ملائم برش سے مسوڑھوں پر صبح و شام ملیں۔ ۵۰ گرام پوڈر 21.00

**G 32**

Alarsan

جی ۳۲

افعال: مسوڑھوں کے ورم پیپ آنے دانتوں میں درد، منہ آنے ورم لوز تن وغیرہ میں مفید ہے۔  
 ترکیب: استعمال ۱ سے ۲ گولی چبا کر مسوڑھوں اور دانتوں پر اور متاثرہ مقام پر انگلی سے خوب ملیں۔  
 قیمت: ۱۰۰ گولی 25.00

**KAMILLOSAN**

German Remedies

کاملوسان

افعال: ورم لٹ مسوڑھوں منہ کی غشاء مخاطی اور متعلقات کے ورم میں مفید ہے۔  
 ترکیب استعمال: منہ کے اندر دن میں ۳ بار دو اکا سپرے کریں۔ ۳۰ ملی لیٹر 49.00

**PIGMENTO**

Charak

پگ منٹو

افعال: برس، چھپ، بھلہری کے لئے مفید دوا ہے۔  
 مقدار: ۲ سے ۴ گولی دن میں ۳ بار بچوں کو نصف مقدار ۵۷ گولی 56.00

**RASGENT**

J&amp;J Dechane

رس جینٹ

افعال: رمد چشم، آنکھ میں سرخی درد جلن پانی بہنے میں مفید ہے۔  
 ترکیب: ۱۵ سے ۳۰ ملی گرام ایک بڑے چمچے میں حل کر کے دونوں آنکھوں میں ڈالیں۔ ۱۰ گرام 5.00



**RIN GO**

Synthochem

رن گو

افعال: داد کھلی، متعدی زخم، جلنے اور ایگزیمائیں مفید ہے۔

مقدار: رن گو پوڈر کسی تیل اور لیموں کے عرق میں ملا کر متاثرہ مقام پر لگائیں۔ ۰.۵۰ گرام 9.50

**RIPANTO**

J&amp;J Dechane

ری پن ٹو

افعال: عرق النساء، ٹانگ اور کمر میں درد، ریڑھ کے مہروں میں ورم و درد کے لئے مفید ہے۔

ترکیب: متاثرہ مقام پر دن میں ۲-۳ بار مالش کریں۔ ۵۰ ملی لیٹر 21.00

**SIX-C**

Ban lab

سکس سی

افعال: تراگزیم، کھلی الرجک ایگزیم اور چھالے پڑنے میں مفید ہے۔


ترکیب: متاثرہ مقام پر مرہم کی اچھی طرح مالش کریں۔ مرہم ۵ گرام 16.75

**Near Total****Ulcer Healing**

Symptomatic improvement (daytime/ night-time epigastric pain, heartburn, nausea) was better with omeprazole 20mg once daily compared with Ranitidine 300 mg per day after 2 weeks in patients treated for Duodenal Ulcer.

Gise et. al. Scandinavian J. of Gastroenterology 26:137-145,1991

in Duodenal Ulcer

**Dabur (ULZOL)**

At daily doses of 20 to 40 mg. Omeprazole consistently achieved complete healing of duodenal ulcers in about 80% of the patients after 2 weeks and in about 100% of the patients after 4 weeks.



## عرق مرت سنجیونی ڈابر

یہ حیات بخش دواؤں کا کشیدہ کیا ہوا عرق ہے، اس سے جسم میں نئی طاقت توانائی اور تازگی پیدا ہوتی ہے، پرانا بخار، ٹائی فائیڈ، پرانے دست خونی کی کمی، بے خوابی، نزلہ زکام کھانسی و ریاحی تکالیف میں مفید ہے، یہ عرق ہاضم اور معدہ جگر دل و دماغ کو قوت بخشتا ہے۔

مقدار: ۱۰-۲۰ ملی لٹر کھانے کے بعد دن میں ۲ بار۔

## درد دانت ڈابر

فینول، روغن لوگ کافور، کلوروفارم، آئل منتھاپ، روغن اجوائن سے تیار کیا جاتا ہے۔ دانت میں کیڑا لگنا، مسوڑھوں کا پھولنا، دانتوں کے درد دورم کے لئے مفید ہے۔ ۵ ملی لٹر کے پیکنگ میں آتا ہے۔

## درد کان ڈابر

یہ ٹیچر اوپیم ٹیچر اکوٹامیٹ اور گلیسرین سے تیار کردہ لوشن ہے۔ کان کے درد کے لئے مفید ہے۔

## آئی نولا ڈابر

زک سلف، بورک ایسڈ، برے رن وغیرہ سے تیار کردہ آکھ کالوشن ہے۔ آکھ دیکھنے، سرخی پانی

## ڈابر

ابن یہ بلاڈونا، افیم، ست مازو وغیرہ سے تیار کردہ مرہم ہے۔ مقعد کی کھجلی، جلن، خونی اور بادی بوا سیر، مسوں کی تکالیف کے لئے مفید ہے، ۲۲ گرام کا ٹیوب ملتا ہے۔

## ڈابر

## دب دمہ

یہ ائروپین، پوٹاشیم، ایوڈائیڈ سکونٹا وغیرہ سے تیار کردہ سرپ ہے۔ سانس کی تنگی، بلغم کارکنا، دمہ کے لئے مفید ہے۔

مقدار: ۱۰ سے ۱۵ بوند پانی میں ملا کر دن میں ۳ بار۔

## ایوڈائیڈ سار سا ڈابر

یہ مرکب انت مول، منڈی، پوٹاس ایوڈائیڈ وغیرہ سے تیار ہوتا ہے۔ خون کی صفائی کرنے، پھوڑے پھنسی کھجلی دور کرنے کے لئے مفید ہے۔ مقدار خوراک: ۲ چمچے پانی میں ملا کر صبح و شام۔

## ڈابر

## پائیریا ریمیڈی

یہ ٹینک ایسڈ، روغن لوگ، فینول، ٹیچر مرہ، ٹیچر ایوڈین، گلیسرین، ست پودینہ سے تیار کی جاتی ہے، مسوڑھوں کے درد دورم خون آنا، پائیریا منہ کی بدبودار کرنے کے لئے مفید ہے۔



بدبودار مواد کے آنے میں مفید ہے۔ کان صاف کر کے ۵-۵ قطرے صبح شام ڈالیں۔

### کھجلینا ڈابر

یہ کیلشیم سلفائیڈ سے تیار کردہ گولیاں ہیں۔ کھجلی، خارش، خون کی خرابی کے لئے کھانے والی گولیاں ہیں، ایک گولی دن میں ۳ بار۔

### کھجلینا ڈابر

روغن صندل، نیم، چال موگرہ، اجوائن سے تیار کیا جاتا ہے۔ کھجلی، پھوڑے پھنسی، زخم وغیرہ کے لئے اکیر صفت ہے۔

### کولاریا ڈابر

یہ ایک مقوی دوا ہے۔ افریقہ کی کولانامی دوا کے عرق سے تیار کی جاتی ہے۔ سانس پھولنے، دل کی دھڑکن اور کمزوری کو دور کرنے کے لئے مفید ہے۔

### لال شر ڈابر

یہ کیلشیم، سوڈیم فاسفیٹ، پوٹاشیم ہائیپوفاسفیٹ، سوڈیم بنزوئیٹ سے تیار کردہ خوش ذائقہ شربت ہے۔ یہ بچوں کی کمزوری، سوکھا، کیلشیم کی کمی میں مفید ہے، یہ خون کو بڑھاتا، ہڈیوں کو طاقت بخشتا،

آنے درد وغیرہ کے لئے مفید ہے۔

### گیسٹرینا ڈابر

لوگ، جی کھار، پپلی، ہینگ، چترک، کشتہ سنگھ، نوشادر، عرق لیموں سے تیار کردہ چٹنی ہے۔ ہاضمہ طعام، کاسر ریاچ، بھوک بڑھانے گیس کی تکالیف کو دور کرنے والی ہے۔

مقدار خوراک: ۱-۲ چمچے کھانے کے بعد۔

### گھارن ڈابر

یہ ایوڈوفارم، یوکلپٹس آئیل سے تیار کردہ لوشن ہے، یہ خراب، متعفن، بدبودار زخموں کے لئے مفید ہے اس کی ڈرینگ سے زخم صاف ہو کر بہت جلد مندمل ہو جاتا ہے۔

### کافو ڈابر

کافو اور الکحل سے تیار کردہ عرق ہے، ہیضہ کی ابتدائی حالت قے، دست، بد ہضمی درد شکم میں فائدہ کرتا ہے، ہیضہ کے ایام میں اس کا استعمال مفید ہے۔

مقدار: ۱-۲ قطرے پانی میں ملا کر دن میں ۲-۳ بار۔

### کان پپ ڈابر

یہ فارمل ڈی ہائیڈر کلوٹن ہے، کان بہنا، کان سے



مقدار خوراک: ۲ چمچے دن میں ۳ بار پانی میں ملا کر  
پلائیں۔

الی انکھ وید ناتھ

آنکھ دکھنے، سرخی، روہے وغیرہ میں مفید ہے۔

انت سالہ وید ناتھ

خون کی خرابی، جلدی امراض پھوڑے پھنسی،  
کھجلی میں فائدہ مند ہے۔

عرق کافور

کالرا، دست قے وغیرہ کے لئے مفید ہے۔

عرق پودینہ

پیٹ پھولنا، بد ہضمی کھٹی ڈکاریں۔ قے، متلی،  
بھوک کی کمی میں فائدہ کرتا ہے۔

بال امرت وید ناتھ

سوکھا، سردی زکام کمزوری میں مفید ہے۔

بواسیر مرہم وید ناتھ

بواسیر، متوں کی جلن، درد خون آنے میں مفید ہے۔

بچھو کی دوا وید ناتھ

دو شیشیوں میں پوڑا آتا ہے دونوں کو ملا کر کاٹی  
ہوئی جگہ پر ملیں۔

بچوں کو سردی زکام کھانسی بد ہضمی سے محفوظ  
رکھتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲ چمچے دن میں ۳ بار۔

پودینہ ہرا ڈابر

یہ عرق پودینہ پیپر منٹ آئل، کلوروفارم سے  
تیار کیا جاتا ہے، بد ہضمی، درد شکم، نفخ شکم، جی  
گھبراتا، کھٹی ڈکاریں، دست پیٹ کی جلن وغیرہ  
میں مفید ہے۔

۵۔ ۱۰ بوند پانی ملا کر دن میں ۳ بار،

سنی لائن ڈابر

یہ سائینڈون، آلیپان، میٹیم لکٹیت اور گلیسرین  
سے تیار کردہ مکسچر ہے، ہر قسم کے جریان خون، مثلاً  
جیض، بواسیر، حلق پھپھروں آنتوں وغیرہ سے  
خون کے اخراج کو روکنے میں مفید ہے۔

مرکیورک اولیٹ ڈابر

گلے پھولنے مرض گھیکھا کے لئے مفید ہے، گلے  
پر مرہم لگائیں جب چھالے پڑ جائیں تو بدن  
کردیں۔

لبھینا

ڈابر

جگر کی خرابی، بھوک کی کمی، قبض، بد ہضمی چکر  
آنا، نیند کی کمی، بواسیر، یرقان وغیرہ میں مفید ہے،



## چرم روگی مرہم

کھنٹی، پھوڑے پھنسی، زخم جلدی امراض میں مفید ہے۔

## دنتایشٹری

دانت کے درد، مسوڑھوں کے درم پائیوریا وغیرہ میں مفید ہے۔

## دھارا

کاسر ریاچ دوست، تے، مٹی وغیرہ میں مفید ہے۔

## گلارین

منہ کی تھنکی کے درم، گلے کی سوجن، درم لوز تین میں غرارے کے لئے۔

## ہیلر مرہم

زخم، موج، کھنٹے درد کے لئے مفید ہے۔

## کاس امرتا

نزلہ زکام کھانسی، سردی، کالی کھانسی، دمہ میں مفید ہے۔

## ملیریا ٹبلیٹ

ملیریا، تھاری، موکی بخاروں میں مفید ہیں۔ ۲ گولی دن میں ۲ بار۔

## پران دا

تھنکی کی دوا " عرق نمبر ۴

## جوڑی تاپ

طیریا، موسمی بخار، تھنکی بڑھتا، خون کی کمی کمزوری میں مفید ہے۔

## سپت گن تیل

کھنٹیا، پنوں کے درد درم، زخم وغیرہ میں مفید ہے۔

## زکامو

نزلہ زکام، کھانسی، نفلواکسٹرا میں مفید ہے۔

## برین شیب

مسکن دماغ و عضلات، دافع درد بے چینی کو دور کرتی ہے۔

## دماغ دو شاہاری

ہائی بلڈ پریشر، دماغی کمزوری، تے مٹی میں مفید ہے۔

## فلور وگری

نفلواکسٹرا، نزلہ زکام، سردی، کھانسی حلق کے درم میں مفید ہے۔

## ویدنا تھ



پاچک وٹی ویدنا تھ

بد ہضمی قولنج، ریاحی تکالیف میں مفید ہے

رکت شودھک ویدنا تھ

خون کی خرابی، کھجلی، پھوڑے پھنسی میں مفید ہے

سرپ گندھا ویدنا تھ

ہائی بلڈ پریشر اور داماغی تسکین کے لئے مفید ہے۔

سندری کلب ویدنا تھ

حیض کی خرابی، رحم کی کمزوری، لیکوریا میں مفید ہے۔

سرکٹ ویدنا تھ

مصفی خون ہے، جلدی امراض میں مفید ہے

سواس کلب ویدنا تھ

دافع درد، دافع الرجی، کھانسی و ضیق النفس میں مفید ہے۔

سوپن دوش ہری ویدنا تھ

جریان احتلام، سرعت انزال میں مفید ہے۔

گیس اتک وٹی ویدنا تھ

دافع تیزابیت، کاسر ریاح، بھوک کی کمی ریاحی درد میں مفید ہے۔

گیسول پاچک ویدنا تھ

کاسر ریاح، بھوک کی کمی، بد ہضمی میں مفید ہے۔

جیون کلب

عام جسمانی کمزوری، بھوک کی کمی، سردی

کاس وٹی ویدنا تھ

کھانسی نزلہ، گلے کے درد میں مفید ہے۔

سداھا کروٹی ویدنا تھ

کوزھ، ٹی بی، گلیوں کے بڑھنے میں مفید ہیں

لورال ویدنا تھ

خون کی کمی، جگر کی خرابی، یرقان میں مفید ہیں

مدھوماری یوگ ویدنا تھ

ہر قسم کی ذیابیطس میں مفید ہیں۔

منداکسی سنہار ویدنا تھ

بھوک کی کمی، عام کمزوری میں مفید ہے۔

مرت سنجیونی ویدنا تھ

مقوی بدن، مقوی باہ، جزل ٹانگ ہے۔



## سفوف

### نام دوا بمعہ مختصر فوائد

اشوگندہ چورن: احتلام، جریان کئی باہ  
آوی پتی کر چورن: ترشی معدہ، قبض  
پشپانگ چورن: جریان الرحم، سيلان الرحم،  
استحاضہ۔

پنج سم چورن: درد شکم، نفخ، قبض  
تالیس آدی چورن: کھانسی، نزلہ  
تر پھلا چورن: کمی بھوک، قبض،  
سار سوت چورن: امراض دماغ  
ستوپلادی چورن: کھانسی، دق  
سدرشن چورن: پرانا بخار، ملیریا  
شت شکار چورن: قبض، بد ہضمی، نفخ  
شواکھار پاجن چورن: قبض، نفخ، درد شکم،  
ہینہ۔

کرشنا آدی چورن: امراض اطفال۔

گنگادھر چورن (برہت): اسہال  
لون بھاسکر چورن: بد ہضمی، درد شکم، نفخ  
لونگ آدی چورن: بخار، کھانسی، بد ہضمی  
مدھورتن چورن: قبض و بواسیر۔

موصلی آدی چورن: احتلام، جریان، برقت منی

ہنکو آدی چورن: بد ہضمی، درد شکم، اچھارہ  
ہنکو واشٹک چورن: بد ہضمی، قولنج، نفخ

## گوگل

تریودشانگ گوگل: عرق النساء  
سنگھ ناد گوگل: پرانا گھٹیا، درد کمر، رینگیٹھن باؤ۔  
کانچنار گوگل: خنازیر

کیشور گوگل: مصفی خون، پھلہری  
گوکھشر آدی گوگل: درد گردہ، پرانا سوزاک،  
سوزاکی گھٹیا

مہاپوگرانج گوگل: تمام اقسام امراض دات  
امراض حیض، بانجھ پن  
یوگرانج گوگل: تمام امراض دات

## پشٹی (صلایہ)

پابال پشٹی: جریان خون، کھانسی، لاغری، دماغی  
کمزوری

زہر مہرہ خطائی پشٹی: بچوں کے ہرے پیلے،  
دست، سوکھا،

عقیق پشٹی: مقوی اعضائے رئیسہ، حابس دم  
مسکن و مفرح

کھریا پشٹی: حابس دم، ضعف قلب، خفقان  
مونی سیپ: بخار، کھانسی دمہ، کمزوری



## اولیہہ و پاک (مجنون)

انڈپاک: گٹھیا، نفرس  
چیون پراش اولیہہ: دق، کھانسی، دل دھڑکنا،  
کمزوری

سپاری پاک: سیلان الرحم، جریان الرحم، درد کمر  
سو بھاگیہ شٹھی: امراض زچہ  
کچ اولیہہ: اسہال، پچش، خونی باوسیر  
کنٹکاری اولیہہ: کھانسی  
مدناتند مودک: سرعت انزال  
ہر دراکھنڈ: پرانی چھپاکی

## گھی و تیل

براہمی گھرت: نیان، کند ذہن، مایخولیا وغیرہ  
پھل گھرت: سیلان الرحم، اسقاط حمل، انخرا،  
بانجھ پن  
مہاتر پھلا آدی گھرت: جملہ امراض چشم  
راری مید آدی تیل: درد دانت، ماخوہ  
جوش دہن  
مہانارائن تیل: درد ورم، فالج لقوہ موج  
چوٹ کے لئے  
برہت (مہا) لاکھشا آدی تیل: پرانا بخار دق،  
کمزوری

## حبوب یعنی گولیاں

آموات آری وٹکا: گٹھیا  
اگنی تنڈی وٹی: کمئی ہاضمہ، درد کمر وغیرہ  
اندر وٹی: سوتے ہوئے بستر پر پیشاب کر دینا،  
کثرت پیشاب  
ایلا دی وٹی: کھانسی، نفث الدم  
پلیہہ آری وٹی: تلی کا بڑھ جانا۔  
چندر پر بھا وٹی: احتلام، جریان، امراض پیشاب  
چندر کلا وٹی: احتلام، جریان، کمئی باہ  
ڈگدھ وٹی: برائے سگرہنی  
ڈگدھ وٹی تخم دھتورا والی: سوجن  
راج وٹی: بد ہضمی، تے  
کھدر آدی گٹکا: جوش دہن، خشک کھانسی  
گندھک وٹی: بد ہضمی  
لشن آدی وٹی: بد ہضمی، ہیضہ  
لونگ آدی گٹکا: کھانسی  
مرچ آدی گٹکا: کھانسی  
منڈوروٹک: یرقان، کمئی خون، سوجن  
وردھی بادھی کا وٹکا: فتن، کلانی فوط  
ویوش آدی گٹکا: نزلہ، زکام، کھانسی



مُزنوا آدی آر شٹ: ہر قسم کی سوجن  
 دراکھش آر شٹ: دق، کھانسی، کمزوری، قبض  
 دشمول آر شٹ: تلی کا بڑھ جانا  
 کُٹج آر شٹ: اسہال  
 کھدر آر شٹ: فساد خون، جذام  
 وژنگ آر شٹ: خنازیر، غدودوں کا بڑھ جانا

### رس

آر گیہ وردھنی رس: یرقان، جلندھر  
 آنند بھیرورس رمسیندر سارنگرہ والا: بخار و  
 اسہال  
 آنند بھیرورس شارنگدھر والا: بخار و اسہال  
 اُپدانش کٹھار: آتشک، پھوڑے پھنسیاں،  
 اجیرن کٹک رس (سرخ): بد ہضمی، پادی، دودھ  
 ہضم نہ ہونا۔

اچھا بھیدی رس (سیاہ): تیز جلاب آوردوا  
 ارش کٹھار رس: پادی، بواسیر  
 اشوچولی رس: بے ضرر جلاب آوردوا  
 اگنی تنڈی رس: کمی ہاضمہ کمزور غیرہ کا درد  
 اگنی کمار رس: ضعف ہاضمہ، اسہال، بد ہضمی  
 امیر رس: آتشک، آتشکی مٹھیا، فساد خون  
 انماد ہر رس: جنون، مرگی

کاسیس ادی تیل: بواسیر  
 کاسیس ادی تیل: بواسیر  
 کھشار تیل: جملہ امراض کان  
 کھربندو تیل: پرانادرد سر، بال جھڑنا، منجاپن  
 مہا بھرتگ راج تیل: امراض بال

### آسو وار شٹ

اُشیر آسو: سیلان الدم، گرمی کا بڑھ جانا  
 دراکش آسو: دق، کمزوری، کھانسی، قبض  
 چندن آسو: سوزاک، دشواری پیشاب  
 سارو آدی آسو: فساد خون  
 کماری آسو: پرانا بخار، تلی و جگر کا بڑھ جانا  
 کنک آسو: دمہ  
 لوہ آسو: کمی خون، تلی کا بڑھ جانا، کمزوری  
 ابھیا آر شٹ: قبض، بواسیر  
 ارجن آر شٹ: امراض دل  
 اشوک آر شٹ: سیلان الرحم، جریان الرحم  
 اشوگندھ آر شٹ: ہشربا، جنون دماغی و  
 جسمانی کمزوری۔  
 امرت آر شٹ: پرانا بخار  
 برہمی آر شٹ: نسیان، کند ذہنی، مانجولیا، جنون  
 وغیرہ



رس آدی وٹی (جدید): بخار، قے، متلی،

زیادتی پیاس

رس پیپری (عام): جملہ امراض بچکان

سدھ پرائٹر ایشور رس: بخار و اسہال کا  
مرکب ہونا، سگر ہنی،

سروانگ سند رس: دق، کھانسی

سمرتی ساگر رس: مرگی

سوت شیکھر رس: بخار، ترشی معدہ، ہچکی

سومنا تھ رس: کثرت پیشاب

شرنگار ابھر رس: کھانسی، دق

شرود جر رس: سردرد

شری بے منگل رس: پرانا بخار

شری من متھ رس: کمکی باہ، سرعت انزال

شواس چنٹا منٹری رس: دمہ

شواس کٹھار رس: دمہ

شول گج کیسری رس: درد پیٹ

کال آری رس: سپنات، بخار

کامنی و دراونٹرس: سرعت انزال

کرپور رس: دست آنا، پچیش، ہیضہ

کرشن چترکھ رس: جنون، مرگی، ہڈیان، نمونیہ۔

کرمی مدگر رس: کرم ہائے شکم

کستوری بھیرو رس: نمونیہ، میعاد بخار نبض

کی کمزوری

کف کرتری رس: کھانسی، دمہ

کف کیتور رس: نزلہ وزکام

کنک سند رس: بخار و اسہال کا مرکب ہونا  
سگر ہنی

گر بھ پال رس: اسقاط، انھراہ

گر بھ چنٹا منٹری رس: امراض حاملہ مستورات

گر ہنٹری کپاٹ رس: سگر ہنی

گندھک رسائن: مصفی خون

گندمالا کنڈن رس: خنازیر

گنگادھر رس: اسہال و پچیش

گھوڑا چول رس: بے ضرر جلاب آور دوا

لکشمی نارائنٹرس: میعاد بخار، پر سوت بخار

لکشمی دلاس نارویہ: احتلام، جریان، ضعف

باہ، نزلہ وزکام۔

لوکنا تھ رس: جگر و تلی کا بڑھ جانا

لیلا و لاس رس: ترشی معدہ

مرتیورنجہ رس: بخار اتارنے کے لئے

مہاجورا نلش: ملیریا بخار

مہا گندھک رس: بچوں کے قے اور دست

مہا لکشمی و لاس رس: میعاد بخار، نمونیہ،

زکام، کمزوری



ویتال رس: سنپات، بخار، ہڈیان  
ہر دیہ آر نثر و رس: دل کا دھڑکنا و پھڑکنا  
ہنگلیشور رس: بخار، گھٹیا۔

### لوہ و منڈرور

اٹل پت آنتک لوہ: ترشی معدہ  
برہت سر و جور ہر لوہ: پرانا بخار، کمی خون  
پٹ پکو و شم جور آنتک لوہ: پرانا بخار کمی خون  
پردر آری لوہ: جریان الرحم، سیلان الرحم  
پردر آنتک لوہ: جریان الرحم، سیلان الرحم  
پنر نوا آدی منڈور: یرقان، بھس، کمی خون  
تریہ او شنر آدی لوہ: ورم گردہ (نفرائینس)  
دھاتری لوہ: ترشی معدہ، درد پیٹ  
دیگر دھاتری لوہ: ترشی معدہ، درد پیٹ  
سپت امرت لوہ: امراض چشم  
سر جور ہرہ: پرانا بخار، کمی خون  
نواٹس لوہ: کمی خون، کمزوری،  
و شم جور آنتک لوہ: پرانا بخار، کمی خون  
یکرت پلیمہاری لوہ: امراض جگر و تلی

### کوی پکورس

تال سندور: فساد خون  
سدھ مکردھونج: رسائن، نامردی، کمزوری،

مہاناراج رس: تیز جلاب آورد  
نرپتی ویلھ رس: سگرہنی، ہیضہ  
نتیہ اودت رس: بواسیر  
وات کلانتک رس: مرگی  
بال کلیانتر رس: بچوں کے دست  
برہت ہنگلیشور رس: زیادتی ذکات حس،  
جریان، کمزوری

برہت پورنتر چند رس: نامردی، ترشی معدہ  
برہت کستوری بھیسرو: نبض کی کمزوری، ہڈیان،  
مٹی باہ سنپات  
برہت وات چٹنا منٹری رس: جنون، مرگی،  
بسنیا، ہڈیان، کمزوری باہ۔  
بسنیت کسما کر رس: ذیابیطیس، احتلام، جریان،  
مٹی باہ  
بسنیت مالتی رس: دق، پرانا بخار، میعاد بخار،  
سیلان الرحم۔

بول بدھ رس: سیلان الدم  
پرانٹر ولجھ رس: یرقان  
پر تاب لنگلیشور رس: پر سوت، بخار، سنپات،  
بسنیا

پردر آنتک رس: سیلان الرحم  
پردر پورس: کھڑت طمٹ



## پرپٹیاں

بول پرپٹی: جریان الرحم، جریان خون، خونی بواسیر  
 پنج آمرت پرپٹی: سگر بنی، رس پرپٹی، سگر بنی،  
 اسہال

سورنٹر پرپٹی: سگر بنی، دق  
 لوہ پرپٹی: سگر بنی، کمی خون

نبض کی کمزوری

مکر دھوج سادہ: سدھ مکر دھوج کی مانند لیکن

کم زود اثر

رس سندور: لقوہ، فالج، فساد خون، مقوی باہ

مل سندور: یوگ واہی

سمیر پنگ رس (فل لگن): فالج لقوہ

سمیر پنگ رس (اوردھ لگن): فالج لقوہ

سورنٹر بنگ: احتلام، جریان، سیلان الرحم،

سوزاک



## دماغ اور اعصاب کی بیماریاں

### دردِ سر اور آدھا سیسی کا درد

**اطریقہ نقلِ زمانی** نزلہ و زکام، دردِ سر، دورانِ سر (سر چکراتا) آدھا سیسی کا درد، قویٰ لور ملٹو لیا میں مفید ہے۔ قبض کو دور کر کے آنتوں کو فضلات سے پاک کرتا ہے۔  
مقدارِ خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک عمر کے مطابق۔  
طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ یا پانی سے کھائیں۔

**اطریقہ نقلِ سنائی** پرانے دردِ سر، آدھا سیسی کا درد لور دورانِ سر (سر چکراتا) میں استعمال کیا جاتا ہے لور قبض کو بھی دور کرتا ہے۔  
مقدارِ خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک عمر کے مطابق۔  
طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ یا پانی سے کھائیں۔

**اطریقہ نقلِ کشنیری** دماغ لور معدے کو قوت دیتا ہے۔ قبض کو دور کرتا

ہے۔ اس کے لگاتار کھانے سے دائمی نزلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ نزلہ سے پیدا ہونے والی تمام بیماریاں مثلاً دردِ سر، سر چکراتا، آنکھوں کی سرخی بھی اس کے

استعمال سے دور ہو جاتی ہے۔ ناک، کان کا درد اور تبخیر رک جاتی ہے۔

مقدارِ خوراک: ۱۰ گرام  
طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت یہ طریقہ نقلِ پانی سے کھائیں۔

**اطریقہ نقلِ ملین** پرانے دردِ سر، دورانِ سر لور آدھا سیسی کو دور کرنے کے لئے بہت اچھی دوا ہے، قبض کو دور کرتا ہے، نزلہ و زکام لور ان کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے لئے خاص طور پر مفید ہے۔

مقدارِ خوراک: ۱۰ گرام  
طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ یا پانی سے کھائیں۔

**ایار ج فیکر** پرانے دردِ سر میں مفید ہے۔ معدہ لور آنتوں کو غلیظ مواد سے پاک صاف کرتا ہے۔

مقدارِ خوراک: ۳ گرام  
طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت پانی سے گل لیں۔

**حب ایار ج** یہ گولیاں دماغ کو بلقی فضلات سے پاک صاف کرنے کے لئے مخصوص



بار بار سر پر رکھیں، درد سر میں سر اور پیشانی پر لگائیں۔  
**قرص مثلث** یہ قرص سر کے درد اور  
 آدھا سیس کے درد کو تسکین  
 دیتے ہیں۔

طریقہ استعمال: ایک تکیہ پانی میں گھس کر پیشانی اور  
 کہنیوں پر لگائیں۔

### ضعف دماغ

اٹریفل مقوی دماغ یہ اٹریفل دماغ کو  
 طاقت بخشتا ہے،  
 آنکھوں کی روشنی کو قائم رکھتا ہے۔ دائمی نزلہ اور درد سر  
 میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام  
 طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت یا صبح کو دودھ سے  
 کھائیں۔

دماغ کو طاقت دینا  
**خمیرہ گاؤز باں سادہ** ہے، دل کی تقویت  
 کے لیے بھی مفید ہے۔ چھان، دوساں اور ملٹولیا کو دور  
 کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام  
 طریقہ استعمال: چائے کے ورق میں پیٹ کر صبح کو  
 کھائیں۔

دل و دماغ کو طاقت  
**خمیرہ گاؤز باں عنبری** دیتا ہے، دل کی  
 تھکاوٹ اور خیالات کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ آنکھوں  
 کو طاقت دیتا اور ذہن و حافظہ کو بڑھاتا ہے۔ اس کا روزانہ

ہیں۔ پرانے درد سر، سر کی اور دوسرے دماغی امراض میں  
 استعمال کی جاتی ہیں۔

مقدار خوراک: ۳ گرام

طریقہ استعمال: یہ گولیاں صبح عام کے بعد صبح  
 خاص (صبح دماغ) کے لئے معالج کے مشورے سے  
 اس طرح استعمال کی جاتی ہیں کہ جب چار گھنٹہ رات  
 باقی رہتی ہے تو یہ گولیاں عرق گاؤز باں ۱۲۵ ملی لیٹر یا کسی  
 دوسرے بدرق سے کھا کر سوجاتے ہیں۔ صبح کو جاگنے  
 کے بعد مسلسل پیتے ہیں۔

دماغ کی خشکی کو دور کرتا، نیند لاتا ہے  
**روغن بنفشہ** اور درد سر کو دور کرتا ہے۔

طریقہ استعمال: سر پر مالش کریں اور پیشانی پر بھی  
 لگائیں۔

گرمی سے پیدا شدہ درد سر کو دور کرتا  
**روغن کاہو** ہے، دماغ کی خشکی کو دور کر کے  
 ٹھنڈک پیدا کرتا اور نیند لاتا ہے۔

طریقہ استعمال: سر اور پیشانی پر لگائیں اور ناک کان  
 میں بھی قطرے ڈالیں۔

گرمی سے پیدا ہونے والے درد سر  
**روغن کدو** کو دور کرتا ہے، دماغ کی خشکی کو دور  
 کر کے ٹھنڈک پیدا کرتا اور نیند لاتا ہے۔

طریقہ استعمال: سر اور پیشانی پر لگائیں اور ناک کان  
 میں بھی ایک دو قطرے ڈالیں۔

سرسام میں مفید ہے۔ گرمی سے  
**روغن گل** پیدا ہونے والے درد سر کو دور  
 کرتا ہے۔

طریقہ استعمال: سرسام کے شروع میں روغن گل،  
 عرق کلاب اور سرکہ خالص ملا کر کپڑے یا روئی کی مدد سے



**مجنون برہمی** ضعف دماغ میں نہایت مفید ہے ، دماغ کو طاقت دیتی اور

ذہن و حافظہ کو بڑھاتی ہے۔

مقدار خوراک : ۱۰ گرام

طریقہ استعمال : صبح کو نہار منہ دودھ سے کھائیں۔

**مجنون نقرہ** یہ مجنون دل و دماغ کو طاقت دیتی ہے ، تفریح بخشتی ہے ، ضعف

اعصاب اور ضعف باہ کو بھی دور کرتی ہے۔

مقدار خوراک : ۵ گرام

طریقہ استعمال : صبح سویرے نہار منہ کھا کر اوپر سے

۲۵۰ ملی لٹر دودھ پی لیں۔

**مفرح مشکیں** دماغ کو طاقت دینے اور ذہن و حافظہ کو قوت بخشنے کے لیے

بہترین دوا ہے۔ تمام دن کا تھکا ہوا دماغ اس کی ایک

خوراک کے استعمال سے تازہ ہو جاتا ہے۔ دماغی کام

کرنے والوں کے لیے خاص طور پر مفید ہے۔

مقدار خوراک : ایک گرام

طریقہ استعمال : صبح سویرے نہار منہ یا بوقت ضرورت

۲۵۰ ملی لٹر دودھ سے کھائیں۔

## سر چکراتا

سر چکراتے میں اطرینفل اسٹو خودوس ، اطرینفل

زنائی ، اطرینفل سنائی ، اطرینفل کشیزی ، اطرینفل ملین ،

خمیرہ گاؤزباں عنبری ، خمیرہ گاؤزباں عنبری جواہر والا ، کشت

مرجان سادہ ، کشت مرجان جواہر والا مفید ہیں۔ ان سب کا

بیان ”درد سر“ اور ”ضعف دماغ“ میں ہو چکا ہے۔

حب جواہر ، دواء المک معتدل ، نوشدارو لولوی اور

استعمال دماغی کام کرنے والوں کے لیے مفید ہے۔

مقدار خوراک : ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک۔

طریقہ استعمال : صبح کو نہار منہ یا بوقت ضرورت کھائیں۔

لوپر لکھے ہوئے

**خمیرہ گاؤزباں عنبری جواہر والا** خیروں کے

مقابلے میں زیادہ طاقت ور اور جلد اثر کرنے والا ہے ، دل

و دماغ کو قوت دینے اور فرحت بخشنے کے لیے نہایت مفید

ہے۔ دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے اور ذہن و حافظہ کو

بڑھاتا ہے ، عام جسمانی کمزوری کے لیے بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک : ۵ گرام

طریقہ استعمال : صبح سویرے نہار منہ یا بوقت ضرورت

کھائیں۔

**خمیرہ گاؤزباں عنبری جواہر والا خاص** لوپر

لکھے ہوئے خمیرے جیسے صفات رکھتا ہے ، لیکن اس کے مقابلے

میں زیادہ قوی الاثر ہے ، بہت جلد اپنا اثر دکھاتا ہے۔

مقدار خوراک : ۵ گرام

طریقہ استعمال : صبح سویرے نہار منہ یا بوقت ضرورت

کھا کر اوپر سے دودھ یا پانی پی لیں۔

**روغن بادام شیریں** دماغ کو طاقت دیتا اور اس

میں تراوٹ پیدا کرتا ہے ،

خیندلاتا ہے۔ اندرونی طور پر استعمال کرنے سے قبض

کو دور کرتا ہے اور بدن میں قوت و حرارت پیدا کرتا ہے۔

مقدار خوراک : ۵ ملی لٹر سے ۱۰ ملی لٹر تک۔

طریقہ استعمال : سر پر لگائیں ، ناک اور کان میں

پکائیں۔ قبض کو دور کرنے کے لئے مقررہ مقدار میں

۲۵۰ ملی لٹر دودھ میں ملا کر پیئیں۔



روغن خشخاش سر پر لگانے سے نیند لاتا ہے اور  
گر می سے پیدا ہونے والے درد  
کو دور کرتا ہے۔

طریقہ استعمال: سر پر لگائیں، ناک اور کان میں پکائیں۔  
روغن لبوب سبب بے خوابی میں مفید  
ہے۔ سر پر لگانے سے  
دماغ میں ترلوث پیدا کرتا اور نیند لاتا ہے۔  
طریقہ استعمال: سر پر آہستہ آہستہ مالش کریں اور  
ناک کان میں پکائیں۔

## لو لگنا

شربت روح افزا شربت روح افزا اگر میوں کی  
شدت میں جب کہ بعض  
آدمی لو لگنے سے بیمار ہو جاتے ہیں، شربت روح افزا بہت  
مفید ثابت ہوا ہے۔ گرمی کی شدت سے جبکہ پیاس  
بے حد لگ رہی ہو، بدن میں آگ سی لگی محسوس ہو  
اور دل و دماغ پر افسردگی چھائی ہو، شربت روح افزا  
کے پیتے ہی سکون محسوس ہونے لگتا ہے۔  
مقدار خوراک: ۵۰ ملی لٹر  
طریقہ استعمال: پانی میں ملا کر اور حسب خواہش برف  
ڈال کر پیئیں۔

## مرگی

خمیرہ گاؤزباں غبری جدوار عود صلیب والا  
یہ خمیرہ مرگی کے مریضوں کے لیے خاص طور پر مفید  
ہے۔ بچوں کی مرگی (ام الصمان) اور مستورات کے  
مرض احتقاق الرحم (مشریا) میں بھی فائدہ دیتا ہے۔

خمیرہ مردارید بھی سر چکرائے میں فائدے دیتے ہیں۔  
ان کا بیان "ضعف قلب" میں آگے آئے گا۔

## نسیان۔ بھول

شربت اسطوخودوس نسیان اور اختلاج میں  
مفید ہے۔ بلغمی اور  
سوداوی مادوں کو آسانی سے نکالتا ہے۔  
مقدار خوراک: ۴۰ ملی لٹر  
طریقہ استعمال: معالج کے مشورے سے یہ شربت  
عرق گاؤزبان ۱۲۰ ملی لٹر میں ملا کر پیئیں۔

مجمون نسیان نسیان (بھول) کی خاص دوا ہے۔  
یہ قوت حافظہ اور ذہن کو بڑھاتی  
ہے۔ کند ذہن اور غبی بچوں کے لیے یہ مجمون بہت مؤثر  
ہے۔ اس سے ذہن کی ذہنی قوتیں کھلتی ہیں۔ بوڑھوں کے  
مرض نسیان میں بھی مفید ہے۔  
مقدار خوراک: ۵ گرام  
طریقہ استعمال: یہ مجمون صبح یا رات کو سوتے وقت یا  
دونوں وقت کھائیں۔ ہر قسم کی کھٹی چیزوں سے  
پرہیز کریں۔

## بے خوابی۔ نیند نہ آنا

اکسیر شفا نیند لانے کے لئے نہایت مفید  
دوا ہے۔ اس کا بیان "جنون" میں ہے۔  
روغن بادام، روغن کاہو اور روغن کدوسر پر لگانے سے  
نیند لاتے ہیں۔ ان کا بیان "درد سر" میں ہو چکا ہے۔



کھائیں۔

فالج و لقوہ میں مفید ہے پٹوں پر  
روغن دھتورہ ممکن تاثیر کرتا اور ان کے  
دردوں کو تسکین بخشتا ہے۔

طریقہ استعمال: مالش کر کے اوپر سے روئی گرم کر کے  
باندھیں۔

فالج و لقوہ، گھٹیا، عرق النساء،  
روغن سرخ نقرس اور کمر کے درد کے لیے  
مفید ہے۔ چوٹ کا درد بھی اس کے استعمال سے دور  
ہو جاتا ہے۔

طریقہ استعمال: نیم گرم کی مالش کر کے اوپر سے روئی  
گرم کر کے باندھیں۔

فالج و لقوہ، گھٹیا، عرق النساء اور درد  
روغن سیر کمر میں مفید ہے۔

طریقہ استعمال: نیم گرم مالش کر کے اوپر سے روئی گرم  
کر کے باندھیں۔

فالج و لقوہ، رعشہ اور گھٹیا میں  
روغن قسط مفید ہے

طریقہ استعمال: نیم گرم مالش کر کے اوپر سے روئی  
گرم کر کے باندھیں۔

فالج و لقوہ، گھٹیا اور درد کمر کو دور  
روغن لوبان کرتا ہے۔

طریقہ استعمال: نیم گرم مالش کریں اوپر سے روئی  
گرم کر کے باندھیں۔

قرص آسیر فالج و لقوہ فالج و لقوہ میں مفید ہیں۔  
مقدار خوراک: ایک بکیہ۔

طریقہ استعمال: صبح و شام دونوں وقت ۱۰ گرام شد میں  
ملا کر کھائیں۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ خیرہ صبح کو چھایا معالج کے  
مشورے سے کسی چیز کے ساتھ کھائیں۔

قرص عود صلیب یہ قرص مرگی میں  
مفید ہیں۔

مقدار خوراک: ایک قرص

طریقہ استعمال: صبح و شام پانی سے کھائیں

### فالج و لقوہ اور رعشہ

حب لذاراتی (پکڑی کولیاں) اعصاب کو طاقت  
دیتی ہیں، فالج و

لقوہ اور گھٹیا وغیرہ بلغمی امراض میں مفید ہیں۔

مقدار خوراک: ایک گولی

طریقہ استعمال: کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت  
کھائیں۔

دواء المسک حار جو اہر والی اعضائے رئیسہ  
(دل، دماغ، جگر) کو

طاقت دیتی ہے۔ وحشت اور ملٹولیا میں مفید ہے۔ فالج و  
لقوہ، رعشہ وغیرہ عصبی و بلغمی امراض میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ دوا صبح کو ۱۲۵ ملی لٹر عرق گاؤ زباں یا  
معالج کے مشورہ سے کسی چیز کے ساتھ کھائیں۔

دواء المسک حار سادہ فالج و لقوہ، رعشہ  
وغیرہ عصبی و بلغمی

امراض میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ دوا صبح کو عرق گاؤ زباں ۱۲۵  
ملی لٹر یا معالج کے مشورہ سے کسی چیز کے ساتھ



## خدر۔ سن بہری

معجون خدر خدر (سن بہری) کے لیے مفید ہے۔  
مقدار خوراک: ۵ گرام  
طریقہ استعمال: یہ معجون صبح یا صبح و شام دونوں وقت  
کھا کر لو پر سے پانی پی لیں۔

## ملٹولیا۔ جنون (پاگل پن)

اکسیر شفا یہ جنون اور پاگل پن کی بہترین دوا  
ہے۔ اس کے استعمال سے اس مرض  
کے عوارض بہت جلد دور ہو جاتے ہیں۔ جنون جو اختلق  
الرحم (مسیخیا) کی وجہ سے ہو وہ بھی اس کے استعمال سے  
اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ دماغ اور اعصاب کو تسکین دیتی اور نیند  
لائی ہے۔ خون کا دباؤ بڑھ جائے (ہائی بلڈ پریشر) میں بھی  
مفید ہے۔

مقدار خوراک: ایک ٹکیہ

طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت کھا کر لو پر سے  
۲۵۰ ملی لٹر دودھ پی لیں۔

شر بہت احمد شاہ ملٹولیا میں مفید ہے، دل، دماغ  
کو طاقت دیتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵۰ ملی لٹر سے ۳۵۰ ملی لٹر تک

طریقہ استعمال: عرق کاؤزباں ۱۲۵ ملی لٹر یا پانی میں  
ملا کر پیئیں۔

معجون نباح ملٹولیا اور دوسرے سوداوی  
امراض میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک۔

طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت دودھ سے  
کھائیں۔

کشتہ ہڑتال ورتی قانج و لقوہ، رعشہ، بوج  
مغاسل (مٹھیا)، ہلٹی کھائی  
لور دودھ کے لیے مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۳۰ ملی گرام یا ایک قرص

طریقہ استعمال: یہ کشتہ شدہ خالص ۱۰ گرام میں یا بکھن یا  
ملائی میں ملا کر کھائیں۔

معجون اذراقی یہ معجون قانج و  
لقوہ، رعشہ، مٹھیا اور

دوسرے عصبی و ہلٹی امراض میں مفید ہے۔ بچوں کو  
طاقت دینے کے لیے بہت اچھی دوا ہے۔ سردیوں کے  
موسم میں بوڑھے آدمیوں کو اس کا استعمال سردی کے  
نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔

مقدار خوراک: ۳ گرام

طریقہ استعمال: یہ معجون کھانا کھانے کے بعد  
دونوں وقت کھائیں۔

معجون جو گراج گوگل قانج و لقوہ، رعشہ  
مٹھیا و غیرہ عصبی و

ہلٹی امراض میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت یہ معجون  
کھا کر لو پر سے ۲۵۰ ملی لٹر دودھ پی لیں۔

معجون سیر جلوی خانی قانج و لقوہ، مٹھیا،  
نقرس، عرق النساء

و غیرہ عصبی و ہلٹی امراض میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: صبح یا رات کو سوتے وقت پانی سے  
کھائیں۔



## آنکھوں کی بیماریاں

تیار کیا جاتا ہے، بینائی کو بڑھاتا اور اسے آخر عمر تک قائم رکھتا ہے۔ روزانہ لگاتار لگاتے رہنے سے آنکھوں کو تمام بیماریوں سے بچاتا ہے۔  
طریقہ استعمال: صبح اور رات کو سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔

### نزول الماء۔ موتیابند

کل الجواہر جو اوپر لکھا گیا ہے، نزول الماء (موتیابند) میں بھی مفید ہے۔

### ضعف بصارت۔ بینائی کی کمزوری

سرمدہ زرگی یہ ایک بہترین سرمہ ہے، بینائی کو طاقت پہنچاتا ہے، آنکھوں کو روشن اور چمک دار بناتا ہے، روہے، جالے، پھولے اور ناخنہ کو دور کرتا ہے۔

طریقہ استعمال: صبح اور رات کو سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔

کل الجواہر یہ آنکھوں کو تقویت دینے والا لاجواب سرمہ ہے جتنی اجزاء سے

## کان کی بیماریاں

دردوں کو تسکین دینے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔  
طریقہ استعمال: ۵ گرام لے کر کان کے چاروں طرف نیم گرم لگائیں۔

قلزم ۲ قطرے روغن گل آٹھ قطرے میں ملا کر نیم گرم کان میں چکائیں۔ کان کے درد کو تسکین دیتا ہے۔ مشترک فائدہ رکھنے والی دواؤں میں مذکور ہے۔

### کان کا درد

روغن ترب کان کے درد کو دور کرتا ہے۔

طریقہ استعمال: روئی کی پھیری بھگو کر ۲-۳ قطرے نیم گرم کان میں چکائیں۔

ضماد راحت کان کے درد کو تسکین دیتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے اعضاء کے



### بہرہ پن۔ اونچا سننا

روغن سباعت کشا کم سننا، اونچا سننا اور کان بچنا  
کی شکاجوں میں مفید ہے۔  
طریقہ استعمال: ۲-۳ قطرے نیم گرم صبح و شام کان  
میں پکائیں۔

### کان کا بہنا

کان بننے کی حالت میں اطریفل شاہترہ اور صافی کا استعمال  
بھی مفید ہے۔ بچوں میں "نومال ہے بی ٹانگ" بھی  
فائدہ دیتا ہے۔ چائے کا ایک ایک چمچ دن میں دو بار دیں۔

### طنین و دوی (کان کی جھنجھاہٹ اور بھنجھاہٹ)

اطریفل زمانی، اطریفل کشیزی اور اطریفل ملین کا استعمال  
طنین و دوی میں مفید ہے۔ ان کا بیان گذشتہ صفحات میں  
ہو چکا ہے۔

### کان کی پھنسیاں

مرہم کافور کان کی پھنسیوں کے لیے نہایت  
مفید ہے۔

طریقہ استعمال: نیم کے تھوں کے جو شائدہ سے کان کو  
دھو کر پھنسیوں پر لگائیں۔

اطریفل شاہترہ اور صافی جو فساد خون کی بیماریوں میں لکھی  
گئی ہے، کان کی پھنسیوں میں بھی مفید ہے

### کان کی کھجلی

کان کی کھجلی کو دور کرنے کے لیے اندرونی طور پر  
اطریفل شاہترہ اور صافی استعمال کرائیں یا قلوبم ۲  
قطرے روغن گل ۵ قطرے میں ملا کر نیم گرم  
پکائیں۔

## ناک کی بیماریاں

طریقہ استعمال: اس تیل کے ۳-۴ قطرے نیم گرم  
ناک میں پکائیں۔

قلزم دوسرے قاعدے رکھنے کے علاوہ ناک کی بدبو میں بھی  
مفید ہے، قلزم دو قطرے روغن گل ۵ قطرے میں ملا کر  
صبح و شام ناک میں پکائیں، اس کا مفصل بیان مشترک  
قائدہ رکھنے والی دواؤں میں درج ہے۔

### ناک کی بدبو

اطریفل زمانی، اطریفل اسطوخودوس، اطریفل شاہترہ،  
اطریفل ملین ناک کی بدبو میں مفید ہے۔ در دسر میں  
لکھے جا چکے ہیں۔

روغن انف ناک کی جھلی کے درم اور ناک کی  
بدبو کو دور کرتا ہے۔



کے لیے ایک کامیاب دوا ہے۔ نزلہ دہائی میں بطور حفظ  
ماتقدم استعمال کیا جاتا ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے مہرلوہ ہے۔

نزلہ وزکام کی خاص دوا ہے۔ بلکہ لیا اور  
بر شمعہا ہڈیاں میں قاعدہ دیتی ہے۔ قانچ و

لقوہ، ریح، لسان، سر پکرا، نیند نہ آنا، کان بچا، قونچ  
لور معدہ و جگر کے درد کو دور کرتا ہے۔ نئی لور پرانی کھانسی  
میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ایک گرام

طریقہ استعمال: نزلہ وزکام میں یہ دوات کو سوتے  
وقت خیرہ گاؤں زباں خیری جو لہر والا ۵ گرام میں ملا کر  
کھائیں۔ معدہ و جگر کے درد میں یہ دوا جوارش جالینوس  
۵ گرام میں ملا کر کھائیں۔

نزلہ کو روکتا ہے، نزلہ کی کھانسی کو  
ترباق نزلہ دور کرتا ہے۔ اس کے نگار

استعمال کرنے سے دائمی نزلہ جاتا رہتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام

طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت کھائیں۔

مرد و عورتوں کا ایک قدیم نسخہ ہے جو  
جوشاندہ ہزار سال سے کامیابی کے ساتھ

استعمال ہوتے آرہے ہیں، یہ کھانسی، نزلہ وزکام، گلے کی  
خراش اور نزلہ بخار میں مفید ہے۔ ہر وقت لور ہر موسم میں  
سب کے لیے یکساں مفید ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

جوشیا طب یونانی میں جوشاندہ کا جو نسخہ نزلہ وزکام  
کے لیے مشہور ہے، جوشیا اسی کا خلاصہ

(ایکسٹریکٹ) ہے اس کے استعمال سے نزلہ وزکام،

کھانسی، گلے کی خراش اور نزلہ سے پیدا ہونے والا بخار  
دور ہو جاتا ہے۔

## ناک کے کیڑے

اطریٹل شاترہ لور صافی کا استعمال ناک میں کیڑے پیدا  
ہو جانے کی حالت میں مفید ہے۔

## نکسیر

قرص بندش خون، قرص حابس، قرص گنار لور کشہ فولاد  
کشہ سنگ جراثیم کے استعمال سے نکسیر کا خون بند ہو جاتا  
ہے۔ ان کا بیان "نصف الدم" (خون تھوکتا) میں ہو چکا ہے،  
جوارش آلہ کھانے سے نکسیر بند ہو جاتی ہے۔ "ضعف  
قلب" میں مذکور ہے۔

## نزلہ وزکام۔ انفلوانزا

اطریٹل اسطوخودوس دائمی نزلہ میں  
خصوصیت سے مفید

ہے، نگار استعمال سے بالوں کی سیاہی کو قائم رکھتا ہے، اگر  
نزلہ یا کسی بیماری کی وجہ سے بال وقت سے پہلے سفید  
ہو جائیں تو ان کو صحیح حالت پر واپس لاتا ہے۔ دماغ کو  
نفسیات سے صاف کرتا ہے، معدہ لور آستوں کو قوت بخشد  
ہے لور قبض کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک۔

طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت پانی سے کھائیں۔  
سفید بالوں کی حالت میں اس کے ساتھ قرص فولاد ایک  
ہر استعمال کریں۔

انفیزا عام نزلہ وزکام، نزلہ دہائی (انفلوانزا) لور  
ان سے پیدا ہونے والے کھانسی، بخار



طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

حب سرفہ یہ گولیاں نزلہ کو روکتی ہیں، حلق کی خراش اور خشک ٹھسکہ دار کھانسی کو دور کرتی ہیں۔

مقدار خوراک: ۲-۲ گولیاں

طریقہ استعمال: وقت ضرورت منہ میں رکھ کر ان کا رس چوسیں۔

حب شفا دائمی نزلہ و زکام کھانسی اور دمہ میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ایک ایک گولی

طریقہ استعمال: صبح و شام پانی سے کھائیں۔

حب نزلہ نزلہ و زکام میں مفید ہیں، نزلہ بہتا ہو، جھینگیں آتی ہوں، درد سر ہو، یہ سب شکایتیں ان کے استعمال سے دور ہو جاتی ہیں۔ ضعف دماغ اور ضعف اعصاب میں بھی ان کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲-۲ گولیاں

طریقہ استعمال: صبح و شام پانی سے کھائیں۔

خمیرہ خشخاش نزلہ و زکام کو روکتا ہے، نزلہ کی کھانسی کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام

طریقہ استعمال: صبح یا رات کو سوئے وقت کھائیں۔

خمیرہ نزلی جو اہر والا دائمی نزلہ و زکام میں خاص طور پر مفید ہے، دماغ و اعصاب کو طاقت دینے اور عام جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: صبح یا رات کو کھائیں۔

دیا قوزہ نزلہ حار (گرم نزلہ) کو بچنے کی طرف مگرنے سے روکتا ہے اور اس کی وجہ سے کھانسی سست رہی ہو تو اس کو دور کرتا ہے، بچپن میں ملیم کو آسانی سے نکالتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰-۱۰ گرام

طریقہ استعمال: صبح اور رات کو کھائیں۔

شربت بنفشہ نزلہ و زکام اور کھانسی بخاروں میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ شربت کسی مناسب دوا کے جو شاندے یا کسی مناسب عرق یا نیم گرم پانی میں ملا کر پیئیں۔

شربت صدر نزلہ و زکام اور کھانسی میں مفید ہے، سل و دق اور دمہ میں بھی فائدہ بخشتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: عرق گاؤ زباں ۱۲۵ ملی لیٹر یا پانی میں ملا کر پیئیں۔

شربت خشخاش نزلہ اور نزلہ سے پیدا ہونے والی کھانسی میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: پانی میں ملا کر یا عشاء پیئیں۔

شربت فریادرس نزلہ و زکام اور کھانسی میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: عرق گاؤ زباں ۱۲۵ ملی لیٹر یا پانی میں ملا کر پیئیں۔

کشتہ بسد دائمی نزلہ اور کھانسی دمہ میں مفید ہے۔



پیدا ہونے والی شدید کھانسی میں مفید ہے۔ بلغم کو خارج کرنا اور قبض کو رفع کرتا ہے، طلق اور حجرے کے درم کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام

طریقہ استعمال: صبح و شام نیم گرم پانی میں ملا کر پیئیں۔

لَعوق معتدل نزله و زکام اور کھانسی میں فائدہ دیتا ہے۔ گرم نزله میں رقیق

رطوبت کو غلیظ کر کے خارج کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام

طریقہ استعمال: دن میں تین بار صبح، دوپہر اور شام کھائیں۔

لَعوق نزلی نزله و زکام اور ان سے پیدا ہونے والی کھانسی کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام

طریقہ استعمال: یہ لعوق دن میں تین بار صبح، دوپہر اور شام کھائیں۔

نزلی یہ نزله و زکام کی خاص دوا ہے۔ اس مرض میں خاص قسم کا زہر یا مادہ ناک اور طلق کی جملی میں

درم پیدا کرتا ہے، پھر چھینکیں آنے لگتی ہیں اور ان ہھلیوں

سے رقیق رطوبت بننے لگتی ہے، اگر اس وقت اس کا

مناسب علاج نہ کیا جائے تو اس سے طرح طرح کے

خطرناک امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس حالت میں نزلی

کے استعمال سے ہھلیوں کی درمی کیفیت دور ہو جاتی ہے

اور اس سے پیدا ہونے والے عوارض زائل ہو جاتے ہیں۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

مقدار خوراک: ۶۰ ملی گرام یا ۲ قرص  
طریقہ استعمال: یہ کشتہ خیرہ گاؤزباں ۱۰ گرام میں رکھ کر کھائیں۔

کشتہ مر جان سادہ نزله و زکام اور کھانسی میں مفید ہے۔ دماغ اور دل کو طاقت دیتا ہے۔

مقدار خوراک: ۶۰ ملی گرام یا ۲ قرص

طریقہ استعمال: یہ کشتہ خیرہ گاؤزباں ۱۰ گرام میں رکھ کر کھائیں۔

کشتہ مر جان جواہر والا نزله و زکام، کھانسی اور دوسرے میں مفید ہے، ضعف دماغ اور ضعف قلب کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۶۰ ملی گرام یا ۲ قرص

طریقہ استعمال: یہ کشتہ صبح سویرے نہار منہ خیرہ گاؤزباں ۵ گرام میں رکھ کر کھائیں۔

لَعوق سپستان نزله و زکام اور کھانسی میں مفید ہے۔ کھانسی کی شدت کو کم کرتا اور بلغم کو نکالتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام سے ۲۰ گرام تک

طریقہ استعمال: صبح سویرے نہار منہ اور رات کو سوتے وقت عرق گاؤزباں ۱۲۵ ملی لٹریں میں جوش دے کر پیئیں۔

لَعوق سپستان خیارشنبری نزله و زکام اور اس کی وجہ سے



## حلق کی بیماریاں

### حلق کی پھنسیاں

شربت توت سیاہ اور لعوق سپٹاں خیار شمیری یہ سب دوائیں حلق کی پھنسیوں میں بھی فائدہ دیتی ہیں۔

### ورم لوز تین (ٹانسلائٹس)

لعوق سپٹاں خیار شمیری، طماور راحت، صدوری اور سعالین یہ سب دوائیں "ورم لوز تین" میں بھی مفید ہیں۔

### خناق و بآئی

جو دوائیں لوپر "ورم لوز تین" کے لیے لکھی گئی ہیں وہ خناق و بآئی میں بھی مفید ہیں۔

### درد و ورم حلق

شربت توت سیاہ حلق کے ورم اور درد کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لٹر

طریقہ استعمال: صبح و شام نیم گرم پانی میں ملا کر پیئیں۔

ضماور راحت حلق کے ورم کو تحلیل کرتا ہے۔

طریقہ استعمال: گلے پر لگائیں اور اس پر پان گرم کر کے رکھیں اور اوپر سے روئی نیم گرم کر کے باندھ دیں۔

لعوق سپٹاں خیار شمیری بھی ورم حلق میں فائدہ دیتا ہے، "تزلزلہ و زکام" میں درج ہے۔



## منہ اور زبان کی بیماریاں

ہو جاتی ہے، اس کے لیے یہ دوا خاص طور پر مفید ہے۔ بچوں کی نقل اتارنے سے یہ عادت رائج ہو جاتی ہے، ان کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ لیکن پیدائشی لکنت میں اس کے استعمال سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔  
طریقہ استعمال: ایک گرام یہ دوا صبح کو اور ایک گرام رات کو سوتے وقت زبان پر ملیں۔

### منہ کی بدبو

جو لرش جالینوس، سمون لاسفہ، سنون خاص منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے مفید ہے۔

### قلاع۔ منہ آتا

ذروور چھالوں والا منہ اور زبان کے زخم اور چھالوں کے لیے مفید ہے۔  
طریقہ استعمال: ایک چمکی دوا منہ میں چمکیں۔  
قلاعی منہ اور زبان کے دانوں اور چھالوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، نہایت مفید ثابت ہوئی ہے۔

طریقہ استعمال: منہ اور زبان پر روئی کی پھریری سے لگائی جاتی ہے۔

### لکنت

دوائے لکنت زبان کے کسی مقامی سبب سے جو لکنت (توٹاپن) پیدا



## دانتوں اور مسوڑھوں کی بیماریاں

طریقہ استعمال: صبح و شام دانتوں پر ملیں اور پندرہ بیس منٹ کے بعد کلی کریں۔

### دانتوں کا ہلنا

سنون پوسٹ مغیلاں ہلتے ہوئے دانتوں کو جاتا ہے، بشرطیکہ دانت اپنی جگہ نہ چھوڑ چکے ہوں۔ مسوڑھوں کو مضبوط بناتا ہے۔

طریقہ استعمال: یہ منجن انگلی سے دانتوں پر ملیں اور پندرہ بیس منٹ کے بعد کلی کریں۔

سنون مقوی دندان ہلتے ہوئے دانتوں کو مضبوط بناتا ہے،

مسوڑھوں کو سخت کرتا ہے، ان سے خون بہنے کو روکتا ہے، اگر مسوڑھے گل گئے ہوں تو ان کو درست کرتا ہے۔ طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت دانتوں پر مل کر سور ہیں یا صبح کو دانتوں پر ملیں اور آدھ گھنٹے کے بعد کلی کریں۔

### پائریا

اکسیر پائریا اکسیر پائریا دو چیزوں پر مشتمل ہے، (۱) منجن (۲) کلی کی دوا۔ منجن ایسے اجزاء سے بنایا گیا ہے جو پائریا کے زہر لیے مادے کی اصلاح کرتے ہیں۔ اور مسوڑھوں کو پیپ سے پاک صاف کرنے اور مزید پیپ پڑنے سے محفوظ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو محفوظ کرتے اور ہلتے دانتوں کو جاتے ہیں۔ کلی کی دوا سے منہ پیپ اور گندگی سے صاف ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد منجن اپنے اثرات اچھی طرح دکھاتا ہے اور یہ خطرناک مرض بالکل دور ہو جاتا ہے۔ طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

### دانتوں کا درد

سنون خاص دانتوں کے درد کو دور کرتا ہے، مسوڑھوں کی سوجن کو تحلیل کرتا ہے، مسوڑھوں سے خراب رطوبت نکالتا ہے، منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے۔



دار بناتا ہے۔ لگاتار استعمال کرتے رہنے سے دانتوں کو مختلف بیماریوں سے بچاتا اور صحیح حالت میں رکھتا ہے۔  
 طریقہ استعمال: روزانہ صبح و شام دانتوں پر ملیں۔  
 ہمدرد لال منجن دانتوں کو موتی جیسا چکاتا ہے، اس کا ایسی ٹر جینٹ ایکشن مسوڑھوں کو صحت مند رکھتا ہے اور ان سے خون بہنے کو بند کرتا ہے، اس کے مسلسل استعمال سے دانت صحت مند اور مضبوط رہتے ہیں۔ اور منہ کی بدبودار ہو جاتی ہے۔  
 طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

اکسیر پاریا بھی دانتوں کے ہلنے میں مفید ہے۔

## دانتوں کا میل

سنون مجلی دانتوں کو صاف کرتا اور ان کو چکاتا ہے۔  
 طریقہ استعمال: صبح و شام دانتوں پر ملیں۔  
 ہمدرد منجن دانتوں کو میل پکیل سے صاف کرتا اور ان کو موتیوں جیسا چمک

## سینے کی بیماریاں

یہ ”کھانسی“ کے زیر عنوان درج ہیں۔

### آواز بیٹھ جانا

شربت توت سیاہ، لعوق آب تربوز والا اور سعالین آواز بیٹھ جانے کے لیے مفید ہیں۔ ان کا ذکر گزشتہ صفحات میں آچکا ہے، سعالین آئندہ صفحہ پر درج ہے۔

### نمونیا۔ پسلی کا درد

نمونیا، پسلی کے درد (ذات الجنب) اور سینے

### ورم حنجرہ، قروح حنجرہ نرخرے کی سوجن اور زخم

شربت توت سیاہ طلق کے ورم اور زخم میں مفید ہے  
 مقدار خوراک: ۲۰ ملی لٹر  
 طریقہ استعمال: یہ شربت چائے یا نیم گرم پانی میں ملا کر پیں۔

لعوق پستان خیار شہری بھی ورم حنجرہ میں مفید ہے  
 حنجرے کے زخموں میں سعالین بھی مفید ہیں،



**قرص گلنار** ان قرصوں کے استعمال سے ہر ایک عضو کا جریان خون رک جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۳ قرص  
طریقہ استعمال: صبح اور شام شربت انجبار ۲۵ ملی لٹر میں ملا کر پانی سے کھائیں۔

## کھانسی

**اکسیر سعال** سینے پر جسے ہوئے بلغم کو نکالتی اور کھانسی میں آرام دیتی ہے۔

طریقہ استعمال: ایک ٹکیہ کو توڑ کر چورا کر کے ۱۰ گرام شد میں ملا کر چائیں۔

**دوائے سرفہ سیاہ** بلغمی کھانسی میں مفید ہے، بلغم کو خارج کرتی ہے۔

مقدار خوراک: آدھا گرام  
طریقہ استعمال: یہ دوا دن میں تین بار شد ۱۰ گرام میں ملا کر کھائیں۔

**دوائے سیاہ کبوتر والی** بلغمی کھانسی اور دمہ میں نہایت مفید دوا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی گرام  
طریقہ استعمال: یہ دوا شد ۱۰ گرام میں ملا کر کھائیں۔

**سعالین** ہر قسم کی کھانسی میں مفید ہے۔  
بچپروں سے بلغم کو نکالتی ہے گلے کی خراش کو دور کرتی اور بیٹھی ہوئی آواز کو کھولتی ہے۔  
طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

**صدوری** کھانسی کے لیے ایک زود اثر شربت ہے۔ اس مرکب میں برگ بانہ اور

اپنے ڈرین، تلسی، پتھول اور کوڈین فاسفیٹ بھی دوائیں شامل ہیں جو کھانسی اور بچپروں میں بلغم جمع

کے درد میں مفید ہے۔ بلغمی کھانسی میں قاعدہ دیتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی گرام یا ۲ قرص  
طریقہ استعمال: یہ کشتہ صبح کے وقت لعوق پستان خیار شہری ۱۰ گرام میں ملا کر کھائیں اور اسی مقدار میں شام کو استعمال کریں۔

## خون تھو کنا۔ نفث الدم

**شربت انجبار** ہر عضو کے جریان کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لٹر  
طریقہ استعمال: یہ شربت پانی میں ملا کر پیئیں یا دوسری دواؤں کے ساتھ بطور دوائے معاون استعمال کریں۔

**قرص بندش خون** نفث الدم (خون تھو کنا) نکسیر، پیشاب میں خون، خون بواہر، خون حیض، غرضیکہ کسی بھی عضو سے خون نکلتا ہو۔ ان قرصوں کے استعمال سے بند ہو جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲ قرص  
طریقہ استعمال: صبح و شام دونوں وقت دودھ سے کھائیں۔

**قرص حابس** بار بار نکسیر پھونتی ہو، کھانسی کے ذریعہ خون نکلتا ہو، پیشاب پاخانہ کے ساتھ خون خارج ہو، کثرت حیض کی شکایت ہو، ان سب حالات میں ان قرصوں کے استعمال سے خون رک جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ایک قرص  
طریقہ استعمال: صبح، دوپہر اور شام دن میں تین بار دودھ سے کھائیں۔



## ضیق النفس۔ دمہ

بخور دمہ مرض دمہ میں جب کہ مریض سانس کی تنگی سے بے چین ہو، بخور دمہ

کے استعمال سے اس کا سانس درست ہو جاتا ہے۔

طریقہ استعمال: دو تین دیکھتے ہوئے کوٹوں پر بخور دمہ ایک چنگی ڈال کر مریض کو اس دھوئیں میں سانس لینے کی ہدایت کریں، جو نہی یہ دھوئیں سانس کے ساتھ پیچروں میں پہنچے گا سانس کی تنگی دور ہو جائے گی۔

حب ضیق النفس یہ گولیاں دمہ کو روک دیتی ہیں۔

طریقہ استعمال: ایک گولی چورا کر کے شد میں ملا کر کھائیں۔

شربت ربوی اس شربت کے استعمال سے دمہ کا دورہ بہت جلد رک جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ ملی لٹر

طریقہ استعمال: یہ شربت تین تین گھنٹے کے بعد پئیں۔

شربت زوفا سادہ ضیق النفس (دمہ) اور کھانسی میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ سے ۵۰ ملی لٹر تک

طریقہ استعمال: یہ شربت نیم گرم پانی میں ملا کر پئیں۔

شربت زوفا مرکب ضیق النفس (دمہ) اور کھانسی میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ سے ۵۰ ملی لٹر تک

طریقہ استعمال: یہ شربت نیم گرم پانی میں ملا کر پئیں۔

لعوق ربوی دمہ کے دورہ اور کھانسی کی شدت کو کم کرتا ہے۔

ہوجانے کی تکلیف، پرانے اور شدید برکاش، زکام، بچوں کی کھانسی اور دمہ وغیرہ میں مفید ہیں۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

کشتہ ابرک سفید کھانسی اور دمہ کو دور کرتا ہے۔ عام جسمانی کمزوری کو

دور کرنا اور قوت باہ کو بڑھاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۶۰ ملی گرام سے ۱۲۵ ملی گرام یا ایک سے ۲ قرص تک۔

طریقہ استعمال: یہ کشتہ شدہ ۱۰ گرام میں ملا کر کھائیں۔

کشتہ ابرک سیاہ یہ کشتہ ابرک سفید جیسے فوائد رکھتا ہے لیکن اس سے

نیچہ قوی لااثر ہے۔

مقدار خوراک: ۳۰ ملی گرام سے ۶۰ ملی گرام تک یا ایک سے ۲ قرص تک۔

طریقہ استعمال: یہ کشتہ شدہ ۱۰ گرام میں ملا کر۔

کشتہ ابرک کلاں یہ کشتہ کھانسی اور دمہ میں مفید ہے۔ عام جسمانی

کمزوری اور ضعف باہ کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۶۰ ملی گرام یا ۲ قرص

طریقہ استعمال: یہ کشتہ شدہ خالص ۱۰ گرام میں ملا کر کھائیں۔ عام جسمانی کمزوری اور ضعف باہ کے لیے ملائی

۲۵ گرام میں ملا کر کھائیں۔

لعوق آب تربوز والا یہ لعوق خشک کھانسی اور بل میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام

طریقہ استعمال: یہ لعوق دن میں دو بار صبح و شام کھائیں۔



مقدار خوراک: ۵۰ گرام  
 طریقہ استعمال: یہ لعوق دن میں تین بار کھائیں۔  
 معجون راح المومنین ضیق النفس (دم) اور  
 خفقان کے لیے مفید  
 ہے۔ ضعف باہ کو دور کرتی ہے۔  
 مقدار خوراک: ۵ گرام  
 طریقہ استعمال: دن میں دو بار صبح و شام کھائیں۔

مقدار خوراک: ۵ گرام  
 طریقہ استعمال: تھوڑے گرم پانی میں ملا کر پلائیں۔  
 لعوق ضیق النفس دمہ میں مفید ہے، بلغم  
 نکالتا ہے۔  
 مقدار خوراک: ۱۰ گرام  
 طریقہ استعمال: یہ لعوق دن میں تین بار کھائیں۔  
 دمہ میں فائدہ دیتا ہے، بلغم کو  
 لعوق کتال خارج کرتا ہے۔

## دل کی بیماریاں

جوارش آملہ عنبری بہ نسخہ کلاں یہ جوارش دل  
 کی کمزوری اور  
 دل کی دھڑکن کو بہت جلد دور کرتی ہے۔ دوسرے  
 فائدے جوارش آملہ جیسے ہی رکھتی ہے لیکن یہ اس کے  
 مقابلے میں زیادہ مفید ہے اور بہت جلد اپنا اثر دکھاتی ہے۔  
 مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک  
 طریقہ استعمال: صبح سویرے نہار منہ کھائیں۔  
 جوارش شاہی دل و دماغ کو طاقت دیتی ہے۔  
 مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک  
 طریقہ استعمال: یہ جوارش صبح سویرے نہار منہ  
 کھائیں۔

ضعف قلب۔ اختلاج قلب  
 (دل کی کمزوری، دل کی دھڑکن)

جوارش آملہ سادہ یہ جوارش ضعف قلب  
 اور اختلاج قلب میں  
 مفید ہے، بول، دماغ اور معدے کو طاقت دیتی ہے، اور دل  
 و جگر کی بڑھی ہوئی گرمی کو دور کرتی ہے، تبخیر کو روکتی اور  
 دستوں کو بند کرتی ہے۔  
 مقدار خوراک: ۱۰ گرام  
 طریقہ استعمال: یہ معجون صبح سویرے نہار منہ کھائیں۔



طریقہ استعمال: یہ خیرہ کھا کر لو پر سے دودھ ۲۵۰ مل لڑیں۔

خیرہ ابریشم شیرہ عنب والا  
دل کی کمزوری، دھڑکن اور گھبراہٹ کو دور کرتا ہے۔ قوت حافظہ اور بھائی کو بڑھاتا ہے۔ سل دودھ کی خشک کھانسی کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ خیرہ صبح سویرے نہار منہ کھائیں۔  
خیرہ ابریشم عود مصطکی والا  
دل و دماغ اور معدے کو طاقت دیتا ہے۔ خیالات کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ خیرہ صبح سویرے نہار منہ کھائیں۔  
خیرہ صندل  
دل کی دھڑکن اور گھبراہٹ کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام

طریقہ استعمال: یہ خیرہ صبح سویرے نہار منہ کھائیں۔

خیرہ مروارید  
یہ خیرہ دل کو طاقت دینے اور فرحت پیدا کرنے کے لیے

مخصوص ہے۔ دل کی دھڑکن اور گھبراہٹ اس کے استعمال سے دور ہو جاتی ہے۔ موتی جمرہ، خسرہ اور چمک جیسی بیماریوں میں دل اور حرارت غریزی کی حفاظت کرتا ہے۔ ان بیماریوں کے بعد کی کمزوری اس کے استعمال سے بہت جلد دور ہو جاتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ خیرہ صبح و شام دن میں دو وقت کھائیں۔

یہ دل کو طاقت دینے اور حرارت جو ابر صبرہ غریزی کو بڑھانے کے لیے طب یونانی کی چوٹی کی دواؤں میں سے ہے۔ عالم نزع میں جب کہ مریض کی حرارت غریزی گھٹ جائے اور کمزوری بڑھ جائے، اس کا استعمال حیرت انگیز اثر دکھاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۶۰ ملی گرام ایک قرص

طریقہ استعمال: یہ جو ابر صبرہ دواہ المسک معتدل جو ابر دلی یا شد خالص ۵ گرام میں ملا کر کھائیں۔

یہ گولیاں دل، دماغ اور جگر کو حسب جو ابر طاقت دیتی ہیں، حرارت غریزی کی حفاظت کرتی ہیں، بیماری سے اچھا ہونے کے بعد کی عام جسمانی کمزوری کو بہت جلد دور کر دیتی ہیں۔

مقدار خوراک: ایک گولی

طریقہ استعمال: صبح نہار منہ یہ گولی دواہ المسک ۵ گرام میں رکھ کر کھائیں اور اوپر سے دودھ ۲۵۰ مل لڑیں۔

خیرہ ابریشم سادہ  
دل و دماغ کو طاقت دیتا ہے، دھڑکن اور گھبراہٹ کو دور کرتا ہے، آنکھوں کی بھائی کو بڑھاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام

طریقہ استعمال: یہ خیرہ صبح سویرے نہار منہ کھائیں۔

خیرہ ابریشم حکیم ارشد والا  
یہ خیرہ دل کی کمزوری کو دور

کرنے کے لیے خاص طور پر مفید ہے۔ دل کی دھڑکن، گھبراہٹ اور خیالات کی پریشانی کو بہت جلد دور کر دیتا ہے۔ دماغ اور جگر کو بھی طاقت دیتا ہے اور بیماریوں کے بعد کی عام جسمانی کمزوری کو دور کرنے کی مخصوص مقوی دوا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام



خمیرہ مروارید خاص اس خمیرہ کے وی

فائدے ہیں جو خمیرہ مروارید کے کھے گئے ہیں۔ لیکن یہ خمیرہ اس سے زیادہ قوی اثر ہے اور اپنے اثرات جلد دکھاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۳ گرام سے ۵ گرام تک

طریقہ استعمال: یہ خمیرہ دن میں دو بار صبح و شام یا بوقت ضرورت استعمال کریں۔

خمیرہ مروارید بہ نسخہ کلاں یہ خمیرہ بھی

سے زیادہ فائدے رکھتا اور فوری اثر دکھاتا ہے۔ دل کی کمزوری سے دل دھڑکنے ہو یا گھبراہٹ رہتی ہو، اس خمیرے کے استعمال سے بہت جلد دور ہو جاتی ہے، عام جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے نہایت مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۳ گرام سے ۵ گرام تک

طریقہ استعمال: یہ خمیرہ صبح و شام یا بوقت ضرورت کھائیں۔

خمیرہ مرکب دل و دماغ کی کمزوری اور عام جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: صبح کو دودھ کے ساتھ یا بغیر دودھ کے کھائیں۔

دواء المسک بار و جواہر والی گرم مزاجوں میں

دینے کے لیے نہایت مفید ہے، دل کی دھڑکن اور گھبراہٹ کو دور کرتی ہے، دماغ اور جگر کو بھی طاقت دیتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ دواء المسک صبح سویرے نہار منہ

کھا کر لو پر سے عرق گاڑنا ۱۲۵ ملی لیٹر پی لیں۔

دواء المسک بار و سادہ گرم مزاجوں کے دل کو قوت دیتی اور فرحت بخشتی ہے۔ دل کی دھڑکن اور گھبراہٹ کو دور کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ دواء المسک صبح سویرے نہار منہ کھا کر لو پر سے عرق گاڑنا ۱۲۵ ملی لیٹر پی لیں۔

دواء المسک معتدل جواہر والی جسم ہے، عام مقوی کی تقویت کے لیے مخصوص ہے، دل کو طاقت دے کر بدن میں دوران خون کو تیز کرتی ہے، دل کی دھڑکن اور گھبراہٹ کو دور کرتی ہے، خون کی پیدائش کو بڑھاتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ دواء المسک صبح کو یا صبح و شام دونوں وقت کھائیں اور لو پر سے ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ پی لیں۔

دواء المسک معتدل جواہر والی خاص لو پر لکھی ہوئی

دواء المسک جیسے صفات رکھتی ہے لیکن اس سے زیادہ قوی اثر ہے اور اپنا اثر بہت جلد دکھاتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ دواء المسک صبح کو یا صبح و شام دونوں وقت کھائیں اور لو پر سے ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ پی لیں۔

دواء المسک معتدل سادہ عام مقوی قلب و جسم ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ دواء المسک صبح کو یا صبح و شام دونوں وقت کھائیں اور لو پر سے ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ پی لیں۔



لور بھوک لگاتا ہے۔ صفر لوی دستوں، مٹی لور قے کور وکتا ہے۔ صفر لوی بخاروں میں استعمال کیا جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ سے ۵۰ ملی لٹریک  
طریقہ استعمال: یہ شربت کسی عرق یا پانی میں ملا کر پئیں۔

دل کو قوت و فرحت  
شربت انگور شیریں  
حصہ ہے، کسی قدر ملین  
تا شیر رکھتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵۰ سے ۵۰۰ ملی لٹریک  
طریقہ استعمال: یہ شربت کسی عرق یا پانی میں ملا کر پئیں۔

دل کو قوت و فرحت بخشتا ہے معدے  
شربت بھی  
لور آنتوں کو طاقت دیتا ہے، قے لور  
دستوں کو روکتا ہے، صفرام کی زیادتی کو گھٹاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰۰ ملی لٹریک  
طریقہ استعمال: یہ شربت عرق گاؤ زباں ۱۲۵ ملی لٹریا پانی میں ملا کر پئیں۔

گھبراہٹ کو دور کرتا ہے، جگر  
شربت صندل  
لور معدے کی گرمی کو تسکین  
دیتا ہے، گرمی کے درد کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰۰ ملی لٹریک  
طریقہ استعمال: یہ شربت ٹھنڈے پانی میں ملا کر پئیں۔

دل کو قوت و فرحت بخشتا ہے،  
شربت کیوڑہ  
دل کی گھبراہٹ لور دھڑکن کو  
دور کرتا ہے، پیاس کو بجھاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰۰ ملی لٹریک  
طریقہ استعمال: یہ شربت ٹھنڈے پانی میں ملا کر پئیں۔

دل کو قوت و فرحت بخشتا ہے، دل  
سفوف فضہ  
کی گھبراہٹ لور دھڑکن کو دور  
کرنے کے لیے نہایت مفید دوا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی گرام  
طریقہ استعمال: یہ سفوف مفرح یا قوتی معتدل یا  
دوام المسک معتدل جوہر والی ۵ گرام میں ملا کر صبح  
سویرے کھائیں۔

آملہ کے دوائی خواص لور علاجی  
شربت آملہ  
افادیت ویسی طبوں میں  
صدیوں سے مسلم ہے۔ ہمدرد نے آملہ پر طویل مدت میں  
مسلسل ساکنی تک ریسرچ کے بعد تازہ آملوں کا اعلا معیار  
کا شربت تیار کیا ہے۔ یہ شربت دل، دماغ اور حافظہ کو  
طاقت دیتا ہے۔ معدہ، جگر کی بڑھی ہوئی گرمی لور صفرام  
کو اعتدال پر لاتا ہے۔ گھبراہٹ لور پیاس کو دور کرتا ہے  
لور گرمی کے دستوں کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔

مقدار خوراک: ۳۰۰ ملی لٹری (دو بڑے چمچے)  
طریقہ استعمال: صبح و شام دونوں وقت استعمال کریں۔  
آٹھ سال کی عمر کے بچوں کو چوتھائی خوراک لور اس سے  
بڑے بچوں کو آدمی خوراک دی جائے۔ گھبراہٹ لور  
پیاس وغیرہ جیسی شکایت میں اس شربت کی ایک خوراک  
بروقت دی جائے۔

دل لور جگر کو طاقت دیتا  
شربت انار شیریں  
ہے، فرحت بخشتا ہے لور  
پیاس کو بجھاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵۰ سے ۵۰۰ ملی لٹریک  
طریقہ استعمال: یہ شربت پانی میں ملا کر پئیں۔

دل کو قوت و فرحت بخشتا  
شربت انار ترش  
ہے، معدے کو قوت دیتا



**شربت گلاب** دل کو قوت و فرحت بخشنے اور  
دھڑکن و گھبراہٹ کو دور

کرنے کے لیے نہایت مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ شربت ٹھنڈے پانی میں ملا کر  
پئیں۔

**عرق الاچھی** مقوی قلب اور مفرح ہے،  
معدے کو طاقت دیتا ہے، تھمہ اور

ہیضہ میں استعمال کیا جاتا ہے، مکی اور تے کو روکتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ شربت دونوں وقت صبح و شام  
شربت نارنج یا شربت لیموں ۲۵ ملی لیٹر میں ملا کر پئیں یا  
بغیر شربت کے پئیں۔

**عرق عنبر** دل کو طاقت دیتا اور فرحت بخشتا ہے،  
اس کے علاوہ جگر اور معدے کو بھی

طاقت دیتا ہے، خشی کو دور کرتا ہے۔ عام جسمانی کمزوری  
کو رفع کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۶۰ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق شربت لار ۱۵ ملی لیٹر میں  
ملا کر پئیں۔

**شربت کیوڑہ** دل کو تقویت اور فرحت کے  
لیے بہترین دوا ہے۔ گھبراہٹ کو

دور کرتا ہے اور پیاس کو بجھاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۶۰ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: عرق کیوڑہ میں شربت مندل ۱۵  
ملی لیٹر ملا کر پئیں۔

**عرق گاؤزباں** دل کو قوت و فرحت بخشتا ہے،  
دماغی بیماریوں میں مفید ہے،

پیاس کو بجھاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق شربت کیوڑہ ۲۵ ملی لیٹر میں  
ملا کر پئیں۔

**عرق گزر سادہ** دل کو قوت و فرحت بخشتا  
ہے، دل کی دھڑکن اور

گھبراہٹ کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق شربت مندل ۲۵ ملی لیٹر میں  
ملا کر پئیں۔

**عرق گلاب** دل کو قوت دینے اور فرحت بخشنے  
کے لیے خوب ہے، دل کی دھڑکن

اور گھبراہٹ کو دور کرتا ہے۔ دماغ، معدہ اور جگر کی

بیماریوں میں بھی مفید ہے، گرمی کو تسکین دیتا اور پیاس کو

بجھاتا ہے۔ خشی کی حالت میں نہایت مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۶۰ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق شربت مندل ۱۵ ملی لیٹر میں  
ملا کر پئیں۔

**قرص فضہ** ضعف قلب اور اختلاج قلب  
(دھڑکن) کو دور کرتے ہیں،

ضعف دماغ میں بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک: ایک ٹکیہ

طریقہ استعمال: خمیرہ گاؤزباں مغزی جو ابر والا ۵ گرام  
میں رکھ کر وقت ضرورت کھائیں۔

**کشتہ زہر مہرہ** دل کو قوت و فرحت بخشتا ہے،  
دل کی دھڑکن اور گھبراہٹ کو

دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی گرام ۲ ٹکیاں



طریقہ استعمال : یہ مطرح صبح یا بعد دو ہر کھائیں۔  
کھائیں۔

**کشتہ عقیق** دل کو طاقت دیتا ہے ، اختلان  
قلب (دل کی دھڑکن) اور  
دھشت (گھبراہٹ) کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک : ۶۰ ملی گرام یا ۲ انگلیاں  
طریقہ استعمال : یہ کشتہ صبح سویرے صاف صاف خیرہ  
مروارید ۵ گرام میں رکھ کر کھائیں۔

**کشتہ نقرہ** دل و دماغ اور جگر کو طاقت دیتا ہے۔  
دل کی دھڑکن اور گھبراہٹ کو دور  
کرتا ہے قوت باہ کو بڑھاتا ہے۔

مقدار خوراک : ۶۰ ملی گرام یا ۲ انگلیاں  
طریقہ استعمال : یہ کشتہ خیرہ گاؤں ہاں جھری جوہر والا  
۵ گرام میں رکھ کر کھائیں۔ قوت باہ کے لیے لب کبیر ۵  
گرام میں رکھ کر کھائیں اور پورے دودھ پئیں۔

**کشتہ یا قوت** دل و دماغ کو طاقت دیتا اور  
فرحت بخشتا ہے۔

مقدار خوراک : ۶۰ ملی گرام یا ایک کپہ  
دل کو قوت و فرحت بخشتا ہے دل  
کی دھڑکن اور گھبراہٹ کو دور  
کرتا ہے۔

مقدار خوراک : ۶۰ ملی گرام یا ۲ انگلیاں  
طریقہ استعمال : یہ کشتہ خیرہ مروارید ۵ گرام میں رکھ  
کر کھائیں۔

**مفرح اعظم** دل کو قوت دیتی اور فرحت  
بخشتی ہے ، دماغ ، جگر اور  
سعدے کو طاقت دیتی ہے۔

مقدار خوراک : ۵ گرام

طریقہ استعمال : یہ مطرح صبح یا بعد دو ہر کھائیں۔  
مفرح بارد جوہر والی دلہ جگر کی بڑھی ہوئی  
گرمی کو دور کرتی ہے۔

مقدار خوراک : ۵ گرام  
طریقہ استعمال : یہ مطرح صبح یا بعد دو ہر کھائیں۔  
مفرح بارد و سادہ دل کو فرمت و قوت  
دیتا ہے۔

مقدار خوراک : ۵ گرام  
طریقہ استعمال : یہ مطرح صبح کو یا بعد دو ہر کھائیں۔  
مفرح شیخ الرئیس یہ مطرح عام جسمانی  
کمزوری اور ضعف قلب

کو دور کرنے کی عجیب تاثیر رکھتی ہے ، دل کی دھڑکن اور  
گھبراہٹ کو دور کرتی ہے ، سل و دق اور سوداوی بخاروں  
میں فائدہ دیتی ہے۔

مقدار خوراک : ۵ گرام  
طریقہ استعمال : یہ مطرح عشاء کسی عرق یا پانی سے  
کھائیں۔

مفرح شاہی فرمت بخشتی اور تعبیر کو روکتی ہے ،  
گرمی کے دستوں کو بند کرتی ہے۔  
مقدار خوراک : ۵ گرام

طریقہ استعمال : یہ مطرح صبح و شام کھائیں۔

مفرح حیا قوتی معتدل یہ اطلاع کی مطرح  
ہے ، عام جسمانی  
کمزوری کو دور کرتی اور دل کو خاص طور پر قوت بخشتی ہے ،  
دل کی دھڑکن اور گھبراہٹ کو دور کرتی ہے ، دماغ اور جگر  
کو طاقت دیتی ہے۔

مقدار خوراک : ۵ گرام  
طریقہ استعمال : یہ مطرح صبح کو عشاء کھائیں یا اس کو کھاکر



حالت اعتدال پر آجاتا ہے اور خون کا دباؤ بڑھانے والی رطوبت کی پیدائش کم ہو جاتی ہے، نیز خون کی رگوں میں ٹپک پیدا ہو جاتی ہے۔ غرضیکہ تریاق فشار اس مرض کی خاص دوا ہے۔  
طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

### خون کے دباؤ کا کم ہو جانا۔ لو بلڈ پریشر

جب خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے تو عام جسمانی کمزوری بڑھ جاتی ہے، کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، اگر کام کیا جاتا ہے تو جلد ہی تھکن پیدا ہو جاتی ہے۔ اکثر سستی اور غنودگی چھائی رہتی ہے۔ ایسی حالت میں کشتہ فولاد، کشتہ طلا، دواء المسک معتدل جواہر والی، مجون اذراقی، حب عنبر مومیائی اور ماء اللحم و آسکو کا استعمال مفید ہے۔

### خون کے سفید دانے

حب سین بعض اوقات خون کی کمیادی ترکیب میں خلل پڑ جاتا ہے، خون کے سفید دانوں (اسٹوفیل) کی تعداد حالت اعتدال سے بڑھ جاتی ہے اور اس صورت میں سانس بھگی سے آنے لگتا ہے اور کھانسی ستانے لگتی ہے۔ ان حالات میں ان گولیوں کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے۔  
مقدار خوراک: ایک گولی  
طریقہ استعمال: صبح کو بکناشتہ کرنے کے بعد کھائیں۔

لوپرے ۲۵۰ ملی لٹر دودھ پئیں۔

### غشی

غشی میں دواء المسک معتدل جواہر والی، دواء المسک معتدل سادہ، عرق عنبر، عرق گلاب کا استعمال مفید ہے، ان کا بیان گذشتہ صفحات میں ہو چکا ہے۔ دواء المسک کو عرق عنبر یا عرق گلاب میں گھول کر چمچ سے مریض کے منہ میں ڈالیں اور عرق گلاب چہرے پر چھڑکیں۔

### خون کا دباؤ۔ ہائی بلڈ پریشر

اسرو فین اسرو فین خون کا دباؤ بڑھ جانے (ہائی بلڈ پریشر) کی تکلیف کے لیے ایک بہترین دوا ثابت ہو چکی ہے، اس کے علاوہ یہ عصبی تناؤ (نروس ٹینشن) دماغی ہیجان، جنون (پاگل پن) اختناق الرحم (ہسٹریا)، مرگی اور خینہ نہ آنے کی شکایت کو بھی دور کر دیتی ہے۔  
طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

تریاق فشار آج کل خون کا دباؤ بڑھ جانے (ہائی بلڈ پریشر) کا ایک خاص سبب یہ ہے کہ بدن کے بعض غدود (کلاہ، گردہ، اور غدود نغمیہ) کے افعال میں تیزی آ جانے سے ان کی خاص رطوبت زیادہ مقدار میں رسنے لگتی ہے جو خون میں شامل ہو کر اس کے دباؤ کو بڑھا دیتی ہے، اس کے استعمال سے ان غدود کا فعل



## معدے کی بیماریاں

### ضعف معدہ

**چھول** بد ہضمی، کھٹی ڈکاریں، پیٹ میں اچھارا،  
بچنے میں جلن، تکی، بھوک کی کمی، پیٹ  
کا درد اور کھانا کھانے کے بعد طبیعت کی سستی آپ سے  
چھول کے استعمال کا تقاضہ کرتی ہے۔ چھول پیٹ کی تمام  
شکایوں کو تیزی سے دور کرتی ہے اور اس کا اثر دیر تک  
 قائم رہتا ہے۔  
طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

**جوارش انارین** گرم مزاجوں کے معدے اور جگر  
کو طاقت دیتی ہے۔ بھوک لگاتی  
ہے، مضرہ کی زیادتی کو کم کرتی اور تکی، تے کو روکتی ہے۔  
مقدار خوراک: ۱۰ گرام

طریقہ استعمال: یہ جوارش صبح کو یا صبح کے وقت کھائیں۔  
**جوارش پودینہ ولایتی** معدے اور جگر کو  
طاقت دیتی ہے، تکی،  
تے اور ہلکی کو روکتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام  
طریقہ استعمال: صبح اور شام دن میں دو بار کھائیں۔

**جوارش جالینوس** معدہ، جگر، آنتوں اور مثانہ  
کو طاقت دیتی ہے، غذا کو  
ہضم کرتی اور بھوک بڑھاتی ہے، ریاح کو تحلیل کرتی اور  
بھوک خوب لگاتی ہے، منہ کی بد بو کو دور کرتی ہے،  
چھشاب کی زیادتی کو روکتی ہے، بلغمی کھانسی اور بواسیر میں  
منفید ہے۔ گردہ و مثانہ میں بار بار پتھری پیدا ہونے کی  
صورت میں اس کے استعمال سے پتھری کی پیدائش رک  
جاتی ہے۔ اگر بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں تو اس کے  
لگاتار استعمال سے وہ صحیح حالت میں آجاتے ہیں۔

مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک  
طریقہ استعمال: کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت پانی  
کے ساتھ کھائیں۔

**جوارش زرعونی سادہ** معدہ، جگر، آنتوں  
اور مثانہ کو قوت دیتی  
ہے۔ تھمہ اور بد ہضمی میں منفید ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک  
طریقہ استعمال: یہ جوارش صبح یا رات کو کھائیں۔

**جوارش زرعونی عنبری بہ نسخہ کلاں** دماغ، معدہ،  
آنتوں اور گردہ



جوارش عود ملین  
معدے کو قوت دیتی ہے  
اور قبض دور کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ مجون صبح کو نیم گرم پانی سے  
کھائیں۔

جوارش قرطم  
معدے کو تقویت بخشتی ہے،  
قبض کو دور کرتی ہے، پیشاب  
لائی اور حیض جاری کرنے میں مدد دیتی ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام

طریقہ استعمال: یہ جوارش صبح سویرے نہار منہ  
کھائیں۔

جوارش مصطکی  
معدہ، جگر اور آنٹوں کو  
طاقت دیتی ہے، معدہ اور

آنٹوں کی کمزوری سے دست آرہے ہوں تو ان کو روکتی  
ہے، منہ سے رال بننے کو بند کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک

طریقہ استعمال: یہ جوارش صبح اور شام کھائیں۔

جوارش مصطکی بہ نسخہ کلاں  
معدے، آنٹوں اور  
جگر کو قوت دیتی

ہے، معدے اور آنٹوں کی کمزوری سے آلے والے  
دستوں اور منہ سے بننے والی رال کو روکنے کے لیے نہایت

منفید ہے، تبخیر کو روکتی اور پیشاب کی زیادتی کو دور کرتی ہے  
۔ جوارش مصطکی سادہ سے زیادہ قوی الاثر ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ جوارش صبح و شام کھائیں۔

حبوب مقوی معدہ  
یہ گولیاں معدہ، جگر  
اور آنٹوں کو طاقت

دینے کے لیے نہایت منفید ہیں، غذا کو ہضم کرتی، بھوک

دہنہ کو طاقت دیتی ہے، درد کمر کو دور کرتی اور پشت کو  
مضبوط کرتی ہے۔ مادہ تولید پیدا کرتی اور قوت باہ کو بڑھاتی  
ہے۔ پیشاب کی زیادتی، بلیغی کھانسی اور نفرس میں فائدہ  
پہنچاتی ہے۔ ریاخ کو خارج کرتی اور بالوں کی سیانی کو قائم  
رکھتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: معدہ، جگر اور گردہ و مثانہ کی تقویت  
کے لیے یہ جوارش قرص فولاد ایک عدد کے ساتھ  
کھائیں اور گردہ و مثانہ کی تقویت اور بلیغی کھانسی کیلئے یہ  
جوارش قرص زمر و ایک عدد کے ساتھ استعمال کریں۔

جوارش زنجبیل  
معدے کو طاقت دیتی ہے، غذا  
لگاتی ہے، ریاخ کو خارج کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ جوارش دونوں وقت کھانا کھانے  
کے بعد کھائیں۔

جوارش عود ترش  
معدے کو قوت دیتی ہے،  
بھوک لگاتی ہے۔ غذا کو

ہضم کرتی ہے، صفراء کی زیادتی میں خاص کر مفید ہے۔  
مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: دونوں وقت کھانا کھانے کے بعد  
کھائیں۔

جوارش عود شیریں  
معدے کو تقویت  
بخشتی ہے، غذا کو ہضم

کرتی اور بھوک لگاتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ جوارش کھانا کھانے کے بعد  
کھائیں۔



لگاتی اور ریح کو خارج کرتی ہیں اور آنکھوں سے فضلات کو نکالتی ہیں۔

مقدار خوراک : ۲ کولی

طریقہ استعمال : کھانا کھانے کے بعد دو نوں وقت کھائیں۔

زنبیلا  
معدہ کو ٹھیک رکھتی ہے اور قوت ہضم کو بڑھاتی ہے۔ ورزش یا جسمانی محنت کے کام

کرنے سے اور زیادہ عمر میں معدہ اور آنکھوں کا فصل ست ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجہ میں بھوک کم لگتی ہے۔ کھانا وقت پر ہضم نہیں ہوتا اور دوسری کئی تکلیفیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دفتروں میں کام کرنے والے اور زیادہ عمر کے لوگ عام طور پر خرابی ہضم اور معدہ کی دوسری تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ زنبیلا ایسے لوگوں کے لیے خصوصیت سے مفید ہے۔ زنبیلا خواتین کے لیے حمل کے دنوں کی مٹکی اور بچے کی شکایت کو بھی دور کرتی ہے۔

طریقہ استعمال : دوا کے ساتھ ہے

سفوف نعناع  
معدے کو طاقت دیتا ہے ، بھوک لگاتا ہے۔

مقدار خوراک : ۳ گرام

طریقہ استعمال : یہ سفوف کھانا کھانے کے بعد کھائیں۔

سفوف نمک شیخ الرئیس  
گرم مزاجوں کے معدے کو قوت دیتا ہے ، بھوک لگاتا اور غذا کو ہضم کرتا ہے۔ مٹکی اور بچے

کو روکتا ہے۔

مقدار خوراک : ۳ گرام

طریقہ استعمال : یہ سفوف بعد غذا دو نوں وقت کھائیں۔

شربت زنجبیل  
معدے کو قوت دیتا اور غذا کو ہضم کرتا ہے۔

مقدار خوراک : ۲۵ ملی لٹر

طریقہ استعمال : یہ شربت کھانے کے بعد دو نوں وقت پئیں۔

شربت نانخواہ  
معدے کو طاقت دیتا ہے اور بھوک لگاتا ہے۔

مقدار خوراک : ۲۵ ملی لٹر

طریقہ استعمال : یہ شربت پانی ۱۲۵ ملی لٹر میں ملا کر پئیں۔

عرق اجوائن  
معدے کو طاقت دیتا ہے ، بھوک لگاتا اور ریح کو خارج کرتا ہے

بلغمی بخاروں میں فائدہ دیتا ہے۔

مقدار خوراک : ۵ ملی لٹر

طریقہ استعمال : یہ عرق صبح اور شام دو نوں وقت پئیں۔ اگر اس میں ۱۵ ملی لٹر شربت نانخواہ ملا کر پئیں تو

زیادہ قوی الازار ہو جائے۔

عرق بادیان  
جگر ، معدہ اور آنکھوں کی بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے ،

معدے کو طاقت دیتا اور ریح کو خارج کرتا ہے۔

مقدار خوراک : ۱۲۵ ملی لٹر

طریقہ استعمال : صبح اور شام دن میں دو بار پئیں۔

عرق پودینہ  
معدے کو طاقت دیتا ہے ، غذا کو ہضم کرتا ہے ، بھوک لگاتا

ہے۔ تھمہ اور ہیضہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔

مقدار خوراک : ۱۲۵ ملی لٹر

طریقہ استعمال : اس عرق میں ۲۵ ملی لٹر گججین لیوں ملا کر پئیں۔

قرص پودینہ  
معدے اور جگر کو قوت دیتے ہیں۔ بھوک لگاتے اور غذا کو



ہضم کرتے ہیں۔ ریاخ کو خارج کرتے ہیں۔

مقدار خوراک: ۲ ٹکلیاں

طریقہ استعمال: کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت کھائیں۔

**مجنون مقوی معدہ** یہ معدے کے طبقات

ہضم اور جذب غذا کے نظام کو درست کر کے بھوک خوب لگاتی ہے، قبض کو دور کرتی ہے، جگر کو بھی تقویت بخشتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵-۵ گرام

طریقہ استعمال: کھانا کھانے کے میں منٹ بعد دونوں وقت پانی سے کھائیں۔

**مجنون ناسخوہ** یہ مجنون معدے کو قوت دیتی ہے، غذا کو ہضم کرتی اور بھوک

لگاتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ مجنون کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت کھائیں۔

**نمک جالینوس** معدہ اور آنتوں کو طاقت دیتا ہے اور معدے کی اس

رطوبت کی پیدائش کو بڑھاتا ہے جو ہضم غذا میں مدد دیتی اور بھوک لگاتی ہے، اس کے علاوہ اس نمک کے استعمال سے دائمی قبض دور ہو جاتا ہے اور ریاخ خارج ہونے لگتے ہیں۔ بدن میں صالح خون کی پیدائش بڑھ جاتی ہے۔

مقدار خوراک: ۲ ٹکلیاں

طریقہ استعمال: کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت کھائیں۔

**نمک سلیمانی** معدے کو قوت دیتا ہے، غذا کو

ہضم کرتا اور بھوک خوب لگاتا ہے۔ پیٹ کے رنجی درد کو دور کرتا اور ریاخ کو خارج کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ایک گرام سے تین گرام تک۔

طریقہ استعمال: کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت کھائیں

معدے کو طاقت بخشتا اور

بھوک لگاتا ہے، پیٹ کی گرانی

اور ریاخ کو دور کرتا ہے، غذا کو ہضم کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۶۰ ملی گرام یا ایک قرص

طریقہ استعمال: یہ نمک یا اس کا ایک قرص جوارش

بہار ۵ گرام میں رکھ کر کھائیں۔

نوشدارو سادہ معدے اور آنتوں کو طاقت

دیتی ہے اور ان کی کمزوری

سے جو دست آجاتے ہیں ان کو روکتی ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام

طریقہ استعمال: یہ نوشدارو صبح کو نہار منہ کھائیں۔

نوشدارو لولوی معدہ، جگر اور آنتوں کو

طاقت دیتی ہے، دل کو

قوت و فرحت بخشتی ہے، دھڑکن اور گھبراہٹ کو دور کرتی

ہے، دستوں کو روکتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: صبح سویرے نہار منہ کھائیں۔

### درد معدہ

معدہ اور آنتوں کے رنجی درد کو

جوارش کمونی روکتی ہے، ریاخ کو خارج کرتی

اور قوت ہضم کو بڑھاتی ہے، ہچکچوں کو روکتی ہے، قبض کو

دور کرتی ہے۔



مقدار خوراک: ۲-۲ گولیاں

طریقہ استعمال: صبح اور شام کھانا کھانے کے بعد کھائیں۔

حب حلتیت  
معدے اور آنتوں کے درد کو دور کرتی ہیں، ریاخ کو خارج کرتی ہیں اور بھوک لگاتی ہیں۔

مقدار خوراک: ۲-۲ گولیاں

طریقہ استعمال: کھانا کھانے کے بعد یا ضرورت کے وقت کھائیں۔

سفوف الاملاح  
پھیٹ کے رنجی درد کو دور کرنے کے لیے نہایت مفید ہے، درد تو لچ کو دور کرتا ہے، غذا کو ہضم کرتا اور بھوک خوب لگاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵۰ ملی گرام سے ۵۰۰ ملی گرام تک  
طریقہ استعمال: یہ سفوف بوقت ضرورت یا کھانا کھانے کے بعد جوارش کمونی ۱۰ گرام میں ملا کر کھائیں۔

سفوف برق  
پھیٹ کے رنجی درد کو دور کرتا اور ریاخ کو خارج کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ایک گرام

طریقہ استعمال: یہ سفوف بوقت ضرورت کھائیں یا کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت استعمال کریں۔

قرص حلتیت  
پھیٹ کے رنجی درد کو دور کرتے ہیں، ریاخ کو خارج کرتے اور بھوک لگاتے ہیں۔

مقدار خوراک: ۲ نکلیاں

طریقہ استعمال: بوقت ضرورت یا کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت کھائیں۔

مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک۔

طریقہ استعمال: دونوں وقت کھانا کھانے کے بعد کھائیں۔

جوارش کمونی اکبر  
معدے کی خراب رطوبتوں اور ریاخ کو خارج کرتی اور معدے کے درد کو تسکین دیتی ہے، ہاضمہ کو درست رکھتی اور قبض کو رفع کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک

طریقہ استعمال: یہ جوارش صبح کو یا کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت کھائیں۔

جوارش کمونی کبیر  
معدے کے درد اور توج رنجی کو دور کرتی ہے، ریاخ کو خارج کرتی اور غذا کے ہضم میں مدد دیتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک

طریقہ استعمال: صبح کو یا بوقت ضرورت کھانا کھانے کے بعد پانی سے کھائیں۔

جوارش کمونی مسہل  
معدے اور آنتوں کو فضلات سے پاک صاف کرتی اور ان کو طاقت پہنچاتی ہے اور ان کے دردوں کو دور کرتی ہے، منہ میں تھوک زیادہ پیدا ہوتا ہو یا رال بہتی ہو اس جوارش کے استعمال سے یہ شکایت دور ہو جاتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام

طریقہ استعمال: یہ جوارش صبح سویرے نہار منہ عرق بادیان یا پانی سے کھائیں۔ قبض کو دور کرنے کے لیے ۱۰ گرام استعمال کریں۔

یہ گولیاں معدے اور آنتوں کے درد کو دور کرتی ہیں، ہاضمہ کے زمانہ میں ان کا استعمال ہاضمہ کے اثرات سے بچاتا ہے۔

حب پیپتہ  
یہ گولیاں معدے اور آنتوں کے درد کو دور کرتی ہیں، ہاضمہ کے زمانہ میں ان کا استعمال ہاضمہ کے اثرات سے بچاتا ہے۔



کھٹی ڈکاریں آتی ہوں اور معدے، حلق اور سینے میں جلن معلوم ہوتی ہو تو ان حالات میں ان قرصوں کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے۔  
مقدار خوراک: ۲ ٹکیاں  
طریقہ استعمال: کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت کھائیں۔

### متلی اور تے

جولش تمر ہندی صفر لوی دستوں اور متلی کو روکتی ہے، صفر لوی مزاج اشخاص کے معدہ اور جگر کو طاقت دیتی اور بھوک لگاتی ہے، گرمیوں اور ہیضہ کے زمانے میں اس کا استعمال بہت مفید ہے۔  
مقدار خوراک: ۱۰ اگرام  
طریقہ استعمال: کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت کھائیں۔  
روغن الاچھی یہ روغن تے، متلی اور دستوں کو روکتا ہے۔  
مقدار خوراک: ۵ یا ۳ قطرے  
طریقہ استعمال: یہ روغن عرق گلاب ۲۵ ملی لٹر میں ملا کر پیئیں۔  
سکجبین ساوہ متلی اور تے کو روکتی ہے، صفر لوی بخاروں میں مفید ہے، پیاس میں تسکین دیتی ہے۔  
مقدار خوراک: ۲۵ ملی لٹر  
طریقہ استعمال: عرق گاؤزہاں ۱۲۵ ملی لٹر یا سادہ پانی میں ملا کر پیئیں۔

چول، سنوف نمک سلیفی، سنوف نمک شیخ ارنیس، سنوف نعلع، قرص پودینہ، مجون مقوی معدہ، مجون مانخولہ، نمک جالینوس، نمک مرگاک، یہ سب معدے کے درد میں مفید ہیں، "مضف معدہ" کے زیر عنوان بیان ہو چکے ہیں۔

### بد ہضمی

یہ کولیاں ہضم کی اصلاح حب ترش مشتمی کرتی ہیں، غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتیں اور بھوک خوب لگاتی ہیں، ریاخ کو خارج کرتی ہیں۔

مقدار خوراک: ۲-۲ کولیاں

طریقہ استعمال: دونوں وقت کھانا کھانے کے بعد کھائیں۔

عرق نعناع بد ہضمی کو دور کرتا ہے، غذا کو ہضم کرتا اور بھوک لگاتا ہے، تے اور متلی کو روکتا ہے۔

مقدار خوراک: ۸۰ ملی لٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق سکجبین ۲۵ ملی لٹر میں ملا کر پیئیں۔

عرق ہاضم بد ہضمی، درد شکم اور ہیضہ میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰ ملی لٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت پیئیں۔

قرص الکھی جب معدے میں غذا کے اچھی طرح ہضم نہ ہونے کی وجہ سے



زیر عنوان درج ہے) بھی مٹی لورتے میں مفید ہیں۔

## قی الدم۔ خون کی قے

**قرص بندش خون** ہر عضو کے جریان خون کو روکتا ہے، نفث الدم (خون تھوکتا) کثرت حیض، نکسیر، پیشاب میں خون آنا، خونی بواسیر وغیرہ کو روکنے کے لیے مفید ہے۔  
مقدار خوراک: ایک قرص

طریقہ استعمال: صبح و شام دودھ پلانی کے ساتھ کھائیں۔  
**قرص حابس** بار بار نکسیر پھوٹنے، پیشاب یا پاخانے میں خون آنے اور کثرت حیض کی شکایت میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ایک قرص  
طریقہ استعمال: صبح و شام ۲۵۰ ملی لٹر دودھ سے کھائیں۔

**قرص کربا** خون کی قے کو روکتا ہے، پیچیدوں سے خون آنے میں مفید ہے۔  
مقدار خوراک: ۳ قرص  
طریقہ استعمال: یہ قرص شربت انجبار ۲۵ ملی لٹر میں ملا کر چائیں۔

## ضعف اشتہا۔ بھوک کی کمی

چھل، جوارش جالینوس، جوارش زنجبیل، جوارش عود ترش، جوارش کموگی، جوہر سین، جوہر متوی مدہ، حب ترش مٹھی، زنگلا، سنوف نناع، سنوف نمک شیخ المرکس، شربت زنجبیل، شربت نانخو، قرص پودینہ، معجون

سکنجبین لیموں مٹی لورتے کو روکتی ہے، مفر لوی بخاروں میں بخار کی

حرارت کو گھٹاتی اور پیاس بجھاتی ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لٹر  
طریقہ استعمال: عرق گاؤ زباں ۱۲۵ ملی لٹر یا سادہ پانی میں ملا کر پیئیں۔

**سکنجبین نعناع** مٹی لورتے کو روکتی ہے، مفر لوی کی تیزی کو کم کرتی اور ہضم

غذا میں مدد دیتی ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لٹر  
طریقہ استعمال: عرق پودینہ ۱۲۵ ملی لٹر یا سادہ پانی میں ملا کر پیئیں۔

**عرق پودینہ** مٹی لورتے کو روکتا ہے، تھمہ اور ہیضہ میں مفید ہے، معدے کو طاقت دیتا ہے، غذا کو ہضم کرتا اور بھوک لگاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی لٹر  
طریقہ استعمال: اس عرق میں سکنجبین لیموں ۲۵ ملی لٹر ملا کر پیئیں۔

**عرق نانخواہ** جگر کی سردی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ پیٹ بڑھنے کو روکتا ہے۔ اچھارہ، ضعف ہضم، معدہ اور آنتوں کے ریاحی درد میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰ ملی لٹر  
طریقہ استعمال: کھانا کھانے کے بعد سادہ پانی میں ملا کر پیئیں۔

جوارش سنر جلی قابض (”ضعف مدہ“ میں درج ہے) شربت انار ترش، شربت مکی (ضعف قلب میں لکھے گئے ہیں) اور عرق نناع (”بد ہضمی“ کے



میں بھی مفید ہے۔  
مقدار خوراک: ۵ گرام  
طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت پانی سے پھلک لیں۔  
جوارش کموگی: معدہ اور آنتوں کی کمزوری سے  
آنے والے دستوں اور پیچش  
کے لیے مفید ہے۔ ریاحی درد کو دور کرتی اور ہچکیوں کو  
روکتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ سے ۱۰ گرام تک  
طریقہ استعمال: دونوں وقت کھانا کھانے کے بعد پانی  
سے کھائیں۔

تخمہ کے تے دستوں کو روکنے میں جلدی نہ کریں، بلکہ  
دمت لانے میں مدد دیں۔ مثلاً جوارش سرجلی مسل  
۵ گرام کھلا کر سوڈا وائٹ یا عرق پودینہ اور عرق الہیچ  
پلائیں۔ قلم اور عرق کافور استعمال کریں جب تے دست  
آکر معدہ اور آنتیں صاف ہو جائیں تو تقویت معدہ کے  
لیے جوارش کموگی، جوارش زنجبیل جیسی دوائیں دیں۔

### ہیضہ

قلمزوم: دوائی پیاریوں کے دنوں میں، خاص کر برسات  
میں ہیضہ و بد ہضمی کی شکایت سے بچنے کے  
لیے اس کا استعمال بے حد ضروری ہے۔  
طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

مقوی معدہ، معجون نانخولہ، نمک سلیمانی، نمک مرگائک، یہ  
سب دوائیں بھوک لگاتی ہیں۔ ان کا بیان ”ضعف معدہ“  
وغیرہ کے زیر عنوان ہو چکا ہے۔

### ہچکی

جوارش کموگی، معجون نانخولہ، حب حلیت، پچول، قرص  
حلیت، یہ سب دوائیں ہچکی میں مفید ہیں اور گزشتہ  
مضامات میں درج ہو چکی ہیں۔

### تبخیر

قرص الکفی، جوارش آملہ، جوارش جالینوس، جوارش عود  
شیریں، جوارش طہاشیر، جوارش معطلی بہ نسخہ کلاں، معجون  
مقوی معدہ، نوشدارو سادہ اور نوشدارو لولوی معدہ کی  
تبخیر کو روکتی ہیں، ان کا بیان ”ضعف معدہ“ کے زیر  
عنوان ہو چکا ہے۔

### تخمہ۔ بد ہضمی کے دست و تے

اندمانی: پرانے دستوں اور پیچش میں مفید ہے۔  
اس کے استعمال سے معدہ اور آنتوں کا  
دور دور ہو جاتا ہے۔ رنجی درد اور مردگی شکایت



## جگر، پتہ اور تلی کی بیماریاں

### ورم و عظم جگر

جوہر نوشادور عظم جگر (جگر کا بڑھ جانا) میں مفید ہے، غذا کو ہضم کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ ملی گرام

طریقہ استعمال: منجوں دبیدالورد ۶۰ گرام میں رکھ کر عرق مکوہ ۵۰ ملی لٹر کے ساتھ کھائیں۔

حب بکند نوشادری یہ گولیاں جگر کی بیماریوں میں خاص طور پر مفید

ہیں۔ خصوصاً ورم جگر اور عظم جگر (جگر کا بڑھ جانا) میں بہت مفید ثابت ہوئی ہیں۔ غذا کو ہضم کرتی ہیں۔

مقدار خوراک: ۲ گولیاں

طریقہ استعمال: کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت کھائیں۔

روغن افسنتین جگر اور معدے کے درموں کو تحلیل کرتا ہے۔

طریقہ استعمال: یہ تیل نیم گرم لگائیں، اوپر سے ایک ارنڈ کا پتہ اسی تیل سے چڑھ کر گرم کر کے ہاندھیں۔

روغن مصطکی جگر بڑھ گیا ہو، سخت ہو گیا ہو، اس روغن کے استعمال

### حرارت جگر۔ جگر کی گرمی

شربت بزوری بارو جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے، پیشاب لاتا ہے

اور پیشاب کی جلن کو دور کرتا ہے، جگر، گردہ اور مثانہ کی گرم بیماریوں میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰ ملی لٹر

طریقہ استعمال: یہ شربت ٹھنڈے پانی میں ملا کر صبح کو پئیں۔

شربت بزوری جگر، گردوں اور مثانہ کی گرمی کو دور کرتا ہے اور

پیشاب لاکر ان کو صاف کرتا ہے، جگر کی گرمی سے بخار رہتا ہو تو وہ بھی دور ہو جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰ ملی لٹر

طریقہ استعمال: پانی میں ملا کر پئیں۔

### برودت جگر۔ جگر کی سردی

جوارش جالینوس، جوارش مہاسہ، جوارش

شریادہ، جوارش مصطکی، شربت بزوری حار جگر

کی سردی کو دور کرنے کے لیے نہایت مفید ہیں۔



سے صحیح حالت میں آجاتا ہے۔

طریقہ استعمال: پیٹ پر نیم گرم مالش کریں، لوپر سے  
ارٹھ کا پتہ گرم کر کے باندھیں۔

شربت بزوری حار  
جگر، گردوں اور مثانہ کی  
بیماریوں میں استعمال کیا

جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰ ملی لٹر

طریقہ استعمال: عرق بادیان ۱۲۵ ملی لٹر پانی میں ملا کر  
پئیں۔

شربت دینار  
ورم جگر، درد جگر اور استقاء میں  
منفید ہے، قبض کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰ ملی لٹر

طریقہ استعمال: یہ شربت عرق بادیان ۱۲۵ ملی لٹر پانی  
میں ملا کر پئیں۔

شربت کاسنی  
جگر، معدہ اور آنتوں وغیرہ کے  
ورم، یہ قان، صفراء کی زیادتی  
اور جگر کی بڑھتی ہوئی گرمی وغیرہ میں منفید ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لٹر سے ۵۰ ملی لٹر تک

طریقہ استعمال: پانی یا کسی مناسب عرق (۱۲۵ ملی لٹر)  
میں ملا کر پئیں۔

ضاد جالینوس  
یہ ضاد معدہ، جگر آنتوں اور  
رحم وغیرہ اندرونی اعضاء کے

درموں کو تحلیل کرنے کے لیے نہایت منفید ہے۔

طریقہ استعمال: ضرورت کے مطابق یہ ضاد چھپے میں  
لے کر گرم کر کے درم پر لگائیں اور لوپر ارٹھ کا پتہ گرم کیا  
ہو باندھیں۔

عرق فستقین  
جگر کی سختی اور درم کو دور کرتا  
ہے۔ ورم جگر کے سبب بخار ہو

تو اس کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰ ملی لٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق صبح و شام دونوں وقت پئیں۔

عرق برنجاسف  
یہ عرق جگر، معدہ، آنتوں  
اور رحم وغیرہ اندرونی

اعضاء کے درموں کو تحلیل کرتا ہے اور ان اعضاء کی  
خرابی سے آنے والے بخار کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی لٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق شربت کشوٹ ۲۵ ملی لٹر میں  
ملا کر پئیں۔

عرق کاسنی  
ورم جگر میں منفید ہے، جگر کی  
گرمی کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی لٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق شربت کاسنی ۲۵ ملی لٹر میں ملا  
کر پئیں۔

عرق مکوہ  
تمام اندرونی اعضاء مثلاً جگر، معدہ  
آنتوں اور رحم کے درموں کو تحلیل

کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ان کی گرمی کو تسکین  
دیتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی لٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق، شربت کاسنی ۲۵ ملی لٹر میں  
ملا کر پئیں۔

معجون دبیدالورد  
ورم جگر، ورم، معدہ ورم  
رحم وغیرہ اندرونی اعضاء

کے درموں کو تحلیل کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ معجون عرق بادیان اور عرق مکوہ  
۶۰-۶۰ ملی لٹر کے ساتھ کھائیں۔



**کشتہ زہرد** ضعف جگر میں مفید ہے، جگر کو طاقت دیتا ہے، دل کو قوت بخشتا ہے، پیشاب کی زیادتی کو روکتا ہے، کھانسی میں مفید ہے۔  
مقدار خوراک: ۳۰ ملی گرام یا ایک قرص  
طریقہ استعمال: جوارش زر عونیٰ ۵ گرام میں رکھ کر کھائیں۔

**کشتہ فولاد** ضعف جگر میں مفید ہے، جگر کو قوت دے کر خون کی پیدائش کو بڑھاتا ہے، اور بیماریوں سے اچھا ہونے کے بعد کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔

مقدار خوراک: ۶۰ ملی گرام یا ۲ قرص  
طریقہ استعمال: یہ کشتہ جوارش جالینوس ۵ گرام یا دواء المسک معتدل جواہر والی ۵ گرام میں رکھ کر کھائیں۔  
کشتہ فولاد سونے چاندی والا جگر کے لیے خاص چیز ہے، خون صالح بکثرت پیدا کرتا ہے، چہرے کو سرخ بنادیتا ہے، ضعف معدہ اور ضعف جگر کو دور کرتا ہے، مقوی غذاؤں کو جزو بدن بناتا اور بدن میں فریبی لاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۳۰ ملی گرام یا ایک قرص  
طریقہ استعمال: یہ کشتہ دواء المسک معتدل جواہر والی ۵ گرام یا جوارش جالینوس ۵ گرام میں رکھ کر کھائیں۔  
**کشتہ مرگانگ** ضعف جگر میں مفید ہے، معدہ اور جگر کو طاقت دیتا ہے۔

مقدار خوراک: ۶۰ ملی گرام یا ۲ قرص  
طریقہ استعمال: یہ کشتہ جوارش جالینوس ۵ گرام میں رکھ کر کھائیں۔

خیرہ ۲۰ بریشم حکیم ارشد والا، دواء المسک معتدل جواہر والی، دواء المسک معتدل جواہر والی خاص، دواء

**عرق ماء اللحم مکوہ کاسنی والا** معدے اور جگر کو طاقت دیتا اور ان کے درموں کو تحلیل کرتا ہے، عام جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے۔  
مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی لٹر  
طریقہ استعمال: یہ عرق، شربت کاسنی ۲۵ ملی لٹر میں ملا کر پئیں۔

### ضعف جگر

**دواء الکرم کبیر** ضعف جگر میں مفید ہے، بیماریوں میں بھی مفید ہے، جب کہ ان کا سبب سردی ہو، گردہ و مثانہ کو بھی طاقت دیتی ہے، ریاخ کو خارج کرتی ہے، اشتیاق میں مفید ثابت ہوتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام  
طریقہ استعمال: یہ دوا صبح کو نہار منہ کھا کر لوپر سے ۱۲۵ ملی لٹر عرق بادیان پی لیں۔

**شربت کٹوٹ** ضعف جگر کے سدوں کو کھولتا ہے، بخاروں میں مفید ہے جو جگر کی خرابی سے آتے ہیں۔

مقدار خوراک: ۵۰ ملی لٹر  
طریقہ استعمال: یہ شربت، عرق بادیان ۱۲۵ ملی لٹر میں ملا کر پئیں۔

**کشتہ خبث الحدید** ضعف جگر میں مفید ہے، معدے کی کمزوری کو دور کرتا ہے، خون کی پیدائش کو بڑھاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی گرام یا ۲ ٹکیاں  
طریقہ استعمال: یہ کشتہ صبح نہار منہ جوارش جالینوس ۵ گرام میں رکھ کر کھائیں۔



**مجمون حجر الیسود** کدو دھانہ کی پتھری اور ریک کو خارج کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام  
طریقہ استعمال: یہ مجمون کھا کر لوپر سے پانی میں شربت بزدوری ۵۰ ملی لٹر ملا کر پیئیں۔

قرص کشتہ حجر الیسود گردو دھانہ کی پتھری اور ریک کو خارج کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ایک قرص  
طریقہ استعمال: یہ کشتہ، مجمون مقرب ۳ گرام یا مجمون حجر الیسود ۵ گرام میں رکھ کر یا سبکجین بزدوری ۱۰ ملی لٹر میں ملا کر استعمال کریں۔

سنگ مرارہ کے مریض کو اگر ضعف معدہ کی وجہ سے اچھا رہ یارنجی درد کی شکایت ہو تو حب حلیطہ ۲-۲ گولیاں کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت دیں۔

### عظم طحال۔ تلی کا بڑھ جانا

ذوبانی بڑھی ہوئی تلی کو صحیح حالت میں لانے کے لیے ذوبانی ایک اکسیر دوا ہے۔ یہ معدے اور جگر کی بھی اصلاح کرتی ہے۔  
طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

شربت المسنین اور مناد جالینوس بھی درم و عظم طحال میں مفید ہیں۔ درم جگر کے زیر عنوان درج ہیں۔

ہلکے معتدل سادہ، کشتہ طلاکالا، مفرح اعظم، یہ سب دوائیں "ضعف جگر" میں مفید ہیں، لوریہ "ضعف قلب" کے زیر عنوان لکھی جا چکی ہیں۔ ان کے علاوہ جوارش انارین، نوشدارو سادہ اور نوشدارو لولوی بھی ضعف جگر میں فائدہ دیتی ہیں لوریہ "ضعف معدہ" میں لکھی گئی ہیں۔

### استقواء۔ جلندھر

**مجمون کلکالنج** استقواء میں مفید ہے، پیشاب لاتی ہے اور درد قونج کو تسکین دیتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک  
طریقہ استعمال: یہ مجمون عرق بادیاں ۱۲۵ ملی لٹر سے کھائیں۔

دواء الکر کم کبیر، شربت دینار، شربت کھوٹ، استقواء میں مفید ہیں۔ لوریہ ضعف جگر اور درم جگر میں لکھے گئے ہیں۔

### سنگ مرارہ۔ پتہ کی پتھری

**دوائے سنگ** گردو دھانہ کی پتھری کو کلڑے کلڑے کر کے نکال دیتی ہے اور کردہ کے درد کو تسکین بخشتی ہے۔ مرارے کی پتھری کو نکالنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ سے ۲۵۰ ملی گرام تک۔  
طریقہ استعمال: یہ دوا سبکجین بزدوری ۲۵ ملی لٹر میں ملا کر کھائیں۔



## آنتوں کی بیماریاں

طریقہ استعمال: رات کو پانی سے کھا کر سو رہیں، پیچش کی صورت میں (اگر گرانی محسوس ہو تو) ان گولیوں کے استعمال سے ایک دن پہلے روغن ارنڈی ۴۰ ملی لیٹر دودھ میں ملا کر صبح کو پیئیں اور رات کو حب پیچش کھائیں۔

حب ساق  
معدے اور آنتوں کی کمزوری سے آنے والے دست ان گولیوں کے استعمال سے رک جاتے ہیں۔

مقدار خوراک: ایک گولی  
طریقہ استعمال: صبح اور رات کو پانی سے کھائیں۔

دوائے سیاہ پیچش  
سدی ہو یا غیر سدی، ہر حال میں اس کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام  
طریقہ استعمال: یہ دوا صبح کو پانی سے کھائیں۔

سفنوف مقلیثا  
پرانے دستوں اور پیچش میں مفید ہے، درد اور مروڑ کو دور کرتا ہے۔ بواسیر رنجی میں بھی فائدہ دیتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام  
طریقہ استعمال: یہ سفوف صبح و شام پانی سے کھائیں۔

### اسہال (دست)۔ پیچش

پیچش یہ اسہال و پیچش کی حمایت مفید دوا ہے۔ اسہال (دست) خولہ کیسی ہی شدت سے جاری ہوں اور پیچش خولہ کیسی ہی شدید ہو، اس کے استعمال سے دور ہو جاتی ہے۔

مقدار خوراک: ایک قرص  
طریقہ استعمال: پانی یا دودھ کے ساتھ کھائیں۔ دن میں تین مرتبہ سے زیادہ ہر گز استعمال نہ کریں۔

جوارش طباشیر  
گری سے آنے والے دستوں کو بند کرتی ہے۔ معدے سے دماغ کی طرف بخارات کے چڑھنے (تخیر) کو روکتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام  
طریقہ استعمال: یہ جوارش صبح اور شام دونوں وقت کھائیں۔

حب پیچش  
یہ گولیاں دستوں کو روکتی ہیں، پیچش کو دور کرتی ہیں۔ درد اور مروڑ کی شکایت بھی ان کے استعمال سے جاتی رہتی ہے۔

مقدار خوراک: ایک گولی



## قبض

جوارش سفر جلی مسهل یہ جوارش دست لاتی ہے، درد تونج کو دور کرتی ہے، جگر کی حرارت کو کم کرتی ہے، بھوک لگاتی ہے، معدے کو طاقت دیتی ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام  
طریقہ استعمال: یہ جوارش صبح کو یارات کو پانی سے کھائیں۔

جوارش شہریاراں قبض کو دور کرتی ہے، معدے اور جگر کی سردی کو دور کرتی اور ان کو طاقت دیتی ہے، تونج میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام  
طریقہ استعمال: یہ جوارش صبح یا رات کو پانی سے کھائیں۔

خمیرہ بنفشہ ایک ہلکی قبض کشا دوا ہے۔ ہر قسم کے بخاروں، نزلہ زکام، کھانسی، دمہ اور سینے کے دوسرے امراض میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ گرام سے ۵۰ گرام تک  
طریقہ استعمال: یہ خمیرہ عرق بادیان ۱۲۵ ملی لیٹر پانی میں ملا کر پیئیں۔

شربت ارزانی آنتوں سے خشک فضلہ کو پھسلا کر قبض کو دور کرتا ہے، نزلہ زکام اور کھانسی کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لیٹر سے ۵۰ ملی لیٹر تک۔  
طریقہ استعمال: یہ شربت صبح کو نیم گرم پانی میں ملا کر پیئیں۔

قرص تنکار دائمی قبض کو دفع کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پیٹ کی

پیش میں سٹوف چھانک کر لوپر سے ریشہ صطی ۵ گرام کا لعاب پانی ۱۲۵ ملی لیٹر میں نکال کر شربت بنفشہ ۲۵ ملی لیٹر ملا کر پیئیں۔

شربت بیلگری دستوں اور پیش میں مفید ہے، گرمی کو تسکین دیتا اور پیاس کو بجھاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لیٹر سے ۵۰ ملی لیٹر تک  
طریقہ استعمال: یہ شربت پانی میں ملا کر پیئیں۔

شربت حب الاس ہر قسم کے دستوں کو بند کرتا ہے، دستوں میں خون آتا ہوا اس کو روکتا ہے، معدے اور آنتوں کو طاقت بخشتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لیٹر سے ۵۰ ملی لیٹر تک  
طریقہ استعمال: یہ شربت پانی میں ملا کر پیئیں۔

معجون سنگدانہ مرغ معدے اور آنتوں کی کمزوری کو دور کرتی ہے اور ان کی کمزوری سے آلے والے دستوں کو روکتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام  
طریقہ استعمال: یہ معجون صبح و شام دونوں وقت پانی سے کھائیں۔

جوارش آملہ، جوارش آملہ عذری، جوارش انارین، جوارش سفر جلی قابض، جوارش معطلی، جوارش معطلی بہ نسخہ کلاں، شربت انار ترش، شربت بی، نوشدارو سادہ اور نوشدارو لولوی جو "ضعف قلب" کے زیر عنوان لکھے جا چکے ہیں، معدہ اور آنتوں کی کمزوری سے آلے والے دستوں کے لیے بھی مفید ہیں۔



جوارش عود ملین اور جوارش کونی مسل قبض کشا ہیں،  
امراض معدہ میں درج ہو چکے ہیں۔  
حب سورنجان، معجون سورنجان، قبض کشا ہیں، ان کو وجہ  
مفاصل کے زیر عنوان لکھا گیا ہے۔  
شربت دینار اور شربت درد بھی ملین ہیں، امراض جگر  
میں درج ہیں۔

### کرم شکم۔ پیٹ کے کیڑے

یہ دوا پیٹ کے ہر قسم کے  
کیڑوں خصوصاً کینچوں کو مار  
کر خارج کر دیتی ہے اور آئندہ کے لیے ان کی پیدائش کو  
روک دیتی ہے۔  
مقدار خوراک: ۱۰ اگرام

طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت پانی سے کھائیں،  
تین روز لگا تار کھانے کے بعد چوتھے دن رات کو قرص  
ملین ۲ عدد پانی سے کھائیں۔

ان کے استعمال سے پیٹ کے  
کیڑے مر کر نکل جاتے ہیں۔  
قرص دیدان  
مقدار خوراک: ۲ قرص

طریقہ استعمال: یہ قرص صبح کو پانی سے کھائیں۔

### بواسیر

اٹریفل مقل  
خونی اور بادی بواسیر میں فائدہ  
دیتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے۔  
مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ اگرام تک  
طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت پانی سے کھائیں۔  
جوارش بسباسہ  
بواسیر بادی کے لیے مفید ہے،  
معدے اور جگر کی سردی کو دور

کرانی کو دور کرتے اور بھوک لگاتے ہیں۔

مقدار خوراک: ایک یا دو قرص

طریقہ استعمال: رات کو دودھ یا پانی سے نکل کر سو  
رہیں۔

قرص ملین  
معدہ اور آنتوں کو فضلات سے پاک  
صاف کرنے کے لیے نہایت مفید  
ہیں۔ نزلہ زکام، آشوب چشم اور ناک کان کی پیدائش میں  
رفع قبض کے لیے عموماً استعمال کیے جاتے ہیں۔

مقدار خوراک: ۲ قرص  
طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت دودھ یا پانی سے  
کھائیں۔

معجون انجیر  
دائمی قبض کو دور کرنے کے لیے  
نہایت مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ اگرام  
طریقہ استعمال: یہ معجون رات کو دودھ یا پانی سے  
کھائیں۔

معجون قرطم  
دائمی قبض کے لیے نہایت  
مناسب دوا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ اگرام  
طریقہ استعمال: یہ معجون صبح کو پانی سے کھائیں۔

ہنز و لیکس  
قبض کشا ہے  
مقدار خوراک: بزرگوں کو ۲ قرص، بچوں کو نصف قرص  
سے ایک قرص تک

طریقہ استعمال: سوتے وقت گرم پانی یا گرم دودھ کے  
ساتھ کھائیں۔

اٹریفل زئی، اٹریفل سنائی، اٹریفل شییری،  
اٹریفل ملین، لیارج فیتر، قبض کو رفع کرتے ہیں۔ یہ  
دوائی امراض میں "دوسر" کے زیر عنوان لکھی جا چکی ہیں۔



مرہم سائیدہ چوب نیم والا  
بواسیری مسوں کے درد اور جلن کو تسکین دیتا اور ان کو خشک کر کے گر لیتا ہے۔  
طریقہ استعمال: آبدست کے بعد مسوں پر یہ مرہم لگائیں۔

مرہم مازو  
بواسیری مسوں کے درد اور جلن کو تسکین دیتا ہے۔  
طریقہ استعمال: آبدست سے فارغ ہونے کے بعد پانی کو خشک کر کے یہ مرہم لگائیں۔

مبجون حبث الحدید  
اس مبجون کے استعمال سے خون بواسیر رک جاتا ہے، مدہ اور جگر کو تقویت پہنچتی ہے اور بھوک خوب لگتی ہے۔

مقدار خوراک: ۳ گرام سے ۵ گرام تک۔  
طریقہ استعمال: یہ مبجون صبح کو چھاپے سے کھائیں۔  
مبجون مقل  
خونی و بادی بواسیر میں مفید ہے، مدہ کو طاقت دیتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام  
طریقہ استعمال: یہ مبجون صبح کو پانی سے کھائیں۔

نمک بواسیر  
اس کی چند خوراک میں خون بواسیر بند ہو جاتا ہے۔  
مقدار خوراک: آدھا گرام سے ایک گرام تک۔  
طریقہ استعمال: یہ نمک دی ۳۰ گرام میں ملا کر کھائیں۔

ہمدور انڈ (مرہم لور کمپوسل)  
بواسیر کا کامیاب اور دوبارہ علاج ہے جو جدید و قدیم تحقیقات کو سامنے

کرتی ہے اور اس کی وجہ سے بد ہضمی کی شکایت رہتی ہو تو وہ رفع ہو جاتی ہے۔ پیٹ کے بڑھنے کو روکتی ہے، کھانا کھانے کے بعد کھانے سے غذا کو ہضم کرتی اور پیٹ کے رنجی درد کو دور کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام  
طریقہ استعمال: یہ جوارش صبح کو یا کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت کھائیں۔

حب بواسیر بادی  
بواسیر بادی میں مفید ہیں۔  
مقدار خوراک: ۲ گولیاں

طریقہ استعمال: صبح کو پانی سے کھائیں۔  
حب بواسیر خونی  
بواسیر خونی کے لیے مفید ہیں۔

مقدار خوراک: ۲ گولیاں  
طریقہ استعمال: صبح و شام دودھ یا پانی سے کھائیں۔  
حب رسوت  
بواسیر خونی اور بواسیری دستوں میں مفید ہیں۔

مقدار خوراک: ۲ گولیاں  
طریقہ استعمال: صبح و شام تازہ پانی سے کھائیں۔  
حب مقل  
بواسیر بادی میں مفید ہیں، قبض کو دور کرتی ہیں۔

مقدار خوراک: ۳ گولیاں  
طریقہ استعمال: رات کو پانی سے کھائیں۔  
مرکبی  
بواسیر بادی میں مفید ہیں۔

مقدار خوراک: ایک قرص  
طریقہ استعمال: رات کو جوارش جالینوس ۵ گرام میں رکھ کر کھائیں، یا صبح و شام پانی سے کھائیں۔



یہ کچھسول بہت جلد  
دورن خون میں جذب  
ہو کر خون کو روکتے ہیں اور دم کو تحلیل کرتے ہیں۔  
طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

اٹریفل کشیزی جو "درد سر" میں بیان ہو چکا  
ہے، اور جو راش جالینوس جو "ضعف معدہ"  
میں درج ہے، قرص گلنار "نفٹ الدم"  
میں تحریر ہے، یہ سب دوائیں بواسیر میں  
بھی مفید ہیں۔

رکتے ہوئے ہمدرد کے تجربات کا حاصل ہے، یہ بیرونی اور  
داخلی، دونوں طرح اپنا تیز اثر دکھاتی ہے۔ درد میں سکون  
اور جلن میں کمی لاتی ہے، جراثیم کو مار ڈالتی ہے، خطرناک  
خون آنے کو روکتی ہے، مسوں کے درم کو دور کرتی ہے اور  
زخم کو تیزی سے بھرتی ہے۔

اسے مقامی طور پر استعمال کیجیے  
ہمدور انڈمرہم  
یہ تیزی سے درد اور جلن کو  
دور کرنے اور مسوں کے زخم کو بھرنے اور جراثیم سے  
پاک ہونے میں تیز مدد دے گا۔

## گردہ و مثانہ کی بیماریاں

نکالنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔  
مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی گرام سے ۲۵۰ ملی گرام تک  
طریقہ استعمال: یہ دوا کچھن بزدوری ۲۵ ملی لٹر میں  
ملا کر کھائیں۔

گردہ و مثانہ کی پتھری اور  
شربت آلو بالو  
ریگ کو خارج کرتا ہے اور  
پیشاب لاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لٹر سے ۵۰ ملی لٹر تک  
طریقہ استعمال: یہ شربت عرق انناس ۱۲۵ ملی لٹر میں  
ملا کر پیئیں۔

### ضعف گردہ و مثانہ

جولش زر عونی عنبری، چندر پر بھلائی، جیون پراش، سنوف  
کالا، لوب کبیر، لوب معتدل، مجون فلاسفہ، مجون  
کندر ضعف گردہ و مثانہ میں مفید ہیں۔

### سنگ گردہ و مثانہ

گردہ و مثانہ کی پتھری کو کھڑے  
دوائے سنگ  
کھڑے کر کے نکال دیتی ہے اور  
گردہ کے درد کو تسکین بخشتی ہے۔ مرارے کی پتھری کو



مقدار خوراک: ۵ گرام  
 طریقہ استعمال: یہ معجون کھا کر اوپر سے عرق انناس  
 ۱۲۵ ملی لیٹر شربت بزدوری ۲۵ ملی لیٹر میں ملا کر پیئیں۔  
 معجون عقرب  
 یہ معجون گردہ و مثانہ کی  
 پتھری کو کھولے کھولے  
 کر کے نکال دیتی ہے۔

مقدار خوراک: ۳ گرام  
 طریقہ استعمال: یہ معجون کھا کر اوپر سے خم کرفس اور  
 بادیان ہر ایک ۵ گرام کو پانی میں جوش دے کر چھان  
 کر پیئیں۔

### گردہ اور مثانہ کی گرمی

شربت ورد مکرر جگر، معدہ، آنتوں اور گردہ  
 و مثانہ کی گرم بیماریوں میں  
 مفید ہے۔ قبض کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰ ملی لیٹر  
 طریقہ استعمال: کسی مناسب عرق میں ملا کر پیئیں۔

گردوں اور مثانہ کی گرمی کو دور کرنے کے لیے  
 شربت بزدوری بارد، شربت بزدوری معتدل،  
 شربت انناس اور عرق انناس مفید ہیں۔

### ورد گردہ

ورد گردہ کو دور کرنے کے لیے دوائے سنگ، قرص کالج،  
 کثت حجر الیسود مفید ہیں اور یہ سب "سنگ گردہ و مثانہ"  
 کے زیر عنوان لکھے گئے ہیں۔

قرص کالج  
 یہ قرص گردہ و مثانہ کی پتھری اور  
 ریک کو خارج کرتے ہیں اور  
 پیٹاب لاتے ہیں۔ درد گردہ میں مفید ہیں۔

مقدار خوراک: ۳ قرص

طریقہ استعمال: یہ قرص صبح و شام دونوں وقت عرق  
 گاؤزباں ۱۲۵ ملی لیٹر شربت بزدوری ۲۵ ملی لیٹر کے ساتھ  
 کھائیں۔

کثت حجر الیسود  
 گردہ و مثانہ کی پتھری اور  
 ریک کو خارج کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی گرام یا ایک قرص  
 طریقہ استعمال: یہ کثت، معجون عقرب ۳ گرام یا معجون  
 حجر الیسود ۵ گرام میں رکھ کر یا سبکجین بزدوری ۱۰ ملی لیٹر  
 میں ملا کر استعمال کریں۔

کثت سنگ سرمائی  
 گردہ و مثانہ کی پتھری  
 کو نکالنے کے لیے  
 مستعمل ہے۔

مقدار خوراک: ۶۰ ملی گرام  
 طریقہ استعمال: یہ کثت، جوارش زر عونی مغبری بہ نسخہ  
 کلاں ۵ گرام میں رکھ کر یا سبکجین بزدوری ۱۰ ملی لیٹر میں ملا کر  
 استعمال کریں۔

معجون حجر الیسود  
 گردہ و مثانہ کی پتھری اور  
 ریک کو خارج کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام  
 طریقہ استعمال: یہ معجون صبح کو کھا کر اوپر سے شربت  
 بزدوری معتدل ۲۵ ملی لیٹر یا تازہ پانی میں ملا کر پیئیں۔

معجون سنگ سرمائی  
 گردہ و مثانہ کی  
 پتھری اور ریک کو  
 خارج کرتی ہے۔



گردوں اور مثانہ کو طاقت دیتی ہے۔  
مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ معجون صبح و شام کھائیں، اگر اس کے ساتھ کشتہ خجستہ المہدیہ یا کشتہ بیضہ مرغ ۱۲۵ ملی گرام کھائیں تو نمایاں فائدہ جلد ظاہر ہوتا ہے۔

بلوٹی، معجون فلاسفہ، جوارش مصطفیٰ اور کشتہ بیضہ مرغ بھی پیشاب کی زیادتی میں مفید ہیں۔

### پیشاب کی بندش

شربت بزوری معتدل جگر، گردوں اور مثانہ کی گرمی کو دور کرتا ہے اور پیشاب لا کر ان کو صاف کرتا ہے جگر کی گرمی سے بخار رہتا ہو تو وہ بھی دور ہو جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰ ملی لٹر

طریقہ استعمال: پانی میں ملا کر پیئیں۔

شربت نانخواہ معدے کو طاقت دیتا ہے اور بھوک لگاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لٹر

طریقہ استعمال: ۱۲۵ ملی لٹر پانی میں ملا کر پیئیں۔

اس کے علاوہ شربت بزوری، شربت کاسنی، شربت انناس، اور عرق کاسنی بھی پیشاب کو جاری کرتے ہیں۔

### ذیابیطس۔ پیشاب میں شکر آنا

ذیابیطس کی کامیاب دوا ہے۔ اس کے استعمال سے پیشاب کا بار بار آنا اور اس میں شکر کا خارج ہونا رک جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ گردوں اور مثانہ کو طاقت بھی دیتی ہے۔  
طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

ذیابیطس میں مفید ہے، پیشاب کشتہ بیضہ مرغ کی زیادتی کو روکتا ہے، مردوں کے مرض جربان و رقت منی اور عورتوں کے مرض سیلان الرحم کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی گرام یا ۲ قرص

طریقہ استعمال: یہ کشتہ، جوارش مصطفیٰ، اگر امیا معجون سپاری پاک، اگر ام میں رکھ کر کھائیں، لوہے ۲۵۰ ملی لٹر دودھ پیئیں۔

### پیشاب کی زیادتی

معجون ماسک البول مثانہ کو طاقت دیتی اور پیشاب کی زیادتی کو روکتی ہے۔ رات کو نیند کی حالت میں پیشاب نکل جانے کے لیے بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ معجون رات کو سوتے وقت پانی سے کھائیں۔

معجون کندر پیشاب کی زیادتی، سلس البول (پیشاب کا بلا لڑوہ لگنا) اور رات کو بستر پر پیشاب نکل جانے کی عادت کو دور کرتی ہے



ہیں، قرص سلاجیت اور ہلوٹی اس مرض میں مفید ہیں۔ "جریان" کے تحت درج ہیں۔

### پیشاب میں خون آنا

قرص بندش خون، قرص حابس، قرص گنار اور کشتہ سنگ جراثیم، یہ سب پیشاب میں خون آنے کو روکتے ہیں۔ "فٹ الدم" کے زیر عنوان درج ہیں۔

### پیشاب کی جلن

شربت بزدوری، شربت کاسنی، پیشاب کی جلن کو دور کرتے ہیں۔ امراض جگر میں لکھے گئے ہیں۔

### بستر پر پیشاب نکل جانا

مجمون ماسک البول، مجمون کنور، کشتہ پیضہ مرغ، قرص سلاجیت اور ہلوٹی، یہ سب دوائیں بستر پر پیشاب نکل جانے کی عادت کو دور کرتی ہیں۔ پچھلے صفحات میں پیشاب کی زیادتی، ذیابیطس اور جریان کے تحت درج ہیں۔

### سلس البول (پیشاب کا بلا لروہ قطرہ قطرہ نکلنا)

چدر پر بھلوٹی، مجمون ماسک البول، یہ سب دوائیں سلس البول (پیشاب کا بلا لروہ قطرہ قطرہ نکلنا) میں مفید ہیں۔ ذیابیطس اور پیشاب کی زیادتی کے زیر عنوان لکھی گئی

## مردوں کی مخصوص بیماریاں

جوہر سینہ معدے کو قوت دینا اور قوت ہاضمہ کو بڑھاتا ہے، بھوک خوب لگاتا ہے، اعصاب کو قوی کرتا اور قوت باہ کو بڑھاتا ہے۔ جاڑوں کے موسم میں بوڑھوں اور بلیٹی مزاج اشخاص کے لیے خصوصیت سے مفید ہے۔  
مقدار خوراک: ۳۰ ملی کرام  
طریقہ استعمال: یہ جوہر، مکھن یا ملائی ۲۵ کرام میں ملا کر کھائیں، لوہر سے ۲۵۰ ملی لٹروں تک۔

### ضعف باہ

الا حمر یہ دوا اطلاع کی متوی باہ ہے، لیکن اس کا استعمال جاڑوں کے موسم میں بوڑھوں اور بلیٹی مزاج مریضوں کے لیے مناسب ہے۔  
مقدار خوراک: ۱۵ ملی کرام  
طریقہ استعمال: یہ دوا مکھن یا ملائی ۱۰ کرام میں ملا کر کھائیں، لوہر سے ۲۵۰ ملی لٹروں تک۔



**حب خاص** یہ گولیاں اعصاب کو قوت دیتیں اور قوت باہ کو بڑھانے کے لیے

مخصوص ہیں۔ اس کے علاوہ دل، دماغ اور جگر کو تقویت بخشتی ہیں، بدن میں قوت و حرارت پیدا کرتیں اور دوران خون کو تیز کرتی ہیں، معدے کو قوت دیتیں اور بھوک بڑھاتی ہیں۔

مقدار خوراک: ایک گولی

طریقہ استعمال: صبح یارات کو ۲۵۰ ملی لٹر دودھ سے کھائیں۔

**حب غبر مومیائی** یہ گولیاں دل، دماغ اور اعصاب کو قوت دیتی ہیں، قوت باہ کو بڑھاتی ہیں، مادہ تولید (منی) کی اصلاح کرتی ہیں۔

مقدار خوراک: ۲ گولیاں

طریقہ استعمال: رات کو ۲۵۰ ملی لٹر دودھ سے کھائیں۔

**مبہی خاص** یہ کپسول قوت باہ کو بڑھانے کے لیے عجیب الاثر ہیں، عصبی کمزوری کو بہت جلد دور کر دیتی ہیں، نقص تغذیہ اور ضعف اعصاب سے جو مردانہ کمزوری لاحق ہوتی ہے اسے بھی دور کر دیتی ہیں۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

**حلوائے ثعلب** یہ حلوائے درجہ کا مقوی باہ ہے۔ مادہ تولید (منی) کی

پیدائش کو بڑھاتا اور عام جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے، دماغی کمزوری کے لیے بھی مفید ہے، بدن میں خون کی پیدائش کو بڑھاتا ہے اور اس کو فروغ دیتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ گرام

**حب احمر** یہ گولیاں اعصاب کو قوت دینے اور قوت باہ کو بڑھانے کے لیے مفید ہیں۔

جاڑوں کے موسم میں ان کا استعمال مناسب ہے۔

مقدار خوراک: آدمی گولی سے ایک گولی تک

طریقہ استعمال: جوان آدمی پہلے دن آدمی گولی مکھن یا ملائی میں رکھ کر کھائیں لوپر سے ۲۵۰ ملی لٹر دودھ پئیں۔

ایک ہفتے تک استعمال کرنے کے بعد پوری ایک گولی روزانہ اسی طرح استعمال کریں۔ بوڑھے آدمی پہلے دن سے ہی پوری ایک گولی اسی طرح کھائیں۔

**حب المسک** یہ دل و دماغ اور اعصاب میں تھکاوٹ پیدا کر کے قوت باہ میں بھان پیدا کر دیتی ہے۔

مقدار خوراک: ایک گولی

طریقہ استعمال: صبح یارات کو دودھ سے کھائیں۔

**حب جالینوس** یہ گولیاں اعصاب کو قوت دیتیں اور قوت باہ کو بڑھاتی ہیں۔

مقدار خوراک: ۲ گولیاں

طریقہ استعمال: صبح یارات کو ۲۵۰ ملی لٹر دودھ سے کھائیں۔

**حب جدوار** یہ گولیاں قوت باہ کو بڑھاتیں اور قوت اساک پیدا کرتی ہیں، جریان، رقت اور سرعت میں بھی مفید ہیں۔ نزلہ و زکام اور کھانسی میں بھی فائدہ دیتی ہیں۔

مقدار خوراک: ایک یا دو گولی

طریقہ استعمال: صبح یارات کو کھا کر ۲۵۰ ملی لٹر دودھ پئیں۔



طریقہ استعمال: یہ حلوامیج کو کھا کر ۲۵۰ ملی لٹر دودھ پئیں۔

ضعفین: یہ دوا اعصاب کی عام کمزوری اور ضعف باہ کو دور کرتی ہے، کثرت جماع اور جلیق کی وجہ سے عام جسمانی کمزوری لاحق ہو جائے اور قوت باہ کمزور ہو جائے، خون کی پیدائش ٹھٹ جائے اور حرارت فری کم ہو جائے تو ضعفین کے استعمال سے حیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے البتہ ذکات حس کی صورت میں اس کا استعمال مناسب نہیں ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

عصبول: نظام صمبی کی کمزوری کو دور کرتا ہے، کثرت احتلام سے ضعف باہ پیدا ہو جائے اس کے استعمال سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ مردانہ عضو میں دوران خون کو جوش پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بوڑھے لوگوں کے لیے خاص طور پر مفید ہے۔

مقدار خوراک: ایک ٹکیہ

طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت دودھ یا چائے سے کھائیں۔

قرص خراطین: کثرت جماع کے نتیجے میں جو ضعف باہ لاحق ہو، اس کو دور کرنے کے لیے خاص طور پر مفید ہیں، نظام صمبی میں تحریک پیدا کر کے عضو مخصوص میں جوش اور طاقت پیدا کرتے ہیں۔

مقدار خوراک: ۲ قرص

طریقہ استعمال: صبح کو لبوب کبیر ۵ گرام میں رکھ کر کھائیں لوپر سے دودھ پئیں، صرف دودھ کے ساتھ بھی یہ قرص کھا سکتے ہیں۔

کشتہ سم الفار: اعلا درجہ کا مقوی باہ ہے، بھوک لگاتا اور قوت ہاضمہ کو بڑھاتا ہے دودھ کمی کو ہضم کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۳۰ ملی گرام یا ایک قرص۔

طریقہ استعمال: یہ کشتہ مکھن یا ملائی ۲۵ گرام میں رکھ کر کھائیں، لوپر سے ۲۵۰ ملی لٹر دودھ پئیں۔

کشتہ شنگرف: عام جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے، اعصاب کو طاقت دیتا ہے، قوت باہ کو بڑھاتا ہے، بھوک خوب لگاتا ہے، مقوی و مرغین غذاؤں کو ہضم کرتا ہے، خون کی پیدائش کو بڑھاتا ہے، بلغمی کھانسی اور دمہ میں مفید ہے۔ جائیوں میں اس کا استعمال مناسب ہے۔

مقدار خوراک: ۶۰ ملی گرام یا ۲ قرص

طریقہ استعمال: یہ کشتہ شد ۱۰ ملی لٹر میں ملا کر کھائیں یا مکھن یا ملائی میں ملا کر کھائیں، لوپر سے ۲۵۰ ملی لٹر دودھ پئیں۔

لبوب اعظم: یہ لبوب دماغ و اعصاب کو طاقت دیتا ہے، مردانہ اعضاء کو غذائیت دے کر انہیں تقویت بخشتا ہے، قوت باہ کو بڑھاتا ہے اور مادہ تولید (منی) کی اصلاح کرتا ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

لبوب الاسرار: دل، دماغ اور اعصاب کو طاقت دیتا ہے، مادہ تولید کو زیادہ کر کے قوت باہ کو بڑھاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام

طریقہ استعمال: یہ لبوب صبح کو کھا کر ۲۵۰ ملی لٹر دودھ پئیں۔



میں بہت تیزی سے اپنا اثر دکھاتا ہے۔  
 طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔  
 معجون اسپند سوختنی معوی باہ و مسک ہے، معوی  
 میں سختی پیدا کرتی ہے۔  
 مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک  
 طریقہ استعمال: یہ معجون صبح کو دودھ کے ساتھ  
 کھائیں۔  
 معجون پنہ دانه معوی باہ و مولد منی ہے۔  
 مقدار خوراک: ۱۰ گرام  
 طریقہ استعمال: یہ معجون صبح کو ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ کے  
 ساتھ کھائیں۔  
 معجون پیاز مادہ تولید (منی) کو زیادہ کرتی اور قوت  
 باہ کو بڑھاتی ہے۔  
 مقدار خوراک: ۱۰ گرام  
 طریقہ استعمال: یہ معجون صبح کو کھا کر ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ  
 پئیں۔  
 معجون ثعلب = معجون مادہ تولید (منی) کو  
 بڑھانے اور قوت باہ کو تحریک  
 دینے والی مشہور معجون ہے، جریان اور رقت منی کی  
 شکایتیں بھی اس کے استعمال سے دور ہو جاتی ہیں۔  
 مقدار خوراک: ۵ گرام  
 طریقہ استعمال: یہ معجون صبح کو ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ کے  
 ساتھ کھائیں۔  
 معجون جالینوس لولوی = معجون عام معوی  
 جسم، معوی اعصاب  
 اور معوی باہ ہے، خون صالح پیدا کرتی اور چرے کا رنگ  
 نکھارتی ہے، ہر معوی کمزوری کو دور کر دیتی ہے۔  
 مقدار خوراک: ۵ گرام

لبوب بارد قوت باہ کو بڑھاتا ہے، گرم حرج  
 لوگوں کے لیے مخصوص ہے۔  
 مقدار خوراک: ۱۰ گرام  
 طریقہ استعمال: یہ لوب صبح کو کھا کر ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ  
 پئیں۔  
 لبوب صغیر مادہ تولید (منی) کی پیدائش کو زیادہ  
 کرتا اور قوت باہ کو بڑھاتا ہے۔  
 مقدار خوراک: ۱۰ گرام  
 طریقہ استعمال: یہ لوب صبح کو کھا کر ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ  
 پئیں۔  
 لبوب کبیر دماغ و اعصاب کو طاقت دیتا ہے، مادہ  
 تولید کی پیدائش کو زیادہ کرنے اور  
 قوت باہ کو بڑھانے کے لیے لاجوب اثر رکھتا ہے، گردوں  
 کو طاقت دیتا ہے، اور عام جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے۔  
 مقدار خوراک: دوا کے ساتھ ہے  
 دماغ اور گردہ و مثانہ کو طاقت دیتا  
 لبوب معتدل ہے، مادہ تولید (منی) کو زیادہ  
 کرتا اور قوت باہ کو بڑھاتا ہے۔  
 مقدار خوراک: ۱۰ گرام  
 طریقہ استعمال: یہ لوب صبح کو کھا کر ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ  
 پئیں۔  
 لجنہ ان چالیس اہم اجزاء کا مرکب عرق ہے  
 جن سے انسانی جسم کو بے پناہ قوت نقد یہ ملتا  
 ہے۔ لجنہ صحت مند زندگی کا سبب بنتا ہے اور ان تمام  
 حالتوں میں مفید ہے جو مردوں اور عورتوں میں عام  
 کمزوری کے سبب پیدا ہوتی ہیں، جیسے گھریلو زندگی میں  
 آکٹاہٹ اور بزماری، کام میں جی نہ لگنا یا صحن، بدن میں  
 سستی اور طبیعت میں پرمردگی وغیرہ۔ لجنہ ایسی شکایتوں



کرتی ہے، بھوک کو بڑھاتی اور غذا کو ہضم کرتی ہے۔  
مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک  
طریقہ استعمال: یہ معجون صبح یا رات کو سوتے وقت  
۲۵۰ ملی لیٹر دودھ سے کھائیں

**معجون کلاں**  
قوت باہ کو بڑھاتی ہے، مردوں کے  
جریان اور عورتوں کے سیلان میں  
فائدہ دیتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک  
طریقہ استعمال: یہ معجون صبح کو ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ  
سے کھائیں۔

**معجون مومیائی**  
یہ اعلا درجہ کی مقوی اعصاب  
اور مقوی باہ ہے، مباشرت  
کے بعد کی کمزوری اس کے کھانے سے دور ہو جاتی  
ہے، حرارت غریزی کو بڑھاتی اور عام جسمانی کمزوری کو  
دور کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ۳ گرام  
طریقہ استعمال: یہ معجون صبح کو ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ سے  
کھائیں

**ہمدوجین**  
محرك، مقوی اور مؤثر ادویہ کا ایک ایسا  
مخصوص مرکب ہے جو نظام جسم انسانی  
کی کھوئی ہوئی طاقت کو دوبارہ واپس لاتا ہے اور جنسی صحت  
بحال کرتا ہے۔ اس سے ماندگی اور تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔  
ہمدوجین مردانہ طاقت میں اضافہ کرتا ہے اور ضعف  
اعصاب کو دور کرتا ہے۔ صحت مند مردوں میں جنسی  
و خائف میں بہتری پیدا کرتا ہے۔ ہمدوجین اپنے دوائی  
خواص کی وجہ سے جوان اور عمر رسیدہ مردوں کے لیے  
ایک مثالی ٹانک ہے۔ اسے کسی نقصان کے احتمال کے بغیر  
عرصہ دراز تک استعمال کیا جاسکتا ہے۔

طریقہ استعمال: یہ معجون صبح کو ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ کے  
ساتھ کھائیں۔

**معجون جلالی**  
اعلا درجہ کی مقوی باہ مسک ہے،  
اعصاب کو تقویت بخشتی اور عام  
جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے، مادہ تولید کو پیدا کرتی اور  
اسے غلیظ بناتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام  
طریقہ استعمال: یہ معجون صبح کو ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ کے  
ساتھ کھائیں۔

**معجون شباب آور**  
ضعف باہ خواہ کسی وجہ سے  
ہو، اس معجون کے استعمال  
سے دور ہو جاتا ہے۔ دماغ و اعصاب پر اس کی نہایت  
زبردست محرک تاثیر ہوتی ہے، اس کے علاوہ یہ قوت  
اساک بھی پیدا کرتی ہے، عام جسمانی کمزوری کو دور  
کرنے میں حیرت انگیز اثر دکھاتی ہے۔

طریقہ استعمال: مکمل ترکیب استعمال دوا کے ہر لوہے۔  
**معجون طلاء**  
کثرت جماع، جریان یا کسی عام  
بیماری کی وجہ سے ضعف باہ ہو تو  
اس کے استعمال سے دور ہو جاتا ہے، عضو میں کامل  
ایستادگی پیدا کرتی ہے، دل کو قوت و فرحت بخشتی اور عام  
جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ۳ گرام  
طریقہ استعمال: یہ معجون ماء اللحم دو آونہ ۶۰ ملی لیٹر یا  
۲۵۰ ملی لیٹر دودھ کے ساتھ کھائیں۔

**معجون فلاسفہ**  
یہ معجون اعصاب کو طاقت دے  
کر اور مادہ تولید کی پیدائش زیادہ  
کرنے قوت باہ کو بڑھاتی ہے، گردہ و مثانہ کو طاقت دیتی اور  
شباب کی کثرت کو روکتی ہے، گھٹیا اور کمر کے درد کو دور



دوائے ڈپٹی صاحب والی جریان منی کی نملیت  
منفید دوا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ سے ۲۵۰ ملی گرام تک یا ایک  
قرص

طریقہ استعمال: یہ دوا کھن ۱۰ گرام میں ملا کر کھائیں۔

سرفوف مولف جریان، رقت و سرعت اور  
کثرت احتلام کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ سفوف صبح کو دودھ سے کھائیں۔

جریان، رقت اور احتلام  
شربت سلاجیت میں منفید ہے۔

مقدار خوراک: ۵ ملی لٹر

طریقہ استعمال: یہ شربت صبح و شام پیئیں۔

قرص جریان کثرت جماع، جلق اور جوانی کی  
دوسری لفظ کاریوں کی وجہ سے

اعضائے تناسل کی ذکات حس بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ  
سے جریان منی، جریان مذی اور کثرت احتلام کی شکایت  
پیدا ہو جاتی ہے، ایسی حالت میں قرص جریان کے استعمال  
سے یہ شکایتیں بہت جلد دور ہو جاتی ہیں۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

جریان منی، جریان مذی اور  
جریان ودی میں منفید ہیں۔ یہ

بیماریاں ان کے استعمال سے بہت جلد دور ہو جاتی ہیں، اس  
کے علاوہ پیشاب کی زیادتی کو روکتے ہیں اور عام جسمانی  
کمزوری میں منفید ہیں۔

مقدار خوراک: ۲۰ ٹکیاں

طریقہ استعمال: صبح کو ۲۵۰ ملی لٹر دودھ سے کھائیں۔

مقدار خوراک: ایک سے ۲ کپسول  
طریقہ استعمال: صبح و شام دودھ یا پانی سے کھائیں۔

عرق منبر، عرق ماء اللعم منبری، کشتہ

طلاء کلاں، کشتہ نقرہ بھی ضعف باہ میں

منفید ہیں۔ یہ "ضعف قلب" میں درج

ہیں۔ مہجون سپاری پاک بھی ضعف باہ

میں فائدہ دیتی ہے، "جریان" کے زیر

عنوان لکھی گئی ہے۔

## جریان و کثرت احتلام

بلوطی ہر قسم کے جریان کی اکسیر دوا ہے، جریان  
منی، جریان مذی اور جریان ودی تینوں قسم

کا جریان اس کے استعمال سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے  
علاوہ یہ دوا گردوں اور مثانہ کو طاقت پہنچاتی ہے۔ پیشاب  
کی زیادتی کو روکتی ہے، کمر کے درد کو دور کرتی ہے، بچوں  
کے بستر پر پیشاب کرنے کی عادت بھی اس دوا کے  
استعمال سے چھوٹ جاتی ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے

جرتائڈ یہ دوا اعضائے تناسل کی بڑھی ہوئی  
حس (ذکات حس) کو دور کر کے جریان

منی، جریان مذی اور جریان ودی کو روک دیتی ہے۔ اس  
کے علاوہ آنکھوں میں تحریک پیدا کر کے دماغی قبض کو رفع  
کرتی ہے۔ مستقل فائدے کے لیے اسے دو مہینے لگاتار  
استعمال کرنا چاہیے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔



ہے، اور اس کے نتیجے میں احتلام کی شکایت غولہ کیسی ہی شدید ہو دور ہو جاتی ہے۔

مقدار خوراک: ایک قرص

طریقہ استعمال: صبح یا رات کو سوتے وقت دودھ یا پانی سے کھائیں۔

معجون آرد خرما یہ معجون جریان اور رقت و سرعت کو دور کرتی ہے،

وقت باہ کو بڑھاتی ہے

مقدار خوراک: ۱۰ گرام

طریقہ استعمال: یہ معجون صبح کے وقت قرص قلعی ایک عدد کے ساتھ کھائیں اور اوپر سے ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ پئیں۔

معجون جریان خاص جريان کے لیے نہایت مفید ہے، مادہ تولید (منی) کو پیدا کرتی اور اسے غلیظ بناتی ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام

طریقہ استعمال: یہ معجون صبح کو کھا کر ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ پئیں۔

معجون مغاظ جريان میں مفید ہے، مادہ تولید (منی) کو غلیظ بناتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک

طریقہ استعمال: یہ معجون صبح کو کھا کر ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ پئیں۔

معجون مغاظ جواہر والی یہ معجون رقت و سرعت اور جريان کے لیے نہایت مفید ہے۔ مادہ منویہ (منی) کو غلیظ بناتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ معجون صبح کو کھا کر ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ پئیں۔

جریان اور رقت و سرعت کی شکایت کشتہ جست کو دور کرتا ہے۔ سیلان الرحم میں

بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۶۰ ملی گرام

طریقہ استعمال: یہ کشتہ مکھن میں رکھ کر کھائیں۔

جریان اور رقت و سرعت میں مفید کشتہ سرب ہے اور سیلان الرحم کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۶۰ ملی گرام یا ایک قرص

طریقہ استعمال: یہ کشتہ مکھن میں ملا کر کھائیں یا کسی مناسب معجون میں رکھ کر استعمال کریں۔

مردوں کے جریان اور عورتوں کے کشتہ صدف سیلان میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۶۰ ملی گرام یا ایک قرص

طریقہ استعمال: یہ کشتہ مکھن ۲۵ گرام میں رکھ کر کھائیں۔

رقت و سرعت، جریان اور کثرت کشتہ قلعی احتلام کی شکایت دور کرتا ہے۔ ضعف

باہ (بوجہ جريان) میں بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی گرام یا ۲ قرص

طریقہ استعمال: یہ کشتہ، معجون آرد خرما ۱۰ گرام میں رکھ کر کھائیں اور اوپر سے ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ پئیں۔

جريان، رقت و سرعت اور کثرت کشتہ مثلث احتلام کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۶۰ ملی گرام یا ۲ قرص

طریقہ استعمال: یہ کشتہ، معجون آرد خرما ۱۰ گرام میں رکھ کر کھائیں، اوپر سے ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ پئیں۔

امعاء کا صل، عیذاب کی نالی اور فتنہ منی کی مثالی شکایت جس کو دور کر کے حالت احتلام پر لاتی



### سرعت

**حب ممک سرخ** یہ گولیاں قوت اساک کو بڑھاتی ہیں اور مقوی باہ ہیں۔

مقدار خوراک: ایک گولی

طریقہ استعمال: یہ گولی مباشرت سے دو گھنٹے پہلے ۲۵۰ ملی لٹر دودھ سے کھائیں۔

**حب ممک طلائی** قوت اساک کو بڑھاتی ہیں، اعصاب کو قوت

دیتی ہیں۔

مقدار خوراک: ایک گولی

طریقہ استعمال: مباشرت سے دو گھنٹے پہلے جب کہ غذا ہضم ہو چکی ہو ۲۵۰ ملی لٹر دودھ سے کھائیں۔

**حب ممک عنبری** یہ گولیاں اعلا درجہ کی ممک ہیں، سرعت کی

شکایت کو دور کرتی ہیں اور جسم کو طاقت دیتی ہیں۔

مقدار خوراک: ایک گولی

طریقہ استعمال: مباشرت سے دو گھنٹے پہلے جب کہ غذا ہضم ہو چکی ہو ۲۵۰ ملی لٹر دودھ سے کھائیں۔

**حب نشاط** یہ گولیاں مقوی باہ و ممک ہیں، ان کے لگاتار استعمال سے رقت و سرعت

کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔

مقدار خوراک: ۲ گولیاں

طریقہ استعمال: غذا کے ہضم ہونے کے بعد مباشرت سے دو گھنٹے پہلے ۲۵۰ ملی لٹر دودھ سے کھائیں۔

**قرص ابیض** یہ قرص مادہ تولید (منی) کی رقت اور کثرت احتلام میں

منفید ہیں، کچھ دنوں کے لگاتار استعمال سے سرعت کی شکایت کو دور کر دیتے ہیں۔

مقدار خوراک: ۴ ٹکیاں

طریقہ استعمال: صبح کو ۲۵۰ ملی لٹر دودھ سے کھائیں۔

**معجون مروح الارواح** یہ معجون قوت اساک پیدا کرتی

اور قوت باہ کو بڑھاتی ہے۔ اس کے علاوہ اعصاب کو قوت دیتی اور عام جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے، نیز

دل، دماغ، معدہ اور جگر کو تقویت بخشتی اور ذہن و حافظہ کو بڑھاتی ہے۔

مقدار خوراک: ایک گرام

طریقہ استعمال: یہ معجون صبح کو ۲۵۰ ملی لٹر دودھ کے ساتھ یا ۶۰ ملی لٹر ہلدی و ماء اللہم کے ساتھ کھائیں۔

**معجون مقوی و ممک** یہ معجون قوت اساک پیدا کرنے

اور قوت باہ بڑھانے میں نہایت مؤثر ہے۔

مقدار خوراک: ڈیڑھ گرام

طریقہ استعمال: مباشرت سے دو گھنٹے پہلے جب کہ کھانا ہضم ہو چکا ہو ۲۵۰ ملی لٹر دودھ کے ساتھ کھائیں۔

**ملذذ عجیب** بعض اوقات طرفین فعل مباشرت سے لذت حاصل نہیں کرتے یا ایک

فریق لذت اندوز ہوتا ہے اور دوسرا محروم رہتا ہے، اس دوا کا استعمال اس نقص کو دور کرتا ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

**ممک بے نظیر** یہ دوا قوت اساک پیدا کرنے میں بے نظیر ہے، اساک کے

ساتھ کیف سرور پیدا کرتی ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

**میٹو سین** مردوں کے نظام جسمانی کمزوریاں، جیسے سرعت انزال، غیر ارادی طور پر



**دوائے مالش** یہ دوائے ٹکڑے سے پئے استعمال کی جاتی ہے، اس سے رگوں پٹھوں میں نرمی آتی ہے اور عصبوں کی ساخت کے بڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

**ڈائنامول (طلاء)** یہ مرکب آزمودہ اور تجربہ خدگی محرک، گردش خون کو تیز کرنے والی ادویہ پر مشتمل ہے۔ ڈائنامول طلاء عصبوں مخصوص کی اسٹینجی بانٹوں اور خلیات کو تغذیہ پہنچا کر عصبوں کی کھوئی اور خوابیدہ مردانہ طاقت کو بحال کر کے فطری اور مکمل ایستادگی پر آمادہ کرتا ہے۔ عصبوں نقص کو دور کرنے کے لیے ڈائنامول کی مالش بہت زود اثر ثابت ہوتی ہے۔ ڈائنامول طلاء سے عصبوں مخصوص میں گردش خون تیز ہو جاتی ہے۔ سستی اور کچی دور ہو جاتی ہے۔ نیچوں اور بانٹوں میں دوران خون کی بھرپور گردش بحال ہونے کی وجہ سے ان کو تغذیہ ملتا ہے۔ خوابیدہ اور غیر متحرک جنسی مراکز میں بیداری پیدا ہو جاتی ہے جس سے فطری ایستادگی بحال ہو کر آدمی جنسی فعل سے لطف اندوز ہوتا ہے۔

طریقہ استعمال: ڈائنامول طلاء ۱۰ قطرے مردانہ عصبوں پر دن میں ایک بار آہستہ آہستہ مالش کریں۔ اگر طلاء کے مسلسل استعمال سے دانے نکل آئیں یا جلن محسوس ہو تو طلاء کا استعمال روک دیں اور اس کی بجائے روغن ناریل لگائیں۔ یہ وقتی مکالیف دور ہونے پر طلاء بدستور سابق استعمال کریں۔ مکمل اور مستقل فائدے کے لیے طلاء کم از کم تین تا چار ہفتے ضرور استعمال کریں۔

**ڈائنامول (کریم)** موجودہ طرز معاشرت کی وجہ سے پیدا ہونے والے ہمہ وقتی عصبی اور دماغی تناؤ، ناقص

باد، منویہ کا اخراج یا زیادہ عمر کے سبب عام کمزوری اور نغصہ مذی کے سبب دوسری جسمانی کمزوریاں میٹوسین کے ہمارے استعمال سے ختم ہو جاتی ہیں۔ میٹوسین تناسلی نظام پر مسکن اثر ڈالتی ہے اور ہمدرد لیباریٹری کے سالہا سال کے تجربات سے اس کی افادیت ثابت ہو چکی ہے۔ میٹوسین جنسی نظام کو درست کرتی ہے اور مردوں میں بھرپور زندگی گزارنے کی خواہش کو بیدار بنائے رکھتی ہے۔ میٹوسین زہر لیے یا پیچیدگی پیدا کرنے والے اثرات سے پاک ہے۔

مقدار خوراک: دو کپسول

طریقہ استعمال: دن میں دو یا تین بار پانی، دودھ یا چائے کے ساتھ کھائیں۔ اس کے بعد بتدریج مقدار خوراک کم کی جاسکتی ہے۔

### عصبوں خاص کی نرمی اور لاغری و کچی

**جینٹول** عصبوں خاص کی رگوں اور پٹھوں کو طاقت دیتا ہے اور اس میں دوران خون کو تیز کرتا ہے، جو عصبوں خاص کی ساخت میں جذب ہو کر اس کی پرورش کرتا اور ڈھیلے اور مرجھائے ہوئے پٹھوں میں نیا جوش اور نئی طاقت پیدا کرتا ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

**دوائے ٹکڑے** عام طور پر کسی طلاء کے استعمال سے پہلے دوائے ٹکڑے استعمال کی جاتی ہے، اس کے استعمال سے عصبوں کی اسٹینجی ساخت میں پھیلنے اور بڑھنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے اور جوانی کی لفظ کاریوں سے عصبوں میں جو نقص پیدا ہو جاتے ہیں انہیں دور کر کے آئندہ استعمال ہونے والے طلاؤں کی تاثیر کے لیے زمین ہموار کرتی ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔



تین یا چار دفعہ استعمال کریں۔

**روغن پیر بہوٹی** اس روغن کی مالش سے  
عضو خاص میں قوت و

حرارت پیدا ہوتی اور فریجی آتی ہے۔

طریقہ استعمال : عضو پر مالش کر کے گرم پان  
باندھیں۔

**روغن خراطین** عضو میں طاقت پیدا کرتا اور  
سازش میں بڑھاتا ہے۔

طریقہ استعمال : عضو پر مالش کر کے گرم پان  
باندھیں۔

**روغن زفت** عضو میں خون جذب کرتا اور  
اس کو فروغ دیتا ہے۔

طریقہ استعمال : مالش کر کے لوہے سے گرم پان  
باندھیں۔

**طلاء اعظم** اس طلاء کے استعمال سے عضو  
مخصوص کی ساخت میں دوران

خون تیز ہو جاتا ہے۔ اور اس کی کمزوری، لاغری، کچی  
اور کوتاہی وغیرہ شکایتیں دور ہو جاتی ہیں اور اس میں

پورے طور پر ترقی اور جوش پیدا ہونے لگتا ہے۔  
طریقہ استعمال : دوا کے ساتھ ہے۔

**طلاء سرخ** جلق اور دوسری بری  
عادتوں کی وجہ سے عضو

مخصوص میں جو خرابیاں مثلاً کچی، لاغری وغیرہ پیدا  
ہو جاتی ہیں، وہ سب اس طلاء کے استعمال سے دور

ہو جاتی ہیں۔  
طریقہ استعمال : ۵۰ ملی گرام یہ طلاء لے کر عضو

مخصوص کی پشت اور دائیں بائیں حصہ پر مالش کریں۔  
سین اور حند کو بچائیں، لوہے سے پان گرم کر کے

نقد یہ دھلی ہوئی مرد وغیرہ ایسے اہم اسباب ہیں جو

انسانی زندگی پر مگر اثر ڈالتے ہیں۔ جس کا نتیجہ مردانہ  
کمزوری اور ناتوانی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے

ہنسی بے رغبتی اور بے کفایتی، عضو مخصوص کی  
ایستادگی میں جڑی کی ہو جاتی ہے۔ دماغ سے ہنسی

مراكز کی ہنسی پیغام رسانی اور حرکت پذیری مدہم  
پڑ جاتی ہے۔ اس کیفیت اور نقص کو دور کرنے کے

لیے ضروری ہے کہ مردانہ عضو اور ملحقہ عضلات کی  
خارجی مالش کر کے ان میں حرکت پیدا کی جائے۔

ڈانکا مول کریم ان تمام نقص کا کامیاب علاج ہے۔  
ڈانکا مول کریم کی مالش سے عضو مخصوص اور دیگر

ہنسی مراكز کی کھوئی ہوئی اور خوابیدہ طاقت عود کر  
آتی ہے۔ اس میں فطری دوران خون بحال ہو کر سرد

مری دور ہو جاتی ہے۔ عضو مخصوص میں مکمل ایستادگی  
کی صلاحیت بحال ہو جاتی ہے۔ قدرتی اساک بحال

ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈانکا مول کی مالش سے عضو  
مخصوص کی استغنی ساخت میں نرمی اور ملائمت پیدا

ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر عضو میں کچی ہو تو اس کو دور کر کے  
اسے سیدھا کرنے میں مدد ملتی ہے جو کہ مکمل مباشرت

اور ہنسی فصل سے بھر پور لطف اندوز ہونے کے لیے  
نمایست ضروری ہے۔

طریقہ استعمال : تقریباً ۵۰ ملی گرام ڈانکا مول  
کریم عضو مخصوص پر دن میں ایک بار آہستہ آہستہ

مالش کریں حتیٰ کہ کریم جذب ہو جائے۔ اگر متواتر اور  
زیادہ عرصہ استعمال سے والے کل آئیں یا جلد محسوس

ہو تو کریم کا استعمال روک کر روغن ناریل لگائیں۔  
جب یہ وقتی تکلیف دور ہو جائیں کریم کا استعمال شروع

کر دیں۔ مکمل فائدے کے لیے ڈانکا مول کریم کم از کم



بند ہیں۔ جب اس کے استعمال سے دانے نکل آئیں یا آبلہ پڑ جائے تو طلاء کا استعمال بند کر کے روغن چنبیلی لگائیں۔ جب دانے اچھے ہو جائیں، پھر طلاء استعمال کریں۔ اسی طرح کئی بار کریں، یہاں تک کہ عمو خاص کی خرابیاں دور ہو جائیں۔

طریقہ استعمال : ۵۰۰ ملی گرام یہ طلاء عمو خاص پر (سر لور سیون بچا کر) مالش کریں، لوپر سے پان گرم کر کے باندھیں، اگر چند روز کے استعمال سے دانے نکل آئیں تو اس طلاء کا استعمال بند کر کے روغن چنبیلی لگائیں، جب دانے اچھے ہو جائیں پھر طلاء استعمال کریں۔

**طلاء مسکن** جلق، کثرت جماع وغیرہ کی وجہ سے اگر عمو خاص میں ذکاوت حس پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے ادنیٰ تحریک سے مادہ تولید خارج ہو جاتا ہو اور احتلام کثرت سے ہونے لگے تو اس طلاء کے استعمال سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔

طریقہ استعمال : اس طلاء میں روئی کی پھریری بھگو کر سارے عمو اور فوطوں پر لگائیں۔ روزانہ اسی طرح کریں۔

**طلاء مقوی خاص** کثرت مباشرت، جلق اور دوسری بری عادت کی وجہ سے عمو مخصوص میں جو خرابیاں (مثلاً عمو کا ڈھیلا پن، کچی، لاغری وغیرہ) پیدا ہو جاتی ہیں، یہ طلاء ان کا مکمل علاج ہے۔ اس کے استعمال سے عمو مخصوص کے رگوں پٹھوں میں نئی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوران خون کے تیز ہو جانے سے عمو کی غذائیت بڑھ جاتی ہے جس سے عمو فربہ ہوتا اور اس میں پوری طرح نئی ہونے لگتی ہے۔

طریقہ استعمال : دوا کے ساتھ ہے۔

بند ہیں۔ جب اس کے استعمال سے دانے نکل آئیں یا آبلہ پڑ جائے تو طلاء کا استعمال بند کر کے روغن چنبیلی لگائیں۔ جب دانے اچھے ہو جائیں، پھر طلاء استعمال کریں۔ اسی طرح کئی بار کریں، یہاں تک کہ عمو خاص کی خرابیاں دور ہو جائیں۔

**طلاء شباب آور** یہ طلاء عمو خاص میں تحریک و تقویت پیدا کرنے کی زبردست تاثیر رکھتا ہے، یہ عمو خاص کے رگوں پٹھوں میں خون کے دوران کو بڑھا کر ان میں نئی زندگی اور نیا جوش پیدا کرتا ہے۔ بوڑھے لوگوں میں اس کے استعمال سے جوانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ عمو کی نرمی نئی سے بدل جاتی ہے۔

طریقہ استعمال : دوا کے ساتھ ہے۔

**طلاء عجیب** عمو مخصوص کی تمام خرابیوں کو دور کر کے اس میں طاقت اور نئی پیدا کرتا ہے۔

طریقہ استعمال : ۵۰۰ ملی گرام یہ طلاء عمو خاص پر (سر لور سیون بچا کر) مالش کریں، لوپر سے پان گرم کر کے باندھیں

**طلاء عروسک** بری عادتوں کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ سب اس طلاء کے استعمال سے دور ہو جاتی ہیں۔ رگوں پٹھوں میں نئے سرے سے خون تیز ہو کر عمو میں جوش پیدا ہوتا ہے۔

طریقہ استعمال : عمو پر مالش کر کے پان گرم کر کے باندھیں۔

**طلاء کیمیا تاثیر** اس طلاء کے استعمال سے نہ پاؤں ہوتا ہے اور نہ جلن ہوتی ہے،



## عورتوں کی مخصوص بیماریاں

کمر کو تسکین دیتی اور بچہ پیدا ہونے کے بعد کی کمزوری کو رفع کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام

طریقہ استعمال: یہ معجون صبح کو ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ سے کھائیں۔

معجون زنجبیل بھی عورتوں کی کئی بیماریوں میں مفید ہے جو آئندہ صفحات میں درج ہے۔

### ورم رحم۔ سختی رحم

مرہم واخلیون رحم اور متعلقات رحم کے ورم مرہم واخلیون کو تحلیل کرنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس کے استعمال سے رحم کی سختی بھی دور ہو جاتی ہے نیز سولیاں اور گلیاں اس کے لگاتار استعمال سے کھل جاتی ہیں۔

طریقہ استعمال: یہ مرہم ۵ گرام لے کر اس میں ہری مکوہ کا پانی ۵ ملی لیٹر ملائیں اور اس میں روئی تھیز کر دایہ سے اندام نہانی میں رکھوائیں اگر ہری مکوہ نہ ملے تو تخم مرہم استعمال کریں۔

مہبول یہ اندام نہانی کے ورم اور اس کی دوسری خرابیوں کو دور کرنے والی خاص دوا ہے،

### متعد بیماریوں میں مفید دوائیں

**مستورین** ماہواری کی تلیفوں، ایام کی بے قاعدگیوں، سیان الرحم، خصیہ الرحم کی بیماریوں اور رحم (بچہ دانی) کے دوسرے عوارض کو دور کرنے والی مجرب دوا ہے۔ ان تلیفوں کی وجہ سے عورت کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، شاداب و حسین چہرہ نکھلا کر بے رونق و بد نما ہو جاتا ہے، لیکن مستورین تمام تلیفوں کو دور کر کے عام صحت کی بحالی میں معاون بنتی ہے۔ طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

**معجون مقوی رحم** یہ معجون رحم کو طاقت دیتی ہے، اس کی تیاری میں خصیہ الرحم کے لئے افضل کا خاص خیال رکھا گیا ہے، اس لیے جو عورتیں وقت سے پہلے یوزمی معلوم ہونے لگتی ہیں، ان کے چہرے پر جھریاں پڑ جاتیں اور ان کی جاذبیت ختم ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں یہ خاص طور پر مفید ہے۔ طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

**معجون سہاگ سونٹھ** عورتوں کے اکثر امراض میں مفید ہے، رحم کو طاقت دیتی اور اس کی کئی خرابیوں کو دور کرتی ہے، درد



ہو کر رحم اور متعلقات رحم کا درم دور ہو جاتا ہے، اس کے استعمال کے بعد عروسک کا استعمال ضروری ہے۔  
طریقہ استعمال: زمانہ ماہواری ایام سے فراغت کے بعد رات کو سوتے وقت دو بتیاں اندام نہانی میں خوب اندر تک رکھیں۔

قرص سیلان  
رحم کو طاقت دیتے ہیں۔

مقدار خوراک: ایک قرص  
طریقہ استعمال: یہ قرص صبح و شام ۲۵۰ ملی لٹرز دودھ سے کھائیں۔

معجون موچرس  
سیلان الرحم کے لیے مفید ہے، رحم کی خراب رطوبتوں کو خشک کرتی اور رحم کو طاقت دیتی ہے۔  
مقدار خوراک: ۱۰ گرام  
طریقہ استعمال: یہ معجون صبح کو ۲۵۰ ملی لٹرز دودھ سے کھائیں۔

سفوف خاص "جو کثرت حیض" میں درج ہے، مہول اور مستورین "درم رحم" میں تحریر ہے، سیلان میں بھی مفید ہیں۔

### کثرت حیض

سفوف حابس  
کثرت حیض کو روکتا ہے، ایام ماہواری کی بے قاعدگی کو دور کرتا ہے۔ مردوں کے جربین اور عورتوں کے سیلان میں مفید ہے۔  
مقدار خوراک: ۵ گرام  
طریقہ استعمال: یہ سفوف صبح کو ۲۵۰ ملی لٹرز دودھ یا تازہ پانی سے کھائیں۔

اندام نہانی کی سوزش، دھنن اور اس سے رطوبت کا بہاؤ (سیلان مہلی) کو ختم کر دیتی ہے، اندام نہانی کے درم کو تحلیل کرتی ہے اور اس کی غشائے مخاطی (اندرونی لعاب دار جلی) کو اصلی حالت میں لے آتی ہے۔  
طریقہ استعمال: دو بتیاں اندام نہانی میں رات کو سوتے وقت رکھی جائیں۔ پانچ دن لگاتار استعمال کر کے دودن کا وقت دینا مناسب ہے۔

شہاد جالینوس بھی رحم کے درم اور سختی کو دور کرتے ہیں اور یہ "درم جگر" کے زیر عنوان لکھے گئے ہیں۔

### سیلان الرحم

حب سروارید  
عورتوں کے مرض سیلان میں مفید ہیں۔ اعصاب کو قوت دیتیں اور عام جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہیں۔  
مقدار خوراک: ایک گولی  
طریقہ استعمال: صبح اور شام دودھ سے کھائیں۔

سیلانول  
۵۰ فی صدی عورتیں بتاتا ہوتی ہیں (اسیری دوا ہے، اس مرض میں اندام نہانی میں جلی خارج اور جلیمن ہوتی ہے اور دودھ یا رٹھ کی سفید رطوبت خارج ہوا کرتی ہے، اس دوا کے استعمال سے یہ شکایت دور ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی جسمانی کمزوری بھی رفع ہو جاتی ہے، بھوک خوب لگنے لگتی ہے اور خون کی پیدائش بڑھ جاتی ہے۔

مقدار خوراک: ایک قرص  
طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت دودھ یا پانی سے کھائیں۔

فہر زین  
سیلان الرحم میں مفید ہے۔ اس کے استعمال سے رحم کی فضول رطوبتیں خارج



جوڑ ٹوٹنے لگتا ہے، پیدوں میں شدید درد اور بے چینی ہوتی ہے، حیض کھل کر نہیں آتا۔ اس دوا کے استعمال سے حیض کھل کر اور باقاعدہ آنے لگتا ہے اور مریضہ کو ان تمام تکلیفوں سے نجات مل جاتی ہے۔

مقدار خوراک: ایک قرص

طریقہ استعمال: ایام مقررہ کے دو تین دن پہلے صبح و شام دونوں وقت دودھ یا پانی سے کھائیں۔

اس مہجون کے استعمال سے  
ایام ماہواری بے قاعدگی سے

### مہجون زنجبیل

آنے اور درد سے آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے، سیان میں فائدہ ہوتا ہے، وضع حمل کے بعد کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ مردوں کے لیے مقوی و مسک ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام

طریقہ استعمال: یہ مہجون صبح کو ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ سے کھائیں۔

### .... کشادگی

اس کے استعمال سے اندام نسائی کو  
سیکڑنے والے اعضا اور اس کی  
دوسری ساریں مضبوط ہوتی ہیں، اندام نسائی کی زائد  
رطوبت خشک ہو جاتی ہے اور وہ ڈھیلی پڑ گئی ہو یا  
کشادہ ہو گئی ہو تو صحیح حالت میں آ جاتی ہے۔ سیان  
کی شکایت جاتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر رحم (بچہ  
دانی) ٹیز می ہو گئی ہو یا باہر نکل آئی ہو تو وہ بھی  
درست ہو جاتی ہے اور تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔  
طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

سفوف خاص کثرت حیض میں مفید ہے، ایام  
ماہواری کی بے قاعدگی کو دور کرتا  
ہے، سیان الرحم کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: صبح کو ۲۵۰ ملی لیٹر دودھ یا پانی سے  
کھائیں۔

قرش بندش خون اور شربت انجبار بھی

کثرت حیض میں مفید ہیں، جو غث الدم

(خون تھوکنہ) میں تحریر ہیں۔

### بندش حیض

حب مدر ان گولیوں کے استعمال سے حیض کھل  
کر آنے لگتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: ایام ماہواری شروع ہونے سے تین  
دن پہلے یہ گولیاں صبح، دوپہر اور شام کو پانی کے ساتھ نگل  
جائیں، ماہواری شروع ہونے کی صورت میں ان کا  
استعمال مناسب نہیں ہے۔

شربت مدر ایام حیض بند ہوں یا کی کے ساتھ  
آتے ہوں تو اس شربت کے

استعمال سے جاری ہو جاتے ہیں، اگر خون نفاس بند ہو تو وہ  
بھی جاری ہو جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ شربت، عرق بادیان ۱۲۵ ملی لیٹر  
میں ملا کر صبح اور شام دونوں وقت پئیں۔

اکثر مستورات کو رحم کی کمزوری یا خصیہ  
ماہواری الرحم کے نفل کی خرابی سے ایام حیض  
میں شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جسم کا جوز



## مجنون سپاری پاک

مجنون سپاری پاک : یہ مجنون استقرار حمل میں مدد دیتی ہے اور وضع حمل کے بعد کی کمزوری کو دور کرتی ہے، اس کے علاوہ مردوں کے لیے عطوی و مسک ہے اور عورتوں کے مرض سیلان اور درد و کمر کو دور کرتی ہے۔

مقدار خوراک : ۱۰ گرام

طریقہ استعمال : یہ مجنون صبح کو دودھ سے کھائیں۔

مجنون عطوی رحم جو پچھلے صلاحت

میں لکھی گئی ہے، استقرار حمل میں

مدد دیتی ہے۔

## استقاط حمل

مجنون حمل عنبری علوی خانی : جن مستورات کا حمل بار بار

ساقط ہوتا رہتا ہو یا بچے زچہ نہ رہے ہوں، سوکھ سوکھ کر

مر جاتے ہوں، اس مجنون کے استعمال سے حمل استقاط

سے محفوظ رہتا ہے اور بچہ تندرست و قوی پیدا ہوتا ہے۔

مقدار خوراک : ۵ گرام

طریقہ استعمال : یہ مجنون صبح کو ۲۵۰ ملی لٹر دودھ سے

کھائیں۔

مجنون نشارہ عاج والی : جو عورتیں استقاط

حمل کی مادی ہوتی

ہیں، تیسرے چوتھے مہینے جن کے حمل ساقط ہوتے رہتے

ہیں، اس مجنون کے استعمال سے جن کا حمل محفوظ رہتا ہے

اور بچہ وقت پر تندرست و قوی پیدا ہوتا ہے۔

مقدار خوراک : ۵ گرام

طریقہ استعمال : یہ مجنون صبح کو ۲۵۰ ملی لٹر دودھ

سے کھائیں۔

## استقرار حمل

جن مستورات کو حیض باقاعدہ آتا ہو، حب حمل چین کسی اندرونی غریبی کی وجہ سے استقرار حمل نہ ہوتا ہو، جن کو لیڈوں کے استعمال سے وہ غریبی دور ہو کر حمل قریب پایا جاتا ہے۔

مقدار خوراک : ایک گولی

طریقہ استعمال : لیام ہا ہواری سے فارغ ہونے کے بعد

صبح کو شام یہ گولی ۲۵۰ ملی لٹر دودھ سے کھائیں۔ تین دن

کھانے کے بعد چوتھے دن مباشرت کریں۔ اسی طرح

دوسرے اور تیسرے مہینے استعمال کریں۔

حلوائے سپاری پاک : جو مرد و عورت

ولاد سے محروم

ہوں اور ان میں کوئی عطوی غریبی نہ ہو، وہ دونوں اس

حلوے کو ۴۰ دن استعمال کریں، اگر خدائے ہا ہا تو ان کی

امید پوری ہوگی۔ مردوں کا جریان، رقت و سرعت

اور عورتوں کا سیلان میں بھی اس کے استعمال سے دور

ہو جاتا ہے۔

مقدار خوراک : ۲۵ گرام

طریقہ استعمال : یہ حلوہ روزانہ صبح سویرے نہار

نہ ۲۵۰ ملی لٹر دودھ سے کھائیں۔

دوائے ابیض : اگر رحم کی کمزوری سے حمل

قرار نہ پاتا ہو تو یہ دوا استقرار

حمل کی استعداد پیدا کرتی ہے۔

مقدار خوراک : ۵۰۰ ملی گرام

طریقہ استعمال : یہ دوا مجنون حمل حمیری یا مجنون سپاری

پاک ۵ گرام میں ملا کر دودھ سے کھائیں۔



**لیڈیز کٹ** خواتین کی نسوانی تکالیف کے لیے تین دواؤں والا یہ مخصوص پکٹ تیار کیا گیا ہے۔ ان تین دواؤں کو استعمال کرنے کی صورت میں خواتین کا جسمانی نظام قدرتی حالت پر برقرار رہتا ہے۔ ضعف اعصاب، ماندگی و تھکاوٹ دور ہو کر توانائی اور چستی پیدا ہوتی ہے، اس میں "قرص سپری پاک" کھانے کے لیے مہبول "مور" ڈولینو "بیرنی استعمال کے لیے ہیں۔ پرچہ ترکیب استعمال پیک کے ساتھ ہے۔

### خارش اندام نہانی

**ہیکٹولین** یہ زنانہ اعضائے قاسل کی خارش کے لیے اکیسری مرہم ہے، خارش خولہ اندام نہانی کے باہر کے حصہ میں ہو یا خولہ اندرونی حصہ میں، اور یہ خون کی خرابی سے ہو یا بالوں میں جوئیں پڑ جانے سے، ان سب حالتوں میں اس کا استعمال مفید ہے۔ پرانی سے پرانی تکلیف جس کی وجہ سے رات کو نیند حرام ہو اس کے استعمال سے دور ہو جاتی ہے۔ طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

اگر خون کی حدت اور گرمی اس مرض کا سبب ہو تو "صافی" استعمال کریں یا شربت محتاب ۲۵ ملی لٹر میں عرق شاہرہ ۱۲۵ ملی لٹر ملا کر پئیں۔

### دودھ کی زیادتی

اگر کسی عورت کی چھاتیوں میں دودھ کی پیدائش ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو مجنون ناخولہ کے استعمال سے معتدل ہو جاتی ہے۔

### عوارض حمل

**قرص حوامل** حمل کے زمانے میں مٹکی لورتے طبیعت کا گرے گرے رہتا، اباکیوں کا آنا، درد سر، بھوک کی کمی جیسی شکایتیں حاملہ کو اکثر ستاتی رہتی ہیں اور ان کی وجہ سے حمل گر جانے کا اندیشہ لگا رہتا ہے۔ قرص حوامل ان تمام عوارض کا کامیاب علاج ہیں۔ ان کے استعمال سے یہ سب عوارض دور ہو جاتے ہیں اور پیٹ میں بچہ صحیح و سالم رہتا اور وقت مقررہ پر تندرست و توانا پیدا ہوتا ہے۔

مقدار خوراک: ایک قرص  
طریقہ استعمال: صبح اور شام شربت اندام ۱۰ ملی لٹر میں ملا کر پئیں۔

مجون حمل عبری علوی خانی اور  
مجون مقوی رحم بھی عوارض حمل  
میں مفید ہیں ان کا ذکر گزشتہ صفحات  
میں درج ہے۔

### پر سوت

**عرق دسمول** عورتوں کے مرض پر سوت میں مفید ہے جس میں ذرا سردی لگنے پانی کے چھیننے پڑنے سے بخار ہو جاتا اور تمام بدن میں درد ہونے لگتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰ ملی لٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق صبح و شام پئیں۔

شریت بخدوری معتدل اور عرق کھو  
مرض پر سوت میں بدرق کے طور پر  
استعمال کیے جاتے ہیں۔



### پستانوں کا لنگ جانا

اس حد کے لگے سے لے  
جہاں شباب لگے پستان کچھ حالت میں

کہتے ہیں۔  
طریقہ استعمال: پستانوں پر لگائیے۔

## بچوں کی بیماریاں

### دق الاطفال۔ سوکھا

نورمال بے بی ٹانگ اس نوزل میں وہ قسم  
وہ سن شال ہیں جو  
کمزور بچوں کو سب سے دقت کا طے ہیں۔ بچوں کی عام  
جسمانی کمزوری، سوکھا (سوکھا سلاں) بچوں کی نرمی اور  
فن کا ٹیلہ حاکم، جڑوں کی سوجن، مسودوں کی  
سوجن، جلد کا کمرور ایمن، صحت کا نزلہ و کام کی زیادتی سے  
سب دقتیں نوزل بے بی ٹانگ کے استعمال سے دور  
ہوتی ہیں۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

بھر رد لال تیل یہ گل بچوں کے ہاتھ دھو  
کی جھریں لہ لہ می می می  
بچوں کو لٹک کر ہے۔ سوکھے کے مرض میں لایع  
مردہ گل ہے۔

طریقہ استعمال: بچوں کے ہاتھ دھو ہاتھ کر میں۔

اکسیر الاطفال اور سٹوف بچل جو کہ بد ہضمی اور  
قبض میں مذکور ہیں بچوں کے مرض سوکھا  
میں منہ ہیں۔

### جیاس کی زیادتی

عرق ہادیہ اور عرق ہادیان جیاس کی زیادتی میں  
منہ ہیں۔ ان کا ذکر ”سحری کی بیماریاں“ عنوان  
کے تحت درج ہے۔

### بد ہضمی۔ قبض

اکسیر الاطفال یہ بچوں کے سحری کو  
کچھ حالت میں رکھتا ہے



بھسی جھری مثال ہیں۔  
 طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

### بچوں کے دست

من گولیوں کے استعمال سے بچوں  
 جب زکچور کے برے پچلے دست رک جاتے  
 ہیں، صدمے کو خالق پہنچتی ہے، بچوں کے پھوڑے  
 پھسلیں نکل رہے ہوں وہ بھی من کے استعمال سے اچھی  
 ہو جاتی ہیں۔

مقدار خوراک: ایک گولی  
 طریقہ استعمال: چار چار گھنٹے بعد ماں کے دودھ میں  
 محلول کر دیں۔

نو نال گراپ سیرپ بھی بچوں کے دست و  
 پیش میں مفید ہے۔

### بچوں کی مرگی (ام الصبیان)

جب صرع بچوں کی مرگی (ام الصبیان)  
 میں مفید ہیں، بڑوں کی مرگی میں  
 بھی فائدہ دیتی ہیں۔

مقدار خوراک: بچوں کو ایک گولی، بڑوں کو ۳ گولیاں  
 طریقہ استعمال: بچہ کو ایک گولی ماں کے دودھ میں  
 گھس کر چلائیں۔ بڑوں کو یہ گولیاں رات کو سوتے وقت  
 پانی سے دیں۔

ضمیرہ گاؤنہن جہری جودر عود صلیب والا بھی بچوں  
 کی مرگی میں مفید ہے ایک ایک گرام دن میں تین بار  
 دیں اور قرص عود صلیب ۱۶ سال سے ۱۴ سال تک کی  
 عمر کے بچوں کو آدھی گلیہ اور اس سے بڑی عمر کے  
 بچوں کو ایک گلیہ صبح و شام پانی سے دیں۔

ہضم کی خرابیوں کو رفع کرنے کے لیے عود صلیب کی عسٹروڈینا کو کام  
 رکھتا ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

سفوف چٹکی یہ سفوف بچوں کی پیاریوں میں  
 کام آتا ہے، ہڈیوں کی اصلاح  
 کرنا اور قبض کو دور کرتا ہے، نو فوٹو پھٹنے کو روکتا ہے اور ریاح  
 کو خارج کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵۰۰ ملی گرام سے اگر ام تک  
 طریقہ استعمال: یہ سفوف بچے کو تھوڑے پانی میں  
 محلول کر چلائیں۔

نورولود، شیر خوار اور کسن  
 بچوں کا پیٹ اور آنتیں  
 صاف رکھنے اور قبض، دائمی ضعف، معدہ، اچھار، پیٹ  
 کے درد اور اعظم، مروڑ و غیرہ جیسی شکایات میں  
 نہایت فائدہ مند ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

نو نال گراپ سیرپ بچوں کے قبض،  
 بڑوں کی مرگی (ام الصبیان) میں  
 فائدہ دیتی ہیں۔  
 ڈالنا، دست اور پیش بوقت کے لانا، جگر کی تلی کا بوجھنا، نیند  
 میں پھٹنا، صدمہ آنا، رال برساتنا، جھٹلنے (پیٹ کے  
 کیزے) اور پیاس کی شدت کو دور کرنے کے لیے  
 نہایت مفید ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

نورولود گراپ وائر بچوں کی پیٹ کی تکلیف  
 اور بے چینی کو دور کرتا  
 ہے اور دانت نکلنے کے دنوں میں خاص کر مفید ہے۔  
 اس میں عرق زہرہ، عرق اجرائن، عرق سوف، عرق  
 سوا، عرق پودینہ اور سوا نیم پانی کا بویٹ آئی۔ لی



### کالی کھانسی

دوائے سرفہ پہنچوانے سیاہ کھڑکی، حب سرفہ، لہوق  
آبہ تریمہ و لکھور لہوق کھٹاں خیار ہمری بچوں کی کالی  
کھانسی میں فائدہ دیتی ہیں۔ ان سب دوائوں کا ذکر گزشتہ  
مضامین میں درج ہے۔

### ڈیپ۔ پسی چلدا

قیر دہلی آرو کر سٹہ فمونیہ، پٹیل کے درد  
لہو چٹا، لہو (دوا)  
میں بچے پالشی کی چلدا ہے۔  
طریقہ استعمال: ضرورت کے مطابق یہ قیر دہلی لے  
کر گرم کر کے مالش کر لیں۔ لہو چٹا سے روغن گرم کر کے  
پاندھیں۔

## جوڑوں کی بیماریاں

حب سورنجان جوڑوں کے درد کے لیے  
خصوصیت سے مفید ہیں۔

عضلات و اعصاب کے درد کو دور کرتی ہیں، قبض کو  
رفع کرتی ہیں۔

مقدار خوراک: ۳ تا ۴ گولیاں

طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت پانی سے کھائیں۔

حلوائے گھیکوار گھیا لور کر کے درد کو دور کرتا  
ہے، کھانسی لور دوسرے میں مفید

ہے۔ جازوں میں اس کا استعمال خاص طور پر مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ حلوا صبح سویرے یا رات کو سوتے

وقت کھا کر پورے ۵۰ ملی لیٹر دودھ پئیں۔

### وجع مفاصل۔ گھیا

لو جاعی جوڑوں کے درد (گھیا) کی نہایت مفید دوا  
ہے۔ گھیا کے علاوہ غرس (گھٹ) میں

بھی فائدہ دیتی ہے۔ دل کے کسی مرض کے بعد یا  
آنکھ، سوزاک کے بعد جوڑوں میں جو درد ہونے لگا

ہے، اس کے استعمال سے دور ہو جاتا ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

حب اسکند گھیا درد کر میں مفید ہیں۔

مقدار خوراک: ۲ گولیاں

طریقہ استعمال: رات کو پانی سے کھائیں۔



مقدار خوراک: ۵ گرام  
 طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت پانی سے کھائیں۔  
 معجون چوب چینی  
 جوڑوں کے درد (مٹھیا) اور  
 تمام بدن کے درد کو دور  
 کرتی ہے، مصلی خون ہے۔  
 مقدار خوراک: ۵ گرام  
 طریقہ استعمال: یہ مجون صبح کو پانی سے کھائیں۔

جوڑوں  
 معجون چوب چینی بہ نسخہ کلاں کے درد  
 اور دوسرے اعضاء کے درد کو دور کرتی ہے، معدے کو  
 طاقت دیتی ہے، حرارت فریزی کو بڑھاتی ہے، خون کو  
 صاف کرتی ہے اور حرے کا رنگ کھلتی ہے۔  
 مقدار خوراک: ۵ گرام  
 طریقہ استعمال: یہ مجون صبح کو پانی سے کھائیں۔  
 معجون سورنجان  
 مٹھیا، نقرس، عرق النساء کے  
 لیے مفید ہے، قبض کو دور  
 کرتی ہے، جوڑوں سے مٹھیا کے مادہ کو نکالتی ہے۔  
 مقدار خوراک: ۱۰ گرام  
 طریقہ استعمال: رات کو سوتے وقت پانی سے کھائیں۔

جوہری، جوہر حق، موغن سیر، موغن  
 ماصحی، مجون مشب، مجون لاسنہ اور  
 سمون مصلی خاص بھی مٹھیا میں مفید ہیں۔

### عرق النساء، نقرس، درد کمر

دفع مفاصل (مٹھیا) کے لیے جو دوائیں اوپر لکھی گئی  
 ہیں، وہ سب عرق النساء، نقرس اور درد کمر میں بھی  
 فائدہ دیتی ہیں۔

روغن بابونہ  
 مٹھیا کے درد کو اور دوسرے دردوں  
 کو تسکین دیتا ہے، درم کو تحلیل  
 کرتا ہے۔  
 طریقہ استعمال: نیم گرم ہاتھ کر کے روئی گرم کر کے  
 باندھیں۔

روغن حنا  
 مٹھیا میں فائدہ دیتا ہے۔  
 طریقہ استعمال: نیم گرم ہاتھ کر کے روئی گرم کر کے  
 باندھیں۔  
 روغن سورنجان  
 مٹھیا، نقرس اور درد کمر کے  
 لیے مفید ہے۔  
 طریقہ استعمال: نیم گرم ہاتھ کر کے روئی گرم کر کے  
 باندھیں۔

روغن کچلہ  
 مٹھیا، نقرس اور عرق النساء میں مفید ہے۔  
 طریقہ استعمال: نیم گرم ہاتھ کر کے روئی گرم کر کے  
 باندھیں۔  
 کشتہ گنودنتی  
 مٹھیا، نقرس اور عرق النساء کے لیے  
 مفید ہے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے  
 بخلاؤں میں فائدہ دیتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی گرام یا ۲ قرص  
 طریقہ استعمال: یہ کشتہ مجون سورنجان ۵ گرام میں  
 رکھ کر کھائیں، بخلاؤں میں تھپی کے پتے پر رکھ کر  
 کھائیں۔

معجون لوجاج  
 یہ مجون ہر قسم کے ریکی دردوں  
 میں مفید ہے، خصوصاً مٹھیا اور  
 نقرس کے پرانے دردوں کے لیے اکسیر ہے، قبض کو دور  
 کرتی ہے۔



## امراض عامہ

مقدار خوراک: ۵ ملی لٹر  
 طریقہ استعمال: یہ عرق صبح و شام پیئیں۔  
 عرق نیلوفر صفراء کی تیزی کو کم کرتا اور گرمی کو تسکین دیتا ہے، پیاس کو بجھاتا ہے۔  
 مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی لٹر  
 طریقہ استعمال: یہ عرق شربت نیلوفر ۲۵ ملی لٹر میں ملا کر پیئیں۔

قرص زرشک تپ محرقہ میں مفید ہیں، معدہ اور جگر کو طاقت دیتے ہیں۔  
 مقدار خوراک: ۲ قرص  
 طریقہ استعمال: صبح و شام عرق گاؤ زباں ۱۲۵ ملی لٹر سے کھائیں۔

قرص حمی جدید بخاروں کو روکتے ہیں، سل و ق میں بھی مفید ہیں۔  
 مقدار خوراک: ایک قرص  
 طریقہ استعمال: جب بخار اتر جائے یا ہلکا ہو جائے تو یہ قرص ۲۵۰ ملی لٹر دودھ یا عرق ماء الحیات ۶۰ ملی لٹر سے کھائیں۔

لرزین جاڑا بخار (لمبریا) کے لیے بہترین دوا ہے۔ حفظ مائع دم کے طور پر بھی اس کا

### بخار

صفراوی بخاروں میں سبب بن بزموری مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لٹر سے ۵۰ ملی لٹر تک  
 طریقہ استعمال: عرق بادیان ۱۲۵ ملی لٹر یا پانی میں ملا کر پیئیں۔

صفراوی بخاروں میں صفراء کی شربت نیلوفر تیزی کو کم کرتا اور پیاس کو بجھاتا ہے، بغیر بخار کے بھی بڑھی ہوئی گرمی کو تسکین دیتا ہے۔

مقدار خوراک: ۴۰ ملی لٹر  
 طریقہ استعمال: یہ شربت عرق نیلوفر ۱۲۵ ملی لٹر یا پانی میں ملا کر وقت ضرورت پیئیں۔

شربت خاکسی موتی جھرہ، چچک، خسرہ اور میعاد بخار میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لٹر  
 طریقہ استعمال: یہ شربت نیم گرم پانی یا عرق گاؤ زباں ۱۲۵ ملی لٹر میں ملا کر صبح و شام پیئیں۔

عرق اجوائن پرانے بخار کو دور کرتا ہے، بھوک لگاتا اور ریاح کو خارج کرتا ہے۔



ہے، کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ مریض اپنے آپ کو روز بروز تندرست و توانا محسوس کرنے لگتا ہے، پیچھڑوں کی دق کے علاوہ کسی دوسرے اعضاء کی دق ہو وہ بھی اس کے استعمال سے دور ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ "ماء الحیات" کا استعمال ضروری ہے۔

مقدار خوراک: بڑوں کو ایک کھیہ بچوں کو آدھی کھیہ طریقہ استعمال: صبح سویرے ۵۰ ملی لٹر ماء الحیات کے ساتھ کھائیں۔

قرص سرطان سل دوق میں مفید ہیں، کھانسی کو دور کرتے ہیں۔

مقدار خوراک: یہ قرص صبح کو عرق گاؤں زباں ۱۲۵ ملی لٹر اور شربت اعجاز ۲۵ ملی لٹر کے ساتھ کھائیں۔

کافور سیال سل دوق میں مفید ہے۔ اگر خون آتا ہو تو اس کے استعمال سے رک جاتا ہے اور بڑھی ہوئی حرارت بھی دور ہو جاتی ہے۔

دوسرے اعضاء سے بھی خون بننے کو روکتا ہے۔ ایضہ میں بھی فائدہ دیتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ قطرے

طریقہ استعمال: صبح اور شام عرق گاؤں زباں ۱۲۵ ملی لٹر میں ملا کر پئیں۔

ماء الحیات یہ ایک عرق ہے جو قرص سحر کے ساتھ استعمال کرنے سے سل دوق میں

حیرت انگیز اثر دکھاتا ہے۔ پیچھڑوں کے اہمار لورن کے زخم اس کے استعمال سے اچھے ہو جاتے ہیں۔ ہلکی ہلکی

حرارت دور ہو جاتی ہے۔ پیچھڑوں کی دق کے علاوہ دوسرے اعضاء کی دق میں بھی مفید ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

استعمال طیرا سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے اجزاء جسم اور خون میں شامل ہو کر طیرا کے حملہ کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ برسات کے دنوں میں جب طیرا کا زور ہو تو اس کا استعمال مفید ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

## سل دوق

شربت اعجاز سل دوق اور خشک کھانسی میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لٹر

طریقہ استعمال: یہ شربت، عرق گاؤں زباں ۱۲۵ ملی لٹر میں ملا کر صبح اور شام پئیں۔

عرق شیر مرکب تپ دق اور جنون دہلنویا میں مفید ہے، ہر قسم کی

حرارت کو تسکین دیتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی لٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق، شربت نیلو فر ۲۵ ملی لٹر میں ملا کر پئیں۔

عرق ہر ابھرا دق میں مفید ہے، گرمی کو تسکین دیتا ہے، پیچھڑوں کو

تقویت بخشتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی لٹر

طریقہ استعمال: اس عرق میں شربت اعجاز ۲۵ ملی لٹر ملا کر پئیں۔

قرص سحر سل دوق کی خاص دوا ہے، اس کے استعمال سے دق کی ہلکی ہلکی حرارت دور ہو جاتی ہے اور پیچھڑوں کے اہماروں کے تحلیل

ہونے اور ان کے زخموں کے اچھا ہونے میں مدد ملتی



### میعادی بخار

میعادی بخار میں شربت خاکساری مفید ہے جو "بخار" کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خیرہ مروارید، خیرہ مروارید خاص اور خیرہ مروارید بہ نسخہ کلاں میعادی بخار میں دل کو طاقت دینے اور عام جسمانی کمزوری میں مفید ہیں۔ یہ "ضعف قلب" کے تحت درج ہیں۔

### خسرہ۔ چیچک

خسرہ اور چیچک میں شربت خاکساری کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔ یہ پچھلے صفحات میں "بخار" کے زیر عنوان درج ہے۔ اس کے علاوہ خیرہ مروارید، خیرہ مروارید خاص اور خیرہ مروارید بہ نسخہ کلاں کا استعمال بھی مفید ہے۔ یہ سب "ضعف قلب" میں لکھے گئے ہیں۔

### مشاپا

سُفوف مہزل  
مشاپا  
مشاپا کو دور کرتا ہے، کچھ دنوں تک لگاتار استعمال کرتے رہنے سے آہستہ آہستہ وزن کم ہو جاتا ہے اور بدن صحیح حالت میں آ جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: صبح و شام عرق زیرہ ۲۰ ملی لیٹر پانی کے ساتھ کھائیں۔

عرق زیرہ  
مشاپا کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے،  
بلیج کو خارج کرتا اور بھوک لگاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ ملی لیٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق صبح اور شام پئیں۔ اگر سُفوف مہزل کھا کر لوپر سے یہ عرق پئیں تو زیادہ بہتر ہے۔

معجون مہزل  
مشاپا کو دور کرنے کے لیے  
نہایت مفید ہے، کچھ دنوں تک

لگاتار استعمال کرنے سے بدن صحیح حالت میں آ جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام

طریقہ استعمال: یہ معجون کھا کر لوپر سے عرق زیرہ ۵ ملی لیٹر پئیں۔

جوارش کوئی، جوارش کوئی مسمل، معجون

فوجی اور معجون ناخوہ بھی مشاپا کو دور کرنے

کے لیے بہتر ہیں۔



## فساد خون اور جلد کی بیماریاں

طریقہ استعمال: ۱۰ گرام یہ دوا روغن چنبیلی ۶۰ ملی لیٹر  
میں ملا کر مالش کریں۔ ایک گھنٹہ کے بعد نیم گرم پانی سے  
نمائیں۔

کھجلی کو دور کرتا اور زخموں کو  
روغن کمیلہ خشک کرتا ہے۔

طریقہ استعمال: کھجلی پر مالش کریں اور زخموں پر  
لگائیں۔

شربت عشبہ خاص یہ شربت اعلا درجہ  
کا مصفی خون ہے،

فساد خون سے پیدا ہونے والی تمام بیماریوں مثلاً کھجلی، دوا  
وغیرہ میں فائدہ دیتا ہے۔ آتشک اور سوزاک میں بھی  
مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لیٹر سے ۵۰ ملی لیٹر تک

طریقہ استعمال: یہ شربت صبح کو پانی میں ملا کر پیئیں۔

شربت عناب خون کو صاف کرتا اور خون کے  
جوش اور گرمی کو تسکین دیتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لیٹر سے ۴۰ ملی لیٹر تک

طریقہ استعمال: یہ شربت پانی میں ملا کر پیئیں۔

### خارش۔ کھجلی

افطریقہ استعمال: ۱۰ گرام یہ دوا روغن چنبیلی ۶۰ ملی لیٹر  
میں ملا کر مالش کریں۔ ایک گھنٹہ کے بعد نیم گرم پانی سے  
نمائیں۔

طریقہ استعمال: کھجلی پر مالش کریں اور زخموں پر  
لگائیں۔

شربت عشبہ خاص یہ شربت اعلا درجہ  
کا مصفی خون ہے،

فساد خون سے پیدا ہونے والی تمام بیماریوں مثلاً کھجلی، دوا  
وغیرہ میں فائدہ دیتا ہے۔ آتشک اور سوزاک میں بھی  
مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لیٹر سے ۵۰ ملی لیٹر تک

طریقہ استعمال: یہ شربت صبح کو پانی میں ملا کر پیئیں۔



**شربت مرکب مصفی خون** فساد خون کی تمام بیماریوں مثلاً کھجلی،

داد اور چنبل وغیرہ میں مفید ہے، آتھک، جذام اور سوزاک میں بھی فائدہ دیتا ہے۔

مقدار خوراک: ۲۵ ملی لٹر

طریقہ استعمال: یہ شربت، عرق مرکب مصفی خون ۱۲۵ ملی لٹر میں ملا کر صبح کو پیئیں۔

**صافی** یہ خون کو صاف کرنے والی لاجواب دوا ہے۔ خون کی خرابی سے پیدا ہونے والی تمام

بیماریوں کے لیے اکسیر ہے۔ خارش (کھجلی) ستارہی ہو یا تمام بدن پر داد اور چنبل پیدا ہو گئے ہوں، ماسوں نے چرے کو بد نما بنا دیا ہو، پھوڑے پھنسیاں نکلتی ہوں، پتی تکلیف دیتی ہو، یہ سب بیماریاں اس کے استعمال سے دور ہو جاتی ہیں۔ آتھک، سوزاک، بھعدر جیسی بیماریوں میں بھی اس کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے۔ مرد و عورت، بچے اور جوان سب کے لیے یکساں مفید ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

**عرق چرایتہ** خون کو صاف کرتا ہے، خون کی خرابی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی لٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق صبح کو یا صبح و شام دونوں وقت پیئیں۔

**عرق شاہترہ** فساد خون کی تمام بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے، خون کی

گرمی اور جوش کو تسکین دیتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی لٹر

طریقہ استعمال: اس عرق میں شربت عناب ۲۵ ملی لٹر

ملا کر صبح کے وقت پیئیں۔

**عرق عشبہ** خون کو صاف کرتا ہے، آتھک میں مفید ہے، آتھک سے پیدا ہونے والی بیماریوں مثلاً غیرہ کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی لٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق شربت عشبہ ۲۵ ملی لٹر میں ملا کر پیئیں۔

**عرق مرکب مصفی خون** اعلا درجہ کا مصفی خون ہے، پھوڑے پھنسیوں کو دور کرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی لٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق، شربت عناب ۲۵ ملی لٹر میں ملا کر پیئیں۔

**عرق منڈی** خون کو صاف کرتا ہے۔ پھانکی کو قوت دیتا ہے، اعصاب ریشہ اور ارواح کو طاقت دیتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۲۵ ملی لٹر

طریقہ استعمال: یہ عرق، شربت عناب ۲۵ ملی لٹر میں ملا کر پیئیں۔

**معبجون عشبہ** مصفی خون ہے۔ آتھک، جذام، کھجلی وغیرہ فساد خون کی تمام بیماریوں میں مفید ہے۔ گھنٹیاں بھی فائدہ دیتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام سے ۱۰ گرام تک

طریقہ استعمال: یہ معجون صبح یا رات کو پانی سے کھائیں۔

**قرص اصفر** یہ قرص خون کو صاف کرتے ہیں، فساد خون سے پیدا ہونے

والی تمام بیماریوں مثلاً خارش (کھجلی) داد اور پھوڑے



دور کرتی ہیں۔ بچے ہوں یا بڑے، دونوں کے لیے یکساں مفید ہیں۔

مقدار خوراک: بڑوں کو ۴ گولیاں، بچوں کو ایک سے ۲ گولی۔

طریقہ استعمال: یہ گولیاں صبح کو پانی سے کھائیں۔ بچوں کو آدمی گولی سے ایک گولی تک ماں کے دودھ میں گھول کر دیں۔ اس سے بڑے بچوں کو ایک سے دو گولی تک دودھ میں گھول کر دیں۔

سٹوف شاہترہ، سنوف مصفی خاص، شربت عشب خاص، صافی، قرص اصطر، مجون چوب گز، مجون عشب، مجون مصفی خاص، یہ سب پھوڑے پھنسیوں میں خون کی صفائی کے لئے استعمال کی جاتی ہیں، گز شدہ صفات میں درج ہیں۔

### مہاسے۔ چھپ

غازہ حسن افزا چہرے کے داغوں، جھانڈوں، چہرے کے چھپ اور مہاسوں کو دور کر کے چہرے کو نکھارتا اور اس میں جاذبیت پیدا کرتا ہے۔ طریقہ استعمال: رات کو ۵ گرام یہ غازہ تھوڑے پانی میں ملا کر چہرے پر لگائیں اور صبح کو پانی سے منھ دھو ڈالیں۔

### زخم

مرہم رال ہر قسم کے زخموں کو بھرتا ہے، زخموں کو میل پکیل سے صاف کر کے بہت جلد بھر لاتا ہے۔

پھنسیوں میں مفید ہیں۔

مقدار خوراک: ایک قرص

طریقہ استعمال: یہ قرص صبح اور شام پانی سے کھائیں۔

مرہم خارش جدید کھلی تر ہو یا ٹنک، دونوں کے لیے مفید ہے۔

طریقہ استعمال: کھلی کی جگہ پر اس مرہم کو ملیں۔

### داد۔ چنبل

مرہم ابیض داد کھلی اور پھنسیوں جیسی مختلف جلدی بیماریوں کی مفید دوا ہے۔ طریقہ استعمال: داد، کھلی اور پھنسیوں پر تھوڑا تھوڑا لگائیں۔

مرہم قوبا اس مرہم کے استعمال سے دلو پورے طور پر جاتا رہتا ہے۔ طریقہ استعمال: داد کو کپڑے سے رگڑ کر یہ مرہم لگائیں۔

اگر دلو اور چنبل تمام جسم پر جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہوں تو مذکورہ بالا مقامی دلوؤں کے علاوہ اطریل شاہترہ، شربت عشب خاص، شربت مرکب مصفی خون، صافی اور قرص اصطر بھی کسی دوا کا ضرور استعمال کریں۔ خارجی استعمال کے لیے مرہم خارش جدید لگائیں۔

### پھوڑے پھنسیاں

حب مصفی خون فساد خون میں مفید ہیں، پھوڑے پھنسیوں اور کھلی کو



طریقہ استعمال: نیم کے چوں کو پانی میں جوش دے کر اس سے زخموں اور پھنسیوں کو دھوئیں۔ اس کے بعد یہ مرہم کپڑے پر لگا کر زخم پر چپا دیں، روز مرہ اسی طرح کریں۔

### پتی

پتی کی حالت میں صافی، اور آکسیر شفا کا استعمال بھی مفید ہے روغن کافور لگانے سے جلن دور ہو جاتی ہے۔

طریقہ استعمال: پہلے نیم کے چوں کے جوشاندہ سے زخموں کو دھوئیں، اس کے بعد یہ مرہم کپڑے پر لگا کر زخم پر چپا کریں۔ اگلے روز پھر یہی عمل کریں۔

مرہم کافور یہ مرہم ایسے زخموں کے لیے مفید ہے جن میں درد اور جلن ہو، یہ ان

میں تسکین بخشنا اور جلدی بھرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان جلن دار پھنسیوں کو بھی فائدہ دیتا ہے جن سے زرد رنگ کا پانی سا بہتا رہتا ہے۔

## امراض خبیثہ

حب لیموں یہ گولیاں آتشک میں مفید ہیں۔ صبح صبح کے بعد استعمال کرنے سے زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں، آتشک کی وجہ سے پیدا ہونے والا گھٹیا اور دوسرے عوارض بھی اس کے استعمال سے دور ہو جاتے ہیں۔

مقدار خوراک: ایک گولی

طریقہ استعمال: صبح اور شام صبح سے اسی گولی، سوکھ کی دال اور گھیا (لوکی) سے پرہیز کریں۔

اس مرہم کے استعمال سے مرہم آتشک آتشک زخم بہت جلد خشک

### آتشک

جوہر منطی آتشک اور آتشک کی وجہ سے پیدا ہونے والے گھٹیا اور نفرس میں نہایت مفید ہے، پرانے سوزاک میں بھی فائدہ دیتا ہے، بدن میں سولوی مادہ کی وجہ سے اختلاج قلب اور گھبراہٹ رہتی ہو تو وہ بھی اس کے استعمال سے دور ہو جاتی ہے۔

مقدار خوراک: ۳۰ ملی گرام

طریقہ استعمال: منطی میں یہ جوہر منطی کی جگہ رکھ کر گولی سی مار کر گل جائیں (چبائیں نہیں) اور ۲۵۰ ملی لٹر دودھ پیئیں۔



طریقہ استعمال: یہ دوا کھاکر لوپر سے شربت بزوری  
۲۵ ملی لٹرا، ۲۵ ملی لٹر دودھ یا پانی میں ملا کر پیئیں۔

روغن بسرورہ سوزاک میں مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۳-۵ قطرے

طریقہ استعمال: یہ روغن بتاش یا تھوڑی چینی پر ڈال کر  
کھائیں لوپر سے دودھ پیئیں۔

سقفوف صندل نئے اور پرانے سوزاک میں  
مفید ہے، پیشاب کی جلن کو

دور کرتا اور پیشاب کی نالی کے زخم کو بھرتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ سفوف صبح کو دودھ کی لسی سے  
کھائیں۔

سقفوف کشتہ قلعی نئے پرانے سوزاک میں  
مفید ہے، سوزاک کی وجہ

سے جریان ہو تو اس کے استعمال سے دور ہو جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ سفوف پھانک کر شربت بزوری  
۳۰ ملی لٹرا پانی میں ملا کر پیئیں۔

قرص سوزاک سوزاک کی مفید دوا ہے، ان  
قرصوں کے استعمال سے

پیشاب کھل کر آتا ہے اور پیشاب کی نالی کا زخم پیپ سے  
صاف ہونے کے بعد جلد ہی بھر جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۴ قرص

طریقہ استعمال: صبح اور شام یہ قرص پھیکے دودھ  
سے کھائیں، گرمیوں میں دینی کے ساتھ پانی سے

استعمال کریں۔

ہو جاتے ہیں، دوسرے خبیث زخم بھی اس کے لگاتے  
سے اچھے ہو جاتے ہیں۔

طریقہ استعمال: زخموں کو پہلے نم کے پانی یا معمولی گرم  
پانی سے دھو کر یہ مرہم لگائیں۔

مجبون مصفی خاص آتشک میں مفید ہے،  
آتشک کے علاوہ جذام،

داد، خارش پرانے سوزاک اور پھوڑے پھنسیوں میں بھی  
فائدہ دیتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ مجون صبح کو شربت عشب خاص  
۳۰ ملی لٹرا پانی میں ملا کر پیئیں۔

شربت عشب خاص، عرق مرکب مصفی خون،

مجبون عشب، مجون مصفی خاص، یہ سب

مرض آتشک میں مفید ہیں، "فساد خون"

کے زیر عنوان درج ہیں۔

## سوزاک

دوائے صندل سوزاک کی مفید دوا ہے،  
پیپ کو روکتی اور جلن کو دور  
کرتی ہے۔

مقدار خوراک: ۵ گرام

طریقہ استعمال: یہ سفوف صبح و شام ۲۵۰ ملی لٹر دودھ  
کے ساتھ کھائیں۔

دوا کرٹھائی والی سوزاک نیا ہو یا پرانا، اس کے  
استعمال سے اچھا ہو جاتا ہے۔

قرحہ بھی اس دوا سے جاتا رہتا ہے۔

مقدار خوراک: ایک گرام یا ایک قرص



## برص۔ پھلسمری

برص (پھلسمری) کے  
روغن برص جدید  
لگاتار لگاتے رہنے سے برص کے سفید دغ صبح حالت  
میں آجاتے ہیں۔  
طریقہ استعمال: پھریری سے داغوں پر لگائیں۔

برص صینا  
اگر برص کا مرض زیادہ پرانا اور بدن پر  
زیادہ پھیلا ہوا ہو تو برص صینا کے استعمال  
سے اچھا ہو جاتا ہے۔

مقدار خوراک: ۳ گرام  
طریقہ استعمال: ناشتہ کے بعد اور رات کو سوتے وقت  
کھائیں۔

روغن بانچی  
برص (پھلسمری) کے لیے  
منفید ہے۔

طریقہ استعمال: برص کے داغوں پر لگائیں۔  
سفوف برص  
برص (پھلسمری) کے دغ  
اگر زیادہ دنوں کے نہ ہوں تو  
اس سفوف کے استعمال سے اچھے ہو جاتے ہیں۔

طریقہ استعمال: ۵ گرام یہ سفوف رات کو ۱۲ ملی لٹر  
پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح کو صاف پانی نثار کر بتیں اور  
پھوک کو پیں کر داغوں پر لگائیں۔

## خنزیر (کٹھ مالا) رسولیاں

اٹریفل غدوی خنزیر (کٹھ مالا) میں مفید  
ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ گرام  
طریقہ استعمال: یہ اٹریفل رات کو پانی سے کھائیں۔  
روغن اکسیر خنزیر  
خنزیری گلیوں کو  
تحلیل کرنے کے لیے  
نمای مفید ہے۔

طریقہ استعمال: تھوڑا سا یہ روغن چپے میں لے کر آگ  
پر گرم کریں پھر اس کو گلیوں پر لگا کر انگلی سے ہلکے ہلکے  
ماش کریں، اس کے بعد پان یا پتیل یا ارغٹ کا پتار رکھیں اور  
لوپر سے روئی رکھ کر باندھیں۔

مرہم جدوار  
خنزیری گلیوں اور دوسری  
گلیوں اور رسولیوں کو تحلیل  
کرتا ہے اور زخموں کو بھرتا ہے۔

طریقہ استعمال: گلیوں پر یہ مرہم گرم کر کے لگائیں  
اور لوپر سے پان، پتیل یا ارغٹ کا پتار گرم کر کے رکھیں اور پھر  
روئی رکھ کر باندھ دیں۔

## بھگدر۔ ناصور

مرہم خارش جدید بھگدر اور ناصور میں فائدہ دیتا ہے۔  
اس کا ذکر گزشتہ صفحات میں درج ہے۔



## بالوں کی بیماریاں

کیمیکل شیپو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ سر کی خشکی کو دور کرتا ہے۔ بالوں کو گرنے سے روکتا ہے اور قبل از وقت بالوں کو سفید ہونے سے بچاتا ہے۔  
طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

ہمدرد ہیئر آئل سیاہ رنگ کے ملائم اور چمک دار بال خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں۔ ہمدرد ہیئر آئل نہایت پاکیزہ خوشبودار تیل ہے جو بالوں کو گرنے سے بچاتا ہے اور ان کو سیاہ، ملائم اور چمک دار رکھتا ہے، ہر موسم میں اپنے بالوں کی حفاظت کے لیے اسے استعمال کیجئے۔  
طریقہ استعمال: سر کے بالوں میں لگایا جاتا ہے۔

بے نظیر ہیئر آئل یہ بالوں کے لیے لاجواب تیل ہے۔ گرتے ہوئے بالوں کو روک دیتا ہے اور جس جگہ کے بال اڑ جاتے ہیں وہاں از سر نو نئے بال پیدا کرتا ہے، اس کے علاوہ بالوں کو بڑھاتا اور ان کو سیاہ چمکنے چمک دار بناتا ہے اور ساتھ ہی دماغ کو طاقت بھی دیتا ہے۔  
طریقہ استعمال: سر کے بالوں میں لگائیں۔

### بالوں کا گرنا

روغن آملہ سادہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا اور ان کی سیاہی کو محفوظ رکھتا ہے۔

طریقہ استعمال: سر کے بالوں میں لگائیں۔  
روغن آملہ خاص یہ تیل سر میں لگانے سے بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا اور ان کو گرنے سے محفوظ رکھتا ہے، نیز بالوں کی سیاہی کو قائم رکھتا اور ان کو ملائم چمک دار بناتا ہے، اس سے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے، اور یہ بالوں کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔

طریقہ استعمال: سر کے بالوں میں لگائیں۔  
زلالہ زلالہ میں آملہ کے ساتھ ساتھ شکاکائی، سرسوں اور دوسری جڑی بوٹیاں بھی شامل ہیں۔ زلالہ بالوں کو دھو تا ہی نہیں بلکہ بالوں کی پرورش بھی کرتا ہے۔ زلالہ بالوں کی جڑوں میں چکنائٹ کی قدرتی صلاحیت کو قائم رکھتا ہے، جسے عام صابن اور



تور اگر وہ عمل از وقت سفید ہو جائیں تو ان کے لگا ہونے سے صحیح حالت پر لوٹ آتے ہیں۔

### بال خورہ

روغن ذراریع بال خورہ جس میں سرور و دھرمی سولجہ کے بال گر کر پختے پختے پیدا ہو جاتے ہیں (میں سفید ہے۔ طریقہ استعمال: چھوٹے پر پھر بری سے لگائیں۔

### مخج

روغن پیر مرغ اور روغن ذراریع "مخج" کے لیے سفید ہیں۔ ان کا ذکر لو پر آچکا ہے۔

### سر کی جوئیں

جرین بھی جوئیں کو مارتی ہے۔ "خارش" کے زیر عنوان تحریر ہے۔

### بالوں کا نہ لگانا

روغن بیضہ مرغ جس جگہ بال نہ لگتے ہوں، اس روغن کی مرصہ تک روزانہ مالش کرنے سے بال نکل آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تل بالوں کو بڑھاتا اور ان کو وقت سے پہلے سفید ہونے کو روکتا ہے۔  
طریقہ استعمال: جس جگہ بال نکالنا چاہیں وہاں اس کی روزانہ مالش کریں۔

### بالوں کا قبل از وقت سفید ہو جانا

بالوں کے عمل از وقت سفید ہونے کی صورت میں اطریعل اسطوخودوس کا اندرونی استعمال مناسب ہے۔ یہ "درد سر" کے زیر عنوان مذکور ہے۔  
خارجی طور پر زلالہ، روغن آملہ خاص اور روغن پیر مرغ کے لگانے سے بالوں کی سیانی محفوظ رہتی ہے



## عام جسمانی کمزوری

**سنگارا** یہ ایک نہایت نفیس جنرل ٹانک ہے جو دہلی جزی بونٹوں کے جوہر اور ان سب دہانوں سے تیار کیا جاتا ہے، جو انسانی جسم کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے استعمال سے بھوک بڑھتی ہے، ہاضمہ درست ہوتا ہے، بدن میں چستی اور توانائی زیادہ پیدا ہوتی ہے، وزن بڑھتا ہے، ہڈیاں دبیز فھوس اور مضبوط ہوتی ہیں، معدہ اور جگر کا فعل درست ہو کر اچھے خون کی پیدائش بڑھ جاتی ہے، دماغ تروتازہ رہتا ہے۔ کام میں خوب جی لگتا ہے اور سستی اور تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ خواتین کے لیے حمل کے زمانے میں اور بچوں کو دودھ پلانے کے دنوں میں اس کا استعمال بے حد مفید ہے۔ اس سے نہ صرف ان کی صحت اور طاقت قائم رہتی ہے بلکہ ماں کے جسم سے غذا حاصل کرنے والے بچے کی صحت پر بھی اس کا شاندار اثر پڑتا ہے۔ بیماری کے بعد کی کمزوری دور کرنے اور طاقت حاصل کرنے کے لئے یہ لاجواب ٹانک ہے۔  
تقدیر یہ کی کمی اور جملہ خرابیوں میں مفید ہے۔  
طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

**شربت فولاد** عام جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے عجیب الٹرا ہے، جو بیماریاں خون سے فولاد کے اجزاء کو کم کر کے اس کا کمیابی عاقل بگاڑ دیتی ہیں، اور عام جسمانی کمزوری پیدا کر دیتی ہیں، ان کے بعد اس شربت کا استعمال حد درجہ مفید ثابت ہوتا ہے یہ خون کی رقت کو دور کرتا ہے اور اس

کی سرخی میں اضافہ کر کے ہرے کو سرخ بناتا ہے  
طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

**شربت اکسیر خاص** خون کی سرخی اور اس مقدار کو بڑھا کر قلت الدم (خون کی کمی) اور رقت الدم (خون کا پتلا پن) کو دور کرتا ہے، جسم کی پرورش کر کے اس کی عام جسمانی کمزوری کو دور کرتا اور قوت مدافعت (نچرل پاور) کو بڑھاتا ہے، دماغ و اعصاب کا تقدیر بڑھا کر انیس طاقت دیتا ہے۔ غرضیکہ اس طرح عام جسمانی کمزوری کو دور کرنے میں عجیب اثر رکھتا ہے۔ ہر موسم اور ہر عمر میں مرد و عورت استعمال کر سکتے ہیں۔  
طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

**حرقاء اللحم غنبری نسخہ کلاں** دل، دماغ، جگر اور دوسرے عضاء کو طاقت دیتا ہے، فرحت بخشتا ہے، قوت باہ کو بڑھاتا ہے، نہایت زود اثر اور لطیف و نفیس چیز ہے۔

مقدار خوراک: ۸۰ ملی لٹر

طریقہ استعمال: روزانہ صبح کو یہ عرق، شربت اور شیریں ۲۵ ملی لٹر میں ملا کر پیئیں، اگر دوام المک معتدل جو ہر ۵ گرام کھا کر لو پے سے یہ عرق پیئیں تو زیادہ بہتر ہے۔  
**کشتہ طلاء کلاں** عام جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے، دل، دماغ اور جگر و اعصاب کو طاقت دیتا اور خون کی پیدائش کو بڑھاتا ہے۔



اطلا درجہ کا مقوی پاد ہے۔

مقدار خوراک: ۳۰ ملی گرام یا ایک قرص

طریقہ استعمال: دوام المسک معتدل جو ہر دلی ۵ گرام یا  
لب کیر ۵ گرام میں رکھ کر کھائیں لو پر سے ۲۵۰ ملی لٹر  
دودھ پئیں۔

اس کا ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ یہ جگر  
گاموں کو تحریک دے کر خون کی پیدائش کو  
بڑھاتا ہے۔ اور اس طرح خون کی کمی کو دور کر کے عام  
جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ اس میں ایسے اجزاء شامل  
ہیں جو نقص تغذیہ سے پیدا ہونے والی تمام بیماریوں کا  
بہترین علاج ہیں۔ پیچیدہ لور ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے  
اور بیماری سے اٹھے ہوئے مریضوں کے ضعف و نقاہت کو  
دور کرتا ہے۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

ماء اللحم دو آتشہ دل کی وقت انتہائی کو  
بڑھاتا ہے، دماغ و اعصاب

میں تسکین پیدا کر کے ان کی قوت میں اضافہ کرتا ہے،  
جگر اور معدے پر بھی محرک اثر ڈالتا ہے اسی لیے اس کے  
استعمال سے بھوک بڑھ جاتی اور کھائی ہوئی غذا اچھی طرح  
ہضم ہونے لگتی ہے اور خون کی پیدائش بڑھ جاتی ہے اور  
بڑھاپے میں بھی جوانی کی انگلیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ عام  
جسمانی و عصبی کمزوری دور ہو کر ضعف باہ دور ہو جاتا ہے۔  
مردیوں میں ہر عمر کے مرد و عورت استعمال کر سکتے ہیں۔

طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

منڈوزا جب بدن میں عیلم کی کمی ہو جاتی ہے تو  
عام جسمانی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے،  
دانت خراب ہو جاتے ہیں، بچوں میں ہڈیاں نرم پڑ جاتی  
ہیں، ہر وقت نزلہ رہنے لگتا ہے، ان حالات میں اس کے

استعمال سے بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ حاملہ لور دودھ پلانے  
والی عورتوں کو اس کی شدید ضرورت ہے۔ یہ دوا قریصوں کی  
شکل میں ہے اور یہ بہت جلد خون میں جذب ہو جاتے ہیں۔  
طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

ماء الصحت گرمی جیسے بخت موسم میں جگر،  
گردوں اور جسم کی مختلف (غدد)  
گلیوں کو بہت تیزی اور قوت سے مسلسل اپنا کام جاری  
رکھ کر انسانی زندگی کو بچانے کا فرض انجام دینا پڑتا  
ہے، زندگی تو بیک فک جاتی ہے لیکن مسلسل کام  
جاری رکھنے کی وجہ سے ان اعضاء کی قوت حیات  
میں کمی آ جاتی ہے۔ ماء الصحت کے استعمال سے یہ قوت  
حیات صحیح حالت میں واپس آتی اور محفوظ رہتی ہے۔ اس  
سیال کے حلق سے اترتے ہی تمام اعضاء کو نئی توانائی  
حاصل ہوتی ہے اور وہ بدستور اپنے افعال کو جاری رکھتے  
ہیں۔ اگر چکر آتے ہوں، دل دھڑکتا ہو، طبیعت ٹھہرا  
رہتی ہو تو یہ سب شکایتیں دور ہو جاتی ہیں اور طبیعت  
ہشاش بھاش رہنے لگتی ہے۔ مرد، عورت، جوان،  
بوڑھے، بچے سب کے لیے یکساں مفید ہے۔  
طریقہ استعمال: دوا کے ساتھ ہے۔

مفرح منکلیں بھی جسمانی کمزوری کے لیے  
مفید ہے۔ یہ "ضعف دماغ" میں تحریر  
ہیں۔ جواہر مرہ، خیرہ ایریشم حکیم ارشد  
والا، خیرہ مردارید خاص، دواء المسک  
معتدل سادہ، دواء المسک معتدل جواہر  
والی، مفرح شیخ الرئیس، یہ سب دوائیں  
بھی عام جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے  
لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ "ضعف قلب"  
کے زیر عنوان درج ہیں۔



## درویشی دواخانہ (رجسٹری) کی دوائیں

**گیس کٹ (درویشی چورن):** ریاحی گیس کی تمام تکالیف، پیٹ پھولنا، پیٹ کا درد، پیٹ میں جلن، دست آنا، ہچکچ، مرد اور گیس خارج نہ ہونے کے لئے اکسیر دوا۔

**درویشی امرت رس:** دوسوں کی تحقیق کے بعد درویشی دواخانہ نے دل دماغ اور عام جسمانی کمزوری کے لئے بہترین دوا "درویشی امرت رس" پیش کی ہے۔ یہ اسکندھ دار چینی، آملہ، برہمی، الا پتھی، مصری، شمد وغیرہ، دس جڑی بوٹیوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ امرت دل دماغ، جگر، نسل، پھٹوں میں نیا خون پہنچا کر ان کو طاقت عطا ہے۔ یادداشت کو تیز کرتا، مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے، نئی امنگ اور نیا جوش پیدا کرتا ہے۔ چالیس دن استعمال سے حیرت انگیز فائدے حاصل ہو۔  
۵ گرام ایک چمچ صبح و شام دودھ یا پانی سے کھلائیں۔

**درویشی ہیر آئل:** دیسی جڑی بوٹیوں اور پھولوں سے تیار کر گدہ "درویشی ہیر آئل" بالوں کو مضبوط کرتا، سفید ہونے سے روکتا اور ان کو کالا اور ملائم رکھتا ہے۔ نزلہ، زکام، سر درد، دماغی کمزوری کے لئے لاجواب ہے۔

**درویشی منجن:** روغن لوبک والا ۲۳ جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ بھارت کا واحد منجن ہے، جو دانتوں کے درد، سوڑھوں کے درم، پانی، منہ سے بدبو آنا، ہر طرح کی دانتوں کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ دانتوں کو مضبوط اور چمکدار بناتا ہے۔

**درویشی مرہم:** یہ مرہم کھجلی پھوڑے، بھنسی، مسالے، جلنے، کٹنے، جانوروں کے کاٹنے، بواسیر وغیرہ کے لئے اکسیر صفت ہے۔ یہ زخموں کو بھرتا ہے درد کو تسکین دیتا ہے جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ وقت پر کام آنے والی ہر گھر میں رکھنے والی چیز۔ درویشی مرہم آزما کر دیکھئے۔

**مدنی فارمولے:** درد کی مشہور دواؤں سے تیار کردہ فوری آرام پہنچانے والا مدنی فارمولہ سر درد، چکر آنا، کیڑے کاٹا، نمونیہ، سردی، گھٹیا، موج، چوٹ، چوٹ ورم کے لئے لاجواب دوا۔ دانت کے درد، کیڑا لگنے میں فوری فائدہ کرتا ہے۔ آنکھ اور کھلے زخم پر یہ دوا لگائیں۔

**درویشی تیل:** صرف ہر دنی استعمال کے لئے۔ دیدوں اور حکیموں کے تجربات کا نچوڑ، بھارت کا مشہور تیل ۲۵ جڑی بوٹیوں، سورنجان تلخ، ہلدی، دار ہلدی، کانٹھل دیو دار، لوبان، کچلہ، ہینگ، نر پجور، چھریلہ، بابونہ، سوتھ، مال کٹنی، رائی، حم قرطم، بابلجھڑ، لوبک، دار چینی، اک، سنسالو کا عرق، لسن، کافور، حنا وغیرہ سے تیار کیا جاتا ہے۔

پرانے سے پرانے درد، درم، موج، چوٹ، گھٹیا، کمر کا درد، پیٹھ اور کولہوں کا درد، جلنے، کٹنے، زخم پھوڑے، کان کا درد، کمزور اور سوکھے مریضوں کی مالش، کھجلی، خارش، ہاتھ پیروں کا پھٹنا، ہاتھ پیروں کی اٹھن، کیڑے مکوڑے اور مچھو کے کاٹنے پر، سردی نمونیہ، پیٹ کے درم جانوروں کے خراب زخم، کھر پکنا، کیڑے پڑ جانے، کمزوری باہ، قانچ، لقوہ، گردن کا اکڑ جانا، ریزہ کے درد میں اس کا استعمال مفید ہے۔

## درویشی دواخانہ



## نسخوں میں لکھنے والے اشارے

اشارات	تشریح	اشارات	تشریح
GR	گرین	a a	برابر۔ برابر
G	گرام	a.c	کھانے سے پہلے
H.S.	سوتے وقت	Ad.	شامل کرو
in-D	روزانہ	ad-lib	مرضی کے مطابق ملاؤ
INJ	انجکشن کی دوا	Aqua	سادہ پانی
I.M.	عضلاتی انجکشن	Aqua dist	کشید کیا ہوا پانی
I.V.	وریدی انجکشن	alt.hor	ایک گھنٹہ بعد
S.U.B.CUT	زیر جلد	alt	ایک دن چھوڑ کر
I.U.	انٹرنیشنل یونٹ	B.I.D.	دن میں دو بار
OMN-BID	ہر تیسرے دن	B.P.	برٹش فارما کوپیا
OMN.B.I.H.	ہر ۲ گھنٹہ بعد	C°	سینٹی گریڈ
O.M.N.NOCT	ہر رات کو	cum-or-c	ساتھ میں
Pro-rat.eat	عمر کے مطابق	MIXT	مکسچر
P.C.	غذا کے بعد	Dil	ہلکا کر کے
Q.S.	بقدر ضرورت	FORT	تیز
R <sub>x</sub>	لیجے	F°	فارن ہائیٹ
SIG	ہدایات	F.M	مکسچر بناؤ
S.O.S.	بوقت ضرورت	F.PILL	گولی بناؤ
TR	نکچر	S.S	آدھا حصہ



اشارات	تشریح	اشارات	تشریح
UNG	مرہم	STAT	فورا
e.m.p.	ہدایت کے مطابق	TAB	نمیت
PULV	پوڈر	Table.S.F	بڑا چمچ بھر کر
T.D.S.	دن میں تین بار	Tea.S.F.	چائے کا چمچ بھر کر
		Q.H.	برگھنہ

### بچوں کی مقدار خوراک

بڑوں کی خوراک لکھی گئی ہے۔ بچوں کو دو اتجویز کرتے وقت ان کی عمر کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس کے لئے آسان طریقہ یہ ہے کہ بچے کی عمر میں ۱۲ جمع کر کے اس کی عمر کے سال سے تقسیم کر دیا جائے جو حاصل نکلے اتنا حصہ پوری خوراک کا بچے کو دیا جائے۔ مثلاً چار سال کے بچے کے لئے۔

(۱۶ = ۳ + ۱۲ + ۳) — (۴ = ۳ ÷ ۱۶) یعنی پوری خوراک کا چوتھائی حصہ بچے کو دیا جائے۔ آسانی کے لئے نیچے ہم عمر کے مطابق خوراک دینے کا طریقہ لکھ رہے ہیں اس سے بھی مدد لی جاسکتی ہے۔

ایک سال کے عمر کے بچے کے لئے پوری خوراک کا	بارھواں حصہ	( $\frac{1}{12}$ )
دو سال	" "	( $\frac{1}{6}$ )
تین سال	" "	( $\frac{1}{4}$ )
۴ سال	" "	( $\frac{1}{3}$ )
۵ سال	" "	( $\frac{1}{2}$ )
۱۳ سال	" "	( $\frac{1}{2}$ )
۱۵ سال	" "	( $\frac{1}{2}$ )



## ادویہ کا ری ایکشن، علاج و تدابیر

### DRUG - REACTION

ایلو پیٹھک ادویہ میں جہاں یہ خصوصیت ہے کہ وہ فوری اثر کرنے والی خطرناک اور مہلک بیماریوں سے مریض کو نجات دلانے والی ہیں، وہاں ان میں یہ نقص بھی ہے بعض اوقات ان کا رد عمل اتنا شدید ہوتا ہے کہ مریض کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، عام طور سے مشہور یہ ہے کہ ہینسی لین اور نے انس کے انجکشن کاری ایکشن ہوتا ہے۔ حالانکہ اسٹریپٹومائی سین، وٹامن بی ۱، کلوروکوئن، لورایکسٹریکٹ، ہر قسم کی ویکسین اور گلوکوز سیلائن کی بوتل چڑھاتے وقت بھی ری ایکشن ہو سکتا ہے۔ ایک مصروف معالج کے لئے یہ بہت مشکل ہے کہ ہر انجکشن کو پہلے ٹسٹ کرے اور پھر لگائے لہذا ری ایکشن کے ازالہ کی تدابیر سے ہر معالج کو آگاہ ہونا چاہیے، بوتل چڑھاتے وقت مریض کو جاڑا آ جانا۔ کچلی ہونا عام بات ہے اس کے لئے سب سے بہتر میرے تجربے میں بوتل کے ساتھ ہی یا فوراً بعد ڈیکسامیتھا سون ایول آئی ڈی زون یا ڈیکاڈرون کا انجکشن لگا دیا جائے اس سے مریض بوتل کے ری ایکشن سے محفوظ رہتا ہے، اسٹریپٹومائی سین۔ اور کلوروکوئن کے شدید ری ایکشن کے کیس بھی تجربے میں آئے۔ ایک مریض کو اسٹریپٹومائی سین کا انجکشن لگاتے ہیں جسم میں کھجلی۔ ہاتھ پیروں میں آگ ٹھکنا۔ سانس کی تنگی، پسینے کی کثرت، چکر، قے، متلی وغیرہ کی شکایت پیدا ہو گئی فوراً مریض کو اے ول، ڈیکاڈرون، ایڈری ٹالین دیا گیا ساتھ ہی گلوکوز کی بوتل چڑھائی گئی اس کے بعد ہی اسٹریپٹومائی سین کا رد عمل ختم ہوا۔

کلوروکوئن کا بچوں پر بہت خراب رد عمل ہوتا ہے ۵ سال سے کم عمر بچوں کو کلوروکوئن کا انجکشن نہ لگائیں۔ اس کے لئے بھی ڈیکاڈرون ۱۰۰ مٹی سال بہترین چیز ہے۔ لہذا ہر معالج کو چاہئے کہ اپنے مطب میں ری ایکشن پر قابو پانے والی ادویات ضرور موجود رکھے ورنہ بعض وقت بڑے خطرناک نتائج بھگتتے پڑتے

ہیں۔



## حمل کے ایام میں دواؤں کے اثرات

قدرت نے عورت کے اندر ایسے اعضاء کی تخلیق کی ہے جس سے حمل فطری طریقے سے انجام پذیر ہونا چاہیے اس کے باوجود بعض ایسی تبدیلیاں بھی اس حالت میں پیدا ہوتی ہیں جس سے کچھ غیر معمولی کیفیات مثلاً تھکی، نفاہت وغیرہ جیسی تکالیف پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان علامتوں کے لئے اور دوسری عام بیماریوں کے لئے حاملہ کو اگر دوا دینا ضروری ہو تو ڈاکٹر کی نگرانی میں اور خوب سوچ سمجھ کر دوا استعمال کرانا چاہیے کیونکہ جو دوا حمل کی حالت میں استعمال کرائی جاتی ہے ماں کے خون کا جز بن کر بچے کے جسم میں سرایت کرتی ہے۔

رحم میں پرورش پانے والے بچے کے نظام مکمل ہوتے نہیں ہیں اس لئے ان دواؤں کے مضر اثرات کا ازالہ نہیں کر سکتا۔

تجربات و تحقیقات سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ بعض دوائیں پیٹ میں پرورش پانے والے بچے اور حاملہ عورتوں پر تباہ کن اثرات ڈالتی ہیں۔ ۱۹۶۱ء میں امریکہ میں دوا "تھالیدومائید" جو کہ مسکن اعصاب اور بے خوابی کے لئے استعمال کی جاتی تھی اس دوا کو جب حاملہ عورتوں نے استعمال کیا تو اس سے بچوں کی خلقت پر اثر پڑا اور ایسے بچے پیدا ہوئے جو جسمانی اور دماغی لحاظ سے ناقص تھے ان کے ہاتھ پیر بھی چھوٹے رہ گئے اس وجہ سے اس دوا کو وہاں خلاف قانون قرار دینا پڑا۔

حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں بچے کے دل، پٹھے، رگیں نشوونما پانے لگتی ہیں ان ایام میں اگر ایسی دوائیں حاملہ کو استعمال کرائی جاتیں جو بچے کی نشوونما میں خلل ڈالنے والی ہوں تو ان کا جنین کی ساخت پر بہت برا اثر پڑتا ہے خاص طور پر دافع کینسر دوائیں حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں بہت مضر ثابت ہوتی ہیں، اس بات کا ثبوت مل چکا ہے کہ اس حالت میں دافع کینسر دوائیں دینے سے پیروں کا خیرھا ہونا، دماغ میں فتور اور گردوں کا غائب ہونا پایا گیا۔ کارٹی سون کے مرکبات حمل کے ابتدائی ۳ ماہ میں استعمال کرنے سے بچے کے تالو، ہونٹ کٹے ہونے کے واقعات پیش آئے ہیں۔ حمل کے ایام میں سگریٹ، تمباکو اور



شراب نوشی کے خراب اثرات کے ثبوت ملے ہیں سگریٹ پینے والی حاملہ عورتوں کے ہونے والے بچے دل کے امراض میں مبتلا اور شراب نوشی کرنے والی حاملہ کے بچوں کو ست، کاہل اور دل کے امراض میں مبتلا پایا گیا ہے۔

حمل کے دوسرے تین ماہ اور آخری تین ماہ میں جو دوائیں استعمال کرائی جاتی ہیں وہ بھی جنین (بچے) پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اگر ان کو احتیاط سے استعمال نہ کرا جائے تو بچے کی جسمانی ساخت تک متاثر ہوتی ہے جس سے زندگی و بال جان بن جاتی ہے۔ ان ایام میں ٹر اسائیکلین کا اندھا دھند استعمال ہڈیوں میں زہریلے اثرات اور دانتوں کو پیلے رنگ میں تبدیل کرتا ہے۔ اسٹروئیدی سین کا زیادہ استعمال ہونے والے بچے کو بہرہ کر سکتا ہے، منوم دواؤں Hypnotics کا زیادہ استعمال بچے کے نظام تنفس اور اعصاب کو نقصان پہنچاتا ہے، مرنخی عضلات ادویہ بچے کی ساخت کو متاثر کرتی ہیں، اسپرین یا اس کے مرکبات سے بچے کو ہیمو فیلیا (خون کا پتلا پن) اور یرقان جیسی تکالیف ہو سکتی ہیں، دافع بلند پریشادویہ بھی حاملہ کے لئے بہت نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ جنسی ہارمون کے بے جا استعمال سے بھی بچوں کے اندر کینسر اور ان کی جنس پر خراب اثر پڑ سکتا ہے۔ مانع حمل خوردنی گولیاں (Contraceptive) کے استعمال سے جدید تحقیقات کے مطابق بچوں کی جسمانی ساخت متاثر ہوتی ہے۔

حمل کے ایام کے علاوہ دودھ پلانے کے ایام میں استعمال کی جانے والی ادویہ بھی بچے پر اثر انداز ہوتی ہیں، منوم دوائیں (Hypnotics) دودھ کے ذریعہ بچے کے جسم میں پہنچ کر اعصاب و تنفس کو متاثر کرتی ہیں، لہذا مرضہ کو بھی دوا دیتے وقت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کمپنیوں کی پبلسٹی سے متاثر ہو کر ایک عام فیشن بن گیا ہے کہ ایام حمل اور ایام رضاعت میں کیمیشیم اور فولاد کے ٹانک استعمال کرائے جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایام حمل و رضاعت میں طاقت بخش اجزاء کی ضرورت بڑھ جاتی ہے اس کمی کو مقوی اور وٹامن سے بھرپور غذاؤں سے پورا کیا جاسکتا ہے اور اگر شدید ضرورت ہو تو ڈاکٹر کے مشورے اور نگرانی کے بغیر ٹانک کا استعمال مناسب نہیں۔ کیونکہ جنین اور نومولود کے نرم و نازک جسم کے لئے بے ضرر دوا بھی مضر ہو سکتی ہے۔ ذیل میں ہم ان ادویات کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے ہیں جو حمل کے دوران ماں اور بچے کے لئے مضر ثابت ہوتی ہیں۔



نام دوا	حاملہ پر اثرات	احتیاطی تدابیر
• ایچی سیلین کے مرکبات مثلاً روسی لین، بروسل وغیرہ	• تجربات سے ان ادویہ کا استعمال دوران حمل محفوظ نہیں۔	• لہذا بہت احتیاط کے ساتھ ان کا استعمال کیا جائے۔
• ایماکسی سیلین کے مرکبات مثلاً سائی نوموکس اموکسائی لین وغیرہ	• دوران حمل ان کا استعمال مضرت سے خالی نہیں۔	• بہت احتیاط اور ڈاکٹر ہدایت کے تحت ہی استعمال کریں۔
• کلورم فینی کال کے مرکبات مثلاً رک لور، پراکسن انبرومائی سین کے مائی شین وغیرہ	• جنین پر زہریلے اثرات مرتب ہوتے ہیں حرکت قلب متاثر ہوتی ہے جلد اور غشا مخاطی پر نیلے دھبے پڑ جاتے ہیں۔	• شدید ضرورت کے تحت ڈاکٹر کی نگرانی میں پوری طرح احتیاط سے استعمال کرائیں۔
• ڈاکسی سائیکلین کے مرکبات مثلاً وی دو سائیکلین، ٹرائی ڈوکس ڈیوراسائیکلین ٹراڈاکس وغیرہ	• حمل کے نصف ایام یعنی ساڑھے چار ماہ بعد ان کے استعمال سے بچے کے دانت پیلے یا بھورے رنگ کے ہو جاتے ہیں۔	• احتیاط سے ڈاکٹر کی نگرانی میں ہی استعمال کرانا چاہیے۔
• ارائی تھرومامی سین کے مرکبات مثلاً ارائی ٹر- آل تھروسن، رتھ مائی سین، تھرومامی سین وغیرہ۔	• یہ مرکبات بھی حاملہ کے لئے پورے طور پر محفوظ نہیں پائے گئے۔	• ان کے استعمال میں بھی احتیاط رکھنی چاہیے۔



نام دوا	حاملہ پر اثرات	احتیاطی تدابیر
• جنٹا مائی سین کے مرکبات، مثلاً جیرامائی سین۔ جنٹی سین وغیرہ	• یہ بھی دوران حمل مضرت سے خالی نہیں۔	• احتیاط سے استعمال کرائیں
نیو مائی سین کے مرکبات، مثلاً، سلواکول۔ ڈاپیک وغیرہ	دوران حمل اس کا استعمال مضرت سے خالی نہیں۔	احتیاط سے استعمال کریں
پینی سیلین کے مرکبات، مثلاً پیمنڈ۔ کرسٹاپین۔ فٹو سین وغیرہ	اس گروپ کی دواؤں کے دوران حمل بے ضرر ہونے کی تحقیق نہیں ہوئی۔	احتیاط سے استعمال کریں۔
ریفامپین سین کے مرکبات، مثلاً رمپن۔ نبرن۔ لپوسن وغیرہ۔	جنین کی ساخت میں خرابی ہونے کا امکان ہے۔	بہت احتیاط اور شدید ضرورت کے تحت ہی استعمال کریں اور دوا کے اثرات پر دھیان رکھیں۔
اسٹریپٹو مائی سین کے مرکبات مثلاً اسٹریپٹو نیلیس کومائی سین۔ اینیسٹرین وغیرہ	بچے میں بہرہ پن پیدا ہو سکتا ہے۔	ڈاکٹر کی نگرانی میں کافی احتیاط سے استعمال کرائیں۔
نٹراسائیڈ کلین کے مرکبات، مثلاً نیرامائی سین ہوشناسائی کمین۔ ایڈر مائی سین۔ رسٹیکلین۔ ال سائیڈکلین نیرامائی سین وغیرہ۔	دوران حمل ان ادویہ کے استعمال سے بچے کے نکلنے والے دانت مستقل طور سے پیلے، بھدے اور بدرنگ ہو جاتے ہیں اور نمو پذیر ہڈیوں	اس لئے ان مرکبات کا استعمال انتہائی ہوشیاری سے اور ڈاکٹر کی نگرانی میں ہی کرانا چاہئے۔ آنکھ بند کر کے اندھا دھند استعمال مناسب نہیں۔



نام دوا	حاملہ پر اثرات	احتیاطی تدابیر
	<p>میں زہریلے اثرات سرایت کر جاتے ہیں خاص طور سے جب کہ حمل کے آخری نصف ایام میں استعمال کرایا جائے۔</p>	
<p>دافع درد وورم (NSAID) مثلاً اسپرین فینائل بوتازون امیڈوپائی رین انڈومیتھاسین اسکی فن بوتازون سیلی سیلامینڈ ابو پروفن الوپری نال وغیرہ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspirin</li> <li>• Ibuprofen, Naproxen, Fenoprofen,</li> <li>• Oxyphenbutazone</li> <li>• Metamizol:</li> <li>• Propyphenazone</li> <li>• Indomethacin</li> <li>• Auranofin</li> <li>• Phenacetin</li> <li>• Nefopam</li> <li>• Carbamazepine</li> <li>• Ketorolac</li> <li>• Mephenamic</li> <li>• Piroxicam</li> <li>• Piroxicam-</li> <li>• Tenoxicam</li> <li>• Meloxicam</li> <li>• Diclofenac Sodium</li> <li>• Diclofenac Potassium</li> <li>• Nimesulide</li> <li>• Nimesulide</li> <li>• Sulphasalazine</li> </ul>	<p>اسپرین کا استعمال حمل کی حالت میں خطرے سے خالی نہیں زیادہ مقدار میں دینے سے جریان خون کا اندیشہ رہتا ہے۔ اور نوزائیدہ بچہ قان کا خطرہ ہوتا ہے۔ امیڈوپائیرین کے استعمال سے جنین میں خون کے سفید ذرات کی شدید کمی ہو جاتی ہے، فینائل بوتازون سے رحم مادر میں زہریلے اثرات مرتب ہوتے ہیں دودھ کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، سیلی سلامینڈ۔ انڈومیتھاسین کے مرکبات کا استعمال حالت حمل میں خطرناک ہے۔</p>	<p>اسپرین کی معمولی مقدار احتیاط سے دی جاسکتی ہے، لیکن زیادہ مقدار اور عرصہ تک اس کا استعمال مناسب نہیں۔ امیڈوپائیرین، فینائل بوتازون، آکسی فن بوتازون سیلی سیلامینڈ، وغیرہ شدید ضرورت کے وقت ڈاکٹر کی نگرانی میں احتیاط سے استعمال کرائی جاسکتی ہے، مگر ابو پروفن اور انڈومیتھاسون کے مرکبات حاملہ کو ہرگز استعمال نہ کرائیں کیونکہ ان کے زہریلے اثرات چھاتیوں میں جمع ہو جاتے ہیں</p>







نام دوا	حاملہ پر اثرات	احتیاطی تدابیر
<p>مسکن اعصاب۔ قے۔ متلی۔          اُبکائی۔ چکر دور کرنیوالی          ادویات مثلاً لار جیکٹیل۔          سیری نمیس۔ اسٹیٹے ٹل سی          کوئل۔ کازائم وغیرہ</p> <p><b>Anti emetics</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prochlorperazine</li> <li>• Metoclopramide</li> <li>• Promethazine</li> <li>• Trifluoperazine</li> <li>• Trifluopromazine</li> <li>• Mecizine</li> <li>• Doxylamin with VitB6</li> <li>• Betahistine</li> </ul>	<p>چوہوں پر لار جیکٹیل کے          تجربات سے پتہ چلا ہے کہ یہ          جنین پر زہریلے اثرات          مرتب کرنے کے ساتھ          ساتھ مہلک صلاحیت رکھتی          ہے۔ نوزائیدہ میں امکانی طور          پر یرقان کا اندیشہ ہوتا ہے۔          لار جیکٹیل لمبے عرصے تک          زیادہ مقدار میں استعمال          کرنے سے بچے کی مینائی          جانے کا خطرہ رہتا ہے یہی          حال تمام مسکن اعصاب          دواؤں کا ہے۔</p>	<p>ابنذا اس قسم کی دواؤں کو          جہاں تک ممکن ہو حالت          حمل میں ہرگز نہ دیں اور اگر          شدید ضرورت پڑی جائے تو          کم سے کم مقدار میں استعمال          کرائیں تاکہ نقصان پہنچنے کا          کم سے کم امکان رہے۔</p>
<p>مسکن اور منوم ادویات، مثلاً          بچرؤئی تال، نمبو تال لومی تال،          شار تال</p> <p><b>Sedatives</b>  <b>Hypnotics</b></p>	<p>ادویات حالت حمل میں خطرے          سے خالی نہیں ولادت کے          وقت اس کے استعمال سے          جنین کے تنفس کے کمزور          ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ          دوائیں ماں کے دودھ میں          شامل ہو جاتی ہیں۔</p>	<p>حالت حمل اور ولادت کے          وقت یہ دوائیں استعمال نہ          کریں دودھ پلانے والی          عورتوں کو استعمال نہیں کرنا          چاہیئے کیونکہ یہ دودھ میں          شامل ہو جاتی ہیں۔</p>



نام دوا	حاملہ پر اثرات	احتیاطی تدابیر
کلورو کوئن رسوچین، نوا کوئن میلو برن وغیرہ <b>ANTIMALARIALS</b> • Sulfonamide • Sulfadoxine 500 mg + Pyrimethamine • Chloroquine • Mefloquine • Quinine Sulphate	حمل کی حالت میں اس سے بچے کو بہرہ پن کا خطرہ اور دیگر خلقی بد وضعی کا اندیشہ ہے، حمل کے ابتدائی ایام میں اسقاط کا خطرہ ہے۔	اسی لئے حالت حمل میں کلورو کوئن خطرے سے خالی نہیں حتی الامکان اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔
پرائی ما کوئن • Primaquine	حالت حمل میں اس کا استعمال نوزائیدہ کو یرقان یا خون کے اجزا متفرق ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔	لہذا اس کو حالت حمل میں کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔
آئی سو نیس آئی سو کن وغیرہ	حالت حمل میں اس کے مخالف اثرات پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔	اس کا استعمال حالت حمل میں خاص طور سے آخری تین ماہ سے قبل استعمال کرنا مناسب نہیں۔
ای تھمبوٹال، تھمبوٹال وغیرہ Ethambutol Combunex <sup>2</sup> Combutoi Inambutol Forte <sup>2</sup> Myambutol Mycobutol Myconex 600 <sup>2</sup>	اس کے استعمال سے بچے میں خلقی بد وضعی پیدا ہونے کا خطرہ ہے	انتہائی شدید ضرورت کے بغیر اس کو حالت حمل میں استعمال نہ کریں۔
میٹری ناڈا یازول فلی جل، میٹرو جل ار شو جل وغیرہ Metronidazole Entamizole <sup>2</sup> Entrozyme-M Susp. <sup>2</sup> Flagyl Flagyl-F <sup>2</sup> Inseptin-MF <sup>2</sup> Kaltin MF <sup>2</sup> Metrogyl/Gel/F <sup>2</sup> Microneg <sup>2</sup> Monizole Negadix-M <sup>2</sup> Ougyl <sup>2</sup> Unimezol	حالت حمل میں اس کا استعمال جنین کی بد وضعی کے خطرے سے خالی نہیں اور اس دوا کے استعمال سے کینسر کے خفیف اثرات بھی ملے ہیں۔	اس کا استعمال حالت حمل میں خاص کر ابتدائی ۳ ماہ میں ہرگز نہ کریں ایام رضاعت میں بھی یہ خطرہ سے خالی نہیں۔ نرائی کو مونس کی سرایت میں بھی اس کا استعمال نقصان دہ ہے۔



نام دوا	حاملہ پر اثرات	احتیاطی تدابیر
<p>زنانہ مردانہ جنسی ہارمون کے مرکبات، مثلاً نارسٹرین۔ مانع حمل گولیاں۔ کلی نسرول اور اسائیکلین۔ سیکروڈائل پرولونان۔ ٹشو-سٹرون ڈیکا ڈیورا بولین۔ پرائی مولٹ ایکویران وغیرہ۔</p> <p>•Oestrogen •Estradiol •Ethinylestradiol- •Norethisterone Enantate •Tibolone •Progestins •Norethindrone Acetate •Dydrogesterone •Hydroxyprogesterone •Lynestrenol •Testosterone •Mesterolone •Danazol •Allyloestrenol</p>	<p>حمل کی حالت میں مانع حمل گولیاں جنین میں خلقتی بد وضعی پیدا کر سکتی ہیں، کلی نسرول کے حاملہ کو استعمال سے جنین میں لڑکی ہے تو اس پر مردانہ خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں، ایکو اوران، ٹشووران ڈیکا ڈیورا بولین وغیرہ بھی انہی خصوصیات کی حامل ہیں ایکو اورین چھاتیوں میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ اس کو دودھ پلانے والی عورتوں کو کبھی استعمال نہ کریں۔</p>	<p>تمام قسم کی جنسی ہارمون کو حالت حمل میں کبھی استعمال نہیں کرانا چاہیے خاص طور سے مردانہ جنسی ہارمون مثلاً۔ ٹشو-سٹران، ایکو اوران تو کسی بھی حالت میں حاملہ کو ہرگز ہرگز نہ دیں۔</p>
<p>ای تھو نامائینڈ مثلاً ری جن سڈ۔ ٹریس کاٹائل وغیرہ۔</p>	<p>اس کے استعمال سے جنین کے اندر خلقتی بد وضعیاں پیدا ہو جاتی ہیں خاص طور سے اگر اس کو ابتدائی حمل کے ۳ ماہ میں استعمال کر یا جائے۔</p>	<p>اس دوا کو دوران حمل استعمال کرنے سے حتیٰ الامکان پرہیز کریں۔</p>
<p>ڈاکٹری کی زیر نگرانی احتیاط کے ساتھ ہی حمل کے دوران استعمال کر سکتے ہیں۔</p>	<p>دوران حمل یا دودھ پلانے کے زمانے میں اس دوا کا استعمال غیر محفوظ ہے۔</p>	<p>ڈاکٹری کی زیر نگرانی احتیاط کے ساتھ ہی حمل کے دوران استعمال کر سکتے ہیں۔</p>



بھرا زین، انٹی پار ہیل ماسڈ وغیرہ	اس کا استعمال لیام حمل میں معصرت سے خالی نہیں۔	ضرورت پڑنے پر احتیاط سے استعمال کرائیں۔
پائی ری میچھامن ڈیرا پر م (لمبریا سے حفاظت کے لئے)	دوران حمل اس کا استعمال جنین میں خلقی بد وضعی پیدا کر سکتا ہے۔	انتہائی شدید ضرورت پر ہی اس دوا کو دوران حمل استعمال کرائیں اور وہ بھی ڈاکٹر کی زیر نگرانی۔
فیورازولیدین کے مرکبات مثلاً، فیوروکسون لوموفین وغیرہ	حالت حمل میں اور لیام رضاعت میں اس کا استعمال معصرت سے خالی نہیں۔	ضرورت شدیدہ پر ڈاکٹر کی زیر نگرانی اس کو استعمال کریں
سلفا گروپ کی ادویہ مثلاً سلفا ڈی زین میڈری لون وغیرہ	سلفا گروپ جنین کے خون میں تیزی سے پہنچ کر گردش کرنے لگتے ہیں اس لئے زہریلے اثرات پیدا ہونے کا خطرہ ہے	بہت احتیاط سے اور ضرورت شدیدہ پر ہی استعمال کریں۔
بھرا زین، انٹی پار ہیل ماسڈ وغیرہ	اس کا استعمال لیام حمل میں معصرت سے خالی نہیں۔	ضرورت پڑنے پر احتیاط سے استعمال کرائیں۔
پائی ری میچھامن ڈیرا پر م (لمبریا سے حفاظت کے لئے)	دوران حمل اس کا استعمال جنین میں خلقی بد وضعی پیدا کر سکتا ہے۔	انتہائی شدید ضرورت پر ہی اس دوا کو دوران حمل استعمال کرائیں اور وہ بھی ڈاکٹر کی زیر نگرانی۔
فیورازولیدین کے مرکبات مثلاً، فیوروکسون لوموفین وغیرہ	حالت حمل میں اور لیام رضاعت میں اس کا استعمال معصرت سے خالی نہیں۔	ضرورت شدیدہ پر ڈاکٹر کی زیر نگرانی اس کو استعمال کریں۔



<p>بہت احتیاط سے اور ضرورت شدید پر ہی استعمال کریں۔</p>	<p>سلفا گروپ جنین کے خون میں تیزی سے پہنچ کر گردش کرنے لگتے ہیں اس لئے زہریلے اثرات پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔</p>	<p>سلفا گروپ کی ادویہ مثلاً ایلکوسن۔ میڈری بون وغیرہ</p>
<p>احتیاط سے استعمال کرائیں۔</p>	<p>حالت حمل میں یہ ادویہ بچے میں خلقی بد وضعی پیدا کر سکتی ہے۔</p>	<p>ٹراموکسازول، میتھاپرم کے مرکبات مثلاً سپران، بیسی ٹرم سائی نسپائیٹ وغیرہ۔</p>
<p>ان دواؤں کے ایام حمل میں استعمال سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیئے۔ اگر ضرورت پڑی جائے تو بہت احتیاط سے اور کم سے کم مقدار میں</p>	<p>کارٹی سون کے دوران حمل استعمال سے ہونے والے بچے کے تالو میں دراڑیں</p>	<p>کارٹی کو سٹرائیڈ مثلاً کارلن بائی ڈرہ کارٹی سون۔</p>
<p>استعمال کرائیں تاکہ نقصان کا امکان کم سے کم رہے۔</p>	<p>پڑ جاتی ہیں ہونٹ پھٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح پریڈنی سولون کے استعمال سے بچہ پیٹ میں مردہ ہو جانے اور جنین کے جسمانی اور ذہنی طور پر معذور ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ جو عورتیں دوران حمل پریڈنی سولون یا کینا کارٹ وغیرہ استعمال کرتی رہی ہوں ان کو تھائی رائیڈ ہارمون کی شدید</p>	<p>پریڈنی سولون ٹرائم سی لون بیٹا میتھاسون۔ ڈیگامیتھاسون وغیرہ</p>



	<p>کمی ہو جاتی ہے۔</p> <p>بنا میتھا سون، اور ڈیکسامیٹھا</p> <p>سون بھی ان ایام میں مضرت</p> <p>سے خالی نہیں۔</p>	
<p>دوران حمل خاص طور سے</p> <p>ابتدائی ۳ ماہ میں ڈایا موکس</p> <p>جیسی پیشاب آور ادویہ بالکل</p> <p>نہ دیں۔</p> <p>لاکس سے بھی پرہیز کریں</p> <p>باقی دوائیں بھی شدید</p> <p>ضرورت پر ڈاکٹر کی نگرانی</p> <p>میں کم مقدار میں استعمال</p> <p>کرائیں، اگر دودھ پلانے والی</p> <p>ماں بائی تھانان اور کینا کو مہ</p> <p>میں سے کوئی دوا استعمال</p> <p>کر رہی ہو تو بچے کو دودھ پلانا</p> <p>بند کر دے، کیونکہ یہ دونوں</p> <p>دوائیں دودھ میں تحلیل</p> <p>ہونے کی صلاحیت رکھتی</p> <p>ہے۔</p>	<p>دوران حمل ڈایا موکس کے</p> <p>استعمال سے جنین میں خللی</p> <p>بدو ضعی کے علاوہ جنین کی</p> <p>موت کا بھی خطرہ رہتا ہے۔</p> <p>یہی حال لاکس اور</p> <p>الڈکٹون کا بھی ہے بائی</p> <p>تھانان استعمال سے نوزائیدہ</p> <p>بچے میں یرقان اور خون کے</p> <p>ذرات میں شدید کمی کا خطرہ</p> <p>رہتا ہے یہی خطرہ کینا کا مہ</p> <p>میں بھی ہے یہ دونوں ماں</p> <p>کی چھاتیوں میں موجود دودھ</p> <p>میں شامل ہو جاتی ہے۔</p>	<p>مدرات بول (ڈایورٹک)</p> <p>ادویہ، مثلاً ڈایا موکس لاکس</p> <p>بائی تھانان ال ڈکٹون کینا</p> <p>و مہ ائی تھاکرین وغیرہ</p> <p><b>DIURETICS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Frusemide</li> <li>•Spironolactone</li> <li>•Triamterene</li> <li>•Hydrochlorothiazide</li> <li>•Clopamide</li> <li>•Chlorthalidone</li> <li>•Acetazolamide</li> <li>•Xipamide</li> </ul>



## کئی دوائیں ایک ساتھ استعمال کرنے کے نتائج

آج کل اکثر ڈاکٹر عموماً اپنے نسخوں میں کئی دوائیں ایک ساتھ تجویز کر دیتے ہیں۔ متعدد دوائیں ملا کر دینے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرض پر جلد قابو پا لیا جائے دوا کے بد اثرات کو دور کیا جائے اور دوا کو زیادہ مؤثر بنا کر مریض کی صحت بحال کی جائے، لیکن یہ افسوسناک حقیقت بھی ہے کہ اس طرح کئی دوائیں ایک ساتھ دینے سے جہاں اس کے مفید نتائج برآمد ہوتے ہیں وہاں بعض اوقات اس کے برعکس اور مضر اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں اور بجائے فائدے کے نقصان پہنچتا ہے۔ ایک معالج کے لئے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ دواؤں کے باہمی ربط اور ان سے پیدا ہونے والے اثرات سے واقف ہو۔ بد قسمتی سے اس طرف کم توجہ دی گئی ہے حالیہ چند برسوں میں یورپی ممالک میں اس پر تحقیق ہوئی اور اب اس کے نتائج ہندوستان میں بھی شائع ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک شاید اردو زبان میں دواؤں کے باہمی ربط کے بارے میں کوئی معلومات شائع نہیں ہو سکی۔ ہم نے انگریزی لٹریچر کی مدد سے یہ معلومات فراہم کر کے اردو ادا حضرات تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ دواؤں کے باہمی ربط اور اس کے اثرات کی ااحسی صرف ڈاکٹروں تک ہی محدود نہیں۔ بلکہ دوا ساز کمپنیاں جو دواؤں کی ریسرچ پر کافی روپیہ صرف کرتی ہیں ایسی دوائیں باہم ملا کر مارکیٹ میں پیش کرتی ہیں جن سے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا مثلاً ٹیرامائی سین اور وٹامن سی کے ملانے سے ٹیرامائی سین کا اخراج گردوں کے ذریعہ تیزی سے ہونے لگتا ہے اور اس کا مانع جراثیم اور دافع ورم اثر بہت جلد ختم ہو جاتا ہے اس طرح اس سے مطلوبہ فوائد پوری طرح حاصل نہیں ہوتے اسی طرح کی بہت سی مثالیں آگے پیش کی جا رہی ہیں ہمیں امید ہے کہ یہ مضمون ڈاکٹروں کے لئے بہت مفید اور نتیجہ خیز ثابت ہو گا۔



## کئی دواؤں کو ایک ساتھ دینے کے اثرات

کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟	اگر یہ دوائیں دی گئیں	مندرجہ ذیل ادویہ کسما تھ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• سلفوٹامائیڈ کا اثر ختم ہو جاتا ہے اس لئے ان کے ساتھ دافع تیزابیت دوائیں نہیں دینا چاہئے۔</li> <li>• ذیابیطیس دور کرنے والی دواؤں کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دافع تیزابیت دوائیں مثلاً۔ جیلوسل۔</li> <li>• الکارب۔ ڈائی جین دینے پر۔</li> <li>• ذیابیطیس دور کرنے والی ادویات مثلاً۔ ڈایا بے نیز۔ ٹالہوٹامائیڈ وغیرہ کھلانے پر۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سلفوٹامائیڈ مثلاً الکوسن (سیپالینڈر کائن (سائی ٹائڈ) تھا ازول، سلفاڈایازین سلفاڈیمی ڈین وغیرہ کے ساتھ۔</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ہینسی لین کا اثر ختم ہو جاتا ہے اس لئے ہینسی لین کے ساتھ دافع تیزابیت Antacid نہیں دینا چاہئے۔</li> <li>• ہینسی لین کا اثر ختم ہو جاتا ہے</li> <li>• ٹراسائیڈ کلین کی وجہ سے ہینسی لین کا اثر کم ہو جاتا ہے۔</li> <li>• لہذا ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں دینا چاہئے۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دافع تیزابیت جیلوسل، ڈائی جین وغیرہ دینے پر۔</li> <li>• کلوروم فینی کال دینے پر</li> <li>• ٹراسائیڈ کلین دینے پر۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ہینسی لین جی۔ پوڈ</li> <li>• گرسٹاپین۔ بسٹر پن ڈائی کرشا سین، کبائی ٹک وغیرہ کے ساتھ۔</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• اموکسی سیلین کا اثر ختم ہو جاتا ہے لہذا اس کے ساتھ دافع تیزابیت نہیں دینا چاہئے</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دافع تیزابیت مثلاً جیلوسل۔</li> <li>• ڈائی جین وغیرہ دینے پر۔</li> <li>• ارائی تھرومائی سین دینے پر</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ایموکسی سیلین مثلاً سائی موکس (سارابھائی) لاموکسی (ایکاکا) ایموکسی ایم کے ساتھ</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• ایسوسی سیلین کا اثر تیز ہو جاتا ہے۔</li> <li>• ایسوسی سیلین کا اثر کم ہو جاتا ہے۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نثر اسائیکلین دینے پر</li> </ul>	<p>Amoxycillin Amclo Amoxil Amoxivan Augmentin Bicidal Plus Biomox Carbomox Comoxyl Damoxy Dicimox Flemoxin Hipen Hipenox Idimox</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ایسوسی سیلین کا اثر کم ہو جاتا ہے اس لئے ان کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔</li> <li>• ایسوسی سیلین کا اثر کم ہو جاتا ہے۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دافع تیزابیت جیلوسی۔ ڈائی جین وغیرہ دینے پر۔</li> <li>• کلورومفینی کال کے دینے پر۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ایسوسی سیلین مثلاً البر سیلین (البرٹ ڈیوڈ) کمکی سیلین (نید ۱۱) بروسل (I.D.P.L.) وغیرہ کے ساتھ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ہینسی لین کا اثر گھٹ جاتا ہے۔</li> <li>• سانس کی رفتار سست اور نظام مصبی متاثر ہوتا ہے۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ہینسی لین استعمال کرنے پر</li> <li>• عضلات کو ڈھیلا کرنے والی دوائیں مثلاً مایانے سین۔ پیرافون وغیرہ دینے پر۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نیومائی سین کے مرکبات مثلاً انٹرومیک (میک ڈیماپیک) وغیرہ کے ساتھ۔</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• خون کی انجمادی کیفیت دور کرنے کا عمل رک جاتا ہے۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• انجماد خون کو روکنے والی ادویہ مثلاً یونی وارفین وغیرہ دینے پر</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• پریڈنی سولن کے مرکبات بے سولون ڈیلنا کارٹرل وغیرہ کے ساتھ۔</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ان ادویہ کا جسم میں تحلیل ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور ان کا اثر جلد ختم ہو جاتا ہے۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• انٹی ہشامین مثلاً فرزگان۔ فورسٹال وغیرہ دینے پر۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• چٹا میٹھا سون کے مرکبات مثلاً جینی ان (گلیکسو) چٹا کارٹرل (فزیو) وغیرہ کے ساتھ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ڈیکسامیٹھا سون کا عمل رک جاتا ہے۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دافع۔ ٹی۔ بی ادویات مثلاً۔ آئی سوئیکس۔ پاس یونی تھائی مین وغیرہ دینے پر۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ڈیکسامیٹھا سون کے مرکبات، مثلاً ڈیکازون (MSD) کلی کارٹن (سیبا) آئی</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• معدہ آنتوں میں زخم بننے کا اندیشہ رہتا ہے۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اسپرین۔ اے پی۔ سی کوڈوپائی رین وغیرہ دینے پر</li> </ul>	بی زون وغیرہ کے ساتھ۔
<ul style="list-style-type: none"> <li>• کارٹی سون کے جسم سے تحلیل ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور وہ جلد اپنا اثر ختم کر دیتے ہیں۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• فینوباربیٹون کے مرکبات مثلاً گارڈینال وغیرہ استعمال کرنے پر۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• کارٹی سون۔</li> <li>• اے۔ سی۔ ٹی۔ ایچ وغیرہ کے ساتھ۔</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ہائیڈروکارٹی سون کے مرکبات کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔</li> <li>• ہائیڈروکارٹی سون کا اثر بڑھ جاتا ہے۔</li> <li>• پوٹاشیم کا اخراج بڑھ جاتا ہے۔ لہذا پوٹاشیم دینا چاہیئے۔</li> <li>• انسولین کا شکر گھٹانے کا عمل رک جاتا ہے۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دافع مرگی ادویات مثلاً اے پی لان۔ ڈائی لن ٹین ایپ سولین وغیرہ دینے پر۔</li> <li>• اسٹروجن کے مرکبات دینے پر۔</li> <li>• فروسی مائیڈ۔ لاسکس وغیرہ دینے پر۔</li> <li>• انسولین دینے پر۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ہائیڈروکارٹی سون کے مرکبات کے ساتھ۔</li> <li>• Hydrocortisone</li> <li>• Allocort</li> <li>• Wycort</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• سانس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے لہذا ان دونوں کو ایک ساتھ استعمال نہ کریں۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• جسم کو ڈھیلا کرنے والی ادویات مثلاً ملیانا سین، پرافون وغیرہ دینے پر۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• جنٹامائی سین مثلاً جیرامائی سین (فل فورڈ) جیٹی سائن (کو اس) وغیرہ کے ساتھ۔</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• نٹراسایکلکین کی قوت ختم ہو جاتی ہے لہذا اس کے ساتھ انٹاسڈ دافع تیزابیت دینے سے پرہیز کرنا چاہیئے۔</li> <li>• نٹراسایکلکین کے اثر سے</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دافع تیزابیت مثلاً جیلوسل، ڈائی جین وغیرہ دینے پر۔</li> <li>• ہینسی لین کے مرکبات</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• نٹراسائی کلکین مثلاً ریسیٹی کلکین (سارابھائی) ٹیرامائی سین (فزر) (لیڈرمائی سین) (وکارٹ) اوئی سم (I.D.P.L) وغیرہ کے ساتھ۔</li> </ul>



<p>ہینسی لین بے اثر ہو جاتی ہے۔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• فولاد کے مرکبات مثلاً</li> <li>• فلوئورون، ٹونافیرون وغیرہ دینے پر</li> <li>• وٹامن سی۔ سی لن۔</li> <li>• ریڈاکسن۔ کسی وغیرہ دینے پر</li> </ul> <p>ایک ساتھ نہیں دینا چاہئے۔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• نٹراسائیکلین جسم سے جلد خارج ہو جاتی ہے اس کا پورا فائدہ نہیں ہوتا۔</li> </ul>	<p>دینے پر۔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• فولاد کے مرکبات مثلاً</li> <li>• فلوئورون، ٹونافیرون وغیرہ دینے پر</li> <li>• وٹامن سی۔ سی لن۔</li> <li>• ریڈاکسن۔ کسی وغیرہ دینے پر</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tetracycline</li> <li>• Achromycin</li> <li>• Dicyclan</li> <li>• Hostacycline-500</li> <li>• Idilin</li> <li>• Resteclin</li> <li>• Subamycin preps.</li> <li>• Threocycline</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ہینسی لین کا جراثیم کش اثر بہت کم ہوتا ہے۔</li> <li>• ڈاکسی سائیکلین کی جراثیم کش تاثیر ختم ہو جاتی ہے</li> <li>• ڈاکسی سائیکلین کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔</li> <li>• ڈاکسی سائیکلین کے جراثیم کش تاثیر کم ہو جاتی ہے۔</li> <li>• اینٹی کاولیٹ کی تاثیر بڑھ جاتی ہے اور خون دیر میں جمتا ہے۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ہینسی لین کے مرکبات اس کے استعمال کرنے پر۔</li> <li>• دافع تیزابیت جیلوسل ڈائی جن وغیرہ دینے پر۔</li> <li>• سوڈائی کارب دینے پر</li> <li>• فولاد کے مرکبات دینے پر</li> <li>• خون جمنے کی صلاحیت کم کرنے والی دوائیں۔</li> <li>• (ANTICOAGULANT)</li> <li>• مثلاً ڈنڈی وان بذریعہ دہن دینے پر۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ڈاکسی سائیکلین مثلاً وی</li> <li>• دو سائیکلین لائی ڈوکس (لایکا)</li> <li>• ڈیور سائیکلین (یونیکم) لا۔</li> <li>• (بی۔ بی۔ نی) نٹراڈاکس، (رین</li> <li>• بخشی) وغیرہ کے ساتھ۔</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doxycycline</li> <li>• Biodox</li> <li>• Doxy-1</li> <li>• Doxypal-DR</li> <li>• Duracyclin</li> <li>• Lydax</li> <li>• Vibazine DT</li> <li>• Vivocycline</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ہینسی لین کا اثر ختم ہو جاتا ہے</li> <li>• دافع مرگی ادویات کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا ان کے ساتھ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ہینسی لین کے مرکبات دینے پر۔</li> <li>• دافع مرگی ادویات مثلاً ڈائی لینٹن (پی۔ ڈی) اپی لپ ٹن</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• کلورم فینی کال مثلاً رک لور</li> <li>• (سارا بھائی) کیٹی لان (ہلکسٹ)</li> <li>• پر آسان (نال) کلورومائی سین</li> <li>• (پی ڈی) وغیرہ کے ساتھ۔</li> </ul>



<p>ایپ ٹون (بوس) وغیرہ دینے پر۔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• دافع ذیابیطس دوائیں ساتھ دینے پر۔</li> <li>• اینٹی کالکولیٹ مثلاً</li> </ul> <p>ANTICOAGULANT یونی وارفین۔ اور ہپارن دینے پر۔</p>	<p>کلوروم فینی کال کے مرکبات استعمال نہیں کرنا چاہیے۔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ذیابیطس کو دور کرنے والی دواؤں کا اثر تیز ہو جاتا ہے</li> <li>• کلوروم فینی کال کے اثر سے خون کو جمانے کی تاثیر کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• خون کو جمنے کی صلاحیت کم کرنے والی دوائیں دینے پر۔</li> <li>• باربی ٹون۔ گارڈینال وغیرہ دینے پر۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• خون کو جمنے کی صلاحیت کم کرنے والی دوائیں دینے پر۔</li> <li>• باربی ٹون۔ گارڈینال وغیرہ دینے پر۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• گرائی سوفلوین مثلاً گرائی سووین (گلیکسو)</li> <li>• آئی ڈی فلوین (I.D.P.L.) وغیرہ کے ساتھ۔</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• انڈومیتھاسون کا دافع درد ورم اثر ختم ہو جاتا ہے لہذا دونوں کو ایک ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔</li> <li>• پاس (PAS) کے زہریلے اثرات بڑھ جاتے ہیں لہذا ان دونوں کو ایک ساتھ کبھی استعمال نہ کریں۔</li> <li>• معدہ میں زخم بننے اور معدہ سے خون آنے کا خطرہ بڑھ جاتا</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• انڈومیتھاسون کے مرکبات مثلاً انڈوسڈ (MSD) آئی ڈی سن (I.D.P.L.) استعمال کرنے پر۔</li> <li>• پاس (P.A.S.) کے مرکبات مثلاً پاسونیکس کبونیکیس وغیرہ استعمال کرنے پر۔</li> <li>• کارٹی سون کے مرکبات مثلاً پریڈنی سولون۔ دے سولون</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ایسپرین اور اس کے مرکبات مثلاً ڈسپرین ایسپر و۔</li> <li>• اتاسین کوڈوپائی رین۔ مائیکروپائی رین۔ اے پی ڈین (I.D.P.L.)</li> <li>• اے۔ پی۔ سی وغیرہ کے ساتھ۔</li> </ul>



<p>ہے لہذا ان دونوں کو ساتھ نہ ملائیں۔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• معدہ اور آنتوں سے جریان کا خطرہ رہتا ہے لہذا ان دونوں کو ایک ساتھ نہ دیں</li> <li>• خون میں شکر کی مقدار ایک دم گھٹ جاتی ہے۔</li> <li>• اسپرین کا اخراج پیشاب کے راستے جلد ہو کر اثر کم ہو جاتا ہے۔</li> </ul>	<p>وغیرہ دینے پر</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• خون کو جمنے سے روکنے والی ادویات (Anticoagulant) مثلاً ہپارین وغیرہ دینے پر</li> <li>• دافع ذیابیطس دوائیں دینے پر۔</li> <li>• پیشاب کو کھاری بنانے والی دوائیں الکلائزر مثلاً سوڈا ہائی کارب وغیرہ دینے پر۔</li> </ul>	<p>• " " " "</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• بند پریش کم ہو جاتا ہے اور آئی بوپروفین کے درد، ورم دور کرنے کے اثرات کم ہو جاتے ہیں۔</li> <li>• معدہ میں زخم بننے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔</li> <li>• ٹرائیکولائی زر کی قوت تاثیر بڑھ جاتی ہے۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اسپرین کے مرکبات دینے پر</li> <li>• کارنی سون کے مرکبات پر یڈنی سولون دینے پر۔</li> <li>• ٹرائیکولائی زر۔ مثلاً کالپوز وغیرہ دینے پر۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ابو پروفین کے مرکبات مثلاً بروفین (بونس) کیٹوپروفین (M.B.) ابو جے سک (سپلا) وغیرہ کے ساتھ۔</li> </ul> <p>Ibuprofen Acta Gel Alfam 400 Anafam Brufen Combiflam Duoiflam Emiflam 200/400 Ibu-Proxyvon Ibucilin Ibuprofen-P Ibuprofen-M</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• باربی ٹون کے مسکن اثرات خطرناک حد تک بڑھ جاتے ہیں۔</li> <li>• خون کو جمانے والی صلاحیت کم کرنے والی تاثیر ختم ہو جاتی ہے</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• باربی ٹون گارڈی ٹال وغیرہ دینے پر۔</li> <li>• خون کے جم جانے کی صلاحیت کم کرنے والی ادویہ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• انٹی ہشامین ادویہ مثلاً۔</li> <li>• بناڈرل (P.D.)</li> <li>• اے ول (ہیپسٹ)</li> <li>• پیڈائن (گلایسو)</li> </ul>



<p>• گرائی سو فلوین کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور وہ فٹکس پر اثر نہیں کرتیں۔</p> <p>• مرگی کے دورے روکنے کا اثر ان ادویہ میں ختم ہو جاتا ہے۔</p> <p>• فینائل بوتازون کا دفاع درد ورم دفع گھٹیا اثر ختم ہو جاتا ہے۔</p> <p>• نظام عصبی کمزور ہو جاتا ہے لہذا ان دونوں کو ملا کر استعمال نہ کریں۔</p>	<p><b>Anti Coagulant</b> دینے پر۔</p> <p>• گرائی سو فلوین (بی پی) گرائی سووین (گلیکسو) وغیرہ دینے پر۔</p> <p>• دفع مرگی ادویات مثلاً ڈائی لن ٹین (P.D.) اور جیروئن (M.B.) وغیرہ دینے پر۔</p> <p>• فینائل بوتازون کے مرکبات مثلاً ارگپائی رین۔ بوتارین وغیرہ دینے پر۔</p> <p>• ٹرائکولائی زر مثلاً کالپوز وغیرہ دینے پر۔</p>	<p>پتھمی سان (M.B.)</p> <p>بشائن (B.W.)</p> <p>مارزین (")</p> <p>فور شال (سیا)</p> <p>کاشین (اتھنور)</p> <p>وغیرہ کے ساتھ۔</p> <p>• "</p> <p>• "</p>
<p>باربی ٹون کا اثر خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے لہذا ان دونوں کو نہ ملائیں۔</p> <p>• مارفین کا اثر بڑھ جاتا ہے لیکن فیورازولی ڈین کا جراثیم کش ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی دورے بھی پڑنے لگتے ہیں، لہذا ان دونوں کو نہ ملائیں۔</p> <p>• آئی سونیکس کے بد اثرات</p>	<p>• باربی ٹون - گارڈی نال دینے پر۔</p> <p>• فیورازولیڈین کے مرکبات مثلاً فیوروسون S.K.F. لوموفین (سیرلے) دینے پر۔</p> <p>• آئی سونیا زائیڈ کے مرکبات مثلاً آئی سونیکس۔ آئی سوکن وغیرہ دینے پر۔</p>	<p>مارفین کے مرکبات مثلاً مارفین۔</p> <p>پتھمی ڈین (M.B.) کلوروڈین وغیرہ کے ساتھ۔</p> <p>• "</p> <p><b>OPIOID ANALGESICS</b></p> <p>• Dextropropoxyphene</p> <p>• Pentazocine</p> <p>• Buprenorphine</p> <p>• Morphine Sulphate</p> <p>• Tramadol Hydrochloride</p>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• پیدا ہو جاتے ہیں۔</li> <li>• نظام عصبی میں خطرناک ضعف پیدا ہو جاتا ہے اس لئے افیون اور شراب کو ہرگز ایک ساتھ استعمال نہ کرائیں۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الکوحل۔ شراب دینے پر۔</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• فینائل بیوٹازون کا دافع ورم و درد اثر ختم ہو جاتا ہے۔</li> <li>• فینائل بیوٹازون کا ورم، درد و رکرنے کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔</li> <li>• خون میں دافع مرگی دواؤں کا اثر بڑھ جاتا ہے۔</li> <li>• جنسی ہارمون کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• انٹی ہشامین ادویات مثلاً بناڈرل (P.D.) ایتھی سان (M.B.) دینے پر۔</li> <li>• باربی ٹون۔ گارڈینال لوی نال وغیرہ دینے پر۔</li> <li>• دافع مرگی ادویہ، ذائقہ لین ٹین (P.D.) ایپ ٹون اپی لیپٹن I.D.P.L. دینے پر</li> <li>• ایسٹروجن پروجسٹرون کے مرکبات دینے پر</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• فینائل بیوٹازون کے مرکبات مثلاً اسکاپائی رین (S.G.) بیوٹارین (تھ مس) زولنڈین (گیگی) الجے سین۔ (المبک) تھلوپائی رین (یونیک) بی پی زولین (B.P.L.) ساتھ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• دافع درد ادویہ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔</li> <li>• ان اسٹرائیڈ کا جسم میں جذب ہونے کا عمل بڑھ جاتا ہے اور دافع ورم اثر ختم ہو جاتا ہے۔</li> <li>• مرکزی نظام عصبی (C.N.S.) میں خطرناک قسم کا ضعف پیدا</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• انا لجن، نووالجن وغیرہ دینے پر۔</li> <li>• کارٹی کوسٹرائیڈ مثلاً پروڈنی سولون۔</li> <li>• ڈیکسامیتھاسون، ڈیکازرون دینے پر۔</li> <li>• انٹی ہشامین ادویہ مثلاً</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• فینوباربی ٹون کے مرکبات مثلاً گارڈی نال (M.B.) پٹابارب (گیگی) سبالجن (اسیا) نمونال (ایبٹ) سوزگان (ایم۔ بی) وغیرہ کے ساتھ</li> </ul>



<p>ہو جاتا ہے۔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مانع حمل ادویہ جلد تحلیل ہو جاتی ہیں۔ اسی لئے ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔</li> <li>• ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔</li> <li>• ان کے ساتھ فینوباربیٹون بذریعہ انجکشن نہ دی جائے۔</li> <li>• باربیٹون کا مسکن اثر تیز ہو جاتا ہے۔</li> <li>• فینائل بیوٹازون کا دافع ورم و درد اثر ختم ہو جاتا ہے۔</li> <li>• باربیٹون کا مسکن اثر خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے۔</li> <li>• مرکزی نظام عصبی (CNS) انتہائی کمزور ہو جاتا ہے۔</li> </ul>	<p>ایول، بنڈرل، فورسٹال دینے پر۔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مانع حمل ادویہ مثلاً اوولین۔</li> <li>• اناولر پرانی موولر۔ وغیرہ دینے پر۔</li> <li>• دافع مرگی ادویات مثلاً ڈائی لن ٹین اپٹائن وغیرہ دینے پر۔</li> <li>• دافع ذیابیطس مثلاً ریسی نان۔ ذائل وغیرہ دینے پر۔</li> <li>• فینائل بیوٹازون کے مرکبات مثلاً اسکاپائی رین۔ بیوٹارین دینے پر۔</li> <li>• نشہ آور ادویہ مثلاً شراب۔ افیم۔ وغیرہ دینے پر۔</li> </ul>	<p><b>HYPNOTICS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barbiturates</li> <li>• Nitrazepam</li> <li>• Diazepam</li> <li>• Flurazepam</li> <li>• Triclofos</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• اسٹروئڈ جسم میں تیزی سے تحلیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس لئے ان کا اثر کم ہو جاتا ہے۔</li> <li>• ایسٹروجن۔ اسٹروئڈ کا اثر بڑھا دیتے ہیں۔</li> <li>• کارنی کو سٹروئڈ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اینٹی ہسٹامین مثلاً ایول فزگان وغیرہ کے دینے پر</li> <li>• ایسٹروجن مثلاً اووسایمکلین، کلی نسرول وغیرہ کے دینے پر۔</li> <li>• دافع مرگی ادویات مثلاً ڈائی لن ٹین۔ اپی لمپٹن دینے پر۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• کورٹی کو سٹروئڈ مثلاً پریڈنی سولون ڈیکسامیتھاسون۔</li> <li>• لائیڈروکارٹی سون (رسل) ہٹی سال (گلیکسو) کیناکارٹ (سارا بھائی) ایف کارلن وغیرہ کے ساتھ۔</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• اسٹرائیڈ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔</li> <li>• دافع ذیابیطس دواؤں کا اثر ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اسٹرائیڈ خون میں شکر کی مقدار بڑھا دیتے ہیں۔</li> <li>• پوٹاشیم کا اخراج بڑھ جاتا ہے اس لئے پوٹاشیم ساتھ میں دینا چاہیے۔</li> <li>• انڈومیتھاسین کے اثر سے اسٹرائیڈ کا اثر تیز ہو جاتا ہے۔</li> <li>• اعصابی شکایات اور شدید بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دافع ذیابیطس دوائیں دینے پر۔</li> <li>• فروسی مائیڈ کے مرکبات مثلاً لاسکس۔ ایسی ڈریکس سیلی نیکس دینے پر۔</li> <li>• انڈومیتھاسین کے مرکبات مثلاً۔ انڈوسڈ۔ آئی ڈی سین D.P.L. دینے پر۔</li> <li>• ویکسین دینے پر۔</li> </ul>	<p><b>CORTICOSTEROIDS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hydrocortisone Acetate</li> <li>• Dexamethasone</li> <li>• Betamethasone</li> <li>• Prednisolone</li> <li>• Triamcinolone</li> <li>• Hydrocortisone Sodium</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ڈیجی ٹیلیس کے زہریلے اثرات میں اضافہ ہو جاتا ہے پوٹاشیم کا اخراج شدت سے ہونے لگتا ہے۔</li> <li>• خون میں شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور دافع ذیابیطس دواؤں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔</li> <li>• کان کے اندر مکالیف مثلاً بہرہ پن۔ جھنجھلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ڈیجی ٹیلیس کے مرکبات مثلاً لے ناکس (B.W.) کا رڈاکسن (سینڈوز) دینے پر۔</li> <li>• دافع ذیابیطس ادویہ مثلاً ریسی نال۔ ڈائل دینے پر۔</li> <li>• اسٹروئیدی سین۔</li> <li>• جنٹامائی سین۔ کنامائی سین دینے پر۔</li> <li>• بلڈ پریشر کم کرنے والی</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ڈایورٹکس (مدارات) مثلاً "سلس (ہلچٹ) سیلی ٹکس (I.D.P.L.) ڈایورال (المبک) ایسی ڈریکس (اسیٹا) نیفرل (فزر) ڈائی ایڈس (سارابھائی) (مرسائل)۔ (بی۔ پی۔ ایل) ہر کردان (پی۔ ڈی) ہائی تھائین (کیٹی)</li> </ul>



<p>• دافع بلڈ پریشر دواؤں کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔</p> <p>• جسم سے پوٹاشیم کا اخراج زیادہ ہونے لگتا ہے اس لئے ان دونوں کو ساتھ نہ دیں۔</p> <p>• پیشاب میں تیزابیت پیدا کرنے والی ادویہ۔ مثلاً ایسوسیم کلورائیڈ وغیرہ دینے پر۔</p> <p>• پیشاب میں کھاری پن پیدا کرنے والی دواؤں مثلاً سوڈائی کارب الکا سول وغیرہ دینے پر۔</p>	<p>• دوائیں مثلاً الذومٹ وغیرہ دینے پر۔</p> <p>• کارٹی سون کے مرکبات مثلاً پریڈنی سولون۔ ڈیکاڈرون وغیرہ دینے پر۔</p> <p>• پیشاب میں تیزابیت پیدا کرنے والی ادویہ۔ مثلاً ایسوسیم کلورائیڈ وغیرہ دینے پر۔</p> <p>• پیشاب میں کھاری پن پیدا کرنے والی دواؤں مثلاً سوڈائی کارب الکا سول وغیرہ دینے پر۔</p>	<p>• دوائیں (لائڈیکا) والڈ کنون (سیرے) وغیرہ کے ساتھ</p>
<p>• ڈیجی ٹلیس کے زہریلے اثرات بڑھ جاتے ہیں اس لئے ان دونوں کو ساتھ نہ دیں۔</p> <p>• ڈیجی ٹلیس کے جسم میں تحلیل ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اثر میں کمی آ جاتی ہے۔</p> <p>• نبض کی حرکات ست دل ڈوبنے Bradicardia کی شکایت ہونے لگتی ہے۔ دل کے مریضوں کو یہ دونوں دوائیں</p>	<p>• کیلشیم گلوکونیٹ انجکشن لگانے پر۔</p> <p>• فینوباربی ٹون۔ گارڈینال وغیرہ دینے پر۔</p> <p>• دل کی حرکات کو درست کرنے والے مرکبات مثلاً سپار (سپلا) کارڈی ٹیب انڈی رال۔ وغیرہ دینے پر</p> <p>• بلڈ پریشر کم کرنے والی دوائیں مثلاً ایڈوپا سیرپاسل سرپنی روٹین دینے پر۔</p>	<p>• ڈیجی ٹلیس کے مرکبات مثلاً لے ناکسن (BW) کارڈیوکسن (سینڈوز) سینڈی لائڈ (سینڈوز) ایسٹی لائڈ (") وغیرہ کے ساتھ۔</p>



<p>ایک ساتھ برگزنہ دیں۔</p> <p>• دل کی حرکات بے ترتیب ہو جاتی ہیں اور دل تیزی سے ڈھرنے لگتا ہے۔</p>		
<p>• بلڈ پریشر کم کرنے کی صلاحیت ان دواؤں سے بڑھ جاتی ہے۔</p> <p>• میتھائل ڈوپا کی بلڈ پریشر کم کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔</p>	<p>• نیفرل جیسی پیشاب آور دوائیں دینے سے۔</p> <p>• ایم فیٹامین کے مرکبات مثلاً بنزیدرین S.K.F. دینے سے۔</p>	<p>• میتھائل ڈوپا (بلڈ پریشر کم کرنے والی) (M.S.D.)</p> <p>ایم ڈوپا (I.D.P.L.) ساتھ</p>
<p>• ڈپ سون کا دافع جذام اثر بڑھ جاتا ہے۔</p>	<p>• گردوں کی راہ پینسی لین کے اخراج کو روکنے والی دوائیں جو پرانے گھٹیا میں دی جاتی ہیں مثلاً مینیڈ (MSD) دینے سے</p>	<p>• دافع جذام ادویہ مثلاً ڈپ سون نوووفون (B.C.) وغیرہ کے ساتھ</p>
<p>• ایڈریٹنالیٹن کا اثر تیز ہو کر دل کو نقصان پہنچتا ہے۔</p> <p>• خون میں شکر کی مقدار کم کرنے کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔</p> <p>• ایڈریٹنالیٹن کا محرک قلب اثر ختم ہو جاتا ہے اس لئے دونوں کو شامل نہ کریں۔</p>	<p>• انٹی ہشامین ادویہ مثلاً ایول فورسٹال۔ سی پی ایم دینے پر۔</p> <p>• دافع ذیابیطس دوائیں مثلاً ریستیٹان۔ ارنون وغیرہ دینے پر۔</p> <p>• دل کی بے ترتیب حرکات کو درست کرنے والی ادویات مثلاً سپلار۔ کارڈی ٹیب وغیرہ دینے پر۔</p>	<p>• ایڈریٹنالیٹن کے ساتھ۔</p>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• تھیوفائی لین کے اثر کو خطرناک حد تک بڑھا دیتی ہیں جس سے زہریلے اثرات اور ری ایکشن کا اندیشہ ہوتا ہے۔</li> <li>• دافع گھٹیا ادویات دینے پر۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دیگر دوسرے دور کرنے والی دوائیں مثلاً ایفڈرین۔ امینوفائی لین وغیرہ دینے پر</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• تھیوفائی لین، ڈیری فائی لین وغیرہ کے ساتھ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تنفس کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے اس لئے میڈ سلف کے ساتھ ڈیازائی پام کبھی نہ دیں۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ڈیازائی پام۔ کالپوز وغیرہ دینے پر۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• میڈ سلف کے ساتھ۔</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• سکونل کا اثر کم ہو جاتا ہے اس لئے اس کے ساتھ اناسٹن نہ دیں۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اناسٹن۔ ڈیازائین جیلوسل دینے پر۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ٹرائی فلوپرومازین مثلاً سی کوئل (سارابھائی) وغیرہ کے ساتھ۔</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• دافع تشنج ادویات کا اثر تیز ہو کر نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔</li> <li>• دورہ روکنے کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔</li> <li>• دافع تشنج دواؤں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔</li> <li>• گرائی سوفلوین کا اثر بڑھ جاتا ہے۔</li> <li>• دافع تشنج دواؤں کے زہریلے اثرات بڑھ جاتے ہیں اور</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اسپرین کے مرکبات دینے پر۔</li> <li>• باربی ٹون دینے پر</li> <li>• کلورم فینی کال دینے پر</li> <li>• گرائی سوفلوین کے مرکبات دینے پر۔</li> <li>• آئی سوئیٹس دینے پر</li> <li>• ٹرائیکولائی زر، کالپوز۔</li> <li>• لبریم دینے پر</li> <li>• اینٹی کوآگولینٹ مثلاً</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دافع تشنج ادویات مثلاً۔</li> <li>• ڈرائی لین ٹین (P.L.)</li> <li>• کوئی مال (بار)</li> <li>• تیروٹن (M.B.)</li> <li>• وغیرہ کے ساتھ</li> <li>• فولاد کے مرکبات مثلاً</li> <li>• ربر پلکس (سارابھائی)</li> <li>• ربر انون ("") فی فول (S.K.F.)</li> <li>• امٹی ران (T.F.) وغیرہ کے ساتھ۔</li> <li>• "</li> </ul>



<p>نقصان دہ اثرات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ایسٹروجن دافع تشنج اثرات کو بڑھا دیتے ہیں۔</li> <li>• دافع تشنج دواؤں کے مخالف اثر کرتا ہے اور ورورہ روکنے کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔</li> </ul>	<p>کو ماڈین وغیرہ دینے پر۔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ایسٹروجن مثلاً کلی نسروول دینے پر۔</li> <li>• فولک ایسڈ دینے پر۔</li> </ul>	<p>"</p> <p>"</p> <p>"</p> <p>"</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• فولاد کے مرکبات کا گردوں سے اخراج بڑھ جاتا ہے اور خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو پاتا۔</li> <li>• فولاد کے مرکبات کی تاثیر میں دیر نکلتی ہے۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دافع تیزابیت مثلاً جیلوسل ڈائی جین وغیرہ دینے پر۔</li> <li>• کلورم فینی کال دینے پر</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• فولاد کے مرکبات مثلاً ربراپلکس (سارابھائی) ربرائون (")</li> <li>• ٹی فول SKF امٹی ران TF وغیرہ کے ساتھ۔</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• انڈومیتھاسین کا دافع غصیہ و درد دورم اثر ختم ہو جاتا ہے۔</li> <li>• انڈومیتھاسین کا اثر بڑھ جاتا ہے۔</li> <li>• انڈومیتھاسین کا اثر بڑھ جاتا ہے۔</li> <li>• انڈومیتھاسین کا اثر تیز ہو جاتا ہے۔</li> <li>• انڈومیتھاسین کا دافع ورم اثر بڑھ جاتا ہے۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ایسپرین کے مرکبات دینے پر۔</li> <li>• فینائل بیونازون کے مرکبات دینے پر۔</li> <li>• ڈیکسامیتھاسون۔</li> <li>• پرنیڈنی سولون دینے پر۔</li> <li>• سیلی سیلیٹ کے بیرونی استعمال کرنے پر۔</li> <li>• خون کے جمنے کی صلاحیت کم کرنے والی ادویہ (Anti Coagulant) دینے پر</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• انڈومیتھاسین کے مرکبات مثلاً۔ انڈوسڈ (M.S.D.) آئی ڈی سن (I.D.P.L.) کے ساتھ</li> </ul> <p>Indomethacin Idicin Indocap/SFV</p>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• کیلشیم سالت مثلاً میکل وٹ (سینڈوز)</li> <li>کیلشیم گلوکو نیٹ وغیرہ کے ساتھ۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ڈیجی ٹیلز کے مرکبات مثلاً ڈی جاکسن لے ناکسن دینے پر۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• کیلشیم کے نمکیات ڈیجی ٹیلز کے زہریلے اثرات کو بڑھا دیتے ہیں اس لئے ان کو ساتھ ساتھ کبھی نہ دیں۔</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• نائٹرو فورن نائن کے مرکبات مثلاً فیورازن ٹین (S.K.F.) پائی راڈاسل (اتھنور) نفروست (رپ ٹکاس) کے ساتھ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دافع تیزابیت مثلاً ڈائی جین۔ سلومگ۔ مک سل دینے پر۔</li> <li>• گرامو نیگ دینے پر</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ان دواؤں کا اثر ختم ہو جاتا ہے لہذا۔ ان دونوں کو نہ ملائیں۔</li> <li>• گرامو نیگ کے مخالف اثر ہوتا ہے اور وہ بے کار ہو جاتا ہے۔</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ریفا م پی سن (دافع ٹی بی) کے مرکبات مثلاً ٹی بی ریم (رین بنش) ریم پن (لائی کا) ریفا پلان کے ساتھ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• پاس P.A.S کے ساتھ دینے پر</li> <li>• مانع حمل خوردنی دوائیں مثلاً سیکروڈائل ، اناولر اوولین وغیرہ دینے پر۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ریفا م پی سن دیر میں خون کے اندر جذب ہوتا ہے۔</li> <li>• حمل کے روکنے والی ادویات بالکل بے اثر ہو جاتی ہیں۔</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• آئی سو نیس وغیرہ کے ساتھ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• وٹامن بی ۱۲ دینے پر</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• وٹامن بی ۱۲ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• مقامی تسکین پہنچانے والی ادویات مثلاً نوو کیں (ہاچسٹ) زائی لو کیں (S.G) بزو کیں (المک) انٹی تھین (گلیکو) وغیرہ کے ساتھ۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سلفونامائیڈ مثلاً سلفا ڈایازین، سلفا ڈی زین دینے پر۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سلفونامائیڈ کا جراثیم کش اثر ختم ہو جاتا ہے۔</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• گلوکوز کی بوتل چڑھانے کے ساتھ۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ڈیجی ٹیلز کے مرکبات دینے میں۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ڈیجی ٹیلز کے زہریلے اثرات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• خون میں شکر کی مقدار تیزی سے کم ہونے لگتی ہے۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• انسولین دینے پر</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• پوناشیم سالٹ مثلاً پالاکال</li> <li>• پ پ نکاس پاٹ کلر (M.H.) کے ساتھ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• خون میں شکر کی مقدار تیزی سے کم ہونے لگتی ہے اور ذیابیطس کو ماکا خطرہ رہتا ہے۔</li> <li>• انسولین کا اثر ست کر دیتے ہیں۔</li> <li>• انسولین کی مقدار زیادہ لینی پڑتی ہے کیونکہ اس کا اخراج جلد ہو جاتا ہے۔</li> <li>• انسولین زیادہ مقدار میں لینا پڑتی ہے۔</li> <li>• خون میں شکر کی مقدار بہت زیادہ گھٹ جاتی ہے۔</li> <li>• دافع ذیابیطس دواؤں کا اثر بڑھ جاتا ہے</li> <li>• انسولین کی خون میں کم کرنے کی صلاحیت گھٹ جاتی ہے۔</li> <li>• انسولین کا شکر گھٹانے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔</li> <li>• خون میں شکر کی مقدار تیزی سے کم ہونے لگتی ہے۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اسپرین کے مرکبات دینے پر۔</li> <li>• کارٹی سون کے مرکبات مثلاً پریڈنی سولون۔</li> <li>• ڈیکاڈرون وغیرہ دینے پر</li> <li>• مدرات مثلاً فروسی مائیڈ لاسکس وغیرہ دینے پر۔</li> <li>• ٹرائاسائیکلین دینے پر</li> <li>• کلورم فینی کال دینے پر</li> <li>• دافع ذیابیطس دواؤں دینے پر</li> <li>• ایسی نوزولامائیڈ کے مرکبات مثلاً ذیابیطس دواؤں کے ریکس دینے پر</li> <li>• سلفونامائیڈ دینے پر۔</li> <li>• فینائل بوتازون کے مرکبات مثلاً اسکاپائی رین وغیرہ دینے پر۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• انسولین کے مرکبات کے ساتھ۔</li> </ul> <div data-bbox="1077 672 1292 963" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Insulin Actraphane Actrapid Human Actraphane Human Actrapid Human Monotard Lentard Monotard MC Rapidica Rapimix Zinulin Insulins Insulins-Boots</p> </div>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• وٹامن بی ۱۲ کے جذب ہونے کا عمل ست ہو جاتا ہے اس لئے ان کے ساتھ بی ۱۲ زیادہ مقدار میں دیں۔</li> <li>• ان وٹامن کے خون میں جذب ہونے کا عمل ست ہو جاتا ہے اس لئے ان کے ساتھ یہ وٹامن زیادہ مقدار میں دینا چاہئے۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• وٹامن بی ۱۲ دینے پر</li> <li>• وٹامن K.D.A.E. وغیرہ دینے پر۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• خون میں کولیسٹرول کی مقدار کم کرنے والی دوائیں مثلاً کولی پنڈ۔ (رین بجشی) لپونڈ (سپلا) کے ساتھ۔</li> </ul> <p><b>HYPOLIPIDAEMIC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemfibrozil</li> <li>• Bezafibrate</li> <li>• Lovastatin</li> <li>• Simvastatin</li> <li>• Atorvastatin</li> <li>• Gugulipid (Guglip)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• کوچی سین کے اثر سے وٹامن بی ۱۲ کے خون میں جذب ہونے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• وٹامن بی ۱۲ دینے پر</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• کوچی سین کے مرکبات مثلاً کوچی سن ڈان وغیرہ (دافع تفرس) کے ساتھ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• فولک ایسڈ جسم میں جلد تحلیل ہونے لگتا ہے لہذا اس کے ساتھ فولک ایسڈ کی مقدار بڑھائیں۔</li> <li>• ان وٹامن کے جسم میں تحلیل ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور ان کی زیادہ مقدار کھلانی پڑتی ہے۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• فولک ایسڈ دینے پر۔</li> <li>• وٹامن D وٹامن K دینے پر۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دافع تشنج ادویات مثلاً ڈائی این نین (پی ڈی) کومینال (بار) وغیرہ کے ساتھ۔</li> </ul> <p><b>ANTICONVULSANTS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carbamazepine</li> <li>• Sodium Valproate</li> <li>• Hydantoins</li> <li>• Primidone</li> <li>• Clonazepam</li> <li>• Clobazam</li> <li>• Gabapentin</li> <li>• Lamotrigine</li> </ul>



### • الکوحل

وہسکی جن روم بیئر  
وڈکا۔ وغیرہ کے ساتھ۔



scotch



WHISKY

• اسپرین کے مرکبات  
استعمال کرنے پر۔

• پیراینا مول کے مرکبات  
دینے پر۔

• فینائل پروٹازون کے مرکبات  
دینے پر۔

• ہینسی لین استعمال کرنے پر۔  
• دافع ذیابیطس ادویات دینے  
پر۔

• ٹرائکولائی زر مثلاً کالپوز۔ لبریم  
دینے پر۔

• میٹری نائی ڈازول کے  
مرکبات مثلاً فلی جل، مٹرو جل  
دینے پر۔

• کوڈین دینے پر  
• آئی سونیکس دینے پر

• بلڈ پریشر گھٹانے والی  
ادویات مثلاً ایلومٹ ایم ڈوپا  
وغیرہ دینے پر۔

• گردوں کے ناکارہ ہونے کا  
خطرہ ہے

• غفلت، بے ہوشی، مرکزی  
نظام عصبی کے انتہائی ست

ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔  
• ہینسی لین کی طاقت گھٹ  
جاتی ہے۔

• خون میں شکر کی مقدار  
تیزی سے گھٹنے لگتی ہے۔

• ٹرائکولائی زر کا عمل تیز  
ہو جاتا ہے۔

• الکوحل کے جسم میں جذب  
ہونے کا عمل رک جاتا ہے۔

• کوڈین کا کھانسی روکنے کا  
عمل تیز ہو جاتا ہے۔

• آئی سونیکس کے ٹی بی کے  
جراثیم کو ختم کرنے کی مدت کم

ہو جاتی ہے اور جس سے یہ جلد  
خارج ہو جاتی ہے۔

• ان دواؤں کا بلڈ پریشر کم  
کرنے کا اثر بڑھ جاتا ہے۔



## غذاؤں کے ساتھ دواؤں کے اثرات

مندرجہ ذیل ادویہ استعمال کرتے وقت	ان چیزوں کا استعمال کیا گیا	کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟
• ڈاکسا سائیکلین مثلاً • دوو سائیکلین زائی ڈوکس لائی • ڈوکس کے ساتھ۔	• پانی یا دودھ استعمال کرنے پر۔	• غذا کی نالی میں خراش یا زخم نہیں ہوگا
• انٹی پارکنوزم مثلاً مایائے • گلیکسہ کمپنی • پاسی ڈائل (امیڈیکا) • پاسی نمین (سائی ٹائڈ) کے • ساتھ۔	• وٹامن بی ۱۲ والی دوائیں • یا غذائیں مثلاً کلیجی، گوشت • مچھلی، سبزیاں وغیرہ دینے پر۔	• انٹی پارکنوزم یعنی ریشہ۔ • کچکی دور کرنے کا اثر رک جاتا • ہے اس لئے وٹامن بی ۱۲ کے • مرکبات یا اس سے بھرپور غذا • استعمال نہ کریں۔
• دافع ذیابیطس ادویہ مثلاً ڈایا • بے نیز ڈائل۔ ٹالپو مائیڈ کے • تھراپ۔	• شکر اور کاربو ہائیڈریٹ • سے بھرپور غذائیں استعمال • کرنے پر	• شکر کو کنٹرول کرنے • ذیابیطس دور کرنے کا عمل رک • جاتا ہے۔
• دافع درد اور دافع بخار • ادویہ • آویدن (سارابھائی) سریدون • ٹائی لی نال (اتھنور) وغیرہ کے • ساتھ۔	• شکر - نشاستہ اور کاربو • ہائیڈریٹ والی غذائیں استعمال • کرنے پر۔	• دافع بخار ادویہ کا عمل دیر • میں ہوتا ہے۔ ان ادویہ کے • ساتھ کاربو ہائیڈریٹ والی • غذائیں کم دیں۔



<ul style="list-style-type: none"> <li>• ذہن کو سکون دینے کا عمل ست ہو جاتا ہے لہذا ان کے ساتھ چائے کافی کا استعمال بند کر دیں۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• چائے کافی استعمال کرنے پر۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عصبی نظام کو سکون بخشنے والی دوائیں مثلاً لار جیکل (M.B.) کلور پرمازین (B.P.) کے ساتھ۔</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• پیر ایٹا مول کے جسم میں جذب ہونے کا عمل ست ہو جاتا ہے۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور غذائیں۔ مثلاً شکر نشاستہ کے استعمال کرنے پر۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• پیر ایٹا مول کے مرکبات مثلاً کاپول (B.W.) مینا سین (تھ مس) کرو سین (ڈوفر) وغیرہ کے ساتھ۔</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ان دواؤں کا اثر جلد ختم ہو جاتا ہے جراثیم کش اثر بھی بہت کم ہو جاتا ہے لہذا ان کو صرف پانی کے ساتھ استعمال کریں۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ترش پھلوں کے رس سوڈا واٹر وغیرہ استعمال کرنے پر۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• وینسی لین اور کلاکسا یلین کے مرکبات مثلاً پینڈ (سارا بھائی کاکس (لائی کا) کلاکسا یلین وغیرہ کے ساتھ۔</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ٹھاسائی کلین پوری طرح جسم میں جذب نہیں ہو پاتی اس لئے ان کو دودھ کے ساتھ استعمال نہ کریں۔</li> <li>• ٹھاسائی کلین پوری طرح جسم میں جذب نہیں ہو پاتی اس لئے ان کو دودھ کے ساتھ استعمال نہ کریں۔</li> <li>• ٹھاسائی کلین پوری طرح جسم میں جذب نہیں ہو پاتی اس لئے ان کو دودھ کے ساتھ استعمال نہ کریں۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء استعمال کرنے پر ترش پھلوں کے رس استعمال کرنے پر۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ٹھاسائی کلین کے مرکبات مثلاً ٹھاسائی کلین ویری مائی سین نیو سائی کلین وغیرہ کے ساتھ۔</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• یہ دوائیں تیزی سے تحلیل ہو جاتی ہیں۔ اور کم فائدہ ہوتا ہے۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ترش پھلوں کے رس سوڈا وائر استعمال کرنے پر</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ارائی تھرو مائی سین کے مرکبات مثلاً ارائی تھرو سین ای مائی سین وغیرہ کے ساتھ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ترش پھلوں کے رس سے فولاد کے مرکبات تیزی سے تحلیل ہونے لگتے ہیں جس سے کسی اثرات قے، متلی، ابکائی وغیرہ پیدا ہونے لگتی ہے۔ دودھ انڈے وغیرہ سے گاڑھے ہو کر دیر میں ہضم و جذب ہوتے ہیں۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ترش پھلوں مثلاً لیموں، نارنگی کے رس۔ دودھ، انڈے مٹی کا آنا وغیرہ دینے پر۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• فولاد کے مرکبات مثلاً ربر انون، نوٹوفیرون بے نوجن ریڈی پلکس وغیرہ کے ساتھ۔</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ذیازی پام کا جذب ہونے کا عمل بڑھ جاتا ہے۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• غذا کھانے کے دوران یا غذا کے فوراً بعد لینے پر</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ذیازی پام کے مرکبات مثلاً کالپوز، کالموڈ وغیرہ کے ساتھ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ڈیجی ٹیلز کے فوائد ختم ہو جاتے ہیں۔</li> <li>• حرکات قلب بے ترتیب ہو جاتے ہیں لہذا دودھ بند کر دیں دوا خالی معدہ نہ دیں غذا کے بعد دیں۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دودھ یا کیلشیم سے بھرپور دیگر غذائیں استعمال کرنے پر۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ڈیجی ٹیلز کے مرکبات مثلاً 1 ناکس (B.W) ڈی چاکسن وغیرہ کے ساتھ</li> </ul>



<p>• فروسی مائیڈ کے جذب ہونے میں دیر لگتی ہے اس لئے ان کو خالی پیٹ پانی کے ساتھ استعمال کرانیں۔</p>	<p>• غذا کے ساتھ یا بعد غذا استعمال کرنے پر۔</p>	<p>• فروسی مائیڈ کے مرکبات مثلاً اسکس (ہلجسٹ) سالی نکس (I.D.P.L) وغیرہ۔</p>
<p>• پیشاب آور دوا کا جذب ہونے کا عمل بڑھ جاتا ہے۔ اس لئے ان کو غذا کے ساتھ یا فوراً بعد استعمال کرنا چاہئے۔</p>	<p>• غذا کے ساتھ یا کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنے پر۔</p>	<p>• بائیڈروکسورامیڈ کے مرکبات مثلاً ایسی ڈریکس نفرل وغیرہ۔</p>
<p>• گرائی سو فلوین پوری طرح جسم میں جذب نہیں ہو پانی لہذا اس کے ساتھ پکینی غذا میں گھی دودھ کھن زیادہ کھلا میں۔</p>	<p>• کم چربی والی غذاؤں کے ساتھ استعمال کرنے پر۔</p>	<p>• گرائی سو فلوین کے مرکبات مثلاً گرائی سوون آئی ڈی فل دن وغیرہ کو</p>
<p>• ان کے جذب ہونے میں دیر ہوتی ہے اور زہریلے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں اس لئے ان کے ساتھ پکینی کا استعمال روک دیں۔</p>	<p>• زیادہ چربی والی غذاؤں کے ساتھ دینے میں۔</p>	<p>• نٹراکسورامیڈ کے مرکبات مثلاً نٹراکسپ (B.W) وغیرہ کو</p>
<p>• اثر کم ہو جاتا ہے یا پھر معدہ میں خراش ہو جاتی ہے۔</p>	<p>• دودھ اور کھاری پن پیدا کرنے والی غذاؤں کے ساتھ دینے پر۔</p>	<p>• بس کوڈائل، ڈل کوڈیکس وغیرہ قبض کشادہ کرنے کو</p>



• آئی سو نیازو کے مرکبات مثلاً آئی سو نیس (فزیر) آئی سو کن (وارنر) وغیرہ کو	• خالی معدہ یا پانی کے ہمراہ استعمال کرنے پر	• بہت جلد خون میں جذب ہو جاتے ہیں۔
• انڈومیتھاسن کے مرکبات مثلاً اڈوسڈ (MSD) آئی ڈی سن I.D.P.L وغیرہ کو	• غذا کے ساتھ کھلانے پر	• متلی قے نہیں ہوتی معدہ اور آنتوں پر بھی کوئی خراب اثر نہیں ہوتا۔
• میٹری نائی ڈا زول کے مرکبات مثلاً میٹروجل (یونیک) فلی جل (MB) وغیرہ کو	• غذا کے ساتھ یا غذا کے فورا بعد استعمال کرنے پر	• معدہ اور آنتوں میں خراش پیدا نہیں کرتے۔ متلی قے کلیجے کی جلن بھی نہیں ہوتی۔
• کوٹرائی موکسازول کے مرکبات مثلاً سپران (BW) سائی ناس مٹ (رسل) سمٹرال (تھے مس) وغیرہ کو	• غذا کے ساتھ یا غذا کے بعد استعمال کرنے پر۔	• ان کے جذب ہونے کی رفتار بڑھ جاتی ہے اور معدہ آنتوں میں خراش بھی نہیں ہوتی۔
• ای ہتھم بیونال کے مرکبات مثلاً مائی کو بونال (ایڈا) آئی بیونال (لائی کا) امبی نال (لوپن) ایڈی نال I.D.P.L وغیرہ کو	• غذا کے ہمراہ یا غذا کے بعد استعمال کرنے پر۔	• ان دواؤں کے جسم میں جذب ہونے کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔



<ul style="list-style-type: none"> <li>• غذا کی نالی معدہ آنتوں میں خراش پڑنے کا اندیشہ نہیں رہتا۔ اسی طرح فیمل بیونازون کے مرکبات کو بھی خالی پیٹ نہیں استعمال کرنا چاہئے۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• غذا کے ہمراہ یا ایک گلاس پانی کے ساتھ استعمال کرنے پر۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• آکسی فن بیونازون کے مرکبات مثلاً آکسی مائیڈ (کیڈلا) آکسی فن (BPL) فینا بڈ (I.D.P.L.) وغیرہ کو۔</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• اس کے جذب ہونے کی رفتار بڑھ جاتی ہے اور یہ دوائیں زیادہ زود اثر ہو جاتی ہیں۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• خالی معدہ یا پانی کے ساتھ استعمال کرنے پر۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ریفا م پی سن کے مرکبات مثلاً ریمپا سن (کیڈلا) ٹبرم (رین بخشی) وغیرہ کو</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• معدہ میں خراش زخم اور خون آنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ غذا کی نالی معدہ آنتیں خراش اور زخم سے محفوظ رہتی ہیں۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• خالی معدہ پر دینے سے بعد غذا یا پانی پینے یا دودھ پینے کے بعد استعمال کرنے پر</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مسکن درد ادویہ مثلاً اسپرو، انا سین اسپرین اے پی ڈین I.D.P.L. کو ڈوپائی رین (گلیکسو) وغیرہ کو</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• غذا کی نالی معدہ، آنتیں خراش اور زخم سے محفوظ رہتی ہیں۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• پانی یا دودھ کے ہمراہ استعمال کرنے پر۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ڈاکسی سائیکلین کے مرکبات مثلاً وی ووسائیکلین I.D.P.L. اینیڈوکس (ایئی کا) وغیرہ کو</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• وٹامن ڈی کا جسم میں جذب ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• چکنی اور زیادہ چربی والی غذائیں استعمال کرنے پر</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• وٹامن ڈی کے مرکبات ایلسی رال (کیڈلا) مناڈیکس (گلیکسو) کے ساتھ</li> </ul>



## OXYGEN THERAPY

## آکسیجن تھیراپی

زندگی قائم رکھنے کے لئے آکسیجن لازمی چیز ہے۔ زمانہ قدیم سے بے ہوش اور آکسیجن کی قلت کے شکار مریضوں کو لٹھلختہ سونگھانے۔ ہوا کرنے، اور تازہ ہوا پہنچانے کی افادیت سے لوگ آگاہ تھے سائنس کی ترقی کی بدولت خالص آکسیجن کو محفوظ رکھنے کا علم ہو جانے کے بعد ایسے مریض جو آکسیجن کی کمی کے باعث موت کا شکار ہو جایا کرتے تھے ان کے علاج و تدابیر میں بہت سہولت ہو گئی ہے۔ بے ہوشی، کوما، مرگی، لوبلڈ پریشروغیرہ میں جہاں مریض زندگی و موت کی کشمکش میں مبتلا ہو آکسیجن پہنچانے سے حیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے۔

طریقہ استعمال: آکسیجن پہنچانے کے چار طریقے مروج ہیں۔

(۱) نازل کیونولا

(۲) نازل کی تھیر

(۳) فیس ماسک

(۴) ٹی ٹیو سٹم۔ ان سب میں سب سے آسان اور آرام دہ طریقہ فیس ماسک یعنی

چہرے پر کپڑا چڑھا کر آکسیجن پہنچانے کا طریقہ ہے۔

احتیاط: آکسیجن تھیراپی کے دوران سب سے زیادہ خطرہ آگ سے ہے کیونکہ آکسیجن بہت جلد آگ پکڑ لیتی ہے لہذا جہاں آکسیجن پہنچانے کا عمل جاری ہو وہاں سگریٹ، بیڑی سے پرہیز رکھنا چاہئے آگ کو اس مقام سے دور رکھنا چاہئے، آکسیجن تھیراپی کے دوران بلغمی رطوبات خشک ہو جاتی ہیں اس لئے اگر بہس تنفس کی شکایت محسوس ہو تو یہ عمل روک دینا چاہئے۔ بعض اوقات زیادہ مقدار میں آکسیجن جسم میں پہنچ جاتی ہے جس کے خراب اثرات نمودار ہونے لگتے ہیں، مثلاً سانس میں دشواری، عروق میں تناؤ جسم میں ابھار پیدا ہونا وغیرہ ایسا حالت میں آکسیجن کی مقدار کم کر دینا چاہئے۔

ملنے کا پتہ: آکسیجن تھیراپی کا سامان بھارت میں ”اٹلس سرجیکل کمپنی

۳۷۷ لاچپت رائے مارکیٹ دہلی میں مل سکتا ہے۔



## EQUIPMENTS

## میڈیکل آلات ان کے ملنے کے لیے

**LARSEN & TOUBRO LIMITED**  
**INDIAN CANCER SOCIETY**  
**BUILDING**  
**C/6 BANDRA-KURLA**  
**COMPLEX**

P.O. BOX. 8119, BANDRA (EAST),  
 BOMBAY 400 05. PRICE: N/A

### PATIENT MONITORING SYSTEM

Wide screen, under friendly and elegantly designed monitors to monitor E.C.G., peripheral pulse, temperature etc. Monitors for monitoring multi parameters is also available. Combined multibed ECG and multiparameter, central station ideal for 6, 12 and 18 beds are available. Note: This equipment is supplied on agency product basis (i.e. those products not manufactured by maintained by the company after the sale).

### ELECTRO CARDIOGRAPH MACHINE

I & T medical manufactures ECG machine with the total technology transfer from Biocardio Biomedical Italy. The I & T ECG machine has superior performance and is sleek, sophisticated and portable. More over it is light weight and impact proof making it ideal for Indian Conditions.

### ULTRASOUND EQUIPMENT KONTRON INSTRUMENTS FRANCE

High performance, upgradeable and versatile scanners from Kontron instruments France. Sector scanners, linear array scanners, for multi disciplinary application with extensive calculation packages and good resolution. Company offers a range of indigenously manufactured transducers the range includes mechanical sector, dynamically focussed linear, curved linear array transducers and intra cavity probes like transvaginal and transrectal Black and white doppler system for cardiac operations with adequate calculation.

### ULTRASOUND SYSTEM MONITORS

Ultrasound machines, patient Monitoring

Systems, ECG and Electrosurgical Units.  
**BOEHRINGER MANNHEIM**  
**INDIA LTD**

54-A, MATHURADAS VASANJI  
 ROAD, CHAKALA, ANDHERI (EAST),  
 BOMBAY- 400 093. Price N/A.

### AUTOCLIX WITH LANCET

Instrument for obtaining droplet of blood. The lancet for use in the Autoclix, the simple way of obtaining a blood droplet for home monitoring of blood glucose.

### REFLOLUX

Instrument for blood glucose measurement. Reflectance photometer is a blood glucose measuring instrument. It offers easy, convenient and accurate determination of the blood glucose in the range 10-500 mg/dl.

### BM HITACHI 717

A discrete fully selective analyser designed for use in larger laboratories and offering:

- \* sample identification on primary tubes
- \* 32 chemistries plus ESE for routine and non-routine tests
- \* average through put of 750 tests/hour
- \* automatic re-runs
- \* high memory capabilities

### PHOTOMETTER 4010

The photometer is an interference filter photometer for both the colorimetric and U.B. range. All enzymes and substrates assays can be done using 5 microprocessor controlled programmes.

**MILES INDIA LIMITED**

589, SAYAJIPURA, AJWA ROAD,  
 BARODA 390 019. Price: N/A.

### GLUCOMETER GX BLOOD GLUCOSE METER

Glucometer Gx blood glucose meter each complete with battery, cheek paddle, user guide and warranty information. Glucolet automatic lancing device with lancets and end caps normal control, product information. Single button operation, self training guide included, compact portable system, 50 second test procedure, result within minute, high accuracy and precision, dry-blot procedure, painless finger pricking device provide, battery life 15,000 tests



virtually no maintenance. Upto 10 results stored in memory, average recall facility. Gluostix can either be read on the meter (25-400 mg/dl) or visually 20-800mg/dl reagent strip manufactured in India. One year warranty, all spares and consumables available.

### HEMACOMP 70

Instrument for 10 simultaneous measurements with visualisation of R.B.C., W.B.C., PLT, histograms- RBC, WBC, Hgb, HCT, MCG, MCH, MCHC, PLT, MPV and PCT. Easy to operate, calibration in memory, self diagnostic capability, high reliable and accurate, complete self test control facility, automatic wash cycle after every analysis, double transducers for speed and convenience, high throughput capacity, 50 samples per hour, automatic platelet threshold adjustment, RBC, WBC, PLT histogram magnification for accurate analysis, display of histograms on LCD and printout of all parameters on preformatted paper.

### ANAESTHETICS

AMAR BUSINESS CENTRE,  
RAM MANDIR ROAD, GORE- GAON  
WEST, BOMBAY-400 104

### LARYNGOSCOPES

A comprehensive range of laryngoscope sets covering paediatric and adult use in hook on or hinge pin fittings. Shiny or matt finish at affordable prices.

Standard handle- Hook on Rs. 150/- each,  
Standard handle - Hinge pin Rs. 150/- each,  
Penlite handle-Hook on Rs. 150/- each,  
Penlite handle-hinge pin Rs.150/- each,  
Macintosh blade English profile Hook on  
(Size 0.1,2,3,4,5) Rs 150/- each, Miller  
blade Hook on (size 0.1,2,3) Rs. 150/- each,  
Robert shaw blade Hook on (size 0.1) Rs.  
150/- each, Dr. Auderson blade-Hook on  
(size 1) Rs.150/- each, Oxford blade-Hook  
on (Size 1) Rs 150/- each, Spare lamp-  
Rs 7.50/- each, Spare pouch for  
laryngoscope- set big, small Rs.40/- each.

### RAO'S RESUSCITATORS

Available in infant child and adult sizes. Autoclavable, soft to handle foldable bag (adult model only) reading available spare for all parts, economic as compared to imported wounder parts. Standard set comprises: Silicone self inflating bag, non-rebreathm valve-with or without blow off, transparent hooded face mask oxygen enrichment tubing, carrying case.

Rao's infant resuscitator Rs.1200/- each,  
Rao's child resuscitator Rs.1200/- each.

Rao's adult resuscitator Rs.2900/- each

**Optional extras:** 30 cm x 11 mm and  
30cm x 20mm corrugated hose with ends to  
extend the bag from the mask Rs.100/- each  
30cm x 11mm and

30cm x 20mm corrugated hose with ends to  
connect resuscitator to the vaporizer  
Rs.100/- each

**SBP MEDICARE SYSTEM,**

4/45 ROOP NAGAR,

DELHI 110 007

### WRIGHT PEAK FLOMETER

Accurate, Durable, Inexpensive. High  
precision instrument for user's respiratory  
capability monitoring.

### AERMAX NEBULISERS

High performance compressor nebuliser for  
aerosol therapy

### WRIGHT PEAK FLOWMETER

This is an accurate, durable, inexpensive  
peak flowmeter for hospital, clinic and home  
use. It is a high precision respiratory  
capability monitor. It permits objective  
assessment of clinical course, warns of  
bronchospasm prior to onset of clinical  
symptoms

### ABL 50 BLOOD GAS ANALYZER

The ABL 50 is an advanced basic blood gas  
analyzer.

**DRAKE MEDICAL PRODUCTS,**

23-A, Juhu Sun N Sea,

33-B, Juhu Road,

BOMBAY 400 049

### AQUA-PURATOR AND CO2 AQUA-PURATOR THE LUMINOUS INTENSIVE OPTICS OF WISAP, ACCORDING TO SEMM.

J.L. MORISON (INDIA) LTD.,

"CRYSTAL", 79, DR. ANNIE BESANT  
ROAD, WORLI,

BOMBAY 400 018

### SURGIFEC SUTURES

A complete range of non absorbable eyeless  
needled sutures branded SURGITEX have  
been produced by J.L. MORISON in technical  
collaboration with pearsalls sutures

**KALEKARSUGICALS PVT LTD,**

305, SHAMALDAS GANDHI MARG,

BOMBAY 400 002.



## SPARK SOLID STATE SURGICAL CAUTERY

- A) Spark 50 Bipolar Coagulator  
B) Spark 400 Monopolar Cautery  
C) Spark 400 B Monopolar Cautery with  
bipolar Coagulator

**BLUE STAR LTD,**  
MEDICAL DIVISION, SAILAS,  
414/2, VEER SAVARKAR MARG,  
PRABHADEVI,  
BOMBAY - 400 025.

## REVOLUTIONARY ULTRASOUND IMAGING WITH HITACHI EUB-405

Advanced imaging techniques such as fast sampling, Digital processing, dynamic focussing with variable aperture and high density probe designs, helps to provide excellent image quality. The built in 9" Monitor, easy to operate control panel with trackball makes the system an easy to use, indispensable diagnostic aid for various applications.

**WIPTO GE MEDICAL SYSTEMS,**  
A-4, GOLDEN ENCLAVE,  
AIRPORT ROAD,  
BANGALORE 560 017

## FLUORILUX - 2000 IMAGING SYSTEM WITH TELEVISION

The Fluorilux- 2000 imaging system from Wipro GE Medical systems is an advanced X-Ray image intensifier efficiently coupled to a video chain for convenient television fluoroscopy. The system is available for mounting on a Spot Film Device on over Table X-Ray configuration.

## SOUND VISION

With the Wipro GERT 3200  
Advantage II

**PEST CONTROL (INDIA)  
LIMITED,**  
SAI COMMERCIAL CENTRE,  
504, LINKING ROAD, KHAR  
(WEST),  
BOMBAY 400 052.

## GAS STERILISERS & ETHYLENE OXIDE GAS MIXTURES

Disposable medical device manufactures,  
hospitals, clinics, pharmaceuticals.

**ANAESTHETICS**  
AMAR BUSINESS CENTRE,

**RAM MANDIR ROAD, GOREGAON  
WEST, BOMBAY 400 104.**

## LARYNGOSCOPES

A comprehensive range of laryngoscope sets covering paediatric and adult use in hook on or hinge pin fittings Shiny or matt finish at affordable prices.

Standard handle-Hook on Rs. 150 - each.  
Standard handle - Hinge pin Rs.150 - each.  
Penlite handle - Hook on Rs.150 - penlite  
handle-Hinge pin Rs.150 - each. Macintosh  
blade English profile, Hook on (Size  
0.1,2,3,4,5) Rs.150 - Miller blade Hook on  
(size 0.1,2,3) Rs.150 - each. Robert shaw  
blade Hook on (size 0.1) Rs. 150 - each. Dr.  
Auderson blade - Hook on (size 1) Rs.150 -  
each. Oxford blade- Hook on (size 1) Rs.  
150 - each. Spare lamp -Rs.7.50 - each.  
Spare pouch for laryngoscope - set big small  
Rs. 40/- each.

## RAO'S RESUCTATORS

Available in infant child and adult sizes  
Autoclavable, soft to handle foldable bag  
(adult model only) reading available spare  
for all parts, economic as compared to  
imported wounder parts. Standard set  
comprises: Silicone self inflating bag,  
non-rebreather valve - with or without blow  
off, transparent hooded face mask oxygen  
enrichment tubing, carrying case.

Rao's infant resuscitator Rs. 1200 - each  
Rao's child resuscitator Rs. 1200 - each  
Rao's adult resuscitator Rs.2900/- each.

## ANALYTICAL AUTOMATION

**(I) PVT. LTD., 7, SAI NIVAS,  
SUBHASH ROAD,  
VILE PARLE (E),  
BOMBAY 400 057**

## ABL 520 BLOOD GAS OXIMETRY ANALYSER ABL 50 BLOOD GAS ANALYSER

- \* Measures pH, PCO<sub>2</sub>, PO<sub>2</sub>,  
Barometric pressure.

**EMPIRE INSTRUMENTATION,  
414, SENAPATI BAPAT MARG,  
LOWER PAREL,  
BOMBAY 400 013.**

## MERKUR 4000 THE SMALL URODYNAMIC SYSTEM WITH GREAT POTENTIAL

Compact, light weight, including all  
necessary measuring capabilities

- \* Flexible in application \* Based on modular  
design principle, allows future system  
expansion.



### NEW STANDARD OF MAMMOGRAPHIC IMAGING

ARK DIAGNOSTICS PVT LTD.,  
292/1, PRABHUSANDESH,  
SHERE-PUNJAB SOCIETY, ANDHERI  
(E) BOMBAY 400 093.

### NEW LOW COST ELECTOLYTE ANALYZER

MEDICO IMAGING CO.,  
2, BRAZE BUILDING, N.M. JOSHI  
MARG, LOWER PAREI,  
BOMBAY 400 013.

### TRULY COMPACT PORTABLE X-RAY UNITS

Medico imaging company manufactures 3  
models of compact, handy, portable box  
type X-ray units Medico P-20, Medico P-30  
and Medico P-50.

ALPHA X-RAY TECHNOLOGIES  
(INDIA) PVT LTD. 748/2,  
RAMDEVI, 10TH ROAD, KHAR,  
BOMBAY - 400 052.

IMAGE INTESIFIER  
TELEVISION SYSTEM  
INDIA PHOTOGRAPHIC CO.,  
222, D.N. ROAD,  
BOMBAY 400 001.

### BIG VALUE SMALL PACKAGE KODAK EKTASCAN 1120

J.F. ENTERPRISES, A/10, ANAND  
NAGAR, FORJETT STRETT,  
BOMBAY 400 036

### VALVE MODEL NEW SOLID STATE JF ESU MODELS

Trade in your old conventional Valve Model  
for a New Solid State JF ESU Models for all  
purpose at an attractive discount and create  
prestige with efficiency and satisfactory  
performance SS 202, SS 303, SS 404, SS 505  
and Introduction of Ophthalmic Bipolar and  
Monopolar Digital Units. Select Model from  
Rs. 10000/- to Rs. 45000/-.

ESPEE DYNAMIC MEDICAL  
EQUIPMENTS PVT. LTD.  
(MEDICAL ELECTRONICS  
DIVISION),  
208, CHARISMA CENTRE, 69-A, 19TH,  
ROAD, CHEMBUR, BOMBAY-400 071

### COMPUTERIZED BODY PLETHSMOGRAPH/DIF- FUSION SYSTEMS

This multi purpose unit provides an all  
round transparent chamber to reduce patient  
anxiety and improve communication. A  
provocation testing module can also be  
added to maximize accuracy in using  
provocative pharmaceuticals.

BRAD INTERNATIONAL, INC.,  
53, FREE PRESS HOUSE,  
NARIMAN POINT,  
BOMBAY 400 021

### ANGIOGRAPHIC WIRES, ANGIOGRAPHY INTRODUCERS, ANGIOPLASTY BALLONS, OXYGENATORS, CARDIOPULMONARY SUPPORT SYSTEM, UTERINE MANIPULATOR, STENTS

Brad offers a wide range of products in  
cardiovascular urological and surgical  
specialities

MEDITRIN INSTRUMENTS,  
MADHUBAN, MALAVANI  
CHURCH,  
NEAR AKASHWANI RADIO  
STATION,  
MARVE ROAD,  
MALAD (WEST),  
BOMBAY 400 095

### BABY CARE

A planned approach to new born  
management.

- \* premature baby incubatore,
- \* Resuscitation Trolley
- \* Halogen Phototherapy
- \* Thermo Mattress
- \* Transport incubator
- \* Oxygenhood
- \* Radiant Heat Warmer
- \* Phototherapy Unit
- \* Infant Care Trolley
- \* Temperature Monitors
- \* Infantometer
- \* Digital Weighing Machine
- \* Slow suction unit



**LIST OF MANUFACTURERS****Abbott Laboratories (India) Pvt. Ltd.**

Jehangir Bldg.,  
133, Mahatma Gandhi Road,  
Mumbai- 400 023

**Ace Laboratories Ltd.**

x-24 Phase-II, Okhla Industrial Area  
New Delhi - 110 020  
Ph. 6846178/6821242 Fax-6841084

**Aglowmed Private Limited**

702-A, Poonam Chambers  
Dr. A.B. Road, Worli,  
Mumbai- 400 018

**Albert David Ltd.**

15, Chittaranjan Avenue,  
Calcutta - 700 072

**Alembic Chemical Works Co. Ltd.**

Alembic Road, Industrial Area,  
Vadodra - 390 003

Ph:330550 Fax:0265-337125/330834

**Alidac Genetics & Pharmaceuticals**

244 Godhasar, Maninagar,  
Ahmedabad - 380 008

Ph.354852(22Lines)

**Alkem Laboratories Ltd.**

Phoenix Mills Complex, 3rd floor,  
462, Senapati Bapat Marg,  
Mumbai - 400 013

Ph. 4952789/90/4952851/52 Fax-495 2955

**Allenburys A Divn of Glaxo (I) Ltd.**

Dr. Annie Besant Road,  
Worli, Mumbai- 400 025

**Allergan India Pvt. Ltd.**

9th Floor, North Block, Manipal Centre  
47, Dickenson Road,  
Bangalore-560042

Ph.558 4242

**Alpine Industries**

A-67 Naraina Ind. Area Phase-I  
New Delhi-110028

Ph.5795703Fax-5432706

**American Remedies**

124, L.B. Road, (Adyar)  
Madras-600 020

**Anand Synthokem Pvt.Ltd.**

101, Kalpita Enclave,  
Kalpita Co-op. Housing Society,  
Swami Nityanand Marg,  
Mumbai-400 059.

**Andre Laboratories Pvt.Ltd.**

28, Sunil Shopping Centre  
J.P. Road, Andheri (W)  
Mumbai-400 058

**Anglo-French Drugs & Industries Ltd.**

41, 3rd Cross, SSI Area V Block  
Rajajinagar Bangalore-560010

Ph.356757/354770

**APT Labs Ltd.**

6-8-32, 8/2, Arundelpet  
Guntur-522002

Ph.233395 Fax.351481

**Aristo Pharmaceuticals Pvt. Ltd.**

Mercantile Chambers, 3rd Floor,  
12, J.N. Heredia Marg, Ballard Estate,  
Mumbai- 400 001.

Ph: 2617909/2618921 Fax :2615604

**Astra- IDL Ltd.**

32/1-2, Crescent Towers,  
Bangalore - 530 001

Ph:2256941/2/3/4 Fax:0802252894

**Bayer (India) Ltd.**

Bayer House, Central avenue,  
Hiranandani Gardens, Powai

Mumbai-400076

Ph. 5779300 Fax-5770416

**BDH Industries Ltd.**

Nair Baug, Akurli Road,  
Kandivli (East)

Mumbai- 400 101

Ph: 8871370,8870082,83,8870834 Fax : 8870856

**Bell Pharma**

Shivaji Service Industries,  
119 / 7, Mahim, Taikalwadi Road,  
Mumbai- 400 016

**Bharat Serum & Vaccines Pvt. Ltd.**

52, Mittal Chambers, Nariman Point,  
Mumbai-400 021.

**Biddle Sawyer Ltd.**

25, Dalal Street, Fort, Das Chambers,  
Mumbai- 400 023

Ph: 2670244/2670036

**Biochem Pharma Industries**

'A' Aidun Building, Ist Dhobi Talao,  
Mumbai- 400 002

Ph: 2085534/2085457/2085430 Fax:2870044

**Biological - E Ltd**

18/1 & 3, Azamabad,  
Hyderabad - 500 020

Ph: 7617831(3Lines)/7615134

**Bliss Chemicals & Pharma India Ltd.**

Sky pak House Annexe,  
Off. Vassanji Road, Marol,  
Mumbai- 400 059

Ph: 8368181 Fax: 8365890

**Blue Cross Laboratories Ltd.**

3, IAN House, Mahakali Caves Road,  
Andheri (East),  
Mumbai-400 093.

Ph: 8390202(4Lines) Fax: 8363740/8380617

**Boehringer Ingelheim (I) Ltd.**

54-A, M. Vasar Road, Chakala, Andheri East,  
Mumbai- 400 093

Ph:8376794 Fax:8379906

**BPL Pharmaceuticals (P) Ltd.**

380/82, J. Sankersett Smriti,  
Chira Bazar, Mumbai- 400 002

**Brown & Burk Pharmaceutical (P)Ltd.**

303, 11th Floor A'Wing, Queen Corner Apart-  
ments, 3, Queens Road,  
Bangalore- 560 001

Ph: 2269609,2268785Fax: 080 2281627

**Burroughs Wellcome (India) Ltd..**

Leo House, 88-C, Old Prabhadevi Road,  
Mumbai- 400 025.

Ph:4304210/4304279/4304434Fax:4304069

**Cachet Pharmaceuticals (P) Ltd.**

518, Shah Nahar,  
Worli, Mumbai- 400 018

Ph.4927526/4936801/4952613Fax-4931121

**Cadila Health Care**

Khemka House, Drive in  
Ahmedabad- 380 052

Ph: 446639/446649 Fax (079)446659

**Cadila Pharmaceuticals Ltd.**

B.D. Patel House, Near Sardar Patel Colony,



## LIST OF MANUFACTURERS

Naranpura, Ahmedabad- 380 014  
Ph: 7410843-49 Fax:(079)7410850  
**Camlin Ltd.**  
(Pharmaceutical Division)  
Camlin House, J.B. Nagar  
Andheri (E) Mumbai-400059  
Ph:836 6635 (4 lines) Fax: 836 6579  
**Cassella Med.**, A Div. of Hoechst India Ltd.  
Hoechst Centre, 54A,  
Sir Mathurdas Vasani Road,  
Chakala, Andheri (E).  
Mumbai-400 093.  
**Centaur Laboratories Pvt. Ltd.**  
279, New Ashirwad No. 5  
Ram Mandir Road, Goregaon (W)  
Mumbai - 400104  
**CFL Pharmaceuticals Ltd.**  
Regent Chambers, 4th Floor  
208, Nariman Point,  
Mumbai - 400 021  
Ph: 2832110/28321148/2025431 Fax:2047053  
**Chemo Pharma Labs Ltd.**  
Empire House 214, D.N. Road, Fort,  
Mumbai- 400 001  
**Chowgule & Co. (Hind) Ltd.**  
Malhotra House, Opp. G.P.O.  
Walchand Hirachand Marg,  
Mumbai - 400 001  
**Cipla Ltd.**  
289 JBB Marg, Bombay Central  
Mumbai - 400 008  
Ph:3082891/3095521  
**Citadel Fine**  
265 TTK Road,  
Madras - 600 018  
Ph: 4992267  
**Combat drugs Ltd.**  
126/2RT, S. R. Nagar,  
Hyderabad-500038  
Ph: 272876,276950  
**Concept Pharmaceuticals Ltd.**  
167, C.S.T. Road, Santacruz (East),  
Mumbai - 400 098  
Ph: 6148252/6129605/6142045 Fax:6114501  
**Core Parenterals Limited**  
Core House, C.G. Road,  
Near Parimal Garden Ellisbridge,  
Ahmedabad 380 006.  
Ph : 446771 Fax:(079) 420239  
**Croslands**  
Plot No. 89, Road No. 15  
MIDC, Andheri (E)  
Mumbai - 400 093  
Ph: 8393406/8393407/8393409 Fax:8376595  
**Cyanamid India Ltd.**  
Nyloc House 254-D-2,  
Dr. Annie Besant Road  
Mumbai - 400 025  
Ph: 4935211 Fax-4944062  
**Dabur Pharmaceuticals Ltd.**  
5, Jain Mandir Marg, Connaught Place,  
New Delhi - 110 001  
Ph: 343844/3746046 Fax: 3732579/3320613  
**Deepharma Ltd.**  
1497, Bhardwaj Bhawan, Bhisham Pitamah Marg  
Opp. P. T. College, Defence Colony  
New Delhi 110 003.  
Ph: 4642920/21/22/23  
**Dey's Medical Stores Ltd.**

62, Bondel Road,  
Calcutta - 700 020 Ph.295512-13/298490  
**Dolphin Laboratories Ltd.**  
41/28, Sarat Bose Road  
Calcutta - 700 020  
**Duphar Interfran Ltd.**  
F - 5, Shivsagar Estate,  
Dr. Annie Besant Road, Worli,  
Mumbai - 400 018  
**E-Merck (India) Ltd.**  
Shivsagar Estate,  
'A'-Block, Dr. Annie Besant Road,  
Worli, Mumbai - 400 018  
**East India Pharmaceuticals Works Ltd.**  
6, Little Russel Street,  
Calcutta - 700 071  
Ph: 3041/40-2262  
**Elder Pharmaceuticals Ltd.**  
11-B, Dhanraj Mahal, Apollo Bunder  
Mumbai - 400 039  
Ph: 2851937/2835802/2835803 Fax:2871868  
**Eli Lilly Ranbaxy Ltd.**  
8, Balaji Estate, Kalkaji,  
New Delhi - 110 019  
**Emcure Pharmaceuticals Ltd.**  
Dapodi, Pune-411 012.  
**Ethnor Ltd**  
30, Forjett Street  
Mumbai - 400 036  
**Euphoric Pharmaceuticals Pvt. Ltd.**  
205, Skylark Building, 60 Nehru Place,  
New Delhi-110019.  
Ph : 6414734/6415405 Fax: 6445539  
**FDC Ltd.**  
142-48 Swami Vivekananda Road,  
Jogeshwari, (West)  
Mumbai - 400 002  
Ph: 6247657/53/56 Fax :6236393  
**Franco Indian Pharmaceutical Ltd.**  
20, Dr. E. Moses Road,  
Mumbai - 400 011  
Ph: 4934026 Fax-4950557  
**Fulford (India) Ltd.**  
IInd Floor Oxford House, Apollo Bunder,  
Mumbai - 400 039  
Ph: 2026440 Fax: 2043223  
**Genesis (Division of Dr. Reddys Labs Ltd.)**  
Ameerpet, 7-1-27, 203, 2nd Floor  
Block C, Srinivasa Complex  
Hyderabad - 500 016  
Ph: 291946 Fax: 291955  
**Geno Pharmaceuticals Ltd.**  
6/8 Navjivan Society, Lamington Road,  
Mumbai- 400 008  
**Geoffrey Manners & Co. Ltd.**  
Udyog Bhawan, Walchand Hirachand Marg,  
Mumbai - 400 038  
**German Remedies Ltd.**  
Shivsagar Estate, A-Block,  
Dr. Annie Besant Road, Worli,  
Mumbai - 400 018  
Ph: 4935528 Fax: 4950327  
**Gland Pharma Limited**  
6-3-862, Ameerpet,  
Hyderabad- 500016  
Ph: 312415/312157 Fax:312229  
**Glaxo Pharma India Limited**  
Dr. Annie Besant Road, Worli  
Mumbai - 400 025



Ph. 493 3871/493 3514 Fax-493 5358  
**Glat(A Div. of Croslands)**  
 Croslands House, Plot No 89, 15th Road,  
 Phase II, M.I.D.C., Andheri (E)  
 Mumbai - 400093  
 Ph: 8393406/07/09 Fax: 8376595  
**Glenmark Pharmaceuticals Ltd.**  
 B/2, Mahalaxmi Chambers,  
 22, Bhulabhai Desai Road,  
 Mumbai - 400 026  
 Ph: 4922850/4922830/4920828  
**Guardian (A Div. Croslands)**  
 15, Steelmade Ind Est,  
 Marol, Andheri (E) Mumbai-400059  
 Ph: 8348824/8363470/8376596  
**Gufic Ltd.**  
 Subhas Road-A, Vile Parle (East),  
 Mumbai - 400 057  
 P: 8341521/22, 8344523, 8348188 Fax: 8369008  
**Haffkine BioPharmaceuticals Co(p). Ltd.**  
 Acharya Donda Marg, Parel,  
 Mumbai - 400 012  
**Himalaya Drug Co.**  
 Tumkur Road,  
 Bangalore-562 123.  
**Hindustan Antibiotics Ltd.**  
 Pimpri, Pune - 411 018  
**Hindustan Ciba-Geigy Ltd.**  
 Royal Insurance Building,  
 14, J. Tata Road,  
 Mumbai - 400 020  
 Ph: 221213/2851111 Fax: 2029170  
**Hoechst Marion Roussel Ltd.**  
 Hoechst House, Nariman Point,  
 193, Backbay Reclamation,  
 Mumbai-400 021  
 Ph: 8216622 Fax: 8370937/8370939  
**ICI Pharmaceuticals India Ltd.**  
 Khaleeli Centre, 149, Montielth Road, Egmore,  
 Madras - 600 008  
 Ph: 8262682/8269235/8269243 Fax: 8255713  
**Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd.**  
 IDPL Complex, Delhi-Gurgaon Rd,  
 Kapashera New Delhi- 110 037  
 Ph: 5563427/5563078  
**Indchemie Health Specialities Pvt. Ltd.**  
 117, T.V. Industrial Estate, Worli  
 Mumbai - 400 025  
 Ph: 4923016/4923868  
**Indo Pharma**  
 Mehta Mahal, Mathew Road,  
 Mumbai-400 004.  
 Ph. 361 4375/3611376 Fax-3614547  
**Indoco Remedies Ltd.**  
 18-A, Mahal Estate, Mahakali Caves Road,  
 Andheri (East). Mumbai - 400 093  
 Ph: 8363449/62/64/65 Fax: 8363502  
**Ind-Swift Ltd.**  
 123, Industrial Area, Phase-I,  
 Panchkula 134109,  
 Haryana  
**Infar (India) Ltd.**  
 38, J.L. Nehru Road,  
 Calcutta-700 071  
**INGA Laboratories (P) Ltd.,**  
 Inga House, Mahakali Road,  
 Andheri (East)  
 Mumbai - 400 093  
**IPCA Labs (P) Ltd.**

63-E, IPCA House  
 Kandivli Industrial Estate, Kandivli (West)  
 Mumbai - 400 067  
 Ph. 8087678/8086098/8013430 Fax-8727119  
**Intas Labs. Pvt. Ltd.**  
 Chinubhai centre, 2nd floor, Ashram Road,  
 Ahmedabad 380009  
 Ph: 637009, 79052, 78365 Fax: 079 - 78862  
**Jagsonpal Pharmaceuticals**  
 P. Box No. 4545, T-210 J, Shahpurjat  
 New Delhi - 110 016  
 Ph: 6213519-24 Fax: 6473708  
**J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.**  
 Unique Group of companies  
 Neelam Centre, B-Wing, 4th Floor  
 Hind Cycle Road, Worli,  
 Mumbai - 400 025.  
 Ph. 4930918(14Lines) Fax-4930534/4939633  
**Jenburkt Pharmaceuticals**  
 Nirmala Apartments  
 93, Jayaprakash Road, Andheri (West)  
 Mumbai - 400 058  
**J.K. Pharmaceuticals**  
 53, Community, Centre, New Friends Colony,  
 New Delhi-110 065.  
 Ph: 6821248/6821285/630233  
**John Wyeth (India) Ltd.**  
 Apeejay House,  
 Dinshaw Wacha Road,  
 Mumbai - 400 020  
**Juggat Pharma (P) Ltd.**  
 27, Bull Temple Road  
 Bangalore 560004  
 Ph: 608310, 620944 Fax: 080-6612489  
**Kamron Laboratories Ltd.**  
 25, 6th Floor, Urvashi Apartment,  
 Mithakhali Six Road, Ellisbridge,  
 Ahmedabad-380 006  
 Ph: 446328 Fax-403676  
**Kee Pharma Ltd.**  
 2nd floor, Payal cinema Building, Naraina  
 New Delhi-110 028.  
**Khandelwal Laboratories Ltd.**  
 79/87, D.Lad Path,  
 Mumbai-400 033.  
**Knoll Pharmaceuticals Ltd**  
 3 & 4, Corporate Park  
 Sion Trombay Road, Chembur  
 Mumbai-400 022.  
 Ph: 5246901, 5246902, 5246903, 5246904  
**Kopran Ltd.**  
 Parijat House, 1076, Dr. E. Moses Road, Worli,  
 Mumbai-400018  
 Ph. 4964480-1-2-3 Fax-4950363/4950314  
**Kramer Pharmaceuticals (P) Ltd.**  
 Parijat House  
 1076, Dr. E. Moses Road, Worli,  
 Mumbai - 400 018  
 Ph: 4922669, 4922455/4922726 Fax: 4950363  
**LA Pharmaceuticals.**  
 465, GIDC Estate Phase-II, Vatva,  
 Ahmedabad - 382445  
**Lederle Labs Div. of Cyanamid I Ltd.**  
 Nyloc House, 254-02, Dr. Annie Besant Road,  
 Mumbai - 400 018  
**Lupin Laboratories Ltd.**  
 159, C.S.T. Road, Kalina, Santacruz (East)  
 Mumbai - 400 098  
 Ph: 6113391/6102722 Fax: 6114008



## LIST OF MANUFACTURERS

**Lyka labs Ltd**

77, Nehru Road, Vile Parle (E)

Mumbai 400057

**Malladi Drugs & Pharmaceuticals Ltd.**

No. 27, 7th Avenue Ashok Nagar,

Madras-600 083.

**Macleods Pharmaceuticals Pvt. Ltd.**

304-310, Allanta Arcade, Church Rd Andheri (E)

Mumbai- 400 069

**Mac Laboratories (P) Ltd.**

Kiorol, Vidyavihar,

Mumbai - 400 086

**Mapra Laboratories Pvt. Ltd.**

201, Adhyaru Industrial Estate, Sun Mill Comp.

Lower Parel, Mumbai-400013

Ph. 4921117/4921119 Fax-4950487

**Max India Ltd.**

Dr. Jha Marg, Okhla

New Delhi - 110 020

Ph: 6828799/80/79/78

**Medicamen Biotech Ltd.**

10, Community Centre No. 2

Ashok Vihar, Phase-II, Delhi-110052

Ph. 7240578, 7240579, 7240610 Fax 7138171

**Medley Pharmaceuticals Pvt. Ltd.**

Medley House, D-2, MIDC Area,

Andheri East, Mumbai-400 093.

**Menarini Raunag Pharma Ltd.**

Allahabad Bank Building, IInd Floor,

17, Sansad Marg,

New Delhi-110 001

Ph: 3360310

**Mejda Marketing (P) Ltd.**

A-101, Kalpita Enclave,

Swami Nityanand Marg., Andheri (East)

Mumbai- 400 069

**Mercury Laboratories Pvt. Ltd.**

Mercury House, R C. Dutt Road,

Vadodara - 390 005

Ph. 326486/326586

**Merind Ltd**

Mulund-Goregaon Link Road, Bhandup

Mumbai - 400 078

Ph: 5642583-86 Fax: 5684518/5645483

**Mesco Pharmaceuticals Ltd.**

11, Zamrudpur, Community Centre

Kailash Colony, Delhi 110 048.

Ph. 6425914/6423218/6460495 Fax: 6444385

**Micro Labs Limited**

303, III floor, 'A' Wing, Queens Corner Apart-

ments, 3, Queens Road,

Bangalore-560 001.

Ph: 2269609/2268785/2267705 Fax: 2281627

**Modi Mundi Pharma Limited**

14th Floor, 1400 Hemkunt Tower

98, Nehru Place

New Delhi-110 019.

Ph. 6434170/6473019/6473058 Fax 6446876

**Montari Laboratories Pvt. Ltd.**

78 Nehru Place

New Delhi 110 019

**Mount Mettur Pharmaceu-ticals Ltd.**

63/1, II Main Road, Gandhi Nagar

Madras - 600 020

**Natco Pharma Ltd.**

Plot No. 8-2-120/112, A-32

Rd. No. 2 Banjara Hills

Hyderabad - 500 034

Ph. 247532 Fax 248243

**Neo-Pharma Private Limited**

Kasturi Building, 5th Floor

J. Tata Road

Mumbai - 400 020

**Neon Laboratories Pvt. Ltd.**

28, Mahal Industrial Estate, M.Caves Road,

Andheri (East)

Mumbai - 400 093

**Nicholas Pirammal India Ltd.**

Sion-Trombay Rd, Deonar,

Mumbai - 400 088

Ph. 5562021/5569703/5568704 Fax 5562064

**Novo Nordisk India Pvt. Ltd.**

21/15, Landmark Building, 5th Floor,

M.G. Road, P.O.Box No. 5243,

Bangalore 560 001.

**Noir Pharmaceuticals Pvt. Ltd.**

62, Summer Ville, Bhulabhai Desai Road,

Mumbai-400 026

**Panacea Biotech Ltd.**

B-1/E, -12, Mohan Co-op

Industrial Estate, Mathura Road,

New Delhi - 110 044

Ph. 6847963/684794 Fax 6840199

**Parke-Davis (India) Ltd.**

Sakinaka,

Mumbai - 400 072

**Pfizer Ltd.**

Express Towers, Nariman Point,

Mumbai - 400 021

**Pfime International Ltd.**

4-1-1240, King Kothi Rd.,

Hyderabad - 500 001

Ph. 236749/236754/236762 Fax 237715

**Pharmaceuticals Co. of India**

Arun, Chambers,

J-Dadajee Rd., Tardeo,

Mumbai - 400 034

**Pharmacia**

Kabi Pharmacia Far East Ltd.

India Liaison Office 4009

100ft Road, Hal-II Stage, Indiranagar

Bangalore- 560 008

Ph. 5265806/5265806 Fax 5273809

**Piramal Healthcare Ltd.**

100, Centre Point,

Dr. Babasaheb Ambedkar Road

Opp Bharatmata, Parel

Mumbai - 400 012

Ph. 4134653/4143885

**Plethico Pharmaceuticals Ltd.**

A.B. Rd. Manglia - 453 771

Indore (MP)

**Procter & Gamble India Ltd.**

Tiecicon House

Dr. E. Moses Road,

Mumbai-400 011.

**Rallis India**

Rallis House 21, D,

Sukhadvala Marg Fort,

Mumbai-400 001.

Ph. 2048221 Fax 2875980

**Ranbaxy Laboratories Ltd.**

Devika Towers, 11th Floor,

6-Nehru Place

New Delhi - 110 019

Ph. 6437078-81 Fax-6430633

**Raptakos, Brett & Co Ltd.**

47, Dr. Annie Besant Road, Worli,



**Mumbai - 400 025**  
Ph. 4934251 Fax-4950341  
**Reckitt & Colman of India Ltd.**  
8 Palam Marg, Ring Road, Vasant Vihar  
New Delhi - 110 057  
Ph. 6115827/6115830/6112794/6114197  
**Recon Limited**  
429/31, 30th Cross, IV Block Jayanagar,  
Bangalore- 560 011  
Ph. 6633197/6643420 Fax 6635547  
**Reliance Formulation Pvt. Ltd.**  
7/2-A, G.I.D.C. Estate,  
Phase - I, Vatva  
Ahmedabad - 382445  
Ph. 5832826/5830377 Fax 5891789  
**Remedies (India) Pharmaceuticals**  
107, Aradhana Bhawan,  
Azadpur Commercial Complex,  
Delhi - 110033  
Ph. 7252496  
**Richie Laboratories Ltd.**  
5, Devkaran Mansion,  
24, Mangaldas Road,  
Kalbadevi  
Mumbai-400 002  
**Rhone Poulenc (I) Ltd.**  
R.P. House, S.K. Ahire Marg,  
Worli, Mumbai- 400 025  
Ph.4934511 Fax-4950479/4932993  
**Roussel India Ltd.**  
D. Shiv Sagar, Dr. A.B. Road,  
Worli, Mumbai- 400 018  
Ph. 4964343(4Lines)4938531 Fax-4933731  
**Samir Remedies Ltd.**  
2nd Floor, Sun House opp.  
Navrangpura Tel. Exchange, C.G. Road,  
Ahmedabad 380 006.  
Ph. 463077  
**Sandoz India Ltd**  
Sandoz House  
Dr. Annie Besant Road,  
Worli, Mumbai - 400 018  
Ph. 4938730 Fax 4923808  
**Sarabhai Chemicals**  
1st Floor, Administration Bldg.  
Gorwa Road,  
Vadodara 390 007 (Gujarat)  
**Seagull Labs Pvt. Ltd.**  
C-10, Community Centre,  
Lawrence Road  
New Delhi - 110 035  
Ph. 7102528/7102965  
**Searle (India) Ltd.**  
Mehta Mahal, 12th Floor  
15, Mathew Road, Opera House  
Mumbai - 400 004  
Ph. 3633510/3630298/3632785 Fax 2047009  
**Serdia Pharmaceuticals (India) Pvt. Ltd.**  
Neelam Centre,  
A-Wing, Hind Cycle Road,  
Worli, Mumbai- 400 025  
Ph. 4922529 Fax 4937547  
**Serum Institute of India Ltd.**  
501, Dalamal Tower  
211, Nariman Point,  
Mumbai - 400 021  
**S.G. Pharmaceuticals Ltd.**  
1st Floor, Administration Building,  
Gorwa Road,

**Vadodara - 390 007**  
**Shalaks,**  
Puja House C-3, Karampura Community Centre  
Milan Complex, Delhi.  
Ph. 5431216/5453832  
**Sigma Labs**  
43, Wadala  
South Mumbai - 400 031  
**Smith Kline Beecham Pharma (I) Ltd.**  
Devanahalli Road Off  
Old Madras Road Post Box No.2  
Bangalore 560049.  
Ph. 8510861 Fax 8510409  
**SOL Pharmaceutical Ltd**  
6-3-110, 3rd Floor  
Amrutha Mall, Begumpet  
Hyderabad - 500 016  
Ph. 316612/316613 Fax 311539  
**Spencer Pharma**  
769, Annasalai, Post Box No. 301  
Madras-600 002.  
**Shree Ganesh Pharmaceuticals**  
542, 1/10, Bhuta Niwas, Dr. Ambedkar Road,  
P.B. No. 6617, Matunga (E),  
Mumbai - 400 019  
**Stadmed Private Ltd.**  
33-A, 11th Jawaharlal Nehru Road,  
Calcutta - 700 071  
Ph. 5560/5434/5437  
**Stancare**  
Division of Ranbaxy Laboratories Ltd.  
12th Floor, Devika Towers, 6, Nehru Place  
Delhi - 110 019  
Ph. 6444135/5437078-81 Fax 6430633  
**Stangen Pharmaceuticals**  
7-1-27, Ameerpet  
Hyderabad- 500 016  
Ph.291946 Fax-291955  
**Sterfil Laboratories Ltd.**  
101, Sterling Chambers  
Mogra Village lane, Andheri (East)  
Mumbai - 400 069  
**Sun Pharmaceutical Industries Ltd.**  
Synergy House,  
Subhanpura, Gorwa Road,  
Vadodara-390 007  
Ph.337538/341222/330427/330956 Fax332644  
**Sustime Pharma Ltd**  
Batliboi House, Plot No.25 &26  
Deonar Ancillary Industrial Complex Deonar,  
Govandi West  
Mumbai-400 043.  
**Systopic Laboratories Pvt. Ltd.**  
101, Pragati Chambers  
Ranjit Nagar, Commercial Complex  
New Delhi - 110 008  
Ph. 5700336/5701734/5700568  
**Synokem Pharmaceuticals Pvt. Ltd.**  
F-301-302, Friends Tower  
Commercial Complex, Paschim Vihar  
New Delhi- 110 063  
Ph. 5683688/5687839 Fax 5587343  
**Tablets India Ltd.**  
179, T.H. Road,  
Madras - 600 081  
Ph.553263/553264/553265/552708 Fax556767  
**Tamilnadu Dadha Pharma Ltd.**  
260-262, Royapettah High Road,  
Madras - 600 014



## LIST OF MANUFACTURERS

Ph: 8267815 Fax: (044) 8266441

**Themis Pharmaceuticals**28, Suren Road, Andheri (East),  
Mumbai - 400 093**TATA Pharma**Taj Building, 2nd floor, 210 D.N. Road,  
Mumbai-400001

Ph: 2851543/544/545 Fax: 2871464

**Torrent Labs (P) Ltd.**

"Torrent House"

Near Dinsh Hall, Off Ashram Road,  
Ahmedabad - 380 009

Ph: (079) 405090/443237 Fax: 462100

**Troika Parenterals**Om Towers, Jodhpur Tekra, Satellite Road,  
Ahmedabad - 380 015

Ph: 079- 6741538/6743563 Fax: 6749956

**TTK Pharma**

91, Santhome, High Road,

Raja Annamalai Puram,

Madras-600 028

**Unicare Remedies Pvt. Ltd.**

F/25, Industrial Estate,

Gorwa Road, Vadodra-390 016.

**Unichem Laboratories Ltd.**

Unichem Bhawan, S.V. Road, Jogeshwari,

Mumbai - 400 002

**Uni-Sankyo Ltd.**

5-9-24/81, Shapurwadi

Hyderabad- 500 483

**Unisearch Labs Ltd.**

801, Mahalaxmi Chambers, 22, B. Desai Rd.,

Mumbai - 400 025

**Universal Medicare Ltd.**

Sion-Trombay Road, Deonar

Mumbai-400088

Ph: 5563493, 5564037, 5555601

**Uni-UCB Limited**

A-201, Neelam centre, Hind Cycle Road, Worli

Mumbai - 400 025

Ph: 4950710/4924116/4964939 Fax: 4950014

**U.S. Vitamins (I) Ltd.**

Poonam Chambers, North Wing, Dr. A.B. Road,

Worli, Mumbai-400 018

Ph: 4920623/25 Fax: 4921381

**Wander Ltd**107, Hans Bhawan, Bahadur Shah Zafar Marg,  
New Delhi-110002.

Ph: 3310580/3328068/3322935

**Wallace Pharmaceuticals Ltd**

Regent Chambers, 4th Floor, 208,

Nariman Point,

Mumbai-400021.

Ph: 2832110/2832146/2025431 Fax: 2840799

**Walter-Bushnell Ltd.**

Pragati Bhawan, 11th Floor,

Bahadur Shah Zafar Marg,

New Delhi - 110 002

**Warner Hindustan Ltd.**

Nirlon House, 254-B,

Dr. Annie Besant Road, Worli,

Mumbai - 400 025

**Warren Pharmaceutical Ltd.**

2/10 Jyothi Wire House

23-A Shah Industrial Estate

Veera Desai Rd. Andheri (W)

Mumbai - 400 058

**Wave International**

1007, Bhikaji Cama Bhawan

11, Bhikaji Cama Place

New Delhi-110 066.

Ph: 6115295/96

**Win-Medicare**

1400, Hemkunt Tower, 98, Nehru Place,

New Delhi- 110 019

Ph: 6434170/6212940 Fax: 6445915/6446876

**Wockhardt Pvt. Ltd.**

Poonam Chambers, North Wing, Dr. A.B. Road,

Worli, Mumbai- 400 018

**Wyeth Laboratories Ltd.**

Apeejay House, Dinshaw Wachha Road

Mumbai - 400 020

**Zandu Pharmaceutical Works Ltd.**

70, Gokhale Road South (Dadar)

Mumbai - 400 025.

Ph: 4307021 Fax: 4375491



# GENERIC INDEX

ACEBUTOLOL .....	110	AZATADINE MALEATE .....	179	TROMETHAMINE .....	500
ACENOCOUMAROL .....	70	AZATHIOPRINE .....	335	CARISOPRODOL .....	437
ACETAZOLAMIDE .....	193-546	AZITHROMYCIN .....	272	CEFACLOL .....	273
ACLARUBICIN .....	323	BACAMPICILIN HCL .....	272	CEFADROXIL .....	273
ACYCLOVIR .....	373,560	BACLOFEN .....	436	CEFAZOLIN SODIUM .....	276
ADHESIVE TAPES .....	537	BECLOMETHASONE		CEFIXIME .....	274
ADRENALINE .....	519	DIPROPIONATE .....	397,567	CEFOPERAZINE SODIUM .....	275
ADRENOCHROME MONO-		BENZALKONIUM CHLORIDE	538	CEFOTAXIME SODIUM .....	278
SEMICARBAZONE .....	80	BENZALKONIUM CHLORIDE		CEFTIZOXIME .....	281
AGAR GEL .....	59	DRESSINGS .....	538	CEFTRIAZONE .....	276
ALBENDAZOLE .....	338	BENZHEXOL HCL .....	210	CEFUROXIME .....	280
ALBUTEROL .....	519	BENZTHIAZIDE .....	407	CENTCHROMAN .....	508
ALGINIC ACID .....	8	BENZYDAMINE HCL .....	565	CEPHALEXIN .....	281
ALLANTOIN .....	561	BENZYL BENZOATE .....	558	CEPHALORIDINE .....	284
ALLYLOESTRENOL .....	482	BENZYL NICOTINATE .....	561	CETIRIZINE DIHCL .....	179
ALPRAZOLAM .....	230	BEPHENIUM		CHLOMEZANONE .....	437
ALUMINIUM CHLOR-		HYDROXYAPHTHOATE .....	338	CHLORAMBUCIL .....	326
HYDROXIDE .....	551	BERBERINE HCL .....	23	CHLORAMPHENICOL .....	285-23
ALUMINIUM HYDROXIDE GEL	8	BETA HISTINE DIHCL .....	201	CHLORDANTION .....	509
AMANTADINE HCL .....	209	BETAMETHASONE .....	397	CHLORDIAZEPOXIDE .....	252
AMIKACIN .....	258	BETAMETHASONE		CHLORHEXIDINE	
ALMILORIDE .....	151	DIPROPIONATE .....	568	GLUCONATE .....	536
AMINO ACID INFUSION .....	479	BETAMETHASONE		CHLOROQUINALDOL .....	510
AMINO CAPROIC ACID .....	81	SOD. PHOS./BENZOATE .....	568	CHLOROQUINE	
AMINOCEPTINE HCL .....	232	BETAMETHASONE		PHOSPHATE .....	23-253
AMINOPHYLLINE .....	522	VALERATE .....	569	CHLORPHENIRAMINE	
AMINO SALICYLIC ACID .....	69	BETAXOLOL HCL .....	546	MALEATE .....	180-527
AMIODARONE .....	134	BEZAFIBRATE .....	106	CHLORPROMAZINE HCL .....	242
AMITRIPTYLINE HCL .....	232	BILE SALTS .....	53-46	CHLORPROPAMIDE .....	390
AMLODIPINE BESYLATE .....	145	BIPERIDEN HCL .....	210	CHLORTERTACYCLINE .....	267
AMMOIDINE .....	563	BISACODYL .....	59	CHLORTHALIDONE .....	152,408
AMMONIUM CHLORIDE .....	529	BISOPROLOL FUMERATE .....	116	CHLORZOXAZONE .....	438
AMODIAQUINE HCL .....	353	BLEOMYCIN .....	324	CHLOESTYRAMINE .....	106
AMOXAPINE .....	233	BLOOD BANKING SOLUTIONS .....	72	CHOLINE CHLORIDE .....	53
AMOXYCILLIN TRIHYDRATE	260	BROMHEXINE HCL .....	529	CHORIONIC GONADO TROPIN .....	483
AMPHOTERICIN-B .....	345	BROMOCRIPTINE .....	211-484	CICLOPIROXOLAMINE .....	510
AMPICILLIN .....	266	BUDESONIDE .....	522	CIMETIDINE .....	37
AMYLASE .....	46	BUMETANIDE .....	407	CINNARIZINE .....	161-201
ANALGIN .....	217	BUPIVACAINE HCL .....	171	CIPROFLOXACIN .....	288
ANTI SNAKE VENOM SERUM	91	BUPRENORPHINE HCL .....	218	CISAPRIDE .....	56
ANTI-CATARRAL VACCINE	98	BUSPIRONE HCL .....	231	CISPLATIN .....	331
APROTININ .....	427	CALAMINE .....	567	CLARITHROMYCIN .....	293
ASPARTAME .....	481	CALCIPOTRIOL .....	564	CLEMASTINL .....	181
ASPIRIN .....	71-446	CALCIUM GLUCONATE .....	82	CLIDINIUM BROMIDE .....	63
ASTEMIZOLE .....	178	CAMYLOFIN DI-HCL .....	36	CLINDAMYCIN .....	551
ATENOLOL .....	111	CAPTOPRIL .....	140	CLOBETASOL	
ATRACURIUM		CARBAMAZEPINE .....	194	PROPIONATE .....	569
BESYLATE .....	436	CARBIDOPA .....	212	CLOBETASONE .....	399
ATROPINE SULPHATE .....	422	CARBIMAZOLE .....	404	CLOBETASONE 17 BUTYRATE .....	570
AURANOFFIN .....	434	CARBOCYSTEINE .....	529	CLOFAZIMINE .....	351
AUROTHIOMALATE SODIUM	435	CARBOPLATIN .....	330	CLOFAZINE .....	352
		CARBOPROST		CLOFIBRATE .....	197



CLOMIPHENE CITRATE .....484  
 CLOMIPRAMINE HCL.....234  
 CLONAZEPAM.....195  
 CLONIDINE HCL.....147  
 CLOPAMIDE.....157-409  
 CLOTRIMAZOLE.....345  
 CLOXACILIN SODIUM.....293  
 CLOZAPINE.....235  
 CODEINE.....219-528  
 CODEINE SULPHATE.....217  
 CODERGOCRINE MESYLATE.....225  
 COLISTIN SULPHATE.....294  
 CONJUGATED GESTROGENS..82  
 CORN CAPS.....538  
 COTRIMOXAZOLE.....295  
 COTTON CREPE  
 BANDAGE .....538  
 CUMIN OIL.....47  
 CYCLANDELATE.....161  
 CYCLIZINE.....202  
 CYCLOPENTOLATE.....547  
 CYCLOPHOSPHAMIDE.....318  
 CYCLOSERINE.....364  
 CYCLOSPORIN.....336  
 CYPROHEPTADINE.....182, 565  
 CYTOSINE.....326  
 D.PENICILLAMINE.....434  
 DANAZOL.....485  
 DAPSONE.....352  
 DEHYDROEMETINE.....359  
 DEMETHYL CHLOR-  
 TETRACYCLINE .....287  
 DESAMINO OXYTOCIN.....500  
 DESFERRIOXAMINE.....103  
 DESOXY CORTICOSTERONE  
 ACETATE .....383  
 DEXAMETHASONE .....399  
 DEXAMIETHASONE SOIUM  
 PHOSPHATE.....571  
 DEXAMETHASONE TRIMETHYL  
 ACETATE .....571  
 DEXCHLORPHENIRAMINE  
 MALEATE .....183  
 DEXFEN FLURAMINE  
 HCL .....480  
 DEXTRAN.....427  
 DEXTROMETHORPHAN .....528  
 DEXTROPROPOXYPHENE...447  
 DEXTROSE .....428  
 DEXTROSE ELECTROLYTE INJ. 429  
 DEXTROSE INJ.....428  
 DEXTROSE SODIUM-  
 CHLORIDE INJ.....429

DIAZEPAM.....175-253  
 DICHLOROXYLENOL SOLN.536  
 DECLOFENAC SODIUM.....448  
 DICYCLOMINE HCL.....33,422  
 DIENOESTROL.....486  
 DIETHYL CARBAMAZINE  
 CITRATE.....337  
 DIGOXIN.....158  
 DIHYDRALLAZINE SULPHATE...162  
 DIHYDRO ERGOTAMINE  
 MESYLATE.....168  
 DIHYDROTESTOSTERONE GEL 487  
 DIIDO HYDROXY QUINOLINE ..359  
 DILAZEP.....121  
 DILOXANIDE FUROATE.....360  
 DILTIAZEM .....122  
 DIMENHYDRINATE.....202  
 DIMERCAPROL.....104  
 DIMETHICONE.....10  
 DIMETHINDENE  
 MALEATE .....183  
 DINOPROSTONE.....501  
 DIOCTYL SODIUM.....59  
 DIOSMIN.....31  
 DIPHENHYDRAMINE.....527  
 DIPHENHYDRAMINE HCL ...184  
 DIPHENYL PYRAZINE.....530  
 DIPHENYLHYDANTION SODIUM 196  
 DIPHTHERIA ANTITOXIN.....93  
 DIPOTASSIUM HYDROGEN  
 CITRATE.....410  
 DIPROPHYLLINE.....522  
 DIPYRIDAMOLE.....73  
 DISODIUM HYDROGEN  
 CITRATE.....410  
 DISOPYRAMIDE PHOSPHATE...135  
 DIOSULFIRAM .....228  
 DOBUTAMINE HCL .....148,159  
 DOMPERIDONE.....203  
 DOPAMINE.....169  
 DOTHIEPIN HCL .....236  
 DOXAPRAM .....534  
 DOXEPIN HYDROCHLORIDE237  
 DOXORUBICIN.....324  
 DOXYCYCLINE .....295  
 DYDROGESTERONE .....487  
 ECONAZOLE.....346  
 EMBRAMINE HCL.....185  
 ENALAPRIL .....11, 141  
 ENFLURANE .....173  
 EPHEDRINE HCL.....519  
 ERGOLOID MESYLATE .....226

ERGOTAMINE .....169  
 ERGOTAMINE TARTRATE...130  
 ERYTHROMYCIN .....297  
 ESTRADIOL .....488  
 ESTRAMUSTINE PHOSPHATE...331  
 ESTRIOL SUCCINATE .....489  
 ETHACRIDINE LACTATE.....502  
 ETHAMBUTOL .....364  
 ETHAMSYLATE .....83  
 ETHER .....174  
 ETHINYLOESTRADIOL .....332  
 ETHIONAMIDE.....366  
 ETHOSUXIMIDE.....197  
 ETHYL ESTRENOL.....383  
 ETHYL MORPHINE.....528  
 ETHYLBUTAMIDE .....535  
 ETHOPHYLLINE .....522  
 ETOPOSIDE .....327  
 FAMOTIDINE.....37  
 FELODIPINE.....147  
 FENFLURAMINE HCL .....481  
 FERACRYLUM .....84  
 FLAVOXATE.....424  
 FLORAFUR.....328  
 FLUBIPROFEN SODIUM.....548  
 FLUCONAZOLE .....346  
 FLUCORTOLONE HEXANOATE .401  
 FLUNARIZINE .....169  
 FLUOCINOLONE ACETONIDE...571  
 FLUCORTOLONE .....571  
 FLUOROCORTOLONE  
 PIVALATE.....32  
 FLUOTHANE/HALOTHANE ..174  
 FLUOXETINE HCL .....237  
 FLUPENTHIXOL.....242  
 FLUPHENAZINE HCL .....243  
 FLURAZEPAM.....254  
 FLURBIPROFEN .....451  
 FLUOROURACIL .....327  
 FLUTAMIDE.....319  
 FOLLICLE STIMULATING  
 HORMONE.....490  
 FRUCTOSE SODIUM CL INJ.430  
 FRUSEMIDE .....411  
 FUNGAL DIASTASE .....46  
 FURAZOLIDONE.....23, 360  
 GABAPENTIN.....197  
 GAMMA BENZENE HEXA-  
 CHLORIDE.....558  
 GAS GANGRENE ANTITOXIN 93  
 GEMFIBROSIL .....107  
 GENTAMYCIN SULPHATE...299



GINSENG.....	464	INDAPAMIDE HEMIHYDRATE.....	158	LIDOFLAZINE.....	118
GLIBENCLAMIDE.....	391	INDOMETHACIN.....	455	LIGNOCAINE.....	513
GLICLAZIDE.....	392	INSULIN ZINC SUSPEN		LIGNOCAINE HCL.....	172, 138
GLIPIZIDE.....	393	SION.....	388	LINCOMYCIN HCL.....	301
GLUCAGON.....	394	INTRAPERITONEAL DIALYSIS		LIQUID PARAFFIN.....	59
GLUCOMANNAN.....	480	SOLUTION.....	417	LISINOPRIL.....	143
GLYCERYL GUAIACOLATE.....	530	INTRAVENOUS DRIP		LITHIUM CARBONATE.....	244
GLYCERYL TRI-		SETS.....	538	LOMEFLOXACIN.....	302
NITRATE.....	130	IODAMIDE.....	379	LOMUSTINE.....	320
GRISEOFULVIN.....	348	IODINE COLLOIDAL		LOPERAMIDE.....	29
GUAIAPHENESIN.....	530	FORM.....	405	LORATADINE.....	186
GUGGUL STERONES.....	108	ODOCHLORHYDROXY		LORAZEPAM.....	255
GUM KARAYA AND CORTEX.....	59	QUINOLINE.....	381	LOVASTATIN.....	186, 109
HAEMACCEL POLYMER FROM		IODOXYURIDINE.....	549	LOXAPINE.....	240
DEGRADED GELATIN.....	430	IOHEXOL.....	379	LYNOESTRENOL.....	492
HAEMATINICS.....	466	IOPANOIC ACID.....	380	LYNOESTRENOL ETHINYL	
HAEMOCOAGULASE.....	84	IOPHENDYLATE.....	380	ESTRADIOL.....	508
HALOPERIDOL.....	250	ISOFLURANE.....	174	LYSINE ACETYL SALICYLATE.....	77
HALOPYRAMINE HCL.....	185	ISONIAZID.....	366	MAGNESIUM	
HAMYCIN.....	349-512	ISOPHANE INSULIN		HYDROXIDE.....	59
HEPARIN.....	74, 561	CRYSTALLINE PROTAMINE		MAGNESIUM	
HEPATITIS B LATEX AGGLUTN.		INSULIN.....	389	TRISILICATE.....	8
QUICK TEST.....	379	ISOPRENALINE.....	65, 520	MALATHION.....	562
HEPATITIS B VACCINE.....	96	ISOPROPYL ANTIPYRIN.....	456	MANNITOL.....	413
HERMIN.....	431	ISOSORBIDE 5, MONONITRATE.....	132	MEASLES VACCINE.....	97
HISTAGLOBIN.....	93	ISOSORBIDE DINITRATE.....	131	MEASLES, RUBELLA, MUMPS	
HOMATROPINE HBR.....	547	ISOXSUPRINE HCL.....	183, 502	VACCINE.....	97
HUMAN ERYTHRO-		ISPAGHOL.....	59	MEBENDAZOLE.....	341
POIETIN.....	469	ITRACONAZOLE ...	350, 114, 178	MEBEVERINE.....	66
HUMAN NORMAL IMMUNO		KALMEG LIQUID		MEBHYDROLIN	
GLUBULIN.....	94	EXTRACT.....	63	NAPADISYLATE.....	186
HYDRALLAZINE.....	163	KANAMYCIN.....	300	MECLIZINE HCL.....	204
HYDROCHLORTHIA		KETACONAZOLE.....	349	MEDROXYPROGES-	
ZIDE ..	412	KETAMINE.....	176	TERONE.....	494
HYDROCORTISONE		KETOPROFEN.....	456	MEFENAMIC ACID.....	458
ACETATE.....	30, 572, 401	KETOROLACTROMETHAMINE.....	457	MEGLUMINE DIATRIZOATE.....	380
HYDROFLUMETHIA		KETOTIFEN.....	518	MEGLUMINE	
ZIDE.....	413	LABETALOL HCL.....	140	IODIPAMIDE.....	381
HYDROXY METHYL		LACTIC ACID.....	580	MEGLUMINE IOTHALMATE.....	381
NICOTINAMIDE.....	53	LACTOBACILLUS		MELPHALAN.....	320
HYDROXY PROPYL METHYL		SPOROGENES.....	102	MENADIOL SODIUM	
CELLULOSE 2% INJ. ....	548	LACTOBACILLUS.....	47	DIPHOSPHATE.....	85
HYDROXYPROGESTERONE		LACTULOSE.....	62	MENADIONE SODIUM	
CAPROATE.....	491	LANSOPRAZOLE.....	42	BISULPHITE.....	86
HYDROXYPROPYL METHYL		LEUCOVORIN CALCIUM.....	376	MENOTROPHIN.....	493
CELLULOSE.....	548	LEVAMISOLE.....	340	MENTHOL.....	566
HYDROXYZINE.....	255	LEVODOPA L		MEPACRINE.....	355
HYOSCYAMINE SUL-		DIHYDROXYPHENYL ALANINE.....	212	MEPHENESIN.....	439
PHATE.....	64	LEVONORGESTREL ETHINYL		MEPHENTERMINE.....	170
IBUPROFEN.....	452	ESTRADIOL.....	509	MEPYRAMINE	
IFOSFAMIDE.....	319	LEVONOROGESTREL.....	492	MALEATE.....	527
IMIPRAMINE HCL.....	238	LEVULOSE.....	59	MERCAPTOPYRINE.....	328



MESALAZINE.....	88	SULPHATHIAZOLE.....	23	PANTANIL.....	220
MESNA.....	321	NEOSTIGMINE (METHYL		PAPAIN.....	47
MESTEROLONE.....	493	SULPHATE).....	445	PARA AMINO BENZOIC ACID.....	564
METFORMIN.....	394	NICLOSAMIDE.....	342	PARA AMINO SALICYLIC ACID.....	368
METHDILAZINE HCL.....	187	NIFEDIPINE.....	124	PARACETAMOL.....	223
METHENAMINEMANDELATE.....	418	NIKETHAMIDE.....	535	PEFLOXACIN.....	305
METHOCARBAMOL.....	439	NIMESULIDE.....	459	PENFLURIDOL.....	245
METHOTREXATE.....	329	NIMODIPINE.....	146	PENICILLAMINE.....	105
METHOXSALIN.....	564	NITRAZEPAM.....	256	PENICILLINS.....	307
METHYL DOPA.....	149	NITRENDIPINE.....	127	PENTATHAL SODIUM-	
METHYL ERGONOVINE		NITROFURANTOIN.....	419	THIOPENTONE SODIUM.....	176
MALEATE.....	504	NITROGLYCERIN.....	133	PENTAZOCINE.....	221
METHYL HESPERIDIN.....	87	NITROUS OXIDE.....	175	PENTOXIFYLINE.....	165
METHYL NICOTINATE.....	566	NITROXAZEPINE HCL.....	241	PEPSIN.....	47
METHYL POLY-		NONOXYNOYL.....	498	PERINDOPRIL.....	144
SILOXANE.....	410	NONYL PHENORYPOLY		PERMETHRIN.....	559
METHYL SALICYLATE.....	566	ETHOXYETHANOL.....	499	PETHIDINE HCL.....	223
METHYLERGOMETRINE		NORETHISTERONE ACETATE.....	494	PHENAZOPYRIDINE.....	420
MALEATE.....	503	NORFLOXACIN.....	304	PHENFORMIN HCL.....	395
METHYLPREDNISOLONE		NORGESTREL.....	495	PHENINDIONE.....	75
ACETATE.....	402	NORGESTREL ETHINYL		PHENIRAMINE	
METOCLOPRAMIDE.....	205	ESTRADIOL.....	509	MALEATE.....	187
METOPROLOL.....	116	NORTRYPTILINE HCL.....	241	PHENOBARBITONE.....	198-257
METRONI-		NOSCAPINE.....	528	PHENOLPHTHALEIN.....	59
DAZOLE.....	16,513, 551	NYLIDRIN.....	165	PHENTOLAMINE.....	139
MEXILETINE.....	136	NYSTATIN.....	351-515	PHENYL BUTAZONE.....	461
MIANSERIN HCL.....	240	OCTINUM MUCTATE		PHENYL EPHRINE	
MICONAZOLE.....	350	AMIDOSULPHONATE.....	424	HCL.....	188-547, 549
MICONAZOLE NITRATE.....	514	OESTRADIOL.....	496	PHENYL PROPANOL AMINE	
MINOCYCLINE HCL.....	303	OESTRADIOL DIPROPIONATE.....	496	HCL.....	188-530
MINOXIDIL.....	184, 582	OIL OF SANDAL WOOD.....	420	PHENYTOIN SODIUM.....	196
MISULBAN.....	321	OMEPRazole.....	43	PHOLEDRINE	
MITOMYCIN-C.....	325	ONDANSETRON HCL.....	206	SULPHATE.....	170
MITOZANTRONE.....	330	ORAL ELECTROLYTES.....	433	PHTHALYL SULPHATHIAZOLE.....	23
MODIFIED GELATIN POLY		ORAL POLIO VACCINE.....	99	PILOCARPINE NITRATE.....	546
PEPTIDE.....	90	ORCIPRENALINE.....	520	PIMOZIDE.....	245
MORPHINE SULPHATE.....	221	ORPHENADRINE		PINDOLOL.....	118
MUCOPOLYSACCHARIDE		CITRATE.....	440	PIPENZOLATE	
POLYSULFATE.....	563	ORPHENADRINE HCL.....	213	METHYLBROMIDE.....	66
MUPIROCIN.....	554	OXAZEPAM.....	257	PIPERACILLIN.....	309
MUSTINE HCL.....	322	OXETHAZINE.....	15	PIPERAZINE CITRATE.....	342
N.BENZOLY SULFANILIMIDE.....	514	OXYMETHOLONE.....	385	PIPERCURONIUM BROMIDE.....	441
NALIDIXIC ACID.....	23-418	OXYPHENBUTAZONE.....	460	PIRACETAM.....	226
NALOCONE HCL.....	377	OXYPHENONIUM BROMIDE.....	44	PIRIBEDIL.....	217-227
NANDROLONE DECANOATE.....	384	OXYTETRACYCLINE.....	287	PIROXICAM.....	462
NANDROLONE PHENYL-		OXYTOCIN.....	505	PITOFENONE HCL.....	425
PROPIONATE.....	384,332	P. PIPERIDINOETHOXY		PODOPHYLLINE.....	560
NAPHAZOLINE		O.CARBOMETHOXY		POLICRESULEN.....	32
NITRATE.....	549	BENZOPHENONE HCL.....	425	POLYESTRADIOL.....	333
NAPROXEN.....	459	PANCREATIN.....	47	POLYMIXIN B	
NATAMYCIN.....	517	PANCURONIUM		SULPHATE.....	309
NEOMYCIN PHTHALYL		BROMIDE.....	411,423	POLYTHIAZIDE.....	414



POLYVINYL POLYMER SPRAY ..538  
 POTASSIUM CHLORIDE.....431  
 POTASSIUM CHLORIDE &  
 DEXTROSE .....431  
 POTASSIUM GUAICOL  
 SULPHONATE .....531  
 POVIDONE IODINE ..... 515-537  
 PRALIDOXIME  
 CHLORIDE.....378  
 PREDNISOLONE .....402  
 PREPARED ERGOT .....506  
 PRETHECAMIDE .....535  
 PRIMAQUINE  
 PHOSPHATE .....355  
 PRIMAXIN .....310  
 PRIMIDONE .....199  
 PROCAINAMIDE HCL.....137  
 PROCHLORPERAZINE 246,207  
 PROCYCLIDINE HCL.....214  
 PROGESTERONE.....497  
 PROGUANIL .....356  
 PROMAZINE HCL .....247  
 PROMETHAZINE HCL.....189  
 PROMETHAZINETHEOCLATE...208  
 PROPAFENONE HCL.....137  
 PROPANTHELINE ..... 67-35  
 PROPOFOL .....177  
 PROPRANOLOL .....119  
 PROPYLBUTAMIDE .....535  
 PROPYLIODONE .....381  
 PROTEIN  
 HYDROLYSATE .....374  
 PSEUDOEPHEDRINE  
 HCL .....531  
 PSORALEN .....565  
 PYRANTEL PAMOATE .....343  
 PYRAZINAMIDE .....368  
 PYRIDAZINE.....314  
 PYRIDINE ALDOXIME  
 METHIODIDE.....377  
 PYRIMETHAMINE.....356  
 PYRITINOL DIHYDRO  
 CHLORIDE MONOHYDRATE227  
 PYRVINIUM PAOATE .....343  
 QUINIDINE PHENYLETHYL  
 BARBITURATE .....138  
 QUINIDINE SULPHATE .....137  
 QUININE SULPHATE.....139  
 QUINIDOCHLOR .....362  
 RABIES VACCINE .....95  
 RAMIPRIL .....145  
 RANITIDINE.....37

RESERPINE .....150  
 RIBAVIRIN .....375  
 RIBOFLAVIN TETRABUTYRATE 110  
 RIFAMPICIN .....369  
 RINGER LACTATE SOLUTION...432  
 RITRODRINE HCL .....506  
 ROXOXACIN.....310  
 ROXITHYROMYCIN .....311  
 RUTIN .....88  
 SALBUTAMOL .....520  
 SALICYLIC ACID.....560  
 SALMETEROL  
 XINAFOATE..... 521,52  
 SANTONINE .....344  
 SECNIDAZOLF ..... 362-516  
 SELEGILINE HCL .....215  
 SENNOSIDES.....57  
 SERRATIO PEPTIDASE .....463  
 SILVER SULPHADIAZINE.....553  
 SILYMARIN.....56  
 SIMETHICONE .....10  
 SISOMYCIN .....311  
 SODIUM BICARBONATE .....8  
 SODIUM BICARBONATE  
 INJ .....432  
 SODIUM CHLORIDE.....433  
 SODIUM COLISTIN METHANE  
 SULFONATE .....294  
 SODIUM CROMO-  
 GLYCAT ..... 55-550  
 SODIUM HYALURO-  
 NATE.....550  
 SODIUM IODINE+MONOBACIS  
 CALPHOSPHATE .....550  
 SODIUM IOTHALMATE .....382  
 SODIUM LACTATE  
 INJ. I.P .....433  
 SODIUM VALPROATE.....199  
 SOLUBLE NEUTRAL INSULIN...387  
 SOMATOSTATIN .....88  
 SOTALOL HYDROCHLORIDE....120  
 SPARTAME SUCCHARINE...481  
 SPIRAMYCIN.....312  
 SPIRONOLACTONE .....414  
 STANOZOLOL .....386  
 STERILE MILK  
 PROTEIN .....103  
 STILBOESTROL .....334  
 STREPTOKINASE .....75  
 STREPTOMYCIN ..... 313-372  
 STREPTOMYCIN SULPHATE 23  
 SUCCINYL CHOLINE CL.....442

SUCRALFATE .....45  
 SULFADOXINE .....357  
 SULFAMOXOLE.....313  
 SULFISOXAZOLE .....313  
 SULPHA-SOMIDINE .....314  
 SULPHACETAMIDE.....514  
 SULPHADIAZINE .....313  
 SULPHADIMIDINE .....313  
 SULPHADOXINE.....313  
 SULPHAGUANIDINE .....313  
 SULPHAMERAZINE.....314  
 SULPHAMETHIZOLE.....421  
 SULPHAMETHOXAZOLE.....314  
 SULPHAMETHOZINE .....314  
 SULPHAMETHOZY PYRAZINE...314  
 SULPHAMETHOXY  
 PYRIDAZINE.....358  
 SULPHAPROXYLINE.....314  
 SULPHASALAZINE.....69  
 SULPHATHIAZOLE .....514  
 SULPHINETHOX  
 YPYRIDAZINE .....314  
 SULPHINYRAZONE.....167  
 SULPHOSUCCINATE .....59  
 SULPHONAMIDES.....313  
 SULPHUR.....551  
 TAMOXIFEN CITRATE .....334  
 TERBUTALINE  
 SULPHATE.....521  
 TERCONAZOLE.....516  
 TERFENADINE.....190  
 TESTOSTERONE PROPIONATE.497  
 TETANUS ANTITOXIN.....96  
 TETANUS TOXOID .....101  
 TETRA ETHYL THIURUM  
 DISULPHIDE .....229  
 TETRACYCLINE HCL.....288  
 TETRAMISOLE HCL .....344  
 THEOPHYLLINE.....523  
 THIAACETAZONE .....373  
 THIOPROPERAZINE.....248  
 THIOPROPERAZINE.....247  
 THIOTEP .....322  
 THYROGLOBULIN.....405  
 THYROXINE SODIUM .....406  
 TICLOPIDINE HCL.....77  
 TIMOLOL MALEATE.....546  
 TINIDAZOLE.....516  
 TISSUE PLASMINOGEN  
 ACTIVATOR .....168  
 TIZANIDINE HCL.....443  
 TOLBUTAMIDE .....395



TRAMODOL HCL .....	224
TRANS RETINOIC ACID .....	551
TRAZODONE HCL .....	251
TREPENE HYDRATE .....	531
TRETINOIN .....	551
TRIAMCINOLONE ACETONIDE .....	403-573
TRIAMTERENE .....	415, 156
TRICHOLINE CITRATE .....	53
TRICLOFOS SODIUM .....	258
TRIFLUOPERAZINE .....	248
TRIFLUOPERIDOL .....	250
TRIFLUOPROMAZINE HCL .....	249-208
TRIHENXYPHENIDYL HCL .....	215
TRIMEPRAZINE TARTRATE .....	191
TRIMETHADIONE .....	200
TRIMETHOPRIM .....	315
TRIMETHYL PSORALEN .....	565
TRIMIPRAMINE .....	243
TRIOXSALEN .....	565
TRIPROLIDINE HCL .....	192, 532
TRITHIO PARAMETHOXY PHENYLPROPENE .....	53
TROPICAMIDE .....	547
TUBERCULIN PURIFIED PROTEIN DERIVATIVE .....	382
TUBOCURARINE CHLORIDE .....	443
TYPHOID VACCINE .....	101
TYPHOID VACCINE ORAL .....	101
UROKINASE .....	78
URSODESIOXY CHLIC ACID .....	53
VALETHAMATE BROMIDE .....	444-507
VANCOMYCIN .....	317
VASOPRESSIN .....	416
VERAPAMIL .....	128
VINCISTINE .....	323
VITAMIN A .....	471
VITAMIN B COMPLEX .....	472
VITAMIN B12 .....	474
VITAMIN C .....	475
VITAMIN D .....	475
VITAMIN E .....	476
VITAMIN K .....	88
WARFARIN SIDIUM .....	79
XANTHINOL NICOTINATE .....	166
XIPAMIDE .....	155-416

XYLOCAINE .....	173
ZIDOVUDINE .....	375

### ALPHABETICAL INDEX

A C D SOLUTION A .....	72
A C D SOLUTION B .....	72
ABACT .....	289
ABACT INFUSION .....	289
ABDEC DROPS .....	478
ABDOGYL-N .....	17
ABDOGYL-N SUSP .....	17
ABORTIL .....	502
ABURIL .....	315
ABURIL SULP .....	315
ABZ .....	339
ABZ SUSP .....	339
ABZORB DUSTING POWDER .....	554
ACEMIZ .....	178
ACEMIZ SUSP .....	178
ACETEN .....	141
ACEZIDE .....	141
ACHROMYCIN .....	287
ACIDIN .....	9
ACIDIN-MPS .....	10
ACIDIN-MPS GEL .....	10
ACIGON .....	9
ACIGON SUSP .....	9
ACILOC .....	38
ACILOC INJECTION .....	38
ACIPEP .....	38
ACITROM .....	70
ACNESOL .....	551
ACNEX .....	551
ACREDIN .....	38
ACTIFED .....	192
ACTIFED PLUS/DM .....	192
ACTILYSE .....	168
ACTIMOL .....	461
ACTIMOL-F .....	453
ACTIMOL-F-SUSP .....	453
ACTRAPID .....	390
ACTRAPID-MC .....	390
ADALAT OROS .....	125
ADELPHANE .....	150
ADELPHANE-ESIDREX .....	150
ADHESIA .....	538
ADILOX .....	286
ADIV-1/2/3/4 .....	538
ADIVATE .....	569
ADRIAMYCIN .....	325
ADRIAM .....	325
ADROYD .....	386

ADVANTAC .....	38
ADVENE .....	38
AEROCORT INHALER .....	523
AEROSPORIN .....	310
AFLOX EYE/EAR DROPS .....	542
AGAROL .....	60
AIRYFEN .....	518
AIRYFEN SYRUP .....	518
ALBENDOL .....	339
ALBENDOL SUSP .....	339
ALBERCILIN .....	266
ALBERCILIN DROPS .....	266
ALBERCILIN INJ .....	266
ALBEZOLE .....	339
ALBEZOLE .....	339
ALBUCID .....	544
ALCEPHIN .....	282
ALCEPHIN DRY SYRUP .....	282
ALCIPRO .....	289
ALCIPRO I.V. .....	289
ALCOPAR .....	338
ALCIZON .....	277
ALDACTIDE .....	413
ALDACTONE .....	415
ALDARONE .....	135
ALDAY .....	180
ALDEZOLE I.V. .....	17
ALDIAGRAM .....	24
ALDIAMYCIN .....	17
ALERID .....	180
ALERZOLE .....	178
ALERZOLE SUSP .....	178
ALESTOL .....	178
ALEX COUGH FORMULA .....	189
ALEXIN .....	282
ALEXIN DRY SYRUP .....	282
ALFLOX .....	304
ALFLUCOZ .....	347-512
ALFUMET .....	17
ALGIRIL TABS .....	461
ALKACITATE .....	411
ALKALISER .....	413
ALKANIL .....	413
ALKANIL INGA SYRUP .....	410
ALKANIL-P SYRUP .....	411
ALKASOL .....	411
ALKERAN .....	321
ALLERGAM .....	94
ALLERGAM INJ .....	94
ALLERZINE .....	180
ALLUJEL DF .....	11
ALMACARB .....	11



ALMAGEL.....	11
ALMINTH.....	339
ALOTEN.....	112
ALPHADINE.....	552
ALPHADINE	
MOUTHWASH.....	541
ALPHADINE OINT.....	552
ALPHADINE POWDERS.....	552
ALPHADINE SCRUB.....	537
ALPHADINE SOLUTION.....	552
ALPHADINE VAGINAL.....	575
ALPHADOPA.....	149
ALPRAX.....	230
ALSPORIN.....	282
ALTHROCIN.....	297
ALTHROCIN	
CHEWABLE.....	297
ALTHROCIN FORTE LIQUID.....	297
ALTHROCIN LIQUID.....	297
ALTHROCIN PEAD	
DROPS.....	297
ALUCINOL.....	11
ALUCINOL SUSP.....	11
ALUDROX.....	9
ALUDROX GEL.....	9
ALUDROX-MH.....	9
ALUDROX-MH GEL.....	9
ALUPENT.....	523
ALUPENT SYRUP.....	523
ALUPROGEL FORT SUSP/TABS	
.....	11
ALUPROMATE TABS.....	45
ALUPROMATE TABS.....	45
ALUPROMATE-D TABS.....	45
ALZAD.....	339
ALZAD SUSP.....	339
ALZOLAM.....	230
ALZOMAX.....	230
ALZOPAX.....	230
AMANTREL.....	210
AMBISTRYN-S.....	273
MBROX.....	260
AMCARD.....	146
AMCLOX.....	266
AMCLOX INJ.....	266
AMDEPIN.....	146
AMEBIS FORTE.....	21
AMIBACTIN-BD.....	21
AMIBEX NA.....	24
AMIBEX NA SYRUP.....	24
AMIBIOTIC INJ.....	
500/250/100.....	259

AMICIN.....	259
AMICLINE.....	24
AMICLINE PLUS.....	24
AMID.....	363-516
AMIFRU-40.....	412-15,153
AMIKACIN INJ.....	259
AMILINE.....	233
AMIMIDE.....	151
AMINOCORE-5S.....	480
AMINODRIP.....	479
AMINOZYME.....	47-470
AMINOZYME TABS.....	47-470
AMIRON.....	259
AMITONE.....	233
AMITROL.....	233-252
AMITROL-DS.....	233-253
AMIXIDE.....	233-253
AMIXIDE-5.....	253
AMIXIDE-H.....	233
AMIXIDE-S.....	233
AMLODAC.....	146
AMLOGARD.....	146
AMLOPIN.....	146
AMOKID.....	260
AMONATE.....	260
AMOTID.....	260
AMOTID BR.....	260
AMOXIL.....	260
AMOXIVAN.....	260
AMOXIVAN DRY SYRUP.....	260
AMOXYBID.....	260
AMOXYBID DRY SYRUP.....	261
AMOXYCILLIN CAPS.....	261
AMPICILLIN.....	266
AMPIDIL.....	266
AMPIDIL SYRUP.....	266
AMPIKENT.....	266
AMPILIN.....	266
AMPILIN DRY SYRUP.....	266
AMPILIN INJ.....	266
AMPILIN KID TABS.....	266
AMPILOX.....	267
AMPILOX DRY SYRUP.....	267
AMPILOX DS INJ.....	267
AMPILOX INJ.....	267
AMPILOX KID TAB.....	267
AMPILOX NEONATAL	
INJ.....	267
AMPILOX PAEDIATRIC	
INJ.....	267
AMPIPEN.....	267
AMPIPEN DRY POWDER.....	267

AMPISYN.....	267
AMPISYN CAPS.....	267
AMPISYN SYRUP.....	267
AMPITUM.....	267
AMPITUM 750 INJ.....	267
AMPLUS.....	267
AMPLUS INJ.....	267
AMPOXIN.....	267
AMPOXIN 250/500/IG INJ.....	267
AMPOXIN DRY SYRUP.....	267
AMPREZ-5/10.....	146
ANADAX.....	220-447
ANAEELL CREAM.....	552
ANAFEBRIN.....	244
ANAFORTAN.....	37
ANAFORTAN INJ.....	37
ANAFRANIL.....	235
ANATENSOL.....	244
ANATENSOL INJ.....	244
ANAWIN HEAVY.....	169
ANAWIN INJ.....	171
ANDRACTIM.....	487
ANEKET INJ 50/10.....	176
ANEMIDOX.....	466
ANESTHAL.....	177
ANEUDOX 12 TABS.....	472
ANEUDOX-12 INJ.....	472
ANGIBLOC.....	125
ANGIBLOC RETARD.....	125
ANGICOR.....	132
ANGIGAURD.....	146
ANGIOGRAFIN 65%.....	381
ANGIOPRIL.....	141
ANGISED.....	133
ANGISPAN SR.....	133
ANGISPAN TR.....	133
ANGITOL.....	112
ANGITOL PLUS.....	112
ANGITRIT.....	132
ANGIZEM.....	122
ANGYL.....	17
ANIN.....	482
ANIN INJ.....	491
ANOVTE.....	30
ANOVATE OINT.....	30
ANQUIN.....	304
ANTADICT.....	229
ANTIBIOTICS.....	267
ANTIDEP.....	239
ANTIPAR WITH	
LAXATIVE.....	342
ANTISNAKE VENOM	



POLYVALENT INJ.....91, 92	EXPECTORANT.....524	BACTRIM I.M./I.V. INJ.....316
ANTRENYL.....45	ASTHALIN INHALER.....524	BACTROBAN.....554
ANTRENYL DUPLEX.....45	ASTYER.....466	BANOCIDE.....337
ANTRIMA.....316	ASTYFER LIQUID.....466	BANOCIDE PAED SYRUP.....337
ANXIPAR.....231	ASTYMIN C DROPS.....478	BANOCIDE SYRUP.....337
ANXIT.....230	ASTYMIN FORTE.....478	BARALGAN.....423-425
ANXOL.....253	ASTYMIN LIQUID.....478	BARALGAN INJ.....423
ANXOL INJ.....253	ASTYMIN-3.....480	BARDASE.....65
ANXYL.....230	ATARAX DROPS.....255	BASITON FORTE.....478
APITAMINE LIQUID.....465	ATARAX INJ.....255	BASOQUIN SUSP.....353
APYRIN.....223	ATARAX SYRUP.....255	BATRAFEN.....510
AQUAMIDE.....412, 158, 415	ATARAX TABS.....255	BATRAFEN CREAM.....554
AQUAMIN.....478	ATCARDIL.....112	BATRAFEN SOLN.....555
AQUAPLAT.....331	ATECARD.....150, 112	BAXIN.....268
AQUASOL A CAPS.....472	ATECARD-D.....152, 112	BAXIN INJ.....268
AQUASOL A	ATECOR.....112	BAXIN SYRUP.....268
PARENTAL.....472	ATELOL.....156	BAYCIP.....289
AQUAVIRON.....498	ATELOL-D.....158	BAYCORT.....567
ARDUAN.....442	ATEN.....112	BD-ROX.....311
ARFLUR.....452	ATEN-75.....112	BEC NM CREAM.....568
ARGENEX CREAM.....552	ATENEX 25/50/100.....112	BEC-FORTE CREAM.....567
ARINAC.....453	ATENOVA.....112	BEC-N CREAM.....567
ARISTOCILLIN.....267	ATIVAN.....256	BECELAC.....472
ARISTOCILLIN INJ.....267	ATROPINE EYE OINT.....548	BECLATE.....567
ARISTOGLYL PLUS.....17	AUBRIL.....316	BECLATE AQUANASE.....540
ARJET SPRAY.....566	AUNATIV.....94	BECLATE FORTE.....567
ARKACIN.....259	AUTRIN.....466	BECLATE INHALER.....524
ALKAMIN.....148	AVACAN.....37	BECLATE NASAL SPRAY.....540
ARKAMIN-H.....148	AVIL 25/50.....188	BECLATE ROTACAPS.....397
ARLIDIN TABS/INJ.....165-83	AVIL EXPECTORANT.....188, 532	BECLOTRIM.....568
ARMIX TABS.....453	AVIL INJ.....188	BECMET.....568
AROVIT.....472	AVOMINE.....208	BECMET-N.....568
AROVIT DROPS.....472	AVON EXPECTORANT.....532	BECOPUS.....48
AROVIT INJ.....472	AZITHAL.....272	BECOSULES CAPS.....472
ARTHOZOLIN TABS.....461	AZIWOK.....272	BECOSULES SYRUP.....472
ASA 50 GR.....71	AZOLIN.....277	BEETAL.....198
ASCABIOL.....558	AZORAN.....336	BEETRION.....478
ASCORBIC ACID.....475	B-LACT CAP.....48	BEKAYCIN.....289
ASIDE.....327	B-LONG.....473	BELL HOMATROPINE.....548
ASMANIL.....523	B.A.L.INJECTION.....105	BELLADENAL-IN.....65
ASMAPAX DEPOT.....523	B.G.PROT.....473	BELLE CREAM.....552
ASMATIDE-BR.....523	BACIGYL TABS/SUSP.....17	BELL PINO-ATRIN.....548
ASMOTONE.....523	BACIPEN.....267	BENADRYL.....184
ASOMERIDE.....480	BACIPEN INJ.....268	BENADRYL COUGH FORMULA.....532
ASPASWEET.....481	BACITRAN DS TABS.....316	BENADRYL SYRUP.....184
ASPICOT.....71	BACITRAN SUSP.....316	BENALGIS.....472
ASTELONG.....178	BACTIGEN EYE/EAR.....542	BENDEX.....339
ASTELONG SUSP.....178	DROPS.....542	BENDEX SUSP.....339
ASTEM.....178	BACTOMET TABS/SUSP.....25	BENDOL TABS/SUSP.....339
ASTHAFEN.....518	BACTOMET 'C' TABS/	BENEURON.....472
ASTHALIN.....524	SUSP.....25	BENEURON FORTE.....472
ASTHALIN	BACTRIM DS.....316	BENICORT INJ.....398



BENICORT ORAL DROPS ....398	BETAMAP ORAL .....268	BIOCIP INFUSION.....289
BENICORT TABS.....398	BETAMIL ..... 555-568	BIOCIP TABS .....289
BENICORT-N EYE/EAR DROPS ..542	BETAMIL GM.....568	BIOCLOX .....294
BENSPAR .....213	BETANACTEN..... 113-125	BIOLCOX INJ .....294
BENYLET LOZENGES .....541	BETANASE.....392	BIODOXI .....296
BENYLIN LOZENGES .....541	BETANIF..... 113,125	BIOFLOXIN .....304
BENZO SCAB.....558	BETANOL .....113	BIOGARACIN .....299
BENZOCENOL	BETASPAN.....130	BIOMOX CAPS.....261
EMULSION .....555	BETASPORE .....282	BIOMOX DRY SYRUP .....261
BENZYDOL..... 210-250	BETASPORE DRY SYRUP.....282	BIOMOX PEAD DROPS.....261
BENZYDOL-15 .....250	BETATOPIC ..... 125,113, 568	BIOPARIN .....74
BENZYDOL-10 .....250	BETATROP ..... 125-113	BIOPENCE .....273
BENZYDOL-5 .....210	BETAVITE FORTE .....473	BIOPRIL.....143
BEPAMOL SYRUP.....223	BETEN .....113	BIOSPIRIN .....77
BEPAMOL TABS .....223	BETHADOXIN-12 .....473	BIOTAX .....279
BEPARINE.....561	BETHADOXIN-12 INJ .....473	BIOTREXATE.....329
BEPARINE CREAM .....74	BETNELAN.....398	BIOVITAL.....464
BEPARINE INJ .....74	BETNESOL.....398	BISTREPEN.....308
BEPLEX FORTE .....472	BETNESOL EYE/EAR.....542	BIVINAL FORTE WITH
BEPLEX FORTE ELIXIR.....473	BETNESOL INJ .....398	VIT C .....473
BEPLEX FORTE INJ .....473	BETNESOL ORAL	BLEOCIN .....324
BEPLEX INJ .....473	DROPS.....398	BLOCACID .....38
BERIN INJ.....473	BETNESOL-N NASAL	BLOSYN .....464
BERIN TABS .....473	DROPS.....540	BLOSYN LIQUID .....466
BERIRAB .....96	BETNOR EAR .....542	BLUCEF TABS.....282
BESTOPHEN-I.....453	BETNOVTE SCALP	BLUCEF-TM .....279
BESTOPIC.....568	APPLICATION.....569	BLUCILLIN INJ.....268
BESTOPLEX LIQUID .....473	BETNOVATE-N .....569	BLUCILLIN TABS .....268
BESTOZYME CAPS.....48	BETONIN .....473	BLUCLOX-250/500 INJ.....268
BESTOZYME PAED.....48	BETONIN .....473	BLUMOX 250/500 .....261
BESTOZYME SYRUP .....48	BEXOL .....216	BLUMOX BH.....261
BETA 50/100 .....113	BEZALIP .....106	BLUMOX BH DT 250/500 .....261
BETA BIDIURET .....113	BEZALIP RETARD.....106	BLUMOX-P .....261
BETA-BIDURET .....153	BI-MOTIC .....546	BOTROPACE .....84
BETA-NICARDIA.....125	BICEF.....282	BREN .....453
BETA-XIPAMID ..... 157,119	BICLOPEN CAPS.....268	BREN PX ..... 220-447
BETABLOC .....119	BICLOPEN INJ .....268	BREN SUSP .....453
BETACARD .....113	BID .....274	BRENFED .....453
BETACORTIL .....398	BID DRY SYRUP .....274	BRENLAX..... 438-453
BETADINE	BIDANZEN.....463	BREXIC.....462
MOUTHWASH.....541	BIDIURET ..... 413-151	BRICANYL.....524
BETADINE OINT .....552	BIDIURET-L.....151	BRICANYL DURULES .....524
BETADINE POWDER .....552	BIDLAX-5.....60	BRICANYL INHALER.....524
BETADINE SCRUB .....537	BIDOPAL .....213	BRICANYL SYRUP .....524
BETADINE SOLUTION .....537	BIDURET .....155	BRICAREX EXPECT-
BETADINE VAGINAL.....515	BILACTAM DRY SYRUP .....268	ORANT..... 524-532
BETADINE-AD.....537	BILACTAM FORTE .....268	BRICAREX TABS..... 524-532
BETAGEL .....568	BILAMIDE .....54	BRINALDIX..... 157-409
BETALOC .....117	BILIGRAFIN I.B. FORTE 50%381	BRINERDIN .....157
BETALOC DURULES .....117	BIOCILIN.....268	BRO-ZEDEX 4/8 .....532
BETALOC INJ .....117	BIOCILIN DRY SYRUP .....268	BROACIL .....268
BETAMAP.....268	BIOCILIN INJ.....268	BROACIL DRY SYRUP.....268



BROACIL INJ.....	268
BROADICILIN.....	268
BROADICLOX.....	269
BROM-INGA.....	211-484
BROMOLIN CAPS.....	261
BROMOLIN D.T.....	261
BROMOLIN SYRUP.....	261
BROMOXYL FORTE.....	261
BRONCOPHYL PLUS.....	524
BRONCORDIL ELIXIR.....	524
BRONCORDIL PLUS SYRUP.....	524
BRONCORDIL-P ELIXIR.....	524
BRONCORDIL-S TABS.....	524
BRONCORDIL-SD TABS.....	524
BRONCORDIL-XL.....	524
BRONKO PLUS FORTE.....	524
BRONKO SYRUP.....	532
BRONKOTAB-4 EX.....	524
BRONOLAX.....	532
BRONTALINE.....	524
BROXYNOL.....	532
BRUDESIC.....	453
BRUFEN.....	453
BRUFEN JUNIOR SYRUP.....	453
BUCTOCIN.....	501
BUMET.....	408
BUSACTIL.....	231
BUSCALM.....	231
BUSCOPAN.....	65
BUSCOPAN INJ.....	65
BUSON.....	231
BUSPIDAC.....	231
BUSPIN.....	231
BUTA PROXYVON.....	220-461
BUTADEX.....	461
C P D SOLUTION.....	72
C-FLOX EYE DROPS.....	544
C-FLOX INJ.....	289
C-FLOX TABS.....	289
C.K.P. TABS.....	86
CADIPHYLATE.....	525
CADIPHYLATE ELIXIR.....	525
CADISPER C.....	85, 87
CALADRYL CREAM.....	567
CALADRYL SOTION.....	567
CALAPTIN.....	129
CALAPTIN 120/240 SR.....	129
CALAPTIN INJ.....	129
CALBETA.....	113, 125
CALBLOC.....	125
CALBLOC RETARD.....	125

CALCIGARD.....	125
CALCIGARD RETARD.....	125
CALCILUVIN.....	186
CALCILUVIN SYRUP.....	186
CALCIROL.....	476
CALMCOLD SUSP.....	189
CALMOCOLD TABS/ CAPS.....	189
CALMESE.....	256
CALMESE INJ.....	256
CALMOD.....	254
CALMPOSE.....	254
CALMPOSE INJ.....	254
CALMPOSE SUSP.....	254
CALPRO SYRUP.....	470
CALPRO ZE CAPS.....	486
CALRON.....	478
CAMOQUIN.....	353
CAMPICILLIN.....	269
CAMPICILLIN DRY SYRUP.....	269
CAMPICILLIN INJ.....	269
CAMRELEASE-TR.....	254
CANCRIPT.....	347
CANDIBIOTIC.....	542
CANDID.....	555
CANDID B LOTION.....	555
CANDID EAR DROPS.....	542
CANDID LOTION.....	555
CANDID MOUTH PAINT.....	541
CANDID POWDER.....	555
CANDID TV SUSP.....	555
CANDID V GEL.....	345-511
CANDID V6/V3/V1.....	511
VANDID-B.....	555
CANDIDERMA.....	555
CANDINIL-100.....	511
CANDISTAT.....	555
CANESTEN SOLN.....	555
CANESTEN VAGINAL.....	511, 345
CANESTIN-8/3/1 VAGINAL.....	511
CAPNIF.....	125
CAPOTRIL.....	141
CAPOTRIL-H.....	141
CAPROSTAT INJ.....	81
CAPSIDOL.....	566
CAPSOVIT CAPS.....	466
CAPTOTRIL-H.....	155
CARAC SOL EYE DROPS.....	550
CARBADAC 200.....	194

CARBAMYL FORTE TABS.....	337
CARBAMYL SYRUP.....	337
CARBATOL.....	194
CARBOMOX.....	261
CARDACE.....	145
CARDICAP-TR.....	132
CARDIF.....	128
CARDIF BETA.....	128
CARDILATE.....	130
CARDIOLONG.....	120
CARDIOXIN TABS.....	159
CARDIPIN.....	126
CARDIPIN RETARD.....	126
CARDIWELL PLUS.....	73
CARDULES.....	71
CARDULES PLUS.....	113
CARDULES PLUS 10/20.....	113
CARDULES RETARD.....	126
CARISOMA.....	437
CARISOMA COMPOUND.....	437
CARMAZ 100/200.....	194
CARMICIDE.....	48
CARMICIDE ADULT.....	48
CARMINOL LIQ.....	432
CARMIPHOS SYRUP.....	465
CARMIPLES SYRUP.....	473-478
CARMIZYME SYRUP.....	48
CARMIZYME-A.....	49
CARPO-MIOTIC.....	546
CATAPRES.....	156
CATAPRES DIU.....	409, 152
CATAZYME SYRUP.....	49
CATENOL.....	113
CATILAN.....	286
CATOXYMAG-O GEL.....	15
CEBION.....	475
CEBION DROPS.....	475
CEBRAN EYE DROPS.....	544
CEBRAN INFUSION.....	289
CEBRAN-250/500.....	289
CEDROX.....	274
CEDROX DRY SYRUP.....	274
CEFADUR.....	274
CEFADUR DT.....	284
CEFADUR SUSP.....	274
CEFAMAX.....	282
CEFAMAX DRY SYRUP.....	282
CEFAMAX PAED DROPS.....	282
CEFAMEZIN.....	278
CEFATOX-1GM.....	279
CEFATOX-250.....	279



CEFA CAPS.....	282	CHLORANTON PLUS		CIPROFLOX INFUSION.....	290
CEFAX SYRUP.....	282	TABS.....	532	CIPROFLOXACIN TABS.....	290
CEFAXONE I.M./I.V.....	276	CHLORANTON TABS.....	532	CIPROGLEN.....	290
CEFAZID.....	276	CHLORANTON-S.....	532	CIPROLET.....	290
CEFF.....	283	CHLORFORMIN.....	391-396	CIPROLET INFUSION.....	290
CEFF DRY SYRUP.....	283	CHILOROMET 500.....	354	CIPROMYCETINE.....	291
CEFF KID TABS.....	283	CHLOROMET SYRUP.....	354	CIPROQUIN.....	291
CEFF 250 D.S.....	283	CHLOROMYCETIN.....	286	CIPROSOL.....	291
CEFIZIX.....	281	CHLOROMYCETIN EAR DROPS.....	543	CIPROSOL INFUSION.....	291
CEFOGEN.....	280	CHLOROMYCETIN I.M.....	286	CIPROVA.....	291
CEFSPAN.....	275	CHLOROMYCETIN SUCCINATE		CIPROWIN.....	291
CEFTEX INJ.....	279	INJ.....	286	CIPROWIN INFUSION.....	291
CEFTROX INJ.....	276	CHLOROMYCETIN SUSP.....	286	CIPROXAN I.V. INJ.....	291
CEFTUM.....	280	CHORIOMON.....	483	CISADE.....	57
CELESTONE.....	398	CHROMERGEN TABS.....	504	CISADE MPS.....	57
CELESTONE INJ.....	399	CHROMOSTAT INJ.....	89-80	CISANORM.....	57
CELESTONE PEDIATRIC		CHROMOSTAT TABS.....	89-80	CISAPID.....	57
DROPS.....	398	CIDAL.....	316	CISAPID-MPS.....	57
CELIN.....	475	CIDOMEX.....	261	CISAPID-MPS SUSP.....	57
CELLOGNOST HBsAg.....	97	CIDOMEX DRY SYRUP.....	261	CISAPRO TABS/SUSP.....	57
CELLUBRIL.....	60	CIDORESP 250/500.....	261	CISPEL.....	57
CENOLCID GEL.....	11	CIFOMED.....	289	CISPEL SUSP.....	57
CENOLFERRUM SYRUP.....	478	CIFRAN.....	290	CISPLATIN.....	331
CENOLGIN SYRUP.....	223-218	CIFRAN INFUSION.....	290	CISTOBIL TAB.....	380
CENOLPLEX.....	466	CILAMIN-250.....	105	CISTOBIL TABS.....	380
CENOLPRIM.....	316	CILFER 12F ORAL.....	466	CITAL.....	411
CENOLPRO POWDER.....	470	CINARYL DROPS.....	188	CITRALKA LIQUID.....	411
CENOLQUINE SYRUP.....	354	CINARYL LIQUID.....	188	CITRAVITE.....	475
CENTRON.....	508	CINARYL TABS.....	188	CITRAZAN.....	180
CEPHADIL.....	283	CENEPAR.....	222	CIZA.....	57
CEPHALKEM.....	283	CINICILLIN.....	269	CIZA MPS.....	57
CEPHALKEM DRY		CINICILLIN INJ.....	269	CAZA SUSP.....	57
SYRUP.....	283	CINTIGO.....	161,202	CIZA-5.....	57
CEPHAXIN.....	283	CINZAN.....	161,202	CLACIN.....	269-294
CEPHAXIN DRY SYRUP.....	283	CINZAN 75MG.....	202	CLACIN INJ.....	294
CEPHAXIN INJ.....	283	CIPAD.....	290	CLAFORAN.....	279
CEPORAN.....	285	CIPIC-250.500.....	290	CLAMP CAPSULES.....	269
CERECETAM.....	227	CIPLACTIN.....	182-465	CLARIBID.....	293
CERELOID.....	226	CIPLACTIN TABS.....	182-465	CLAVIUNATE.....	261
CERVIPRIME.....	501	CIPLAR.....	120	CLENDAL.....	162
CESPOR DRY SYRUP.....	283	CIPLAR-H.....	120,155	CLINDAC-A.....	552
CETIRIZ.....	180	CIPLIN.....	316	CLINIUM.....	118
CETRIZET.....	180	CIPLOX.....	290	CLISTIN EXPECTORANT.....	532
CETZINE.....	180	CIPLOX I.V. INFUSION.....	290	CLO-KIT.....	354
CETZINE SYRUP.....	180	CIPRIL.....	143	CLOBEN.....	555
CEZIN, CEZIN SYRUP.....	180	CIPROBID.....	290	CLOBENATE.....	569
CEZOLIN.....	278	CIPROBID I.V.....	290	CLOBEQUAD.....	555-570
CFX.....	289	CIPROBID INFUSION.....	29	CLOBETAMIL.....	570
CHANNEL.....	122	CIPROBID TABS.....	29	CLOBETAMIL-H.....	555
CHESTON		CIPRODAC.....	290	CLOBETAVATE.....	570
EXPECTORANT.....	532	CIPRODAC INFUSION.....	290	CLOBETOL.....	570
CHLORAMPHENICOL.....	385	CIPROFLOX.....	290	CLOFERT.....	485



CLOFODAP .....	352	CONVIRON-TR .....	466	CYCLOGIC EYE DROPS .....	548
CLOFOZINE .....	352	COMPAMIDE .....	391	CYCLOMINOL .....	34
CLOFRANIL .....	235	COPEN .....	269	CYCLOPAM DROPS .....	34
CLOMIFRIL .....	235	CORARONE .....	135	CYCLOPAM INJ .....	423, 34
CLOMIN .....	423	CORBETA .....	120	CYCLOPAM SUSP .....	423, 34
CLOMIN DROPS .....	423	CORBETAZINE .....	163, 120	CYCLOPAM TABS .....	34, 423
CLOMITROP .....	485	CORBUTYL .....	220-447	CYCLORINE .....	364
CLOMOZIL .....	235	CORDARONE .....	133	CYCLOSERINE .....	364
CLOMYCIN CREAM .....	555	CONRDARONE X I.V. ....	135	CYCLOSPASMOL .....	162
CLONIL .....	235	CORDARONE-X .....	135	CYCLOVIR .....	374
CLONOTRIL .....	196	COREX .....	533	CYCLOVIR CREAM .....	560
CLOQUIN .....	354	CORFLAM .....	453	CYCLOVIR OINT .....	374
CLOSTAGEN CREAM .....	570	CORFLAM PAED SUSP .....	453	CYCLOXAN INJ .....	318
CLOTHALTON .....	150, 409, 148	CORGEN EYE/EAR		CYCLOXAN TABS .....	319
CLOXACILLIN INJ .....	294	DROPS .....	543	CYDINE .....	182-465
COBADERX FORTE .....	473	CORICIDIN-F .....	189-533	CYNOMYCIN-50/100 .....	303
COBEDERM-H .....	346	CORION 1000 IU .....	483	CYP-L .....	465
CODINOL SYRUP .....	532	CORMELIAN .....	121	CYPON CAPS .....	465
COFAMOL SUSP .....	223	CORT-S .....	401	CYPON SYRUP .....	465
COLDIFF .....	525	CORTIL .....	399	CYPROWAL .....	182-465
COLIMEX DROPS .....	34	CORTILATE .....	555	CYTARABINE KOREA .....	326
COLIMEX TABS .....	423, 34	CORTILATE-N .....	555	CYTOCRISTIN AQUEOUS .....	323
COLIZOLE .....	316	CORTO QUINOL .....	572	CYTRABIN .....	326
COLLOSOL IODINE		CORTOLA-m .....	544	D-ALER .....	181
ORAL .....	405	COSAVIL .....	533	DABCILOX .....	269
COLOSPA .....	66	COSCOPIAN BR .....	533	DAIVONEX .....	564
COLSIPAN .....	572	COSCOPIAN LINCTUS .....	533	DAKTACORT GEL .....	555
COLSIPAN-N .....	572	COSOME .....	189-533	DAKTARIN .....	555
COLSPRIN .....	446	COSTINI .....	517	DAKTAXORT GEL .....	572
COLSPRIN 100/325 .....	446	COSULF-DS .....	316	DAMOXY DRY SYRUP .....	261
COMANTRIN .....	343	COSYP .....	525	DAMOXY PAED DROPS .....	261
COMBIDOL .....	216-251	COTARYL .....	560	DANEMOX FORTE .....	262
COMBIDOL 1.5 .....	216	COVERSYL .....	144	DANEMOX-KID .....	262
COMBIDOL-5/10 .....	216	COXCIDE INH .....	370	DANOGEN .....	486
COMBIFLAM TABS .....	453	COXRID .....	367	DANOL .....	392-486
COMBIGESIC .....	447-461	COZY PLUS .....	525	DAONIL .....	392
COMBUNEX .....	365	CREMAFFIN .....	60	DAPSONE .....	352
COMBUTOL .....	365	CREMAFFIN PINK .....	60	DARAPRIM .....	357
COMPAIN TABS .....	218	CREMAFFIN-FS .....	60	DARDANT .....	539
COMPEBA .....	513	CROCIN IBU .....	453	DASLIN .....	525
COMPLAMINA .....	167	CROMAL-5 INHALER .....	519	DBI .....	396
COMPLAMINA RETARD .....	167	CROTORAX .....	555	DBIOTD .....	396
COMPLAMINA TAB .....	167	CROTORAX LOTION .....	555	DE-NOL .....	46
COMSAT .....	316	CROYDOXIN FM .....	358	DEBORIN SKIN .....	560
COMYCIN SYRUP .....	373	CRYSTAPEN V TABS .....	308	DECA-NEUROPHEN INJ .....	384
CONCOR .....	116	CTM CREAM/LOTION .....	555	DECA DURABOLIN .....	333-384
CONFLOX .....	291	CUPRIMINE .....	105	DECA NEURABOL .....	384
CONRAY-280/420 INJ .....	382, 381	CURAMOL .....	525	DECDAN INJ .....	400
CONSEC .....	38	CUT/CUTI-N .....	571	DECDAN N EYE/EAR DROP .....	543
CONTACT-CC .....	189	CUTISTAT-G .....	570	DECDAN TABS .....	400
CONTRAMAL .....	225	CYBAN 0.5% LOTION .....	562	DECLOT .....	74
CONVERTEN .....	142	CYCLASYN .....	162	DECON NASA DROPS .....	540



DEFERON LIQUID .....	467	DESENT .....	539-541	DICLOGESIC .....	449
DEHYDROEMETINE .....	359	DESFERAL .....	104	DICLOMAX .....	449
DELAMIN .....	262	DETTOLIN .....	539-541	DICLOMAX GEL .....	449
DELAMIN DIS TABS .....	262	DEWORMIS50/150 .....	340	DICLOMAX INJ .....	449
DELAMIN ORAL SUSP .....	262	DEXONAEYE/EAR .....	543	DICLOMOL GEL .....	449
DELETUS TABS .....	192	DEXONAINJ .....	400	DICLOMOL INJ .....	449
DELETUS-A .....	525-533	DEXONA ORAL DROPS .....	400	DICLOMOL TABS .....	449
DELETUS-D .....	192	DEXONA TABS .....	400	DICLOMOL-SR TABS .....	449
Delfen .....	499	DEXORANGE PLUS CAPS .....	467	DICLONAC .....	449
DELPHICOL .....	54	DEXOSYN-C .....	544	DICLOTAL D.T. ....	449
DELTACORTIL .....	403	DEXTRAN 70 .....	428	DI CLOTAL-CR .....	449
DEMBUTOL 200/400/800 .....	365	DEXTROLYTE-G .....	429	DICOFEN-50 .....	449
DEMOLOX 50/100 .....	234	DEXTROSE 5% & SODIUM		DICRYSTICIN-S FORTE .....	308
DENTAL .....	539	CHLORIDE 0.2,0.33,0.45,9% .....	429	DICYNENE .....	83
DENTICIDE MOUTH		DEXTROSE INJ 2.5%/5%/10%/20		DICYNENE INJECTION .....	83
WASH .....	539	.....	428	DIENOSTROL .....	487
DENTICURE PAINT .....	539	DEYPLES CAPS .....	473	DIETMANN .....	481
DEPENDAL-M .....	17	DHE .....	169	DIFEN GEL .....	449
DEPICOR .....	126	DI-CALCII-PLEX .....	478	DIFEN INJ .....	449
DEPICOR SR .....	126	DIABEND .....	393	DIFEN-SR .....	449
DEPIDOL .....	251	DIABINESE .....	391	DIFISAL .....	449
DEPIDOL DROPS .....	251	DIACILLIN DRY SYRUP .....	269	DIGEPLEX .....	49
DEPIDOL L.A. ....	251	DIACILLIN PEAD DROPS .....	269	DIGEPLEX DROPS .....	49
DEPIN .....	126	DIACILLIN PLUS .....	270	DIGOX .....	159
DEPLIN CAPS .....	269	DIAFLOX .....	21	DIGOXIN PAED ELIXIR .....	159
DEPLIN DROPS .....	269	DIALOX .....	21	DIHYDERGOT .....	169
DEPLIN SYRUP .....	269	DIAMOX .....	193-547	DILANTIN SUSP .....	196
DEPNON .....	240	DIAPHAGE .....	395	DILCAL .....	122
DEPO MEDROL .....	402	DIARLOP .....	29	DILCAL SR .....	122
DEPO-PROVERA .....	495	DIARLOP PLUS .....	29	DILCARDIA SR 90 .....	123
DEPRANIL .....	239	DIARLOP PLUS SUSP .....	29	DILCONTIN .....	123
DEPRANIL PLUS .....	239	DIASTIG INJ .....	445	DILGARD .....	123
DEPRYL-25/50/100 .....	252	DIABACT CREAM .....	552	DILGINA .....	123
DEPSOL .....	239	DIBETA .....	113,149,155	DILIGAN .....	205
DEPSOL FORTE .....	239	DIC INJ .....	448	DILITISYN .....	123
DEPSOL PLUS .....	239	DIC TOP GEL .....	448	DIOSYN	
DEPSONIL .....	239	DIC-FA .....	448	EXPECTORANT .....	533
DEPSONIL-DZ .....	239	DIC-SR .....	448	DIOSYN TABS/SYRUP .....	187
DEPSONIL-DZ FORTE .....	239	DICALCII-PLUX .....	478	DILOTOL .....	123
DEPSONIL-PM .....	239	DICARB INGA MITIS .....	337	DILTIME SR .....	123
DEPTEN .....	126,114	DICARB INGA TAB .....	337	DILZEM .....	123
DEQUADIN LOZENGES .....	541	DICARB-50/100/150 .....	338	DILZEM INJ .....	124
DEQUADIN PAINT .....	541	DICARD .....	123	DILZEM-SR .....	124
DERIPHYLLIN .....	525	DICARD SR .....	123	DIMIRIL .....	184
DERIPHYLLIN RETARD .....	525	DICICYCLINE .....	287	DIMOL .....	11
DERIPHYLLIN SYRUP .....	525	DICIMOX .....	262	DIMOL SUSP .....	11
DERIPHYLLIN TABS .....	525	DICIMOX KID .....	262	DINDEVAN .....	75
DERMICORT .....	568	DICIPRIM .....	316	DINITE SUSP .....	17
DERMILITE II .....	538	DICLOFAM TABS/INJ .....	448	DIONOSIL .....	382
DERMOQUINOL .....	559	DICLOFEN INJ .....	448	DIOVOL FORTE DGL .....	11
DEROBIN HC .....	573	DICLOFEN MR .....	448	DIOVOL FORTE TABS/	
DEROMONORM TABS .....	348	DICLOFENAC SOD. INJ .....	448	SUSP .....	12



DIPRORM .....	568	DOXY-24 .....	296	EBEXID .....	478
DIPGENTA .....	568	DOXYPAL .....	296	ECANOL VIGINAL .....	346
DIPHThERIA ANTITOXIN .....	92	DOXYTERA CAPS .....	296	ECANOL .....	346
DIPLNE .....	568	DRAMAMINE .....	203	ECLOSPAN .....	568
DIPOSOL .....	410	DRAMAMINE LIQUID .....	203	ECODAX-G .....	346-568
DIPROMOL .....	449	DRISTAN NASAL DROPS .....	540	ECOPROT PLUS .....	470
DIPROVATE .....	568	DROGENIL .....	319	EFCINOL PLUS CREAM .....	571
DIPROVATE LOTION .....	568	DROSYN EYE DROPS .....	550,548	EFCORLIN INJ .....	401
DIPROVATE RD .....	568	DROXIBID .....	274	EFCORLIN NASAL	
DIPROVATE-MF .....	568	DROXYL .....	274	DROPS .....	540
DIPSALIC LOTION .....	568	DROXYL SUSP .....	274	EFCORLIN PELLETES .....	401
DISILOX MPS .....	12	DTM .....	124	EKON-D.T. ....	180
DISILOX MPS SUSP .....	12	DUALTACK .....	316	ELCION CR .....	254
DISOGEL TABS/SUSP .....	12	DUALTACK SUSP .....	316	ELCLOX .....	270
DISPEPTAL .....	49	DUBLACTIN-MR .....	438	ELCLOX INJ .....	270
DISPIRIN C V 100 .....	71	DUBOGEN .....	494	ELDEPRYL .....	215
DISPRIN .....	446	DULCOLAX .....	60	ELDERM CREAM .....	555
DISTENIL .....	12	DUOCLOX .....	270	ELDERVIT CAPS .....	473
DISULFIRAM .....	229	DUOCLOX DRY SYRUP .....	270	ELDERVIT-12 .....	474
DIUOCONTIN-K CONTINUOUS .....	412	DUOCLOX INJ .....	270	ELECTRAL .....	433
DIZEP .....	254	DUOCLOX-250 .....	270	ELEGELIN .....	215
DIZEP-P INJ .....	254	DUODIL .....	438	ELIWEL .....	233
DIZIRON .....	161-202	DUOFLAM .....	453	ELOCON OINT .....	559
DIZYTONE .....	148	DUOFLAM GEL .....	449	ELSOMA .....	473
DOBUCIN .....	160	DUOLUTON-L .....	490-492-496	ELSORBIN .....	54
DOBURAN INJ .....	160	DUPHALAC .....	60	ELTOCIN .....	297
DOBUTREX .....	160	DUPHASTON .....	488	ELTOCIN LIQUID .....	298
DOCABOLIN .....	333-383-385	DURABOLIN .....	333-385	ELTOSIN SUSP .....	297
DOFLEX .....	449	DURACYCLIN .....	296	ELTROXIN .....	406
DOLAC .....	457	DUVADILAN .....	164-502	ELUCIN .....	298
DOLONEX .....	462	DUVADILAN INJ .....	164-502	ELUCIN SUSP .....	298
DOLONEX I.M. ....	463	DUVADILAN		EMBOKINASE .....	76
DOLOPAR .....	218	RETARD .....	164-503	EMBRU .....	453
DOLOPAR SYRUP .....	218	DWANEX .....	238	EMDICILLIN .....	270
DOMPERON .....	203	DYMIC .....	222-223	EMDICILLIN DRY	
DOMPERON DROPS .....	203	DYNACAL .....	73	SYRUP .....	270
DOMSTAL .....	203	DYNACARD .....	73	EMDICLOX CAPS .....	270
DOMSTAL SUSP .....	204	DYNACREPE .....	538	EMDIL .....	124
DOPAGYT .....	149	DYNAPAR .....	449	EMDOPA .....	149
DOPAMET .....	149	DYNAPAR-EC .....	449	EMENIL .....	205
DOPAMINE HCL INJ .....	160	DYNAPLAST .....	538	EMESET .....	207
DOPAMYL .....	296	DYNASPIRIN ENCO TAB .....	71	EMESET INJ .....	207
DOPINGA ING .....	160	DYSFUR-M .....	17	EMETIL .....	216
DORFEX .....	453	DYSFUR-M SUSP .....	17	EMETIL DS .....	216-242
DORMIN-5/10 .....	256	DYSKINON .....	211	EMIETIL PLUS .....	216-242
DOXAPRAM .....	534	DYSKINON INJ .....	211	EMFLAM .....	453
DOXETAR .....	237	DYSMEN .....	34-458	EMFLOX-400 .....	304
DOXETAR FORTE .....	237	DYSMEN FORTE .....	458	EMIDOXYN .....	207-246
DOXORUBUCIN .....	325	DYSMEN INJ .....	34	EMQUIN .....	354
DOXORUBUCIN MEIJI .....	325	E-MYCIN .....	298	EMQUIN DS-TABS .....	354
DOXT .....	296	E-MYCIN DRY SYRUP .....	298	EMTHROCIN .....	298
DOXY-1 .....	296	E-PRIN .....	71-446	EN-ACE .....	142



EN-ACE-D.....	142	EPITOL SYRUP.....	194	ETOSID.....	327
ENAM.....	142	EPICELIN.....	281	ETOSID CAPS.....	327
ENAMATE.....	142	EPSOLIN.....	196	EUCARD.....	114
ENAPRIL.....	142	EPSOLIN INJ.....	196	EUDYNA.....	552
ENAPRIL LD.....	142	EPTOIN.....	197	EUGLUCON.....	392
ENAPRIL-HT.....	142	EQUAGESIC.....	446	EUMOSONE.....	570
ENCARDIL.....	142	EQUILIBRIUM.....	253,63	EUMOSONE-G.....	570
ENCEPHABOL.....	228	EQUIREX.....	253	EUMOSONE-M.....	570
ENCEPHABOL INFUSION.....	228	ERBAZIDE.....	367	EVABOLIN.....	333-385
ENCEPHABOL SUSP.....	228	ERGACAP CAPS.....	506,503	EVACEF INJ.....	279
ENCORATE.....	200	ERGOPHEN.....	169	EVACUOL.....	60
ENDAR TABS/SUSP.....	17,18	ERGOTAB.....	506	EVALON.....	489
ENDOPACE.....	204	ERGOTAB FORTE.....	506	EVALON CREAM.....	489
ENDOPACE SUSP.....	204	ERO B SYRUP.....	298	EVATOCIN INJ.....	505
ENDOS.....	49	ERO-B 250/500.....	298	EVION.....	476
ENDOXAN ASTA.....	319	EROATE SUSP.....	298	EXEL.....	570
ENDOXAN-ASTA INJ.....	319	EROATE-250/500.....	298	EXITAL POWDER.....	60
ENDRINE NASAL DROPS.....	540	ERYACNE.....	553	EXPENT.....	343
ENERJAL.....	470	ERYBEST-250.....	298	EXPERGESIC.....	222
ENGERIX-B.....	97	ERYBEST-P.....	298	FABIZOL.....	21
ENIDAZOL.....	21	ERYC.....	298	FACICAP.....	467
ENOX EYE/EAR DROPS.....	544	ERYC 50.....	298	FACICAP CAPS.....	467
ENPRI.....	140	ERYC DRY SYRUP.....	298	FACID.....	38
ENSAMYCIN.....	312-544	ERYMER SUSP.....	298	FACID AC.....	38
ENSAMYCIN CREAM.....	553	ERYMER TAB.....	298	FACID INJ.....	38
ENTAMIZILE.....	18	ERYNATE.....	298	FACTGARD.....	283
ENTERO QUINOL.....	362,25	ERYSAFE.....	298	FACTAGARD DRY	
ENTERODIX.....	25	ERYSTER.....	298	SYRUP.....	283
ENTERODIX SUSP.....	25	ERYTAL-TR.....	166	FADINE.....	38
ENTEROMYCETIN.....	286	ERYTHROCIN DROPS.....	299	FAIRGENOL.....	553
ENTEROMYCETIN INJ.....	286	ERYTHROCIN DRY		FAIRGENOL PLAIN.....	537
ENTEROMYCETIN OTIC SOLN.....	543	SYRUP.....	299	FAKTU.....	32
ENTEROMYCETIN		ERYTHROCIN		FAL 650.....	223
SYRUP.....	286	GRANULES.....	299	FALBITONE PLUS CAPS.....	467
ENTEROMYCETINE EYE		ESGIPYRIN.....	462	FALBITONE PLUS	
DROPS.....	544	ESGIPYRIN TABS.....	462	TONIC.....	467
ENTEROZYME TABS/		ESIDREX.....	413	FALCLOX CAPSULES.....	270
SUSP.....	25	ESKAMEL OINT.....	559	FALMADOL.....	223
ENTROFURAN-M CAPS.....	25	ESKOLD.....	189-533	FALMADOL SUSP.....	223
ENTROLATE TABS.....	21	ESKOLD EXPECTORANT.....	189	FALMASPAS.....	34
ENVAS TABS.....	142	ESORID.....	58	FALMENDAL TABS.....	25
ENZAR FORTE.....	49	ESPERAL.....	229	FALMOGYL TABS/SUSP.....	18
ENZIDE.....	142	ESSENTIALE.....	54	FALMOX.....	262
ENZYSTAL.....	54	ESTRACYT.....	332	FALMOX DISTAB.....	262
EPHEDRESX.....	533	ESTRADERM 25,50,100.....	488	FALMOX DRY SYRUP.....	262
EPHEDREX-N.....	533	ESTRADURIN.....	334	FALPLEX CAPS.....	473
EPIDOSIN.....	68-444-507	ET-400/800.....	365	FALPLEX S'RUP.....	473
EPIDOSIN INJ.....	68	ETHAMSYL.....	84	FALTENOL TABS.....	114
EPILEX.....	200	ETHIOCID.....	366	FALTIDIN.....	39
EPILEX ORAL		ETHNORUB.....	566	FAMCIN.....	370
SOLUTION.....	200	ETHOSUXIMIDE.....	197	FAMCIN-H.....	370
EPITOL.....	194	ETO-SALBETOL.....	525	FAMOCID.....	37



FAMOFAST .....	39	FINTAL INHALER.....	519	FLURID .....	181
FAMONITE.....	39	FINTAL NASAL SPRAY.....	540	FLUROFEN.....	452
FAMOPRIL 20/40 .....	39	FLABOLIN-40 .....	481	FLUZIDE .....	347-512
FAMORILA .....	39	FLAGYL .....	18, 513	FLUZON.....	347
FAMOTIN 20 .....	39	FLAGYL I.V. INJ.....	18	FLUZON INFUSION .....	347
FAMOTIN SUSP.....	39	FLAGYL SUSP.....	18	FOETABORT.....	502
FAMOWAL.....	39	FLAGYL-DF.....	18	FORACET.....	222-224
FAMTAC .....	39	FLAGYL-F TABS/SUSP.....	18	FORCAN .....	541, 347-512
FARIZYM FORTE.....	54	FLAMAR CREAM.....	466, 439	FORCAN INFUSION.....	347
FARLUTAL .....	495	FLAMAR-P.....	439	FORISTAL .....	184
FASIGYN-500/DS.....	21	FLAMAREST TABS .....	453	FORISTAL LONTABS.....	184
FAZEPINE TABS.....	194	FLAMARIN TABS.....	450	FORTAGESIC.....	222
FEBRAFEM .....	453	FLAMFORT.....	453	FORTENAL .....	25
FEBREX.....	224	FLANZEN.....	463	FORTEZOL MF.....	18
FEBREX 250 SUSP.....	224	FLAVOXATE.....	424	FORTEZOL MF SUSP.....	18
FEBREX PLUS.....	189-224	FLEMICLOX .....	262	FORTIFIED PROCAINE	
FEBREX PLUS SYRUP .....	189	FLEMIPEN .....	262	PENICILLIN INJ.....	308
FEBREX SUSP.....	224	FLEMIPEN DROPS .....	262	FORTRIM-A .....	316
FEBRINIL INJ.....	224	FLEMIPEN DRY SYRUP.....	262	FORTUM.....	276
FECONTIN-Z .....	467	FLEMOXIN.....	262	FORTWIN TABS.....	222
FEFOL Z SPANSULE.....	467	FLEXINOL.....	440	FOXIL .....	302
FELOGARD-ER.....	147	FLEXITAL .....	166	FRAMYCETIN TULLE.....	553
FENACON.....	450	FLEXITAL INJ FOR INFUSION ..	166	FRENAC .....	450
FENACON GEL.....	450	FLEXON.....	453	FROBEN .....	452
FENAPLUS.....	450	FLOCY .....	291	FRUCTODEX.....	430
FENCETA .....	453	FLOCY INFUSION.....	291	FRUCTOSE NaCl INJ .....	430
FENCETA SUSP.....	453	FLOWPENT .....	166	FRUMIL.....	412, 153
FENLONG 400.....	453	FLOWPENT INFUSION.....	166	FRUSELAC.....	153, 412-415
FENOX NASAL DROPS.....	540	FLOXADAY.....	302	FRUSEMIDE .....	154
FENSAIDE .....	450	FLOXAQUIN-C .....	291	FRUSEMIDE INJ .....	154
FENSAIDE GEL.....	450	FLOXETIN .....	238	FRUSENEX.....	412, 154
FENSAIDE INJ .....	450	FLOXIGARD .....	543-544	FUCIBET CREAM .....	553
FERBON KOREA .....	376	FLOXIP .....	291	FUCIDIN CREAM.....	553
FERINOVA CAPS.....	467	FLUANXOL.....	243	FUCIDIN OINT .....	553
FERINOVA DROPS.....	467	FLUANXOL DEPOT INJ .....	243	FUDONE .....	39
FERINOVA SYRUP.....	467	FLUCOLD .....	181	FUDONE/FUDONE-M.....	25
FEROTABS 25 .....	485	FLUCORT .....	571	FU INJ .....	328
FERRADOL .....	467	FLUCORT LOTION .....	571	FULTERM.....	482
FERROCIN.....	467	FLUCREME-NM.....	555	FUMEDIL .....	25
FERROSTAN LONGULES.....	467	FLUDAC.....	238	FUMIN .....	555
FERROUS FUMARATE TABS IP.	467	FLUDECAN INJ.....	244	FUNAZOLE.....	350
FERRUM FOL.....	467	FLUFRAN .....	238	FUNGAL TABS.....	348
FERTO TAB.....	485	FLUGEN.....	238	FUNGICIDE.....	350
FERTOMID .....	485	FLUMAP .....	245	FUNGITOP GEL .....	556
FESOFOR-Z SPANSULE.....	467	FLUNARIN .....	170	FUNGIVIN .....	348
FESOVIT ELIXIR.....	467	FLUNIL.....	238	FUNGIZONE I.V.....	345
FESOVIT SPANSULE .....	467	FLUOTHANE .....	174	FURADANTIN.....	420
FESTAL .....	50	FLUTHAN HALO THAN.....	174	FURADANTIN SUSP.....	420
FETUGARD .....	482	FLUOURACIL INJ .....		FURAMIDE .....	360
FEVASTIN SUSP.....	224	FLUPAR.....	238	FURANOL-M SUSP.....	28
FILIBON.....	479	FLURACIL .....	328	FURATOR.....	328
FINTAL EYE DROPS .....	550	FLURACIL ORAL .....	328	FUROXIL.....	280



FUROXONE.....	26
FUROXONE SUSP.....	26
FYBOGEL.....	60
G-MYCIN EYE/EAR DROPS.....	543
G-MYCIN INJ.....	299
G-MYCIN INJ PAED.....	299
GAB.....	558
GAMMALIN H INJ.....	95
GAMMALIN INJ.....	95
GAMMIMUNE-N.....	95
GARAMYCIN.....	299
GARAMYCIN EYE OINT.....	544
GARAMYCIN EYE/EAR DROPS . 543	
GARDENAL.....	198-257
GAROIN.....	197-198
GASTABID-1/2.....	65,66
GASTRACTIV.....	204
GASTRIUM.....	204
GAVISCON.....	9
GEFRICH.....	470
GELORA.....	539, 541
GENMAC.....	299
GENOPHANE.....	151
GENOZYME.....	50
GENTALENE.....	556
GENTALENE C CREAM.....	568
GENTAMICIN IJ.....	300
GENTARIL.....	300
GENTASPORIN.....	300
GENTASWIFT.....	300
GENTICYN EYE/EAR.....	543
GENTICYN INJ.....	300
GENTOMIN-D EYE/EAR DROPS.....	544
GENTOPIC.....	568
GENTYN.....	300
GERFREE EYE/EAR DROPS.....	543
GEROCIN BM E/E DROPS.....	543
GEROCIN E/E DROPS.....	543
GEROCIN INJ.....	300
GESICAIN 2% JELLY.....	172
GESICAIN 2% SOLN WITH ADRENALINE.....	172
GESICAIN 4% TOPICAL.....	172
GESICAIN OINT.....	172, 567
GESICAIN SOLUTION.....	172
GESICARD.....	136
GETOSIL PLUS SUSP.....	12
GINADOX.....	296
GINSEC.....	464

GINTONA.....	464
GLASEPT.....	464
GLAUCARE.....	547
GLAXO SALBUTAMOL INHALER.....	525
GLENGENG TONIC.....	464
GLENGENG-500.....	464
GLENTONA SYRUP.....	470
GLIBETIC.....	393
GLIDE.....	394
GLIZID.....	393
GLOBAC LIQUID.....	467
GLOBAC-Z.....	467
GLOBUNAL 10% INJ & 16.5.....	95
GLUCAGON.....	394
GLUCOLIP.....	394
GLUCOMOL.....	547
GLUCORED.....	392
GLUCOTROL.....	394
GLUFORMIN.....	395
GLYCIPHAGE.....	395
GLYCOMET.....	395
GLYNASE.....	394
GOCOX.....	370
GOCOX COMP.....	367-370
GOLDAR.....	435
GONABLOK.....	486
GONADOTROPHIN LH.....	483
GONOTROP-C.....	483
GONTROP-M.....	491
GRAMOGYL.....	26
GRAMOGYL SUSP.....	26
GRAMONEG.....	419,26
GRAMONEG SUSP.....	419,26
GRAMONEG SYRUP.....	19,26
GRAVOL.....	203
GRD.....	470
GRILINCTUS.....	525
GRILINCTUS-BM.....	525
GRILINCTUS-BM SYRUP.....	525
GRILINCTUS-BM TABS.....	525
GRILINCTUS-BM TABS/ PAEDIATRIC.....	525
GRISACTIN FORTE.....	348
GRISOFIL.....	348
GRISORAL.....	348
GRISOVIN-FP.....	348
GROMANE.....	165,562
GROMIN.....	479
GROTHIC.....	333-385
GUGLIP.....	109

GUTENFLOX.....	262
GUTPRO.....	58
GUTPRO SUSP.....	58
GYNAE C V P.....	88
GYNO-TERAZOL VAGINAL CREAM.....	516
GYNODAKTARIN.....	514, 350
GYNODAKTARIN OVULE.....	514, 350
GYNOSAN.....	510
GYNOSTATUM.....	511
GYNOTOCIN.....	505
HAEM UP.....	467
HAEM UP GEMS.....	467
HAEMACCEL.....	431
HAEMATINGA CAPS.....	467
HAEMATINGA LIQUID.....	467
HAIREX.....	165,562
HALOPLUS.....	251
HALORAN 50.....	450
HALORAN GEL.....	450
HALORID.....	251
HALTAX.....	279
HAMYCIN.....	349-512
HAMYCIN OVULES.....	513, 349
HANSEPRAN.....	352
HEALEX SPRAY.....	538
HEALON.....	550,553
HEBALD.....	165,562
HELMACID WITH SENNA.....	343
HELMAZAN.....	338
HELMINTOL.....	341
HELMINTOL SUSP.....	341
HEMATRINE.....	467
HEMEX.....	469
HEMFER.....	468
HEMOCID INJ.....	81
HEMOLOK.....	85
HEMSYNERAL-TD.....	468
HEPALEX.....	379
HEPASULES.....	68
HEPASULFOL.....	55
HEPASULFOL AA.....	181-55
HEPATOGLOBIN.....	468
HEPP FORTE.....	468
HERMIN.....	431
HERPERAX OINT.....	374,560
HERPERAX TABS.....	374
HERPEX CREAM.....	560
HERPEX OPHTHALMIC.....	545
HETRAZAN.....	338



HETRAZAN SYRUP.....	338	HYPROSOL.....	549	IMOL.....	454
HEXIDOL.....	216-251	HYPROSOL FORTE.....	549	IMOSEC-F.....	29
HEXIDOL FORTE.....	216-251	HYSTALIN.....	525	IMOSEC-S.....	26
HEXIDOL PLUS.....	216-251	HYTHALTON.....	409-152	IMOX.....	263
HEXINAL.....	216	HYTROL.....	142	IMOX-CLO.....	263
HICON.....	503	HZAX TABS.....	178	IMPRAMINE.....	239
HICON INJ.....	503	Hb PLUS.....	467	IMPRAMINE-75.....	239
HIPRES.....	114-155	Hb RICH.....	467	IMPREL.....	239
HIPRES-D.....	114-155	IBEROL.....	468	IMURAN.....	336
HIPRIL.....	141	IBEROL-500 LIQUID.....	468	INABUTOL FORTE.....	365
HIRUDOID.....	563	IBODIK SUSP.....	454	INAC 50.....	450
HISNOFIL.....	180	IBU-PR.....	454	INAC GEL.....	450
HISTAC.....	39	IBU-PROXYVON.....	447-454	INAC INJ.....	450
HISTAC INJ.....	39	IBUACT.....	454	INAC TR.....	450
HISTAFEN.....	190	IBUCLIN.....	454	INCIDAL TABS.....	187
HISTAGLOBULIN.....	94	IBUCON 200/400/600.....	454	INCREMIN SYRUP.....	488
HISTALONG.....	178	IBUCON PLUS KID DISP TABS.....	454	INDERAL.....	120
HISTALONG JUNIOR.....	178	IBUFLAMAR 200/400.....	454	INDOCAP.....	456
HISTEESE.....	178	IBUFLAMAR MX.....	454	INDOFLAM.....	456
HISTEESE SUSP.....	178	IBUGESIC.....	454	INDOVUNAL.....	485
HISTERF.....	190	IBUGESIC SUSP.....	454	INFARTIN 60.....	75
HISTERNA TABS/ SUSP.....	190-191	IBUGESIC-M.....	410	INFLAPEN CAPS.....	454
HIZTIGO.....	180	IBUGIN.....	454	INFLAVAN 10/20.....	463
HOLOXAN.....		IBUPLUS.....	454	INGAGEN M TABS.....	504
UROMITEXAN.....	320	IBURIN.....	454	INGAGEN-M.....	504
HONVAN.....	334	IDIBEND.....	341	INRAS.....	143
HONVAN INJ.....	334	IDICIN.....	456	INSEPTIN.....	26
HORMOPIRIN.....	224	IDICIN-P.....	456	INSULATARD.....	390
HOSTACORTIN-H.....	403	IDIFULVIN.....	348	INSULIN.....	388
HOSTACYCLINE.....	287	IDILIN.....	287	INSULIN ISOPHANE (NPH).....	388
HPC DEPOT.....	492	IDIMOX.....	263	INSULIN PROTAMINE ZINC.....	388
HUMAN ACTRAPHANE.....	387	IDIMOX DRY SYRUP.....	263	INSULIN ZINC (LENTE).....	389
HUMAN ACTRAPID.....	388	IDIZONE.....	400	INTRA PERITONEAL DIALYSIS LACTATE.....	417
HUMAN UNSULATARD.....	390	IFICIPRO I.V.....	291	INTRAVAL SODIUM.....	177
HUMAN MIXTARD.....	388	IFIPEF.....	306	INVORIL.....	142
HUMAN MONOTARD.....	388	IFIPEF INFUSION.....	306	INVOZIDE.....	142
HUMAN NORDISULIN.....	388	IFIRAL.....	519	IOBET.....	547
HUMEGON.....	491	IFIRAL NASAL DROPS.....	540	IOPAC.....	380
HUMILIN.....	270	IHD 20/40.....	132	IOQUIN.....	354
HUMILIN DRY SYRUP.....	270	ILDAMIN INJ.....	134	IOTIM.....	547
HYCIBEX CAPS.....	473	ILDAMIN TABS.....	132	IPCACIN KID TABS.....	367
HYCIBEX SYRUP.....	473	ILETIN-L.....	390	IPCAZIDE LIQUID.....	367
HYCIMOX.....	262	ILETIN-N.....	390	IPCAZIDE TABS.....	367
HYDERGINE.....	226	ILETIN-R.....	390	IROSPAN-Z.....	468
HYDERGINE INJ.....	226	IMDUR.....	132	ISMO-10/20/40.....	132
HYDROCORTISONE INJ.....	401	IMRGEN INJ.....	504	ISO-RIPHARMED.....	370
HYKATAPASE.....	43	IMFERON.....	468	ISOCOR-20.....	132
HYKIL.....	262	IMIDOL VAGINAL.....	345-511	ISOGEL GRANULES.....	61
HYKIL DRY SYRUP.....	263	IMIDIL VAGINAL TABS.....	354	ISOKIN FORTE.....	373
HYKIL PLUS CAPS.....	263	IMIPAM.....	239		
HYPACE.....	142	IMODIUM.....	29		
		IMODIUM LIQUID.....	29		



ISOKIN TAB	129, 367
ISOKIN-TF	367
ISOMACK RETARD	132
ISONEX	367
ISONIAZID TABS	366
ISORDIL	132
ISORIFAM	367-370
ISOVAC	61
ITASPOR	351
ITEOL-3	537, 553
IVEMETRO INFUSION	18
IVIMICIN	259
J.P. TONE	468
JAGRIL	461
JECTALVIL	
JECTOFR	468
JECTOFR PLUS	468
JENSHENG	464
JETOMISOL-P	344
JOHNSON PLAST	538
JONAC GEL	450
JONAC INJ	450
JONAC PLUS TABS	450
JONAC TABS	450
JULAX	61
JUMEX	215
K-5 HAIR TINCTURE	561
K-GARD	431
KALPASTIC	86
KANAMOL	218
KANAMYCIN	300
KANCIN	300
KANORMAL	61
KANPLEX FORTE TABS	473
KANPLEX SYRUP	473
KANSULF	300
KARPIN LOTION	559
KARVOL	540
KARVOL PLUS	
INHALENT	541
KAY-CIEL	432
KAYPEN	308
KEFLOR	273
KEFLOR GRANULES	273
KEFLOR POWDER	273
KEFLOXIN	274
KEFLOXIN POWDER	274
KELAC	457
KEMADRIN	214
KEMICETINE	
ANTIOZENA	541
KEMICETINE CAPS	286

KEMICETINE INJ	286
KEMICETINE OTIC	
SOLN	543
KEMICETINE SUSP	286
KEMICETINE VAGINAL	509
KEMOPLAT	331
KENACOMB	573
KENACORT	404-573
KENACORT INJ	404
KENALFIN TABS	457
KENALOG-S SKIN	573
KENTROQUIN	18
KERALIN	560
KERUTIN-C	87
KETALAR	176
KETAMAX	176
KETANOV	457
KETASMA	518
KETMIN	176
KETONIC TABS	457
KETOTIF	518
KETOVENT	518
KETOWIN	457
KETOZOLE TABS	350
KEYLYTE	432
KILPANE CREAM	439, 566
KINETAL-400	166
KINETAL-INJ	166
KINETO	464
KINETONE	479
KLARCID	9
KLASINOMYCIN	324
KLOX	294
KLOX DRY SYRUP	294
KLOX INJ	294
KOMBINA	316
KOMBINA SUSP	316
LABORON INJ	505
LACALM FORTE	216-249
LACALM PLUS	216-249
LACTISYN	50
LACTOBACIL	50
LACTONE	415
LATHEXY	216
LALITHIUM	244
LAMKLOX	263
LAMOXY	263
LAMOXY DIS. TAB	263
LAMOXY DRY SYRUP	263
LAMOXY-BX	263
LANOXIN INJ	159
LANOXIN/DIGOXIN	159

LANPRO	42
LANSOD	42
LARAP-2/4	246
LARENASE	251
LARIAGO TABS/SUSP/	
INJ	354
LARIDOX	357-358
LARPOSE	256
LASILACTONE 50/100	412
LASIRIDE	412
LASIX	150, 154, 412
LASIX 250 INJ	412
LASIX HIGH DOSE	154
LASIX HIGH DOSE INJ	154
LASTET CAPS/INJ	327
LASTUSS-LA	533
LATILIN 25/50/75	233
LAVERAN	356
LAVIEST	473
LAXICON	61
LAXICON ENEMA	61
LEDERCORT	404-573
LEDERFLAM PLUS	454
LEDERMYCIN	287
LEDERMYCIN OINT	553
LENAGESIC	458
LENTARD	389
LEPROMINE CAPS	352
LERIN	504
LERIN INJ	504
LEUCOVORIN	
CALCIUM	376
LEUKERAN	326
LEVODOPA AND CARBIDOPA	
TABS	213
LEVOPA	213
LIBOTRYP	233
LIBOTRYP DS	233
LIBRIUM	253
LICAB	244
LICAB XL	245
LIGNOCAINE HCL INJ	172
LIGNOCAINE WITH	
ADRENALINE	173
LIMBICON	233-253
LIMBICON FORTE	233
LIMCEE	475
LINCOCIN	301
LINCOCIN CAPS	301
LINEMENTT-333/500	288
LINVAS	143
LIORESAL	437



LIPABOL.....	110	LOXAPAC 10/25.....	240	MASSE CREAM.....	561
LIPIGEM.....	108	LOXAPAC-C LIQUID.....	240	MATA-PX 250/500.....	263
LIPIZYL.....	108	LOZAPIN.....	236	MATOCOL MPS.....	205
LIPRIL.....	144	LPL.....	144	MATRIM DS.....	316
LISICARD.....	144	LUMIGARD.....	18	MAGRIM SS.....	316
LISINACE.....	144	LUMIGARD FORTE.....	19	MAXERON.....	205
LISIR.....	144	LUMINAL.....	198-257	MAXERON MPS.....	205
LISORIL.....	144	LUMINALETES.....	198-258	MAXIGAN.....	426
LISTRIL.....	144	LUPILIN.....	270	MAXIGAN INJ.....	426
LITBON.....	245	LUPILIN INJ.....	270	MAXILASE FOTRE.....	464
LITHOCAP.....	245	LUPIZYME.....	50	MAXIMOX.....	263
LITHOSUN.....	245	LUPIZYME CAPS.....	50	MAXREL.....	450
LITHOSUN-SR.....	345	LYBUTOL.....	365	MAZETOL.....	194
LIVOGEN.....	470	LYDIN.....	39	MEASLES RUBELLA MUMPS	
LIVOGEN CAPS.....	468	LYDOX.....	296	VACCINE.....	97
LIVOLUK.....	62	LYDROXIL.....	274	MEASLES VACCINE.....	98
LIVOTONE CAPS.....	55	LYDROXIL SYRUP.....	274	MEBAGEN TABS.....	341
LIVOTONE LIQUID.....	55	LYNAMIDE.....	369	MEBAZOLE.....	341
LOBAK.....	439-454	LYNDIAL.....	490	MEBEX.....	341
LOBATE-CM.....	570	LYNDIOL IMG.....	493	MEBRYL.....	185
LOCULA.....	545	LYNORAL.....	332-490	MECOLIN.....	55
LODOSPRIN.....	71	LYNX CAPS.....	301	MEDICREME.....	566
LOGASCID.....	12	LYNX INJ.....	301	MEDITHANE.....	31
LOGASCID FORTE.....	13	LYNX SYRUP.....	301	MEFTAL.....	458
LOGASCID SUSP.....	12	LYPRO.....	291	MEFTAL SPAS.....	423
LOMAC.....	43	LYRAMYCIN.....	300	MEGAPEN.....	270
LOMADAY.....	302	LYRAMYCIN EYE/EAR.....	543	MEGAPEN INJ.....	270
LOMEF-400.....	302	LYSIRON.....	468	MEGATIL.....	242
LOMEWON.....	302	LYZOLIN.....	278	MEGATIL INJ.....	242
LOMFLOX.....	302	M-VAC.....	98	MEGATUSS-P.....	533
LOMITAS.....	302	MACALVIT INJ.....	477	MEGYL-F.....	19
LOMODEX.....	428	MACSORALEN.....	564	MELALITE.....	564
LOMODEX-40.....	90	MACSORALEN LOTION.....	564	MELANOCYL.....	563
LOMODEX-70.....	90	MADRIBON.....	315	MELANOCYL OINT.....	563
LOMOFEN.....	28	MAFEXIN CAPS.....	283	MELANOCYL SOLN.....	563
LOMOTIL.....	28	MAFEXIN DRY SYRUP.....	283	MELDOPA.....	149
LONAZEP.....	196	MAGEL-MPS.....	13	MELLERETS.....	248
LONGACILLIN.....	308	MAGNADYN.....	465	MELLERIL.....	248
LONOL.....	114	MAGNINE.....	9	MELOZINE.....	248
LOPID.....	108	MAHAQUIN.....	302	MELUBRIN.....	354
LOPRESOR.....	117	MAINTANE.....	483	MENABOL.....	386
LOPRESOR INJ.....	117	MAINTANE INJ.....	492	MENCEVAX.....	99
LOPRIN-75.....	72	MALANDIN.....	355	MENDAZOLE.....	341
LORESS.....	43	MALIDENS.....	224	MENINGO COCCAL VACCIE	
LORFAST.....	186	MALOCIDE.....	358	A+C.....	98-99
LORI INJ.....	254	MAMOFEN.....	335	MEPHENTINE.....	170
LORIDINE.....	186	MANADERM.....	565	MEPHENTINE INJ.....	170
LORVAS.....	158	MANADERM OINT.....	565	MEPRATE.....	495
LOSTEROL.....	108	MANDELAMINE.....	418	MERGOX INJ.....	504
LOTRIDERM.....	556	MANNITOL 5%10%20%.....	413	MERIEUX INACTIVAATED	
LOVADAC.....	109	MARZINE.....	202	RABIES VACCINE (HDC).....	96
LOX 2% INJ.....	173	MASDIL.....	124	MERIFLOX.....	304



MERIGENTA CREAM .....	553	MICRODINE SOLUTION .....	537	MORPHINE INJ .....	221
MERIGANTA EYE/EAR .....	543	MICRODOX .....	296	MOTILAX .....	58
MERIGENTA INJ .....	300	MICROFLOX .....	292	MOTINORM .....	204
MERIZYME DROPS .....	465-50	MICROSHIELD .....	536	MOTINORM SYRUP .....	204
MERIZYME ELIXER .....	51	MICROSHIELD PVP-S/		MOVON-20 .....	463
MERIZYME TABS .....	51	PVP .....	537	MOVONAC TAB/CREAM/	
MESACOL .....	69	MIDARINE .....	442	SR .....	450
MESACOLENEMA .....	69	MIGRANIL .....	169	MOX .....	263
MESNA .....	321	MIGRATAN .....	169	MOX DRY SYRUP .....	263
METABOL .....	333-385	MIKACIN .....	259	MOX INJECTION .....	263
METACLOX .....	263	MIKAJECT .....	259	MOXILUM .....	263
METADEC .....	384	MILLICORTEN-		MOXILUM DRY SYRUP .....	264
METAMOL .....	224	VIOFORM .....	556-571	MOXILUM PAED DROPS .....	264
METAMOL SYRUP .....	224	MILLICORTENOL .....	571	MOXYCARB .....	264
METAMOX .....	263	MINAPHILLIN .....	525	MOXYDIL .....	264
METAMOX DRY SYRUP .....	263	MINICAM D.T .....	463	MOXYDIL INJ .....	264
METAMYCIN EYE		MINICAM GEL .....	463	MOXYDIL SYRUP .....	264
DROPS .....	545	MINILIN .....	270	MOZEP .....	246
METHAZIL .....	543	MINILIN SYRUP .....	270	MTX KOREA .....	329
METHERGIN INJ .....	87-504	MINIPRIL .....	142	MTX TABS KOREA .....	329
METHERGIN TABS .....	504	MINOCILLIN .....	270	MUCAINE .....	15
METHERONE .....	504	MINOXIL DRY SYRUP .....	263	MUCODYNE .....	533
METHERONE INJ .....	504	MINTOP .....	165, 562	MUCODYNE SYRUP .....	533
METHYLERGOMETRINE INJ	504	MITOMYCIN-C KYOWA .....	325	MUCORIS-E .....	541
METMIN .....	395	MIT LINCTUS CODEINAE CO. ..	533	MULTIFUNGIN .....	556
METOCARD .....	117	MITTAVIN .....	479	MULTIFUNGIN H .....	556
METOCONTIN .....	206	MIXOGEN .....	490-497	MULTIFUNGIN POWDER .....	556
METOLAR .....	206-117	MIXOGEN INJ .....	498	MULTIGAIN .....	165, 562
METOLAR-H .....	117	MIXOPEN .....	270	MULTIVITE FM CAPS .....	479
METOPAR .....	224	MIXTARD .....	388-389	MUSLAX CREAM .....	566
METOPAR SUSP .....	206-224	MIZOLE CREAM .....	556	MUSTINE HCL .....	322
METOPAR SYRUP .....	206, 224	MIZOLE-F CREAM .....	556	MYAMBTOL .....	365
METOZIDE .....	117-155	MOBINAK .....	450	MYCIDEX INJ .....	400
METRINA PLUS TABS .....	19	MOBIZOLX .....	439	MYCIDEX TABS .....	400
METRINA TABS .....	19	MOCLOX .....	263	MYCOCID .....	556
METROGYL .....	19-513	MOCLOX DRY SYRUP .....	263	MYCOCIN .....	264
METROGYL COMP .....	19	MODACT-20 .....	463	MYCOCIN DRY SYRUP .....	264
METROGYL GEL .....	552	MODIPIN .....	146	MYCOCIN FORTE CAPSULES ...	
METROGYL SUSP .....	19	MODUS 2.5/10 .....	495	264	
METROGYL-F TABS/SUSP .....	19	MOISOL EYE DROPS .....	549	MYCODERM .....	556
METRON .....	19	MOLIN .....	224	MYCONEX-600/800 .....	365
METRON FORTE .....	19	MOLZYME .....	51	MYCOREST .....	347-512
METRON SUSP .....	19	MONICOR .....	132	MYCOSTATIN .....	351
METRON-DF .....	19	MONIT 20 .....	132	MYCOSTATIN OINT .....	556
MEXITIL .....	137	MONO SORBITRATE .....	133	MYCOSTATIN VAGINAL .....	515
MEXITIL INJ .....	137	MONOCEF I.V .....	276	MYOBID .....	366
MEXOGIL-F SUSP .....	19	MONOCONTIN .....	133	MYOBOLIN .....	333-384
MEZAPIN .....	195	MONOSULIN .....	389	MYODIL .....	380
MICOGEL .....	556	MONOTARD MC .....	389	MYOGARD .....	126
MICOLON .....	514, 556	MONOTRATE .....	133	MYOGARD-LA .....	126
MICOPTIC .....	545	MONOTRATE OD .....	133	MYOLAXIN OINT .....	566
MICRODINE OINT/SOLN .....	553	MORCONTIN 10/30/60/100 .....	221	MYONIT .....	133



MYOSPAS .....	438
MYOSTIGMIN INJ .....	445
MYOVIN .....	133
MYSOLINE .....	199
NAC-50 .....	450
NAC-PLUS .....	126
NAC-SR .....	126
NACLO INJ .....	450
NACLO-TR .....	450
NACPOT .....	451
NACTEN .....	126
NACTIN .....	126
NADIX ACUTAB .....	419-26
NALIDYS .....	26
NALIDYS SUSP .....	26
NAPROSYN .....	459
NARCOTAN .....	377
NASIVON .....	541
NATAMOX .....	264
NATAMOX PAED DROPS .....	264
NATCARDINE .....	139
NATUROLAX .....	61
NATUROLAX FORTE .....	61
NATUROLAX SF .....	61
NAUSIDOME .....	204
NAUSIDOME SUSP .....	204
NAUSIFAR-MPS .....	206
NAZALIN NASAL DROPS .....	541
NEBASULF .....	515
NEBASULF OINT .....	553
NEBASULF SPRINKLING POWDER .....	553
NEGADIX .....	419
NEGADIX KID TABS .....	26
NEGADIX M SUSP .....	26
NEGADIX-M .....	26
NEO-FERRUM INFANTS .....	468
NEO-HEPATEX .....	470
NEO-MERCAZOLE .....	405
NEO-OCTINUM .....	425
NEO-OCTINUM DROPS .....	425
NEO-OCTINUM INJ .....	425
NEOCALM .....	249
NEOCALM FORTE .....	216-242
NEOCALM PLUS .....	216-249
NEOCEF .....	283
NEOCURON INJ .....	441
NEOFEBRIN TABS .....	224
NEOGADINE ELIXIR .....	470
NEOMESMAR TABS .....	254
NEOMIN .....	339
NEOMOL INJ .....	224

NEONOX 200 .....	304
NEOPAM .....	378
NEOPEPTINE CAP .....	51
NEOPEPTINE DROPS .....	51
NEOPRIM SUSP .....	316
NEOREX EXPT .....	
NEOSORALEN .....	565
NEOSORALEN FORTE .....	565
NEOSORALEN LOTION .....	565
NEOSPORIN EYE DROPS .....	545
NEOSPORIN H EAR DROPS .....	543
NEOSPORIN H OINT .....	553
NEOTOMIC ENEMA .....	61
NEOTREXATE .....	329-330
NEOTREXATE TABS .....	329
NEPHLEX 125/250/500 .....	274
NEPHROGESIC .....	420-421
NEPRESOL .....	166
NEURABOL CAPS .....	386
NEURABOL INJ .....	333, 385
NEURAP .....	246
NEUROBION .....	473
NEUROBION INJ .....	473
NEURONTIN .....	198
NEUROPHEN COMPOUND .....	438
NEUROPHEN CREAM .....	566
NEUROPHEN FORTE .....	454
NEUROPHEN P SUSP .....	454
NEUROSPAS .....	423-34
NEUROSPAS DROPS .....	34, 423
NEUROSPAS FORTE .....	423
NEUROSPAS INJ .....	423
NEUROXIN-12 INJ .....	474
NEWACE .....	140
NICARDIA .....	127
NICARDIA-CD .....	127
NICLOSAN .....	342
NIDAGEST .....	483
NIDAGYL .....	21
NIFEDINE .....	127
NIFELAT .....	127
NIFELAT RETARD TABS .....	127
NIFETEX TR .....	127
NIFETOLOL CAPS .....	127
NIFUGAL B OINT .....	542
NIFUGAL OINT .....	556
NILCARIS-50/150 .....	344
NILOL .....	127, 114
NILSEC .....	43
NIMESEL .....	460

NIMIND .....	480
NIMODIP .....	146
NIMOTIDE .....	146
NIMULID .....	460
NINDRAL .....	254
NIPAM .....	256
NITAVAN/5/10 .....	236
NITENOL .....	127
NITRAVET .....	256
NITRAVET KID TABS .....	256
NITREPIN .....	128
NITROCONTIN .....	131
NITROCURE .....	131
NITRODERM TTS .....	133
NITROFIX .....	133
NITROMACK .....	133
NITROSUN .....	256
NIVAQUINE-P FLAV SUSP .....	354
NIVAQUINE-P INJ .....	354
NIZRAL .....	350
NIZRAL SHAMPOO .....	556
NODEP .....	238
NODINE .....	457
NOL VADEX .....	335
NOMIGRAIN .....	170
NOOTROPIL .....	227
NOPAR TABS .....	339
NOR-U .....	305
NORBACTIN .....	304
NORBACTIN EYE DROPS .....	545
NORBID .....	305
NORFLOX .....	305
NORFLOX-TZ .....	21
NORI-A .....	468
NORILET .....	305
NORISTREAT .....	494
NORMABRAIN .....	227
NORMACE .....	142
NORMACE-D .....	155
NORMADATE .....	140
NORMAX .....	305
NORMAXIN .....	64
NORMETIC .....	204
NORMETIC SUSP .....	204
NORMODIL .....	204
NORMODIL SUSP .....	204
NORMOLIP .....	108
NORMOLOL .....	114
NORMOSPAS .....	64
NORMOZYME .....	51
NORMOZYME SYRUP .....	51



NORPACE .....	135-33	OMEPRAL 10/20 .....	43	SYRUP .....	476
NORPHIN .....	219	OMEPRAZ 10/20 .....	44	OSTOCALCIUM TABS .....	476
NORSWEL .....	454	OMEPREN 10/20 .....	44	OSTOFEN .....	456
NORZED .....	305	OMEZ .....	44	OTEK .....	543
NOSOCEF .....	277	OMEZOL .....	44	OTEK AC .....	543
NOVACLOX .....	264	OMICITE .....	485	OTINA EAR DROPS .....	543
NOVACLOX PAED TABS .....	264	OMIZAC .....	44	OTOFLOUR TABS .....	543
NOVAMOX .....	264	OMINATAX .....	279	OTOGESIC .....	543
NOVAMOX DRY SYRUP .....	264	OMINICEF .....	279	OTRIM .....	317
NOVAMOX DT .....	264	OMNIGEN C .....	99	OVAFAR .....	485
NOVELON .....	490	OMNIPAQUE .....	380	OVRAL .....	490
NOVIGAN .....	426-454	140/180/240/300/350		OVRAL-G .....	490-496
NOVONIDAGYL TABS/		OMNIPEN .....	264	OVRAL-L .....	490-492
SUSP .....	27	OMNITEL .....	340	OXADEP .....	238
NOWORM .....	339	OMNITEL SUSP .....	340	OXALGIN .....	218
NOWORM .....	339	ONCOCARBIN .....	331	OXYSTECLIN .....	288
NOXTIN .....	21	ONCODEN .....	207	OXYTET INJ .....	288
NUBEND .....	340	ONCODEN INJ .....	207	P-FEBRIN .....	454
NUBEND SUSP .....	340	ONCOTRON .....	330	P-ZIDE .....	369
NUFEX .....	283	ONE-UP .....	481	PACITANE .....	216
NUFEX DRY SYRUP .....	283	ONIL-2 .....	358	PAKDIA SUSP .....	20
NULIP .....	374	ONTOP .....	302	PALADAC .....	474
NUMOX 250/500/1000 .....	264	OPTEZE .....	547	PAM-A INJ KOREA .....	378
NURIL .....	140	OPTIMOX .....	264	PAM-A TABS KOREA .....	378
NURRISH LIQUID .....	471	OPTIMOX INJ .....	264	PANCONIUM .....	441
NUTRIFIL .....	468	OPTIMOX-B .....	264	PANFLOX .....	292
NUTRISAN .....	479	OPTINEURON .....	474	PANIMUN .....	336
NUTROLIN B PED TABS .....	474	ORABOLIN .....	383	PANKREOFLAT .....	51
NUTROSEC .....	479	ORACIP-500 .....	292	PANKREON .....	51
NUTROSEC LIQUID .....	479	ORAL POLIO VACCINE SABIN .....	99	PANKREON COMP .....	51
OBAX .....	305	ORAP .....	248	PANKREON PAED .....	51
OCCUREST EYE		ORBITS .....	13	PANOLASE .....	51
DROPS .....	548-550	ORGALUTIN .....	490-493	PANTELMIN .....	341
OCID .....	43	ORGAMETRIL .....	493	PANURON .....	441
OCIFRIL .....	235	ORICITRAL .....	411	PANZYNORM .....	52
OCIUM .....	477	ORIPHEX .....	283	PARABUTAZONE .....	462
OCUFLUR .....	548	ORIPHEX DRY SYRUP .....	283	PARACLOX CAPS .....	271
OCULOSE .....	549	ORIPRIM DS .....	316	PARACLOX INJ .....	271
OCUPOL-DEYE EAR		ORIPRIM I.M. INJ .....	316	PARACTAL .....	13
DROPS .....	543	ORIPRIM I.V. INJ .....	316	PARAFLAX .....	439
OCUPRES .....	547	ORIPRIM PAED SUSP .....	316	PARAFON .....	439
ODACE .....	142	ORIZOLIN .....	278	PARAMET .....	206
ODAL .....	340	ORPHAMOL .....	214-441	PARAMINOL CREAM .....	684
ODINOL .....	114	ORPHAMOL FORTE .....	214	PARAXIN .....	286
ODIROX .....	311	ORPHIPAL .....	214-441	PARAXIN EAR DROPS .....	543
ODOXIL .....	274	ORPIC 250/500 .....	292	PARBUDOL GEL .....	439
OFRAMAX .....	277	OSCAL-12 TABS/INJ .....	477	PARBUDOL TABS/SUSP .....	454
OLAMIN .....	556	OSDIL .....	68-444-507	PARKIMET 275 .....	213
OLD TUBERCULIN .....	382	OSIFORT-F .....	468	PARKIN .....	216
OLIADE BATH OIL .....	474	OSTEOFAM .....	451	PARNON .....	210-447
OMALCER .....	43	OSTEOFAM INJ .....	451	PARVON FORTE .....	220-447
OME-10/20 .....	43	OSTOCALCIUM B-12		PARVON SPAS .....	220



PARVON-N .....	220-447	PERIVALAN .....	503	PIROX GEL .....	463
PAVULON INJ .....	441	PERLICE CREAM RINSE .....	559	PIROX INJ .....	463
PAXUM .....	254	PERMITE CREAM .....	559	PITOCIN .....	505
PAXUM INJ .....	254	PERNOX GEL .....	552	PLACENTIREX .....	458
PEACIN .....	254	PERSANTIN .....	73	PLACIDOX .....	254
PEBACT .....	306	PERSOL FORTE .....	552	PLAXID .....	230
PEDIA-3 .....	533	PESULIN-O .....	27	PLENDIL .....	147
PEDIC DROPS .....	474	PETRESIN KOREA .....	416	PLUTAMID .....	319
PEDITRAL .....	433	PFT .....	13	PMQ INGA .....	356
PEFBID .....	306	PH .....	413	POISE .....	230
PEFCIN .....	306	PHARMA LIQUID .....	52	POLARAMINE .....	183
PEFLOBID .....	306	PHENA INJ .....	190-208	POARAMINE PAED	
PEFLOBID INFUSION .....	306	PHENA KID .....	190-208	SYRUP .....	183
PEFCIN .....	306	PHENA-P .....	190-208	POLARAMINE REPEAT TABS ...	
PEFOXAN .....	306	PHENABID .....	461	183	
PEFLOX .....	306	PHENAMIN INJ .....	188	POLIO SABIN (ORAL POLIO) ..	99
PEFLOX INFUSION .....	306	PHENERGAN .....	190	POLYBION .....	474
PEFLOX INJ .....	306	PHENERGAN ELIXIR .....	190	POLYBION INJ .....	474
PENCOM .....	308	PHENOBARB 30/60 .....	198-258	POLYBION SYRUP .....	474
PENETRIN .....	317	PHENOBARBITONE SOD. INJ ...		POLYCOL FORTE .....	13
PENICILLAMINECAPS .....	105	258		POLYCOL FORTE GEL .....	13
PENIDURE AP .....	308	PHENORIN .....	462	PONSTAN KAPSEALS .....	458
PENIDURE LA6/LA12/		PHENOXYL .....	265	POTASOL .....	431
LA24 .....	308	PHENOXYL DRY SYRUP .....	265	POTTNOL LIQUID .....	431
PENIVORAL .....	308	PHENSEDYL .....	525	POVIDAX SOLUTION .....	537
PENIVORAL FORTE .....	308	PHENSEDYL EXPECTORANT .....	533	POVIDINE SOLUTION .....	537
PEMIX .....	271	PHENYNTAL .....	197	POVIDONE MOUTH	
PENMIX FORTE INJ .....	271	PHENYNTAL-30/150 .....	197	WASH .....	542
PENQUIN .....	292	PHERIMOL TABS .....	224	POVIDONE VAGINAL .....	515
PENTADERM CREAM .....	556	PHEXIN .....	283	POWER GESIC .....	451
PENTALGIN INJ .....	222	PHOSFOMIN .....	474	PRACTIN .....	182
PENTAVITE .....	468-474	PHOSFOMIN IRON .....	468	PRACTIN SYRUP .....	182
PENTAVON .....	222	PHYLOBID .....	526	PRACTIN TABS .....	466
PENTAWIN .....	222	PIBIZYME LIQUID .....	152	PRAGMATAR .....	556
PENTAZSOCINE INJ .....	222	PIF .....	306	PRAGMATAR OINT .....	559
PENTIDS .....	308	PIFLASYN I.V. .....	306	PRAVIDEL .....	211-484
PENTIN .....	306	PIFLASYN TABS .....	306	PRAZEP .....	239
PENTOFYL .....	166	PILOCAR .....	547	PRAZEP-2 .....	239
PENTOREL .....	219	PIMAFUCIN EYE DROPS .....	545	PREGNIDOXIN .....	205
PENZYL .....	222	PIMAFUSIN VAGINAL		PREGNORM .....	493
PEPGARD .....	40	TABS .....	517	PREGNORM 75/150 IU .....	491
PEPGARD FORTE .....	40	PIODIN .....	553	PREGNYL .....	484
PEPTICA .....	13	PIPCOL .....	67	PREGONAL-75/150 .....	493
PEPTICAINE .....	16	PIPRAPEN INJ .....	309	PREMARINN TABS .....	83
PEPTILCER .....	44	PIRALDINA .....	369	PREMEZOL INJ .....	20
PERIM .....	204	PIRATAM .....	227	PREMICILLIN INJ .....	271
PEPRINORM .....	206	PIRICAM .....	463	PREMOBION .....	474
PERINORM INJ .....	206	PIRITON		PREMOCLOX 250/500 .....	271
PERINORM LIQUID .....	206	EXPECTORANT .....	181-533	PREMOCLOX INJ .....	271
PERIONE .....	178	PIRITON TABS .....	181	PREMODEX INJ I.P. .....	428
PERITOL .....	182-466	PIROX 10/20 CAPS .....	463	PREMOGYL INJ .....	20
PERITOL SYRUP .....	182	PIROX DISTABS .....	463	PREMOLYTE-G .....	429



PREMOQUIN INJ	354
PREMSPOR	283
PRENATAL CAPS	479
PREPULSID	58
PRESOLAR	114-127
PREZOLIN	278
PRILEX	284
PRILEX INJ	278
PRIMICIN EYE DROPS	545
PRIMICIN INJ	300
PRIMIKACIN	259
PRIMOLUTIN	494
PRIMOVLAR 30	490-496
PRIMOX	241
PRIMPROST	501
PROBANTHINE	35-67
PROBOFEX	465
PROBOFEX CAPS	468
PROCISA	58
PROCTINAL	211-484
PROCTO QUINOL	33
PROCTO SEDYL	33
PRODAC	238
PRODEP	238
PROFASI	484
PROFENID CR	456
PROFENTOL SUSP	455
PROFERIN	468
PROFETON	471
PROFLOX	306
PROFLOX EYE DROPS	545
PROKINE	58
PROLINATE INJ	244
PROLIQ	471
PROLOID	406
PROMALGIN	218
PROMASUN	190-208
PROMETHAZINE HCL INJ	190
PROMOL	455
PROMPICIN	271
PRONESTYL	137
PRONUTRIN	471
PRONUTRIN CAPS	471
PROPAL	120
PROPAMID MPS	206, 13
PROPAMID PMS GEL	206
PROSOYAL	471
PROSTAMID	319
PROSTIMINE TABS/INJ	445
PROSTODIN	500
PROSUP	471

PROTHIADEN	236
PROTINULES	471
PROTO-BORIC	549
PROTOCOL	44
PROTOFER	471
PROTOMEAL	471
PROTOSOL INJ	427
PROTUSSA PLUS	526-533
PROVERA	485
PROVIRONUM	484
PROXYTAB	220-224-447
PROXYVON	220-447
PUBERGEN	484
PULMICORT INHALER	526
PULMOREST	526
PULMOREST PLUS SYRUP	526
PULSID	58
PULSID SUSP	58
PUPILETTO FORTE	548
PURINETHOL	329
PURSENNID	81
PYLOCID	46
PYOPEN	273
PYRALFIN	357
PYRALFIN SUSP	357
PYRAPHASE 500/750	369
PYRICONTIN	474
PYRICORT	545
PYRIDIUM	421
PYRIGESIC	224
PYRMOATE TABS	343
PYROSED	224
PYZINA	369
PZA-CIBA 500/750	369
Q-BID	292
Q-BID EYE/EAR DROPS	545
QCB	292
QUADRIDERM	589
QUADRUPLE VACCINE INJ	89
QUCIN	306
QUEP 250/FORTE	292
QUESTRAN	167
QUGYL	27
QUGYL SYRUP	27
QUIET	230
QUIN INGA	367
QUIN INGA INJ	367
QUINIDINE	137
QUINOBACT	292
QUINOBACT EYE/	

DROPS	545
QUINOLOX	385
QUINROSS INJ	354
QUINROSS TABS/DS TABS	354
QUINTON	292
QUINTON EYE DROPS	545
QUINTON INFUSION	292
R-CIN	370
R-CIN SYRUP	370
R-CINEX	367
R-CINEX Z	370
R.B. TONE	468
RABIPUR	96
RAFLOX	292
RAFTACE	9, 10
RALCEF	284
RALCRIZYME	52
RALSWEET	482
RAMACE	145
RANIAL	40
RANITIDINE	40
RANITIN	40
RANITIN INJ	40
RANTAC	40
RANTAC INJ	40
RANTI TABS 150	40
RAPIDICA	389-390
RARICAP FORTE	468
RASH FREE	567
RASTINON	386
RBFLEX	166
RBFLEX INJ	166
RECLOR	286
RECOCIF	292
RECOL	109
REDIPLEX	468
REDITONE PLUS	468
REDUCIN	461
REFLIN	278
REFTACE TABS/LIQUID	10
REGILAC-B	474
REGLAN	206
REGLAN INJ	206
REGLAN SYRUP	206
REGUBEAT	136
REJUN	485
RELAXYL	430, 506
RELAXYL TABS	451
RELCEP GEL	14
REMCLOX CAPS	271
REMCLOX DRY SYRUP	271



REMULIDE.....	460	RINIZIDE.....	368-371	SCABOMA CREAM.....	558
RENEDIL.....	145	RIPHARMED.....	372	SCALTIX.....	559
REPARIL.....	461	RIPHARMED SYRUP.....	372	SCOLINE INJ.....	443
REPTILASE.....	84	RIVOTRIL.....	196	SECNIL.....	363-516
RESEC.....	44	ROBIFLAM.....	440	SECNIL FORTE.....	363
RESOCHIN.....	354	ROBIFLAM 400.....	440	SECTRAL-200.....	111
RESPIMOX.....	265	ROBINAX TABS/INJ.....	440	SECZOL.....	363
RESPIRA SYRUP.....	519	ROBINAXOL.....	440	SECZOL DS.....	362-516
RESPIRA TABS/SYRUP.....	533	ROCEPH.....	284	SEFGARD.....	124
RESPORIDEX.....	284	ROCEPH DRY SYRUP.....	284	SEFLOX.....	292
RESPOSYRUP.....	533	ROLAC.....	14	SELCA.....	114
RESPREN.....	526	ROLAC PLUS.....	13	SELERIN-5.....	215
RESTECLIN.....	288	ROLOX.....	306	SELGIN TABS.....	215
RESTIMULEN.....	535-536	ROSCILLIN.....	271	SELOPRES.....	117
RESTIMULEN PEARLS.....	535	ROSCILLIN INJ.....	271	SELOPRES-50.....	117-155
RESTOREM.....	256	ROSCILLIN PAED		SELSUN SUSP.....	559
RETYL.....	230	DROPS.....	271	SEMBRINA 250.....	149
RETINO-A.....	552	ROVACOR.....	109	SEMI DAONIL.....	392
RETROVIR.....	376	ROVAMYCIN.....	312	SEMI EUGLUCON.....	392
REVITAL.....	464	ROVAMYCIN FORTE.....	312	SENORM.....	251
REVITAL LIQUID.....	464	ROXIBID.....	311	SENORM LA INJ.....	251
REZIPEN.....	423	ROXID.....	311	SENORM-5 INJ.....	251
RHIZIN.....	180	ROXIMOL.....	311	SENSIVAL.....	241
RIBUFEN GEL.....	455	ROXIN.....	406	SENSORCAINE.....	171
RIDAZIN.....	248	ROXITEM.....	311	SENSORCAINE	
RIDCER.....	40	ROXYROL.....	311	HEAVY 0.5%.....	171
RIDCER INJ.....	40	RULIDE.....	311	SENSORCAINE SPINAL.....	172
RIDCORN.....	538	RUMANIL.....	455	SENSORCAINE WITH	
RIDINOX DROPS/OINT.....	549	RYTMONORM.....	138	ADRENALINE.....	172
RIDOL SOLN.....	30	SAGENTYL.....	516	SEPEXIN.....	284
RIFA 1-6 ADULT.....	370	SAGENTYL-DS.....	363	SEPEXIN DRY SYRUP.....	284
RIFACOM.....	370	SALAZOPYRIN.....	69	SEPMAX.....	317
RIFACOM EZ.....	371	SALAZOPYRIN EN.....	69	SEPTRAN.....	317
RIFACOM-Z KIT.....	371	SALBETOL.....	526	SEPTRAN PAED SUSP.....	317
RIFADIN-INH.....	367-371	SALINEX.....	154	SERACCEL.....	91
RIFINEX PLUS.....	371	SALZER.....	411	SERADOL.....	251
RIFLUX.....	10	SAN-GA-REE ELIXIR.....	474	SERADOL INJ.....	251
RIFLUX FORTE.....	10	SANDOCAL-500.....	477	SERADOL PLUS.....	251
RIFLUX LIQUID.....	10	SANDOGLOBULIN.....	95	SEREBANTHINE.....	36, 67
RIMACTANE.....	371	SANTEVINI.....	479	SERENACE.....	251
RIMACTANE SYRUP.....	371	SANVITONE.....	479	SEREPAX.....	257
RIMACTAZID.....	367	SANZYME.....	52	SEREPAX 30 TABS.....	257
RIMACTAZID+Z.....	371	SANZYME DS TABS.....	14	SERIDAC.....	240
RIMACTAZID-450.....	371	SARIL.....	27	SEROCRYPTIN.....	211-484
RIMEVAX.....	98	SAROTENA.....	233	SERPA.....	464
RIMODAR.....	358	SARPLAZINO.....	151	SERVOPRIM PAED TAB/SUSP.....	317
RIMPAZID-450.....	371	SATERGIN.....	504	SETRIDE EYE DROPS.....	545
RIMPIN.....	371	SCABEX.....	558	SHELCA SYRUP.....	477
RIMPIN SYRUP.....	371	SCABEX-S CREAM.....	558	SHELCAL-250/500.....	477
RIMPINAH.....	368-371	SCABINE LOTION/		SIBELIUM.....	170
RINGER LACTATE		CREAM.....	558	SIGMA-CALVIT.....	477
INJ I.P. ....	432	SCABOMA.....	558	SIGMADERM.....	558



SIGMAZINE .....	249	SOLU-MEDROL .....	402	STEMIN ORAL DROPS .....	399
SIGMAZOL CREAM .....	514-556	SOLUBET INJ .....	399	STEMIZ .....	179
SIGMET .....	206	SOLUBET ORAL DROPS .....	399	STEMIZ SUSP .....	179
SIGMET INJ .....	206	SOLUNAC .....	451	STERADENT .....	542
SII POLYVALENT .....	92	SOPARIN-KID .....	224	STERADENT POWDER .....	539
SILODERM CB CREAM .....	556	SORBACID .....	14	STERILE CEFOTAXIME .....	279
SILODERM MIXI CREAM .....	556	SORBACID GEL .....	15	STILAMIN .....	89
SILOX FORTE GEL .....	14	SORBICAP .....	132	STIMULIV .....	55
SILOXOGENE .....	14	SORBILINE .....	55	STIMULIV TABS .....	55
SILVER SULPHADIAZINE		SORBITRATE .....	132	STREPTASE .....	76
CREAM .....	553	SORVICIN .....	475	STREPTO ERBAZIDE .....	373
SIL VEREX CREAM .....	553	SOSECON TABS .....	222	STREPTOMAGMA .....	27
SILVERES-1 .....	545	SOTAGARD .....	121	STREPTOMAGMA GEL .....	27
SILYBON-70 .....	56	SOYAL .....	471	STRESS CAPS .....	474
SIMECO TABS/SUSP .....	14	SPAGYL SUSP .....	27	STROX .....	292
SINIUM CREAM .....	556	SPASMIZOL-K .....	425	STUGERON .....	161-202
SINIUM V .....	556	SPASMO PROXYVON ...	35, 220	STUGERON FORTE .....	161-202
SINIUM VAGINAL .....	511	SPASRIL .....	64	STYPTOCHROME INJ I.M.81	
SINTAMIL .....	241	SPASTHELENE .....	67	STYPTOCID .....	81, 85
SINUMOL TABS .....	224	SPECIAL ASTHMA MIXED		STYPTOCID FORTE INJ .....	81
SIOCHROME .....	80	VACCINE .....	100	STYPTOCID INJ .....	85
SIOCITRATE .....	411	SPECIAL ECZEMA MIXED		STYPTOMET .....	81-504
SIOLAN INJ .....	103	VACCINE .....	100	STYPTOVIT .....	81
SIOLAN-12 INJ .....	103	SPIRACIN .....	312	SUBAMYCIN .....	288
SIORIL .....	461	SPIRACIN SUSP .....	312	SUBAMYCIN	
SIOZIDE .....	368	SPIROMIDE .....	412, 154	CAPLETS500 .....	288
SIPHENE .....	485	SPORANOX .....	351	SUBDU .....	220-447-455
SIQUIL .....	209-250	SPOREN 500 CAPS .....	284	SUCCINYL CHOLINE CL .....	482
SIQUIL INJ .....	209-250	SPOREN CAPS .....	284	SUCRACE .....	45
SIRDALUD .....	443	SPORIDEX .....	284	SUDHINOL .....	220-447
SISOPTIN-50 .....	312	SPORIDEX SUSP .....	284	SUGARIL .....	461
SIXAPP .....	468	SPORLAC .....	102	SUGAR FREE TABS .....	482
SIZON .....	180	SPORLAC POWDER .....	102	SULBACIN .....	271
SIZON SYRUP .....	180	SPOROSTACIN .....	510	SULBACIN 750 .....	271
SIZOPIN .....	236	SSZ APLICAPS .....	545	SULFAMINE .....	358
SKINMENT .....	557	STADMED BETA .....	114	SULPHADIAZINE .....	313
SKIZORIL .....	236	STAFEN .....	518	SULPHAMETHIZOLE .....	421
SLIMERAX .....	481	STAMINE INJ .....	474	SUMETROL .....	317
SODIUM BICARBONATE		STAN DS .....	317	SUNPRAZIN .....	242
INJ .....	432	STAPHNII .....	294	SUPACEF .....	280
SODIUM CHLORIDE SOLN		STAPHNIL INJ .....	294	SUPRAFLOX .....	292
0.45%, 0.9%, 5%, 20% .....	433	STATUM .....	557	SUPRICORT .....	571
SODIUM LACTATE INJ .....	433	STATUM B LOTION/		SUPRIMOX .....	265
SOFRADAX CREAM .....	557	CREAM .....	557	SUPRIMOX INJ .....	265
SOFRAMYCIN EYE		STATUM DUSTING POWDER .....	557	SUPROX .....	164-503
DROPS .....	545	STATUM LOTION .....	557	SUPROX INJ .....	164-503
SOFRAMYCIN OPHTHALMIC		STATUM PLUS .....	557	SUPROX SR .....	164-503
OINT .....	545	STATUM VAGINAL TABS .....	511	SURFAZ .....	557
SOFRAMYCIN SKIN		STEDEX INJ .....	400	SURFAZ DUSTING .....	232
CREAM .....	553	STEMETIL .....	207-246	SURVECTOR .....	232
SOLACID SUSP/TABS .....	14	STEMETIL INJ .....	207-246	SURFAZ SN CREAM .....	557
SOLACID-O SUSP .....	14	STEMIN .....	399	SURFAZ VAGINAL TABS .....	345



SURFLOX TABS .....	305	TENFRI .....	142	THROMBOSPRIN .....	72
SURGIDRES .....	538	TENOCLOD .....	115-153	THROMYCIN .....	299
SUSTANON "100"/"250" .....	498	TENOFED .....	127, 115	THROMYCIN DRY	
SWEETEX PELLETS .....	482	TENOFED CAPS .....	115	SYRUP .....	299
SYLANS .....	42	TENOLOL .....	115	THYROZOLE .....	405
SYMOXYL .....	265	TENORIC .....	115	TIBICIN SUSP .....	372
SYMOXYL BR .....	265	TENORIC-50 .....	115-153	TIBIKIT PLUS .....	372
SYMOXYL BR SUSP .....	265	TENORMIN .....	115	TIBINES-450 .....	372
SYMOXYL DRY SYRUP .....	265	TENORVATE-G .....	570	TIBIRIM INH .....	368-372
SYNASTAT .....	317	TENORVATE-M .....	570	TICLOP .....	77
SYNASTAT PAED SUSP .....	317	TENSARIL .....	248	TICLOPIDINE .....	78
SYNDOPA 110/275 .....	212	TENSICARD .....	115	TICLOVAS .....	78
SYNDOPA CR .....	213	TENSIMIN .....	115	TIDIGESIC .....	219
SYNDOPA PLUS .....	212-213	TERDANE .....	191	TIDOCOL .....	69
SYNTOCINON .....	505	TERDANE SUSP .....	191	TIDOMET FORTE .....	212-213
SYSCAN .....	347-512-542	TERF .....	191	TIDOMET L.S .....	212-213
SYSCAN INFUSION .....	347	TERF SUSP .....	191	TIDOMET PLUS .....	212-213
SYSPRIDE .....	58	TERFAX SUSP .....	191	TILODOXON INJ .....	475
SYSPRIDE MPS .....	58	TERFAX-60 .....	191	TILSTIGMIN TABS/INJ .....	445
SYSTACORT .....	399	TERFED TABS/SUSP .....	191	TIMOLO EYE DROPS .....	547
SYSTAFLAM .....	229-438-447	TERIGON .....	191	TIMOPTAL EYE DROPS .....	547
SYSTAFLAM CREAM .....	451	TERIGON TAB .....	191	TINADERM .....	557
SYU .....	471	TERIN .....	191	TINADERM CREAM .....	557
TABALON .....	455	TERIN SUSP .....	191	TINI 75/150 SUSP .....	22
TABROL .....	317	TERRAMYCIN .....	288	TINI-300/500 .....	22
TAGERA .....	363-516	TERRAMYCIN I.M .....	288	TINI-500 .....	517
TAGRID .....	206-22	TERRAMYCIN SF CAPS .....	288	TINI-F TABS/SUSP .....	22
TAMOFEN .....	335	TERRAMYCIN SKIN		TINIBA 300/500/1000 .....	22
TAMLOD .....	146	OINT .....	534	TINIBA INFUSION .....	22
TAMOXIFEN .....	335	TESTANON 25/50 .....	498	TINIBA-N TABS .....	22
TAMOXIFEN LYKA .....	335	TESTOVIRON DEPOT .....	498	TINIBID-DS .....	22
TANCODEP .....	239	TESTOVIRON INJ .....	498	TINICIDE .....	22
TANCODEP-2 .....	239	TETANUS ANTITOXIN .....	96	TINICIDE FORTE .....	22
TANTUM CREAM .....	566	TETANUS TOXOID .....	101	TINICIDE-V .....	517
TANTUM ORAL RINSE .....	542	TETANUS TOXOID I.P .....	101	TINIDAFLY .....	22, 517
TAVEGYL .....	181	TETRACYCLINE HCL .....	288	TINIDAFLY PLUS .....	22
TAVEGYL SYRUP .....	181	TETRADEP .....	240	TINIFLOX .....	22, 27
TAVIST .....	181	TETRADOX .....	296	TINOR .....	22
RAVIST SYRUP .....	181	TETRAMAC CAPS .....	288	TINOXIN .....	22
TAXCEF .....	279	THEMIBUTOL .....	365	TIXYLIX .....	189-533
TAXIM .....	279, 61	THEMIBUTOL PLUS .....	365	TOBACIN .....	546
TAZODA .....	252	THEO-ASTHALIN .....	526	TOBAZON .....	546
TEDIN .....	191	THEO-ASTHALIN SYRUP .....	526	TOBUR .....	41
TEDIN SYRUP .....	191	THEOMAC .....	526	TOCOFER .....	476
TEDRAL LIQUID .....	526	THERAGRAN-M .....	474	TODAY .....	499
TEDRAL SA .....	526	THIORIL .....	248	TOFRIN .....	191
TEEJAL TEETHING GEL .....	539	THIOSOL INJ .....	177	TOFRIN SUSP .....	191
TEFICON .....	191	THIOTEPA .....	323	TOLAGIN .....	218
TEGRETOL 100/200/400 .....	195	THREOCYLINE .....	288	TOLBET CREAM .....	569
TEGRETOL SYRUP .....	195	THROMBONIL .....	73	TOMID .....	206
TELOL .....	115	THROMBOPHOB .....	74, 561	TONIAZOL .....	468
TENASE .....	115	THROMBOPHOB GEL .....	74	TONOFERON .....	468



TONOFERON DROPS.....469	TRIGAN INJ.....426	TYPHIM-VI.....102
TOPCEF.....275	TRIGLOBE.....315	TYPHOID PARA TYPHOID
TOPCID.....41	TRIGLOBE SUSP.....315	VACCINE.....101
TOPIFORT CREAM.....570	TRIGLYD.....108	TYPHORAL.....102
TOPINATE CREAM.....570	TRIKA.....230	UDCA.....55
TORMOXIN.....265	TRIMEXOL TABS/SUSP.....317	UDILAN.....164
TORMOXIN DRY SYRUP.....265	TRIMOVAX (MMR).....97	UDILAN INJ.....164
TOROCEF.....277	TRINERGIC.....464	UKIDAN.....79
TOROLAC.....457	TRINEUROSOL.....474	ULBEN.....340
TORVIN.....457	TRINEUROSOL DROPS.....475	ULBEN SYRUP.....340
TOSS GEL.....542	TRINEUROSOL-H INJ.....475	ULCEKON.....45
TOSS K TOOTH PASTE.....539	TRINICALM.....249	ULCEREX 150/300.....41
TOSS TOOTH PASTE.....539	TRINICALM FORTE.....216-242	ULCERFATE.....45
TOSSEX IMPROVED.....534	TRINICALM PLUS.....216-249	ULCIBAN.....41
TPRIM SUSP/FORTE.....317	TRINORM.....251	ULCIMAX.....41
TRACRIUM.....436	TRINORM-1.5/5/10.....216	ULCINIL-F.....41
TRAMAZAC.....225	TRIPERIDOL.....250	ULCITAB.....41
TRAMAZAC CAPS.....225	TRIPERIDOL INJ.....250	ULGEL SUSP/TABS.....15
TRANCODOL.....251	TRIPHEN.....216	ULIX-P.....419
TRANCODOL INJ.....251	TRIPHENAZIN.....217	ULTAC.....41
TRANINOL.....230	TRIPLE ANTIGEN.....101	ULTIDIN.....41
TRAPEX.....256	TRIPLE SULPHA.....515	ULTIRON TR.....469
TRASIC.....225	TRIPRESS.....163, 117	ULTRA-K.....451
TRAZALON.....252	TRIQUILAR.....492	ULTRACAINE GEL.....15
TRAZE 25/50/100.....252	TRISULFA CREAM.....515	ULTRAGIN SYRUP.....218
TRAZINE.....249	TRISULFOSE.....317	ULTRALAN.....572
TRAZINE-H.....216-249	TRITOFEN.....518	ULTRAPROCT.....32-572
TRAZINE-SO.....249, 216-242	TRITOFEN SYRUP.....518	SUPPOSITORIES.....32, 572
TRAZODEP.....252	TRIVASTALA.....217-227	ULTRASPORIN.....284
TRAZONIL.....252	TRIVIRATEN.....97	ULTROX.....315-317
TRENTAL INFUSION.....166	TRIZ.....180	ULTROX SUSP.....317
TRENTAL-400.....166	TRIZ SYRUP.....180	ULZOL.....44
TRESIVAC.....97	TRIZAC.....238	UNICARBAZAN.....338
TRESMOX.....265	TROFENTYL.....221	UNICARBAZAN
TREXYDIN.....191-534	TROMAGESIC.....451	FORTE 250.....338
TREXYL.....191	TROMAGESIC INJ.....451	UNIDROL.....402
TREXYL SUSP.....191	TROMALGIN.....218-461	UNIZYME MPS.....52
TRIBEN DUSTING	TRONAL TABS/INJ.....457	UNIMEZOL.....513
POWDER.....557	TROPICO EYE DROPS.....548	UNIPRIDE.....58
TRIBEN LOTION.....557	TROPISYN EYE DROP.....548	UNIWARFIN.....79
TRIBEN PLUS CREAM.....557	TROYCAL.....477	UNIZYME SYRUP.....52
TRIBEN VAGINAL.....511, 345	TROYCEF.....280	URIBEN.....305
TRIBUSYNTH.....455	TRYMO.....48	URISPAS.....424
TRICAIN MP5.....16	TRYPTOMER.....233	URODIXIC.....419
TRICAL-D 250/500.....477	TUSSIVIL.....526	UROFLOX.....305
TRICLORYL SYRUP.....258	TWC 30.....224	UROGRAFIN.....381
TRICORT-10/40.....404	TWINDIX KID TABS.....20	UROKINASE.....78
TRICOX.....368	TWINDIX SUSPENSION.....20	UROLUCOSIL.....315-421
TRICOX FORTE.....372	TWINDIX TABS.....20	UROMIRO 24%
TRIDAZOLE.....22, 517	TYDE-S INJ.....288	INFUSION.....379
TRIDEP.....233	TYKLID.....78	UROVIDEO 76%.....381
TRIGAN.....426	TYLOX-2.....30	UTIBID.....305



UTIDIX.....	419	VITAMYCETIN SYRUP .....	286	XTRAGESIC .....	455
UTIDIX SUSP.....	419	VITAPLEX.....	474	XYLOCAINE .....	173
UTREGIN .....	504	VITAZYME.....	52	XYLOCAINE 2% WITH	
UTREGIN INJ .....	504	VITAZYME DROPS .....	52	ADRENALINE.....	173
UTROGESTAN.....	497	VITOCOFOL IRON CAP .....	469	XYLOCAINE 5% HEAVY.....	173
V.C.R.....	323	VITOCOFOL SYRUP WITH		XYLOCAINE JELLY.....	173
VALBET CREAM.....	569	IRON .....	469	XYLOCAINE OINTMENT.....	173
VALBET SCALP APPLICATION.		VITEOLIN.....	476	XYLOCAINE TOPICAL .....	173
569		VITNEURIN.....	474	XYLOCAINE VISCOUS.....	173
VALIUM-2.5,10 .....	254	VITONEX .....	471	XYLOCARD INJ 2% .....	134
VALOSIN .....	444,58,507	VIVIRIL.....	143	XYMEX.....	53
VALPARIN .....	200	VIVIRIL-D.....	143	XYMEX DROPS .....	53
VALPARIN ALKALETS.....	200	VIVOCYCLINE.....	296	XYTID.....	265
VALPARIN LIQUID.....	200	VIZ CAPS.....	479	XYTID DRY SYRUP .....	265
VALPROL .....	200	VIZOL .....	549	YUTOPAR.....	507
VANCOCIN-CP.....	318	VIZYLAC .....	53,103	YUTOPAR INJ.....	507
VANCORID CP.....	318	VIZYLAC SYRUP .....	53	ZACTANE .....	41
VASONIT 10/20/30 TABS.....	133	VOLINI GEL .....	451	ZADINE .....	179
VASONORM-5/4.....	143	VOVERAN.....	451	ZAMOX 250/500 .....	265
VASOPRIL .....	143	VOVERAN EMULGEL.....	451	ZAMOX DISPERSIBLE	
VASOPTEN .....	129	VOVERAN INJ.....	451	TABS.....	265
VASOTOP.....	146	VOVERAN SR .....	451	ZARONTIN.....	197
VASOTOP INFUSION .....	146	WALACORT .....	399	ZE-SPAS.....	423-458
VBC-12 INJ.....	474	WALAGESIC .....	220-224	ZEDASE.....	464
VECREDEL .....	502	WALAMYCIN SUSP.....	295	ZEDEX .....	534
VENEX 300/500.....	31	WALAVIN 250 .....	348	ZEET EXPECTORANT.....	534
VENPHENICOL INJ .....	286	WALAVIN-FP.....	348	ZEFONE.....	277
VENT.....	526	WARCILIN .....	265	ZEN RETARD .....	195
VENT FORTE .....	536	WARCILIN DRY SYRUP .....	265	ZEN-200 .....	195
VENT LIQUID .....	526	WAXOLVE .....	546	ZENAD .....	191
VENTAKOF.....	526	WINOFT GINSENG .....	464	ZENAD SUSP .....	191
VENTORLIN .....	526	WINOFT GINSENG CAPS.....	464	ZENAX .....	231
VENTORLIN EXPT.....	526	WINTREL.....	526	ZENOPRAX .....	231
VERAMIL .....	130	WOKADINE .....	554	ZENTEL .....	340
VERITOL AMPOULES/		WOKADINE GARGLE.....	542	ZENTEL SUSP .....	340
LIQUID .....	171	WOKADINE POWDER.....	544	ZEPTOL .....	195
VERMISOL .....	340	WOKADINE SCRUB .....	537	ZEROSMA .....	518
VERSZUR .....	195	WOKEX-4 .....	372	ZETOP .....	180
VERTIGON .....	161-202	WOMIBAN .....	340	ZEDARM-S .....	568
VERTIGON-75 .....	202	WORMIN.....	341	ZIDOVIR.....	376
VERTIN .....	201	WORMIN SYRUP .....	341	ZIL .....	23,517
VESPARAX.....	255	WYCORT .....	573	ZIMALGIN .....	218-224
VIBAZINE DT.....	296	WYCORT INJ.....	401	ZINAMIDE .....	58
VICTOFOL DROPS .....	475	WYGESIC .....	220-224-447	ZINETAC.....	41
VICTOFOL INJ .....	475	WYMESONE.....	400	ZINGISOL .....	539
VINCRISTINE .....	323	WYMESONE INJ .....	400	ZINULIN .....	389
VIRAZIDE.....	375	WYSERIN .....	292	ZIPCIN.....	292
VIRAZIDE SYRUP .....	375	WYSOLONE .....	403	ZIRLON .....	180
VISCID .....	15	XENOBID .....	459	ZIRTIN.....	180
VISCODYNE .....	534	XERO-SED .....	180	ZITHROMAX.....	272
VISKEN.....	119	XIPAMID .....	157-417	ZOA FORTE .....	23
VITAMYCETIN.....	286	XITMA .....	526	ZOACIDE DS .....	23



ZOACIDE-500.....	23
ZOACIDE-V.....	517, 557
ZOCON.....	347-512
ZOCON INFUSION.....	347-512
ZODIC-P.....	451
ZOFEN-K.....	451
ZOLAM.....	231
ZOLANDIN.....	462
ZOLAX.....	231
ZOLE.....	514, 557
ZOLE DUSTING POWDER.....	557
ZOLE OVULE.....	514
ZOLE-F.....	557
ZOPTIC EYE DROPS/OINT.....	557
ZORAN.....	41
ZOROVON.....	457
ZOROVON INJ.....	458
ZOTER.....	191
ZOTER SUSP.....	191
ZOVATE.....	568
ZOVIRAX I.V. INFUSION.....	374
ZOXAN.....	292
ZUCOX KIT.....	372
ZUCOX PLUS CAP TABS.....	372
ZUMIN.....	341
ZUPAR.....	455
ZYMMUNE.....	336
ZYNCET.....	180
ZYRTEC.....	180
ZYRTEC SYRUP.....	180
ZYTEE TEETHING GEL.....	539
pH4.....	13
pH4 SUSP.....	13

# AYURVEDIC INDEX

ABANA.....	584
ACIDINOL.....	574
ADDYZOA.....	598
ALARSKIN.....	588-610
ALLERIN.....	585
ALLERKHAND.....	606
ALOES COMPOUND.....	599
ALPITONE.....	595
ALSAREX.....	574
ALURETIC.....	591
AMLJEER SYRUP.....	574
ANAZYM SYRUP.....	574
ANCARE.....	583
ARJIN.....	584
ARJUNIN.....	584
ARSHONYT.....	575
ARSOL.....	575
ARTHROM.....	592
ASMAGARD.....	606
AYAPON.....	583
AYUR.....	
B & M PILLS.....	595
B.H.PILLS OR SHILAJIT PILLS/FORTE.....	599
BACTIMO.....	610
BANGSHIL.....	591
BANOVIT.....	599
BILOVAS TABS.....	585
BIO-GAL.....	575
BONNISAN.....	595
BRAHAMDINE.....	599
BRAVOBOL.....	585
BRENTA.....	586
BRIFRIL.....	606
CALCUROSIN.....	591
CALCURY.....	591
CARIOTONE-M.....	584
CARIOTONES-S.....	584
CEA TANGLE TENT (C.T.T.).....	599
CEPHAGRAINE.....	586
CEVIT.....	595
CHESOL.....	593
CHINIUMCO.....	583
CHIRAKIN.....	589
CLAREX.....	610
COLICARMIN.....	575
CONSTILAX.....	575
CORAZAN.....	606
CURX COUGH SYRUP WITH	

TULSI.....	607
CUTFAR OINT.....	610
CYSTONE.....	591
DANGINE.....	607
DEKOFECYN.....	607
DENTOSOL.....	610
DERMAFEX.....	588
DERMAFEX CREAM.....	611
DESMA.....	607
DETOSY.....	607
DIABECON.....	590
DIAREX.....	576
DIASYN.....	576
DIGEST.....	576
DRILL EXPECTORAN.....	608
DYGAID.....	576
ELPHA.....	595
ENTERODARIN.....	595
FATOF.....	596
FEMIFORTE.....	599
FEMIPLEX.....	596
FEROLIV.....	596
FETEX PASTE.....	600
FEUVRIL.....	586
FORTEGE.....	596
FTX.....	576
G 32.....	611
GARLILL.....	577
GASCUT.....	577
GASEX.....	577
GASOFIX.....	577
GASTREX.....	477
GASTROMONE.....	577
GERIFORTE.....	596
GESTONE.....	600
GLUSET.....	590
GLYSAN SYRUP.....	607
GRANDI CO.....	584
GUM TONE.....	611
GYNEC 20.....	600
H.P-200.....	587
HEMOPLEX.....	589
HEPANORM.....	578
HEPATOGARD.....	578
HERBITARS.....	578
HERBO SULPH.....	589
HERBOLAX.....	578
HIBRIL.....	586
HIMCOLIN.....	600
HONYMOON GOLD PILL.....	598
INFEE.....	578
IOBINE.....	608



J.K.22 .....	590
JERIAT .....	600
K4 TABLETS .....	592
KAMILLOSAN .....	611
KAMILLOSAN MOUTH SPRAY .....	611
KASKOL .....	608
KAYBEE .....	592
KOFLET .....	608
KOFLYN .....	608
KOFOL .....	608
KYNOTOMINE .....	579
LA-FORTE CAPS .....	600
LA-VIRIL CAPS .....	600
LAXATE & LAXATE FORTE .....	579
LEPTADEN .....	601
LICOGEN .....	601
LIPAN .....	596
LIV-52 .....	580
LIVEX .....	579
LIVMEGH SYRUP .....	579
LIVOMYSN .....	579
LIVOSYN .....	580
LIVOTRIT .....	580
LUCOGL .....	601
LUCOSYNTH-O .....	601
LUCOSYNTH-V .....	601
LUKOL .....	602
LUNAREX .....	602
M2 TONE .....	602
MAMTONE .....	602
MANOLL MANOLL .....	596
MEDITAB .....	609
MENORIL .....	602
MENTAT .....	587
MERSINA .....	590
MYRKAP .....	602
NEO .....	587
NEVOSS .....	587
OAKAY PILLS .....	603
OBENYL .....	597
OJUS .....	597
ORUCLYN .....	592
OVARIN .....	603
OVOUTOLINE .....	603
PEP CAPS .....	603
PEPTARD .....	580
PIGMENTO .....	611
PILEX .....	580
PILZAND .....	581
POLYMIX .....	581
POSEX .....	603

POTENZA .....	597
POWER PILLS .....	597
R-PYRIN .....	597
R. COMPOUND .....	593
RASGENT .....	611
REGULAX .....	581
REMITONE .....	593
REMORIN .....	587
REPEL .....	603
RHUMASYL .....	593
RHUMAYOG/RHUMAYOG WITH GOLD .....	593
RINGO .....	612
RHIPANTO .....	612
ROYAL ELPHA .....	597
RUMALAYA .....	594
RYMANYL .....	594
SAL PHOS .....	581
SAPERA .....	585
SATAVAREX .....	604
SAVOURYN .....	581
SENSA HERB .....	604
SENSA SPUR .....	604
SENZINE .....	604
SEPTILIN .....	609
SERPINA .....	585
SEXTON .....	604
SILEDIN .....	588
SIX C .....	612
SLIMIT .....	582
SOOKTYN .....	582
SPASMA .....	609
SPEMAN .....	604
SPEMAN FORTE .....	605
SPOLAX .....	582
STYPLON .....	583
SULPHONAX .....	589
SUPERGESIC CREAM .....	594
SUPERGESIC FORTE CREAM .....	594
SUPERTINE .....	597
SVERGEN .....	605
TENTEX FORTE .....	605
TRIBANGSHILA .....	590
TURAI-CO .....	592
ULTRA-LIV SYRUP .....	582
UREXYNOL .....	589
VEDNIL .....	594
VIGOREX .....	605
VIGORIT CAPS .....	597
VIGOROLL .....	598
VIROGEN-G .....	605
VIRAFIX .....	588
VITALIP .....	583
VITESSON .....	588

VITON 99 .....	598
VOMITEB .....	588
VYBRANT .....	605
VYSEX .....	606
WHOOPEX .....	609
ZANDUZYME .....	582
ZEFS .....	609
ZENIF SYRUP .....	609



# Deleted Products

Cumulative list of deleted products. Brands appearing in bold type have been deleted from the current issue

ALBUDAC Cadila Pharma  
ALDACTIDE RPG Life  
ALFAM-400 Albert-David  
ALFUMET Albert-David  
AMIBACTIN BD CFL Pharma  
AMINOPLASMA PREPS Wallace  
AMITROL Torrent  
AMLOPIN Lyka  
AMPILIN-SB Lyka  
ANAFEBRIN Themis Chemicals  
ANQUIN Lyka  
AQUASOL A USV  
AROVIT Piramal Healthcare  
ASMATERB RPG Life  
BACTOMET/C TABS Win-Medicare  
BARALGAN Hoechst  
BELLADENAL-IN Sandoz  
BENOGEN Rallis  
BETALOC DURULES Astra-IDL  
BIOPENCE Biochem  
BIOPROT Biochem  
BIOSPIRIN Biochem  
BISOLPENT German Remedies  
BIVINAL FORTE c VIT. C Alembic  
BRINERDIN Sandoz  
BPONCHOPHYL PLUS CFL Pharma  
CARBELIN Lyka  
CARDIOXIN INJ. Novartis  
CARDIWELL Torrent  
CELLUBRIL Astra-IDL  
CELLUMIDE FDC  
CEPHACILLIN Biddle Sawyer  
CEPHAXIN INJECTION Biochem  
CEPORAN Glaxo  
CLOMITROP Modi-Mundipharma  
CIPRIDE Torrent  
COLSIPAN German Remedies  
COMBANTRIN Pfizer  
COMPEBA IDPL  
CORBETA-40 D Sarabhai  
CORTEC PLUS Torrent  
COTARYL-H FDC  
CREMMAFIN c  
PHENOLPTHALEIN Knoll  
CRYS-4 Sarabhai  
DHE Inga  
DEPENDAL-M SmithKline  
DIABENESE Pfizer  
DICRYSTICIN-S PREPS. Sarabhai  
DIZYTONE Unichem  
DOXETAR Torrent  
E-MYCIN DRY  
SYRUP Themis Pharmaceuticals  
ECZO-BETADINE Win-Medicare  
EFCORLIN N EYE/EAR Allenburys  
ENCEPHABOL INF. Merck  
ENTROLATE PLUS Stadmed  
ERADACIL Win-Medicare  
ERGOPEN Inga  
ET-800 Wockhardt  
ETINOL Sarabhai  
FERRUM-FOL Khandelwal  
FLAGYL I.V. INJ. Rhone-Poulenc  
FLAGYL-DF Rhone-Poulenc  
FLAMAR-P Indoco  
FLUANXOL CFL Pharma  
FLUMAP Torrent  
FRADE Gulf

FUCIBET Wallace  
FUCIDIN-LEO Wallace  
FURATOR Biochem  
GASTROVISION German Remedies  
GESICARD Sarabhai Piramal  
GLUCAGON Torrent  
GONADOTROPHON L.H. Biochem  
HARTEZE Lyka  
HB PLUS Torrent  
HERPEX OPHTH. Torrent  
HEXINAL Torrent  
HIBITANE CONC ICI  
HIPHYLLIN Lyka  
HITERF Lyka  
HORMO-DUVADILAN Duphar  
IBUFLAMAR Indoco  
IBUFLAMAR-MX Indoco  
IBUFLAMAR-P KID Indoco  
INABUTOL Themis Chemicals  
INCIDAL Bayer  
INDERYTH SUSPENSION Indoco  
INOCOR Win-Medicare  
ISMELIN Ciba-Geigy  
ISOMACK RETARD Biochem  
ISOMERIDE Serdia  
ISOPTIN German Remedies  
IVEMETRO Torrent  
JAGRIL Jagson Pal  
KANAMYCIN Biochem  
KENALOG-S SKIN Sarabhai  
LADOGAL Win-Medicare  
LAXATIN Alembic  
LEDERMYCIN OINT. Cyanamid  
LIPOFUNDIN-S 10% Wallace  
LOGASCID FORTE Astra-IDL  
LOMODEX Rallis  
LY-BUTOL Lyka  
LYCORTIN-S Lyka  
LYKAPRIM DS Lyka  
LYMESAL Walter Bushnell  
LYNAMIDE Lyka  
LYNDIOL Infar  
LYRAMYCIN EYE/EAR Lyka  
LYRAMYCIN TOPICAL Lyka  
MADRIBON Piramal Healthcare  
MANDELAMINE Parke-Davis  
MICOGEL-F Cipla  
MICRONEG TABS Dabur  
MUCORIS-E FDC  
MULTIGAIN Torrent  
MYCOSTATIN OINT. Sarabhai  
NALAXYN Lyka  
NACPOT Systopic  
NEBACORTIL SKIN Pfizer  
NEGADIX-M TABS. CFL Pharma  
NEO-FERILEX Rallis  
NICINAL Cipla  
NIMOTIDE Torrent  
NITROMACK/RETARD Biochem  
NIVAQUINE-P FORTE Rhone-Poulenc  
NORBID/ EYE/EAR Alembic  
NUREN GEL Dabur  
OMICITE Torrent  
ONCOTOR Torrent  
ONE ALPHA LEO Wallace  
ORABOLIN Infar  
ORGALUTIN Infar  
ORGAMETRIAL Infar  
ORIPRIM-P EYE Cadila Healthcare  
ORPHAMOL Torrent  
OSSIDOSS Wockhardt  
OSTEOFAM INJ. Indoco  
OTEK/OTEK-P FDC  
OVULEN RPG Life  
PANZYNNORM German Remedies  
PARAMET SUSPENSION Wallace  
PARAZOLANDIN Sarabhai Piramal  
PENTAVON Jagson Pal

PENTIDS SYRUP Sarabhai  
PHENSEDYL EXPECTORANT/ Sarabhai  
DM-LINCTUS Rhone-Poulenc  
PIFLASYN Rhone-Poulenc  
PLAKICIDE MOUTH WASH RPG Life  
PLUTAMIDE Torrent  
PROFENID-CR Rhone-Poulenc  
PROMPICIN Geno  
PRONUTRIN CAPS. CFL Pharma  
RALCIDIN-S Rallis  
REAFERON Torrent  
REPARIL FDC  
RESTIMULEN Sarabhai Piramal  
RIFAMPILA Albert David  
ROXIN Cadila Healthcare  
RIMPIN-IPZ Lyka  
RUBRAGAN-HP Sarabhai  
RUBRATON Sarabhai  
SECTRAL Rhone-Poulenc  
SECTRAL PLUS Rhone-Poulenc  
SEFLOX Jagson Pal  
SELVIGON German Remedies  
SERPASIL Ciba-Geigy  
SII HUMAN ALBUMIN Serum Inst.  
SILOX FORTE Searle  
SIOCITRATE Albert-David  
SIOCOBIN Albert-David  
SIOZIDE Albert-David  
SOFRAMYCIN EYE OINT. Roussel  
SOOTHEX Win-Medicare  
SOSECON Win-Medicare  
SPAGYL Indoco  
SPEP Indoco  
STROMBA Win-Medicare  
SUGAFEN Sarabhai Piramal  
TAMOFEN Torrent  
TEDRAL Parke-Davis  
TEFICON Modi-Mundipharma  
TERBUSIN EXPECT. Wallace  
TERRACORTIL SKIN Pfizer  
TESTOVIRON German Remedies  
THALAZOLE Rhone-Poulenc  
THEREGRAN Sarabhai  
THYROZOLE Cadila Pharma  
TIBICIN SUSP. Themis Chemicals  
TIBIRIM Ranbaxy  
TIDOCOL Torrent  
TIDOMET Torrent  
TOFRIN Torrent  
TOLDIN Torrent  
TOLSOL Jagson Pal  
TOPCEF Torrent  
TORVIDONE Torrent  
TORVIN Torrent  
TOSSEX IMPROVED Sarabhai  
TRAZODEP Torrent  
TRIGAN Cadila Pharma  
TRIPRES Astra-IDL  
ULTRALAN German Remedies  
ULTRAPROCT German Remedies  
UNI-VITE Unichem  
UNIMEZOL SUSP./V. Unichem  
UROKINASE Win-Medicare  
VALIUM INJ. Piramal Healthcare  
VALLERGAN Rhone-Poulenc  
WINHYDRAN Win-Medicare  
WINSPRIN Win-Medicare  
WYPAL D.S. Jagson Pal  
ZOLANDIN PREPS. Sarabhai Piramal  
ZOPIC Centaur



## NEW ENTRIES

785

# New Entries

ACBIM	EMCURE		
(Clarithromycin 250mg)			
Tab	10	270.00	N.A.
ALA-100 (Alpha-lipoic Acid)	ALEMBIC		
Cap	15	N.A.	N.A.
ALERGO (Cetirizine 10mg)	GOOD HEALTH		
Tab	10	23.00	N.A.
Susp 5mg/5ml	60ml	24.00	N.A.
ALOREX	PURE HEALTHCARE		
(Silver sulphadiazine 1% w/w, Chlorhexidine Gluconate 0.20% w/w, Aloe 15% w/w, Allantoin 0.1% w/w per gm)			
Cream	20gm	35.00	N.A.
ALZOLEX (Alprazolam)	KEYWEST		
Tab 0.25mg	10	6.24	4.99
0.50mg	10	11.26	9.01
ALTACEF (Cefuroxime)	GLENMARK		
Tab 250mg	4	136.90	112.20
500mg	4	248.00	203.25
Susp 125mg/5ml	30ml	129.70	106.29
Inj 250mg	Vial	45.00	36.52
750mg	Vial	49.00	73.26
AMADAY (Amlodipine)	AJANTA PHARMA		
Cap 2.5mg	10	6.00	N.A.
5mg	10	9.50	N.A.
10mg	10	17.50	N.A.
AMBRODIL-S	ARISTO		
(Ambroxol Hcl 15mg, Salbutamol 1mg per ml)			
Susp	100ml	26.50	24.43
AMBICLOR	SALI HEALTHCARE		
(Amitriptyline Hcl 12.5mg, Chlordiazepoxide 5mg)			
Tab	10	8.30	N.A.
AMBICLOR DS	SALI HEALTHCARE		
(Amitriptyline Hcl 25mg, Chlordiazepoxide 10mg)			
Tab	10	13.20	N.A.
AMLOL	THEMIS		
(Amlodipine 5mg, Atenolol 50mg)			
Tab	10	25.14	N.A.
APKEF (Cephalexin)	AJANTA PHARMA		
Cap 250mg	10	59.00	N.A.
500mg	10	110.00	N.A.
OT 125mg	10	27.00	N.A.
ARIKADOM (Domperidone)	RKG PHARMA		
Tab 10mg	10	19.90	16.50
ARICAPLAM	RKG PHARMA		
(Diclofenac sodium 50mg, Paracetamol 325mg, Chlorzoxane 500mg)			
Tab	10	50.00	41.50
ARICABRON	RKG PHARMA		
(Etiophylline 100mg, Bromhexine 8mg, Terbutaline 2.5mg)			
Tab 500mg	4x30	114.00	95.00
ASCAZIN (Zinc Sulphate 220mg)	APEX		
Cap	200	160.00	N.A.

ASCORIL	GLENMARK		
(Sulbutamol 1mg, Bromhexine hydrochloride 2mg, Guafenesin 50mg, Menthol 0.5mg)			
Tab	10	6.25	5.35
ASCORIL-D	GLENMARK		
(Dextromethorphan Hydrobromide 10mg, Pseudoephedrine Hcl 30mg, Triportidine Hcl 1.25mg, Menthol 1.50mg per 5ml)			
Syrup	100ml	30.94	26.50
ATORLIP	RANBAXY(MRKT BY CIPLA)		
(Atorvastatin 10mg)			
Tab	10	210.00	N.A.
ATEEZ (Alprazolam)	EAST AFRICAN		
Tab 0.25mg	10	7.00	5.00
0.5mg	10	12.00	10.20
AZMUNE	INCA		
(Azathioprine 50mg)			
Tab	10	60.00	N.A.
BAROZAC (Fluoxetine Hcl)	BARODA PHARMA		
Tab	10	16.50	13.20
BENZ-2	SALI HEALTHCARE		
(Benzhexol Hcl 2mg)			
Tab	10	7.40	5.95
BETALOC 25	ASTRA-IDL		
(Metoprolol Tartrate 25mg)			
Tab	10	9.90	N.A.
BETAVERT	MILMET		
(Betahistine Hcl 8mg)			
Tab	10	N.A.	N.A.
BROZYME	BARODA PHARMA		
(Diastase (1:1200) 50mg, Pepsin(1:3000) 10mg per 5ml)			
Liquid	200ml	38.33	32.20
(Diastase (1:1200) 33.33mg, Pepsin(1:3000) 5mg, Vit B1 1mg, Vit B2 1mg, Vit B6 1mg, Vit B12 1mcg, Niacinamide 10mg per ml)			
Drop	15ml	16.50	13.86
(Diastase (1:1200) 50mg, Pepsin(1:3000) 10mg Simethicone)			
Tab	30	16.10	13.52
CALOS	SHAILMIL		
(Hydroxyapatite Providing Calcium 99mg, Phosphorous 45mg, Zinc Sulphate 20mg)			
Tab	20	15.00	12.60
(Hydroxyapatite Providing Calcium 99mg, Phosphorous 45mg, Ferrous Fumarate 300mg, Folic Acid 5mg)			
Forte Tab	10	9.40	7.99
CECARB	INTAS		
(Cephalexin 250mg, Carbocysteine 150mg)			
Cap	4	19.75	N.A.
(Cephalexin 500mg, Carbocysteine 150mg)			
Cap	4	38.25	N.A.



<b>CEFOX (Cefadroxyl)</b>	<b>RKG PHARMA</b>		
DT Tab 125mg	4x30	318.00	265.00
Tab 500mg	5	50.00	41.50
<b>CIFABID (Cefadroxil)</b>	<b>EAST AFRICAN</b>		
Tab 250mg	10	60.00	58.50
500mg	10	120.00	102.00
<b>CIPIN (Ciprofloxacin)</b>	<b>RKG PHARMA</b>		
Tab 250mg	10	34.00	28.30
500mg	10	65.00	54.00
750mg	10	87.50	73.00
<b>CIPINPLUS</b>	<b>RKG PHARMA</b>		
(Ciprofloxacin, Tinidazole)			
Tab 500+600mg	10	87.50	73.00
<b>CIPROFOX (Ciprofloxacin)</b>	<b>EAST AFRICAN</b>		
Tab 125mg	10	17.50	14.87
250mg	10	37.50	31.87
500mg	10	69.00	58.65
<b>CLAMOX</b>	<b>INGA LAB</b>		
(Amoxycillin 500mg, Clavulanic Acid 125mg)			
Tab	5	135.00	N.A.
<b>CYSTRAN (Oxybutynin)</b>	<b>INTAS</b>		
Tab 2.5 mg	10	N.A.	N.A.
5mg	10	N.A.	N.A.
<b>CZCOLD</b>	<b>LUPIN</b>		
(Cetirizine Di-Hcl 5mg, Phenylpropanolamine Hcl 25mg, Paracetamol 500mg)			
Tab	10	20.00	N.A.
<b>DIALOL</b>	<b>RKG PHARMA</b>		
(Propranolol Hcl 20mg, Diazepam 2.5mg)			
Tab	10	8.75	10.50
<b>DIAZ (Diazepam 10mg)</b>	<b>MANO PHARMA</b>		
Tab	10	9.90	N.A.
<b>DICLOTAB</b>	<b>BARODA PHARMA</b>		
(Diclofenac Sodium 50mg, Paracetamol 500mg)			
Tab	10	12.00	10.08
<b>DOBIUM</b>	<b>MANO</b>		
(Calcium Dobesilate Monohydrate 500mg)			
Cap	10	N.A.	N.A.
<b>DOLAMIDE</b>	<b>RANBAXY</b>		
(Nimesulide 100mg, Paracetamol 500mg)			
Tab	10	23.50	N.A.
<b>DYNAPAR (Diclofenac Sodium)</b>	<b>TROIKAA</b>		
Inj 25mg	5x3ml	22.50	18.44
<b>DYNAPAR-EC (Diclofenac Sodium)</b>	<b>TROIKAA</b>		
Tab 50mg	10	71.00	58.18
<b>DYNAPAR-SR</b>	<b>TROIKAA</b>		
(Diclofenac Sodium)			
Tab 100mg	10	131.60	107.85
<b>ELCAB (Lithium carbonate)</b>	<b>BARODA PHARMA</b>		
Tab 300mg	10	10.50	8.40
<b>ELAMIN</b>	<b>BARODA PHARMA</b>		
(Imipramine Hcl)			
Tab 25mg	10	5.60	4.48
75mg	10	12.50	10.00
<b>EMANZEN-D</b>	<b>EMCURE</b>		
(Serratopeptidase 10mg, Diclofenac Sodium 50mg)			
Tab	10	59.50	N.A.

<b>ENTHRO (Roxithromycin)</b>	<b>EAST AFRICAN</b>		
Tab 150mg	10	9.50	8.07
<b>EQUIZINE</b>	<b>RKG PHARMA</b>		
(Trifluoperazine Hcl 1mg, Chlordiazepoxide 10mg)			
Tab	4x30	7.00	N.A.
<b>ESMOX (Amoxycillin)</b>	<b>ABS REMEDIES</b>		
Cap 250mg	10	N.A.	N.A.
500mg	10	N.A.	N.A.
DT 125mg	10	N.A.	N.A.
250mg	10	N.A.	N.A.
<b>EURYTHMIC (Amiodarone)</b>	<b>TROIKAA</b>		
Tab 100mg	10	40.00	32.78
200mg	10	70.00	57.36
<b>EVIONCREAME</b>	<b>MERCK</b>		
(Tocopherol Acetate 1%w/w, Propylene Glycol 5% w/w, Liquid paratin)			
Cream	50g	N.A.	N.A.
<b>EZAMPS</b>	<b>PURE HEALTHCARE</b>		
(Cisapride 10mg, Poly Dimethylsiloxane 125mg)			
Tab	10	26.00	N.A.
<b>FELINIGEL</b>	<b>PURE HEALTHCARE</b>		
(Diclofenac diethylammonium 1.16%w/w equiv. to Diclofenac Sodium 1%w/w, Oleum Lini(containing predominantly alpha linolenic acid) 3%w/w, Methyl Salicylate 10%w/w, Menthol 5%w/w, Preservative Benzyl Alcohol 1% w/w per gm)			
Gel	30gm	39.90	N.A.
<b>FENCURE</b>	<b>BIO-ETHICALS</b>		
(Diclofenac diethylammonium 1.16%w/w equiv. to Diclofenac Sodium 1%w/w per gm)			
Gel	15gm	16.65	13.64
<b>FENGEL</b>	<b>PURE HEALTHCARE</b>		
(Diclofenac diethylammonium 1.16%w/w equiv. to Diclofenac Sodium 1%w/w per gm)			
Gel	30gm	26.50	N.A.
<b>FENTYL'F</b>	<b>KEYWEST</b>		
(Tinidazole 300mg, Diloxanide Furoate 250mg)			
Tab	10	17.95	15.08
<b>FENTYL</b>	<b>KEYWEST</b>		
(Metronidazole Benzoate 100mg, Furazolidone 25mg per 5ml)			
Susp	60ml	13.67	11.48
<b>FLIN (Ofloxacin)</b>	<b>RKG PHARMA</b>		
Tab 200mg	6	81.00	67.50
<b>FLOXIDATE</b>	<b>EAST AFRICAN</b>		
(Ofloxacin)			
Tab 200mg	10	180.00	153.00
<b>FORTACEF</b>	<b>TROIKAA</b>		
(Ceftazidime)			
Inj 250mg	Vial	108.00	88.50
500mg	Vial	186.00	152.43
1gm	Vial	290.00	237.99
<b>G.NIL</b>	<b>MANO PHARMA</b>		
(Glibenclamide)			
Tab 2.5mg	10	3.90	N.A.
5mg	10	6.70	N.A.



## NEW ENTRIES

<b>G-DROX (Cefadroxil)</b>	<b>GOOD HEALTH</b>		
Tab 500mg	10	110.00	N.A.
Kid Tab 125mg	10	28.00	N.A.
<b>GLENTONA</b>	<b>GLENMARK</b>		
(Liver Fraction 1 (derived from 4.167 gm fresh liver having vitamin B12 activity equiv to 1 mcg Cynocobalamin 166.68mg, Riboflavine 1mg, Nicotinamide 15mg, Pyridoxine Hcl 1mg, Calcium Pantothenate 2mg, Ferric Ammonium Citrate 30mg per 15ml)			
Syrup	200ml	29.50	25.27
<b>GLIMER (Glimepiride)</b>	<b>NICHOLAS</b>		
Tab, 1mg	10	N.A.	N.A.
2mg	10	N.A.	N.A.
<b>GLYCIGON-M</b>	<b>ARISTO</b>		
(Gliclazide 80mg, Metformin 500mg)			
Tab	10	37.00	30.36
<b>GOCOF</b>	<b>GOOD HEALTH</b>		
(Guaiphenesin 100mg, dextromethorphan Hydrobromide 10mg, Phenylpropanolamine Hcl 12.5mg, Chlorphediramine Maleate 4mg per 5ml)			
Syrup	60ml	30.75	N.A.
<b>GOPRIDE</b>	<b>GOOD HEALTH</b>		
(Cisapride 10mg)			
Tab	10	35.00	N.A.
<b>GOPRIDE MPS</b>	<b>GOOD HEALTH</b>		
(Cisapride 10mg, Simethicone 125mg)			
Tab	10	38.00	N.A.
<b>HALIDACE-T</b>	<b>BARODAPHARMA</b>		
(Haloperidol 1.5mg, Trihexyphenidyl Hcl 2mg)			
Tab	10	7.90	6.32
<b>HALIDACE-PLUS</b>	<b>BARODAPHARMA</b>		
(Haloperidol 5mg, Trihexyphenidyl Hcl 2mg)			
Tab	10	18.50	14.80
<b>HALIDACE-FORTE</b>	<b>BARODAPHARMA</b>		
(Haloperidol 10mg, Trihexyphenidyl Hcl 2mg)			
Tab	10	23.00	18.40
<b>HELPIDASE (Serritopeptidase)</b>	<b>EAST AFRICAN</b>		
Tab 10mg	10	57.50	48.87
<b>HISTARIV (Cetirizine)</b>	<b>EAST AFRICAN</b>		
Tab 10mg	10	15.00	12.75
<b>IPAMIDE (Sterile Ifosfamide 1gm)</b>	<b>ADBUR</b>		
Inj	Vial	330.00	N.A.
<b>IPRAVENTROTACALS</b>	<b>CIPLA</b>		
(Ipratropium Bromide 40mg)			
Cap	10	40.00	N.A.
<b>KEFDIL (Cefadroxil)</b>	<b>AJANTAPHARMA</b>		
Tab 250mg	10	50.00	N.A.
500mg	10	97.50	N.A.
<b>LISNOP (Lisinopril)</b>	<b>AJANTAPHARMA</b>		
Tab 2.5mg	10	15.50	N.A.
5mg	10	30.00	N.A.
<b>LISNOP AM</b>	<b>AJANTAPHARMA</b>		
(Lisinopril 5mg, Amlodipine 5mg)			
Tab	10	42.00	N.A.
<b>LYMPOGLOBULINE</b>	<b>AVENTIS PASTEUR</b>		
(Equine Anti-Human Thymocyte Globulin)			
Inj 100mg/5ml	Vial	3960.00	N.A.
<b>MANOCALM FORTE</b>	<b>MANOPHARMA</b>		
(Trifluoperazine 5mg, Trihexyphenidyl 2mg, Chlorpromazine 50mg)			
Tab	10	11.90	N.A.
(Trifluoperazine 5mg, Trihexyphenidyl 2mg, Chlorpromazine 100mg)			
Tab	10	19.50	N.A.
<b>MANOCALM PLUS</b>	<b>MANOPHARMA</b>		
(Trifluoperazine 5mg, Trihexyphenidyl 2mg)			
Tab	10	9.60	N.A.
<b>MANOCALM PLUSH</b>	<b>MANOPHARMA</b>		
(Trifluoperazine 2.5mg, Trihexyphenidyl 1mg)			
Tab	10	5.20	N.A.
<b>MEZAPIN-XR</b>	<b>LA PHARMA</b>		
(Carbamazepine)			
Tab 200mg	10	15.00	N.A.
400mg	10	30.00	N.A.
<b>MOBITONE</b>	<b>ADVIK</b>		
(Diclofenac Potassium 50mg, Paracetamol 500mg)			
Tab	10	12.00	9.84
<b>MOBITONE PLUS</b>	<b>ADVIK</b>		
(Diclofenac Sodium 50mg, Paracetamol 500mg, Chlorzoxazone 500mg)			
Tab	10	48.00	39.39
<b>NCA</b>	<b>TROIKAA</b>		
(Megaldrate 800mg, simethicone 50mg)			
Tab	10	12.75	10.44
<b>NIPOCEF</b>	<b>TTK</b>		
(Ceftazidime 1g)			
Inj	Vial	290.00	N.A.
<b>NORMOSPAS-DP</b>	<b>SYSTOPIC</b>		
(Dicyclomine Hcl 20mg, Diclofenac Sodium 30mg, Acetaminophen 325mg)			
Tab	10	16.00	N.A.
<b>NOTTY</b>	<b>EAST AFRICAN</b>		
(Norfloxacin 400mg, Tinidazole 600mg)			
Tab	10	5.81	4.92
<b>NOVACLOX-LB</b>	<b>OKASA PHARMA</b>		
(Amoxycillin 250mg, Cloxacillin 250mg, Lactic Acid Bacillus 60 million cells)			
Cap	6	30.00	N.A.
<b>NOVAMOX-AX</b>	<b>CIPLA</b>		
(Amoxycillin Trihydrate 500mg, Ambroxol Hydrochloride 30mg)			
Cap	6	42.80	N.A.
<b>NOVA TEN (Atenolol)</b>	<b>AJANTAPHARMA</b>		
Tab 50mg	10	18.45	N.A.
100mg	10	33.33	N.A.
<b>NOVA TEN AM</b>	<b>AJANTAPHARMA</b>		
(Atenolol 50mg, Amlodipine 5mg)			
Tab	10	29.50	N.A.
<b>OCUZINE EYE DROPS</b>	<b>CENTURE</b>		
(Zinc Sulphate 0.1%, Phenylephrine Hcl 0.12% w/v, Naphazoline Hcl 0.05% w/v, Menthol 0.005% w/v, Camphor 0.01% w/v per 10ml)			
Drop	10ml	17.31	N.A.



<b>ORCALMIN</b> <b>TTK</b> (Microcrystalline Hydroxyapatite complex (MCHC) equiv to 133mg of Calcium and 66mg of phosphorus)			
Tab	10	153.89	N.A.
<b>OVISTA</b> <b>DR. REDDY'S LAB</b> (Vit B6 3mg, Vit C12 150mg, Vit E 400mg, Folic Acid 1.5mg, Zinc 20mg, Selenium 100mcg)			
Cap	10	39.60	N.A.
<b>PIMO</b> (Pimozide) <b>MANOPHARMA</b>			
Tab	2mg	10	33.50
	4mg	10	45.50
<b>PROLIN</b> <b>LINCOLN</b> (Hydroxyprogesterone caproate 250mg per ml)			
Inj	1ml	35.00	N.A.
	2ml	56.00	N.A.
<b>PROPILAN</b> (Lansoprazole) <b>GLENMARK</b>			
Cap	15mg	10	24.00
	30mg	10	44.50
<b>PYRONIL</b> <b>KEYWEST</b> (Promethazine Hcl 2.5mg, Paracetamol 125mg per 5ml)			
Susp	60ml	16.95	14.24
	450ml	49.95	41.95
(Promethazine Hcl 10mg, Paracetamol 500mg)			
Tab	10	9.20	8.46
<b>PYRONIL PLAIN</b> <b>KEYWEST</b> (Paracetamol 125mg per 5ml)			
Susp	60ml	14.75	12.39
<b>REBECT-T</b> <b>EAST AFRICAN</b> (Ciprofloxacin 500mg, Tinidazole 600mg)			
Tab	10	84.00	71.40
<b>RELENT</b> <b>AMERICAN REMEDIES</b> (Cetirizine Hydrochloride 5mg, Ambroxol Hydrochloride 60mg)			
Tab	10	24.50	N.A.
<b>RIFIN FORTE</b> <b>RKG PHARMA</b> (Rifampicin, Isoniazid)			
Tab	450+300mg	10	65.00
<b>ROXYVIR</b> (Roxythromycin) <b>EAST AFRICAN</b>			
Tab	150mg	10	9.50
<b>RUBYL</b> <b>RKG PHARMA</b> (Vit b1 10mg, Vit B2 10mg, Vit B6 3mg, Vit B12 15mcg, Folic Acid 1mg, Niacinamide 50mg, Calcium Pantothenate 12.5mg, Vit C 150mg, Zinc Sulphate 54.93 mg)			
Cap	10	11.50	9.58
<b>SECKAA</b> (Secnidazole) <b>TROIKAA</b>			
Tab	500mg	4	34.00
	1gm	2	34.00
<b>SERECTIL</b> (Chlorpromazine) <b>BARODA PHARMA</b>			
Tab	50mg	20	8.56
	100mg	20	14.28
<b>SERENTIN</b> <b>BARODA PHARMA</b> (Trifluoperazine Hcl 5mg, Trihexyphenidyl Hcl 2mg)			
Tab	10	6.50	5.20
<b>SPASMIL-P</b> <b>SHAIMIL LAB</b> (Paracetamol 500mg, Dicyclomine Hcl 20mg)			
Tab	10	6.50	5.52
<b>T.ZINE</b> (Thioridazine) <b>MANOPHARMA</b>			
Tab	10mg	10	9.90
	25mg	10	19.20
	50mg	10	31.60
<b>TAVANIC</b> <b>HOECHST MARION</b> (Levofloxacin Hemihydrate 512.46mg Equiv. to Levofloxacin 500mg)			
Inj	25mg+5ml diluent Vial	6014.00	N.A.
<b>THYMOGLOBULINE</b> <b>AVENTIS PASTEUR</b> (Rabbit Anti-Human Thymocyte Immunoglobulin)			
Tab	10	95.00	N.A.
<b>TINCY</b> (Ciprofloxacin, Tinidazole) <b>GOOD HEALTH</b>			
Tab	500+600mg	10	95.00
<b>TINOM</b> (Ciprofloxacin, Tinidazole) <b>EAST AFRICAN</b>			
Tab	250mg+300mg	10	46.90
<b>TRAMAGO</b> (Tramadol Hcl) <b>GOOD HEALTH</b>			
Tab	50mg	10	60.00
<b>TRAXAL-O</b> (Cefixime) <b>INDOPROKEM</b>			
Tab	100mg	10	270.00
Susp	50mg/5ml	30ml	98.00
<b>TRINEUROSOL</b> <b>INDUS PHARMA</b> (Vit b1 50mg, Vit V6 100mg, Vit B12 1000mg per ml)			
Inj	2ml	5.15	4.15
<b>TRIPODERM</b> <b>PURE HEALTHCARE</b> (Clotrimazole 1%w/w, Beclomethasone Dipropionate 0.025%w/w, Gentamicin 0.01%w/w per gm)			
Cream	10gm	25.00	N.A.
<b>VALUCLOX</b> <b>AJANTA PHARMA</b> (Amoxycillin 250mg, Cloxacillin 250mg, Lactic Acid Bacillus 60million spores)			
Cap	10	42.50	N.A.
<b>WESTEL</b> <b>KEYWEST</b> (Prochlorperazine 5mg)			
Tab	10	7.84	6.27
<b>WESTO</b> <b>KEYWEST</b> (Diclofenac Sodium 50mg, Paracetamol 500mg)			
Tab	10	13.95	11.72
<b>WESTOGESIC</b> <b>KEYWEST</b> (Diclofenac Sodium 50mg, Paracetamol 325mg, Chlorzoxazone 250mg)			
Tab	10	26.95	22.64
<b>XEROPANE</b> (Nimesulide) <b>GOOD HEALTH</b>			
Tab	100mg	10	23.00
Susp	50mg/5ml	60ml	17.00
<b>ZEFONE</b> (Ceftriaxone) <b>ZYDUS ALIDAC</b>			
Inj	250mg	Vial	39.72
	1000mg	Vial	123.75
<b>ZINOSL</b> <b>INDUS PHARMA</b> (Sulphacetamide Sodium 10%, Sodium Chloride 0.85%, Boric Acid 1.8%, Zinc Sulphate 0.1%, Naphazoline Hcl 0.02% per vial)			
Tab	15ml	16.00	14.10
<b>ZYRTEC-D</b> <b>UCB</b> (Cetirizine 5mg, Pseudoephedrine 120mg)			
Cap	10	22.00	N.A.



ایک ہی خوراک میں علاج

## SINGLE DOSE TREATMENT



**ALBEZOLE**

**ZENTEL**

ZENTEL® An Original Product of SmithKline




(۱) ال بندازول (پیٹ کی کیڑوں کے لیے)

- زین ٹل

- ال بی زول

(۲) روسوکسا سین (سوزاک کے لیے)

- ارڈاسل



(۳) سلفامیتھاپازین پائی رامیتھامین

(ملیریا کے لیے)



(۴) فلوکونازول (لیکوریا، مہلی انفکشن میں)

- لاجی کین

- فورکان

- سیکنی ڈازول

In Vaginal Candidiasis

**LOGICAN** 150 mg  
(FLUCONAZOLE)

A Logical Alternative To Topical Antifungals

(P) Win-Medicare

**SECNIL**  
(Secnidazole Tabs.)

THE ORIGINAL SINGLE-DOSE  
NITROIMIDAZOLE RECOMMENDED FOR  
AMOEBIASIS/GIARDIASIS/LEUKORRHOEA





آسان اردو  
 زبان میں عورتوں اور بچوں  
 کے امراض پر ایک مفید معلوماتی  
 کتاب سو سے زائد امراض کے اسباب، علامات مجرب  
 ایلوپیٹھی اور یونانی علاج کا بیان۔ بچوں کی تربیت، پیدائش،  
 مڈوائفری پر قیمتی معلومات۔ استقرار حمل، شناخت، رکاوٹ، حفاظت حمل پر  
 بیش بہا معلومات، اس فن سے دل چسپی رکھنے والوں، اطباء و ڈاکٹروں کے  
 لیے بہترین تحفہ۔

صفحات ۱۶۰ با تصویر  
 قیمت: ۳۵ روپے ڈاک خرچ علاوہ

پتہ: ڈاکٹر عبدالجبار، ڈانگ ضلع پیلی بھیت۔ ۲۶۲۰۰۱



# نزلہ کھانسی، دمہ نمونیہ

ٹکا بجا گائیڈ

نزلہ زکام، کھانسی، دمہ، نمونیہ

اور ٹی بی پر مفصل اور مفید معلوماتی کتاب۔ ان امراض کی حقیقت،

اسباب، علامات، حفاظتی تدابیر، منتخب ایلوپیتھک اور یونانی علاج

اطباء ڈاکٹروں، اور ان امراض میں مبتلا افراد کے لیے بہترین

معلوماتی کتاب۔

قیمت - ۱۲/- روپے

پتہ: ڈاکٹر عبدالجبار، ڈانگ ضلع پبلی بھیت - ۲۶۲۰۰۱



# تندرستی ہزار نعمت ہے

تندرستی ہزار نعمت ہے

تنگدستی اگرچہ ہو غالب

• ہماری خوراک کے ضروری اجزاء • کیا کھائیں کیا نہ کھائیں کس غذا میں کون سے وٹامن پائے جاتے ہیں • پھلوں میوؤں سبزیوں کے فوائد • بیماریوں کے پرہیزی کھانے • نزلہ زکام احتیاطی تدابیر و علاج • قبض کا علاج غذا و دوا سے، • موٹاپا احتیاط و علاج • ملیریا بخار بچنے کی تدابیر و علاج • آنکھ ہے تو جہان ہے آنکھ کی روشنی کیسے بڑھے • تندرستی حاصل کرنے کے مفید مشورے • گھریلو کارآمد مفید نسخے • ورزش کے فوائد • صحت کے بارے میں نبی اکرم ﷺ کے ارشادات • اقوال حکماء • صحت کے زیر اصول • زیادہ کھانے کے نقصانات • دل ہی تو ہے، ہارٹ ایک احتیاطی تدابیر و علاج • کارآمد و مفید باتیں • خوش رہنے کے گر • پان تمباکو کے مضر اثرات علاج بالغسل ایک جرمن کی نادر و نایاب قیمتی کتاب کا خلاصہ • ان سب باتوں کو جاننے، پر مسرت اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے تندرستی ہزار نعمت نامی کتابچہ کا مطالعہ کیجئے دریا کوزے میں بند ہے۔

قیمت صرف ۵ روپے

پتہ: ڈاکٹر عبدالجبار، ڈانگ ضلع پبلی بھیت۔ ۲۶۲۰۰۱



## رہنمائے جنس اور مردانہ امراض

جنس اور مردانہ جنسی امراض کے موضوع پر ڈاکٹر عبد الجبار کی ایک اور مفید اور معلوماتی کتاب، نامردی ضعف باہ، سرعت رقت، جریان احتلام، آتشک سوزاک ایڈزو غیرہ امراض پر تحقیقات کا خلاصہ اسباب علامات مجرب یونانی ڈاکٹری اور ہومیو پیتھک علاج، جنسی معلومات کا خزانہ ۴۰ سوالات کے جوابات، جنسی زندگی کو پر مسرت بنانے کے بیش قیمت راز، مجرب نسخے، مفید غذائیں، جنس کے موضوع پر وہ سب کچھ جس کی آپ کو تلاش ہے۔

قیمت: اردو ۴۰ روپے

ہندی ۳۰ روپے

پتہ: ڈاکٹر عبد الجبار، ڈانگ ضلع پبلی بھیت۔ ۲۶۲۰۰۱



# جدید رہنمائے تشخیص

## New Diagnosis Guide

علم و فن تشخیص پر لا جواب کتاب، جس میں مریض کے معائنہ کا طریقہ، تشخیص کے قدیم و جدید ذرائع، تشخیص اور علاج کے اسرار و رموز، علامات موت، علامات فاروقہ جدید آلات سے تشخیص، ۱۰۰ الیو ریٹری ٹسٹ، پیشاب، پاخانہ بلغم سے تشخیص ۱۰۰ سے زائد مخصوص امراض و علاقے (Syndroms) کی تشخیص و علاج، اردو زبان میں منفرد معلوماتی اور مفید کتاب مریض کی پوزیشن دیکھ کر تشخیص کرنا، آپریشن کے لیے مریض کی پوزیشن علم و فن تشخیص پر آج تک ایسی کتاب شائع نہیں ہوئی ہر طبیب و ڈاکٹر کے لیے قیمتی تحفہ، تصاویر سے مزین۔

صفحات: ۳۲۰

قیمت: -/۱۲۰ روپے

پتہ: ڈاکٹر عبدالجبار، ڈانگ ضلع پبلی بھیت۔ ۲۶۲۰۰۱



## جدید رہنمائے علاج

حکیم، ڈاکٹروں رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنرز کے لیے بیش بہا تحفہ  
 • بنگال اردو اکیڈمی سے انعام یافتہ • آسان اردو زبان میں ڈاکٹری کی بہترین  
 کتاب، جدید معلومات سے لبریز اہم کتابوں کا نچوڑ۔ اس میں تین سو سے زائد  
 امراض کی تعریف اسباب و علامات و چوٹی کے بہترین ڈاکٹروں کا مجرب علاج،  
 جسمانی اعضاء کی مختصر تشریح مع فوٹو بیش قیمتی معلومات، مثلاً بلند پریشردیکھنا،  
 انجکشن لگانا، استھسکوپ، اینما کی تھیر، تھرمامیٹر لگانا، خون پیشاب، پاخانے کی طبعی  
 اور غیر طبعی حالت و جانچ کرنا مطب میں چلنے والے مکچر، مرہم و لوشن، نسخوں کے  
 اشارات و اوزان کی تشریح، فوائد کے لحاظ سے دواؤں کی تفصیل، کتاب کا قیمتی  
 حصہ ۳۰ سالہ مطالعہ اور تجربات کا خلاصہ ایک طبیب اور ڈاکٹر کو نامور بنانے،  
 مطب اور آمدنی بڑھانے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ انتہائی مفید ثابت ہوگا۔

دل کثر طباعت، صفحات ۴۰۸ مع تصاویر۔

اردو ایڈیشن ۸۰ روپے ڈاک خرچ علاوہ

ہندی ایڈیشن ۶۰ روپے

پتہ: ڈاکٹر عبد الجبار، ڈانگ ضلع پیلی بھیت۔ ۲۶۲۰۰۱



دریوشی میٹر آئل

دہی جڑی بوٹیوں اور پھلوں سے تیار کردہ

”دریوشی میٹر آئل“

بالوں کو مضبوط کرنا سفید ہونے سے روکتا اور اوران کو کالا

اور ملائم رکھتا ہے۔ نزلہ زکام سرد درد ماغی کمزوری کے لیے لاجواب ہے

قیمت ۱۰۰ ملی لیٹر - ۲۵ روپے

طبیعی بام

صرف بیرونی استعمال کے لیے

۱۔ درد کی بہترین اور قیمتی دواؤں سے تیار کیا جاتا ہے۔

۲۔ یہ دوسلین اسپرٹ اور رنگ کی خرابیوں سے پاک ہے۔

۳۔ درد کو فوراً آرام پہنچاتا ہے۔ کوئی خراب اثر نہیں کرتا ہے۔

۴۔ سر کے درد میں انگلی سے دوا کو پیشانی پر لگائیں۔

۵۔ سر چکرانے میں دوا کو بار بار سونگھیں اور کپہنی اور پیشانی پر لگائیں۔

۶۔ کینڑے مکوڑے بچھو وغیرہ کاٹنے پر روئی میں بھگو کر درد کے مقام پر رکھیں۔

۷۔ گھٹیا، نفرس میں درد کے مقام پر لگائیں۔

۸۔ نزلہ زکام میں دوا کو رومال میں لگا کر سونگھیں چند قطرے اٹلتے پانی میں ڈال کر بھپارہ لیں اور

پیشانی پر لگائیں۔

۹۔ نمونیہ اور پبلی کے درد میں درد کے مقام پر لگائیں۔

۱۰۔ پیٹ کے درد اور قونج میں مقام درد پر آہستہ آہستہ لگا کر کپڑا گرم پانی میں بھگو کر رکھیں۔

۱۱۔ دانت کے درد اور کپڑا لگنے میں یہ دوا درد کے مقام پر روئی میں بھگو کر رکھیں۔

۱۲۔ چھمروں سے بچنے کے لیے یہ بام لگائیے اور آرام سے سو جائیے۔

۱۳۔ کھلے زخم اور آنکھ میں دوا نہیں لگانی چاہیے۔

قیمت - ۵ روپے بجھنی کے لیے خصوصی رعایت

پتہ: ڈاکٹر عبد الجبار، ڈانگ ضلع پیلی بھیت - ۲۶۲۰۰۱



صرف بیرونی استعمال کے لئے

## درویشی تیل

ویدوں اور حکیموں کے تجربات کا  
نچوڑ، بھارت کا مشہور تیل ۲۵ جڑی  
بوٹیوں، سورنجان تلخ، ہلدی، انبہ  
ہلدی، دار ہلدی، کا پھل دیودار،  
لوبان، کچلہ، ہنگ، نر پجور، چھریلہ،  
بابونہ، سونٹھ، مال گنگنی، رائی تخم قرطم، بالچھڑ، لونگ، دارچینی، آک، سنبھالو کا عرق، لہسن، کافور،  
حناء وغیرہ سے تیار کیا جاتا ہے۔

- ۱۔ پرانے سے پرانے درد، ورم، موج، چوٹ، گٹھیا، کمر کا درد، پیٹھ اور کولھوں کے درد میں گرم کر کے مالش کریں۔
  - ۲۔ جلنے کٹنے، زخم، پھوڑے، بھنسی میں اس تیل کو لگا کر پٹی باندھیں۔
  - ۳۔ کان کے درد کان میں کچھ پڑ جانے میں اس تیل کو گنگنا کر کے ڈالیں۔
  - ۴۔ کمزور اور سوکھے مریضوں پر صبح کو روزانہ ایک بار مالش کریں۔
  - ۵۔ کھلی، خارش، ہاتھ پیروں کا پھٹنا، ہاتھ پیروں کی انٹھن میں مالش کر کے نبھائیں۔
  - ۶۔ کیڑے مکوڑے اور بچھو کے کاٹنے پر اس تیل کو روئی میں بھگو کر رکھیں۔
  - ۷۔ سردی نمونیہ، پیٹ کے ورم میں تیل لگا کر سنکائی کریں۔
  - ۸۔ جانوروں کے خراب زخم، کھر پکنا، کیڑے پڑ جانے پر تیل کا پھایہ رکھیں۔
  - ۹۔ کمزوری باہ میں اس تیل کو لگا کر بگلہ پان باندھیں۔
  - ۱۰۔ فالج، لقوہ، گردن کا اکڑ جانا، ریڑھ کے درد میں دن میں دو بار مالش کریں۔
  - ۱۱۔ بچوں کے چن چنوں میں مقعد کے اندر پھیری سے لگائیں۔
  - ۱۲۔ مچھروں سے بچنے کے لیے منہ ہاتھ پیروں پر ہلکی سی مالش کر کے آرام سے سوئیں۔
- قیمت:** ۱۰ ملی لٹر -/ ۷ روپے ۲۵ ملی لٹر -/ ۱۵ روپے ۵۷ ملی لٹر -/ ۳۰ روپے
- (ایجنسی کے لیے خصوصی امانت آج ہی لکھیں)

پتہ: ڈاکٹر عبدالجبار، ڈانگ ضلع پبلی بھیت۔ ۲۶۲۰۰۱





ریاحی و گیس کی تمام تکالیف، پیٹ پھولنا، پیٹ کا درد پیٹ میں  
جلن، دست آنا، ہچکچ، مروڑ اور گیس خارج نہ ہونے کے  
لیے اکسیر دوا، درویشی دوا خانہ کی مایہ ناز ایجاد  
ترکیب استعمال: ایک چمچ صبح و شام تازہ پانی سے کھائیں درود  
قبض کے وقت ایک چمچ گرم پانی سے کھائیں۔  
قیمت: ۶۵ گرام - ۱۲ روپے

فینہ شفاء للناس

## درویشی امرت رس

برسوں کی تحقیق کے بعد درویشی دوا خانہ نے دل دماغ اور عام جسمانی کمزوری کے لیے  
بہترین دوا "درویشی امرت رس" پیش کی ہے یہ اسکند دارچینی، آملہ، برہمی، الہی، مصری،  
شہد و غیرہ ۱۰ اجڑی بوٹیوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ امرت دل دماغ جگر نسوں پٹھوں میں نیا  
خون پہونچا کر ان کو طاقت بخشتا ہے۔ یادداشت کو تیز کرتا مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے نئی امنڈ  
اور نیا جوش پیدا کرتا ہے۔ ۳۰ دن کے استعمال سے حیرت انگیز فائدے حاصل ہوتے ہیں۔

قیمت: ۷۵ گرام - ۲۰ روپے  
۵ گرام ایک چمچ صبح و شام دودھ یا پانی سے کھائیں۔

پتہ: ڈاکٹر عبدالجبار، ڈانگ ضلع پبلی بھیت۔ ۲۶۲۰۰۱



## شاہی ٹانک پلز

عنبر، زعفران، کشتہ فولاد و شکر ف و غیرہ سے تیار کردہ گولیاں بھوک کی کمی، ضعف باہ، دائمی نزلہ زکام فالج لقوہ، عام جسمانی و دماغی کمزوری، گٹھیا و غیرہ میں مفید اور بے نظیر ہیں اس سے

بے انتہا بھوک لگتی ہے دودھ بھی خوب ہضم ہوتا ہے۔

۲-۲ گولی کھانے کے بعد کھائیں۔ کمزور مریض یا بچے صرف ایک ایک گولی کھانے کے بعد کھائیں۔  
قیمت: ۶۰ گولی ۶۰ روپے

## ہینی مون گولڈن

زعفران، سلاجیت، کشتہ فولاد و غیرہ قیمتی دواؤں سے تیار کردہ سنہری گولیاں طاقت میں اپنی مثال آپ ہیں۔ طاقت، لذت اور امساک کے لیے بیش بہا تحفہ۔ اس کے استعمال سے نئی طاقت نیا جوش پیدا ہوتا ہے۔

پی۔ بی۔

مایوس مریضوں کے لیے امید کی کرن، زندگی کا حقیقی لطف حاصل کرنے کے ”ہینی مون گولڈن پی۔ بی۔“ استعمال کر کے دیکھئے۔ دو گولی سوتے وقت دودھ یا تازہ پانی سے کھائیں۔

قیمت: ۱۲ گولی -/۶۰ روپے



## طلاء درویشی مشکی

نوجوانوں کی غلطیوں اور بد اعمالیوں کے سبب جو کمزوری پیدا ہوتی ہے طلاء مشکی اس گے لیے لا جواب چیز ہے۔ اس کے استعمال سے مردہ رگوں میں دوران خون تیز ہو کر نسوں پٹھوں میں نئی طاقت حاصل ہوتی ہے مایوس اور لاعلاج مریضوں کے لیے لا جواب چیز۔ شب میں عضو مخصوص پر دو قطرے لگائیں۔

قیمت ۵ ملی لٹر -/۳۵ روپے

## درویشی منجن

روغن لونگ والا

۳۲ جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ بھارت کا واحد منجن ہے جو دانتوں کے درد، مسوڑھوں کے ورم، پانی لگنا، منہ سے بد بو آنا ہر طرح کی دانتوں کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ دانتوں کو مضبوط اور چمکدار بناتا ہے۔ ہر شخص کے لیے ہر گھر کے لیے ایک ضروری چیز۔

قیمت ۵ گرام

-/۱۲ روپے

پتہ: ڈاکٹر عبد الجبار، ڈانگ ضلع پیلی بھیت۔ ۲۶۲۰۰۱